

GB23200.121&113　农残检测前处理：蔬菜/水果/食用菌/糖料



GB23200.121&113　农残检测前处理：谷物、油料和坚果



GB23200.121&113　农残检测前处理：茶叶和香辛料



GB23200.121&113　农残检测前处理：植物油



8. 1. 1 肌肉、禽蛋

称取试样（5±0.05）g 于 50 mL 离心管中，加入 3.0 mL 0.1mol/LMcllvaine-Na_2EDTA 缓冲溶液，涡旋 10 s，加入 10.0 mL 乙腈，涡旋混匀后，振荡 10 min，4000 r/min 离心 5 min，转移上清液于另一 50 mL 离心管中，残渣用 3.0 mL 0.1 mol/LMcllvaine-Na2EDTA 缓冲溶液和 10.0 mL 乙腈重复提取，合并两次上清液。上清液加入 6 g 无水硫酸钠和 1.5 g 氯化钠，涡旋 30 s，静置 10 min 后 7000 r/min 离心 5 min，吸出上层液（乙腈层）备用。

8. 1. 2 牛奶、羊奶

称取试料（5±0.05）g 于 50 mL 离心管中，加入 20.0 mL 乙腈，涡旋混匀后，振荡 10 min，7000 r/min 离心 5 min，转移上清液于另一 50 mL 离心管中。上清液加入 4 g 无水硫酸钠和 1 g 氯化钠，涡旋 30 s，静置 10 min 后 7000 r/min 离心 5 min，吸出上层液（乙腈层）备用。

8. 2　净化

HyperSep Retain PEP 小柱依次用 4 mL 甲醇和 4 mL 水活化平衡后，取 2 mL 备用液润洗小柱，弃去流出液。再移取适量备用液通过小柱，收集流出液并准确移取 4 mL 于 40 ℃下氮吹干，加入 200 μL 甲醇后涡旋混匀 10 s，再加入 800 μL 纯水涡旋混匀 30 s，超声 2 min 后，过 0.22 μm 尼龙微孔滤膜，上机测定。

文本