

Expérimenté	Non-saisonnier long	Afrique	Sur le substrat/ fosse
Fundulopanchax sjoestedti			
			
Biotope – description Grand Aphyosemion semi-annuel, membre du groupe Sjoestedti. On le rencontre dans les plaines côtières avec de l'eau douce pure dans la forêt primaire. Il occupe des points d'eau parfois temporaires d'eau stagnante sur substrat plus sombre et sale (feuilles mortes, paillis) sans courant.		Populations les plus fréquentes : principalement les importations commerciales . On trouve des poissons avec les populations : Loé, Fungé, Niger Delta	
PH: Acide (6-6,5)	dureté/conductivité:140	Température :22-24	
Taille adulte : 9-15 cm	Volume : 30 L	Maintenance : couple ou 1 mâle et plusieurs femelles	
Incuber : humide	Durée : 4-8 semaines	Début: artemias	Croissance : rapide



Principe d'élevage : dans l'aquarium de reproduction, il est conseillé de garder un mâle avec plusieurs femelles, car cela tend à minimiser toute agression ; les œufs sont déposés sur le substrat et le mouvement du couple pendant le frai fait que les œufs sont enterrés sous la surface du substrat, par exemple, de la tourbe bouillie et bien rincée (exempte d'engrais ou d'autres produits chimiques) ; il peut être préférable de placer la tourbe dans un bol ou un autre récipient (avec un trou de 5 cm sur le dessus) à l'intérieur de l'aquarium afin d'éviter qu'elle ne soit polluée par de la nourriture non consommée et de la confiner ; on peut également utiliser des serpillières immergées ou des fibres de tourbe comme substrat de ponte ; l'eau doit être neutre à légèrement acide ; après 7 à 10 jours d'activité de ponte, la tourbe contenant les oeufs peut être retirée et laissée sécher jusqu'à un état légèrement humide, puis stockée dans un sac en plastique scellé et étiqueté pour la période d'incubation appropriée à une température d'environ 25°C ; ensuite, les oeufs peuvent être examinés et, si les embryons sont complètement développés (les yeux des embryons doivent être clairement et nettement visibles), la tourbe avec les oeufs est immergée dans l'eau à une température de plusieurs degrés inférieure à celle à laquelle les oeufs sont stockés : les alevins éclosent généralement en quelques heures ("poissons instantanés") ; la tourbe est re-séchée et stockée pendant 3 à 4 semaines supplémentaires pour permettre le développement des oeufs restants : le mouillage de la tourbe re-séchée peut provoquer une nouvelle éclosion d'alevins ; il est préférable de séparer les mâles et les femelles dès qu'ils deviennent sexables, à moins que le rapport des sexes ne soit fortement déséquilibré (dans ce cas, il est conseillé d'isoler les alevins non sexués par groupes de 3 à 5 dans des aquariums séparés pour obtenir un équilibre).