Ders 2:

- Gauss'u zorlayalım © 1'den N'e kadar olan sayıların çarpımı?
 - O Stirling Formülü: $n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$ iyi güzel ama yaklaşık. Peki kaç işlem?
 - o n. dereceden üs var. Yani n işlem 🟵. İyi ama n! zaten n işlemdi.
 - O Ama xⁿ 'i log₂n ile çözmek mümkün. İlerleyen derslerde göreceğiz. Yani n!'i log₂n işlemle bulabiliyoruz tabi yaklaşık olarak.
- xⁿ i bulalım.

```
x=1;
for i=1:n
    x=x*x;
end
```

oldu mu?

- $\pi = 4 \frac{4}{3} + \frac{4}{5} \frac{4}{7} + \cdots$ ne kadar fazla terimi hesaplarsak o kadar yaklaşırız.
 - o if'l
 - o -1'li
- $e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$
 - o Her adımda xⁿ ve n!'i bulup bölüp topla
 - o $x^{n+1}=x^n*x$ ve (n+1)!=n!*n ile daha hızlı çözüm
- n. Fibonacci sayısını bulmak. f(1)=1, f(2)=1, f(n)=?
 - o dizi ile

```
F(1)=1; F(2)=1;
for i=3:n
F(i)=F(i-1)+F(i-2);
end
```

o dizisiz, i hariç, 3 değişkenli çözüm

```
f1=1;
f2=1;
for i=3:n
     fn=f1+f2;
    f1=f2;
    f2=fn;
end
```

- Ama ikisi de n işlem gerektiriyor. Daha iyisini ilerideki derslerde göreceğiz.
- 1-1000 arası basamaklarının küplerinin toplamı kendisine eşit sayıları bulmak:
 - 0 1, 153, 370, 371
- Bir sayının bir dizi içinde ilk, ikinci, n., son (?) geçtiği yeri bulmak (while)
 - Tüm geçtiği yerleri bulmak (for)
- Aşağıdaki önerme doğru mudur?
 - \circ $\forall n \in \mathbb{N}^+, n^2 + n + 41 \text{ asal sayıdır.}$
 - 0<N<39 için doğru. N=40 için yanlış. O halde önerme yanlış.
- Aşağıdaki önerme doğru mudur?
 - $\circ \neg \exists a, b, c, d \in \mathbb{N}^+, a^4 + b^4 + c^4 = d^4$
 - O Diğer bir deyişle $a^4 + b^4 + c^4 = d^4$ denkleminin doğal sayılar kümesi içinde bir çözümü yoktur.
 - o Ama var. a=95800, b=217519, c=414560, d=422481
 - Bu önermenin yanlışlığı anca 1988'de bulunabilmiş. Neden acaba?

Yapısal Programlamaya Giriş, BBG2 ders notları, Mehmet Fatih Amasyalı

- Sonuç olarak bir önermenin doğruluğunu göstermek için çalışan binlerce örneğe güvenemeyiz. Bir önermenin yanlışlığını göstermek için bir karşıt örnek yeter. Ama doğruluğu göstermek için ispat gerekir.
- 2 haricindeki her çift tam sayı 2 asal sayının toplamıdır.
 - o Bu önermenin doğruluğu ya da yanlışlığı bilinmiyor.