

$$(y'')^2 + y(y')^3 + yx = \emptyset$$

Modeli
transfer fonksiyonu
eşitlik
Bağıntı

$$y' + x = \emptyset$$

$$\frac{dy}{dx} + x = \emptyset$$

$$\int dy = \int -x \cdot dx$$

Bu yöntemler karmaşık problemlerde işe yaramaz

$$y = \frac{-x^2}{2} + C$$

$$\sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt{17} = y$$

$$\sqrt{4^2} = 4^{2/2} = 4^1$$

$$4^2 < \sqrt{17} < 5^2$$

4.1^2 4.5^2

---

2 sayı sistemi ⟶ 4, 8, 16, 10

$2^3\ 2^2\ 2^1\ 2^0$

$(t\ z\ y\ x)_2 \longrightarrow 8$

$(t2^3 + z2^2 + y2^1 + x2^0)_{10}$

$\longrightarrow (\ )_8$

$(\underset{2}{01}\ \underset{1}{01}\ \underset{3}{11}\ \underset{1}{01}\ \underset{1}{01})_4$ ⟶ 2'lik sistemdeki sayı sistemini 2'şerli sıralarsak 4'lük sayı sistemine geçeriz

$\underline{10}\ \underline{01}\ \underline{11}\ \underline{01}\ \underline{01}$

$(1\ 1\ 6\ 5)_8$

100111010_1

$(2 * 5)_H$

Sayfa 17

1000 → 300⁻

1000 → 700⁺

	+	−
+	600	100
−	50	250

$\frac{600 + 250}{1000}$

↳ $\frac{250}{300} \cdot \frac{600}{700}$ → Bu hassasiyetimizdir