

Entrevista 1

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, desde hace tres semanas tengo un dolor constante en la parte baja de la espalda que apareció después de ayudar a mi hijo a mudarse. El dolor es moderado, como un 6 de 10, y empeora cuando me quedo mucho tiempo de pie en el trabajo. Puedo caminar distancias cortas sin problema, pero después de 10-15 minutos necesito sentarme. Para lavarme los dientes o vestirme por las mañanas tengo que hacerlo más despacio y a veces me apoyo en la pared. No puedo cargar las bolsas del supermercado como antes, ahora le pido ayuda a mi esposa. Cuando estoy sentado en la oficina estoy bien las primeras horas, pero después de mediodía el dolor aumenta. Los viajes largos en coche son un problema, tuve que parar tres veces en mi último viaje de dos horas. He cancelado algunas salidas con amigos porque no me siento cómodo. La intimidad con mi pareja se ha visto afectada por el dolor. Duermo bien la mayor parte de las noches, aunque a veces me despierto si me giro bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, con un intensidad de 6/10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias sin problemas, pero necesita sentarse después de 10-15 minutos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede andar, pero con dificultades al prolongar la actividad.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para realizar cuidados personales como lavarse los dientes o vestirse debido a que se tiene que hacer más despacio.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente no puede cargar bolsas del supermercado como antes y necesita ayuda.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse en la oficina durante las primeras horas, pero el dolor aumenta después de mediodía.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente tiene problemas para viajar en automóvil por largas distancias y ha tenido que parar tres veces en su último viaje.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha cancelado algunas salidas con amigos debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad con su pareja se ha visto afectada por el dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme bien la mayor parte de las noches, aunque despertarse si se gira bruscamente.

Total: 21 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (21-40 puntos).

Puntuación esperada: 14 | Modelo: 22 | Diferencia: 8

2%|| | 2/126 [00:48<49:13, 23.82s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 2

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Llevo dos días con una pequeña molestia en la zona lumbar izquierda. Creo que fue por el ejercicio del fin de semana, hice una rutina nueva en el gimnasio. Es más una molestia que un dolor real, tal vez un 2 de 10. Puedo estar de pie trabajando en mi taller sin problemas, camino normal tanto distancias cortas como largas. Me visto y me aseo sin ninguna dificultad. Ayer cargué unas cajas pesadas sin problema, aunque sí noté un poquito más la molestia. En el trabajo paso muchas horas sentado frente al computador y no me molesta para nada. El fin de semana fui a visitar a mis padres, un viaje de 3 horas, y llegué perfecto. Anoche salí a cenar con unos amigos y la pasé muy bien, sin pensar en la espalda. Con mi pareja todo normal, no hay ningún impedimento. Duermo excelente, no me ha despertado ni una sola vez." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (el paciente describe la sensación como "una pequeña molestia" y un "2 de 10", lo que sugeriría un bajo nivel de dolor)

2. Estar de pie: 0 puntos (el paciente puede trabajar en su taller sin problemas y caminar sin dificultad)

3. Andar: 0 puntos (el paciente puede caminar normalmente tanto cortas como largas distancias)

4. Cuidados personales: 0 puntos (el paciente puede verse y asearse sin problemas)

5. Levantar peso: 1 punto (el paciente notó un poco más de molestia al levantar cajas pesadas)

6. Estar sentado: 0 puntos (el paciente pasa muchas horas sentado en el trabajo sin molestia)

7. Viajar: 0 puntos (el paciente pudo hacer un viaje de 3 horas sin problemas)

8. Vida social: 0 puntos (el paciente pudo salir a cenar con amigos sin problemas)

9. Actividad sexual: 0 puntos (el paciente informó que todo está normal en este aspecto)

10. Dormir: 0 puntos (el paciente duerme excelentemente y no ha despertado durante la noche)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtuvo un total de 2 puntos de discapacidad, lo que sugiere un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 3 | Diferencia: 3

2% | 3/126 [01:15<51:55, 25.33s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 3

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda baja es insoportable, llevo así cuatro meses desde mi accidente laboral. El dolor es constante, un 9 de 10, y nunca desaparece completamente. No puedo estar de pie más de 2-3 minutos porque el dolor se vuelve inaguantable. Caminar más de 10 metros es imposible, necesito sentarme o recostarme inmediatamente. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, me siento en una silla especial, y vestirme me toma 20 minutos con mucha dificultad. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera una taza de café sin que el dolor se dispare. Estar sentado también es problemático, después de 15-

20 minutos el dolor aumenta terriblemente. Los viajes son imposibles, no he salido de casa en semanas. He perdido contacto con todos mis amigos, no puedo participar en ninguna actividad social. La intimidad con mi pareja es inexistente desde el accidente. Duermo fatal, me despierto cada hora por el dolor, necesito analgésicos fuertes para poder descansar algo." [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos (máximo) - El paciente describe que su dolor es constante y de intensidad 9 de 10, lo que representa el máximo nivel de intensidad de dolor en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 2-3 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar más de 10 metros debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse, vestirse y sentarse, lo que representa un gran nivel de dificultad en realizar estas actividades.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar absolutamente nada debido al dolor.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo por 15-20 minutos antes de que el dolor aumente terriblemente.

7. Viajar: 0 puntos - Los viajes son imposibles debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido contacto con todos sus amigos y no puede participar en ninguna actividad social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad con su pareja es inexistente desde el accidente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y necesita analgésicos fuertes para poder descansar algo.

Basado en la información proporcionada, el paciente presenta una discapacidad severa lumbar según la escala Oswestry, con un puntaje total de 31 puntos (máximo 50).

Puntuación esperada: 42 | Modelo: 16 | Diferencia: 26

3% | 4/126 [01:42<53:13, 26.18s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 4

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar desde hace un mes después de una caída en casa. El dolor es considerable, como un 7 de 10 en los momentos más intensos. Puedo estar de pie unos 10-15 minutos antes de que el dolor me obligue a sentarme. Caminar distancias cortas está bien, pero para ir al supermercado necesito usar el carrito como apoyo. En el baño tengo que ir más despacio, especialmente para ducharme, a veces

me apoyo en las paredes. Vestirme por las mañanas es complicado, sobre todo ponerme los calcetines y zapatos. No puedo cargar las bolsas de la compra, mi hija me ayuda con eso. En el trabajo, donde paso mucho tiempo sentado, las primeras horas van bien pero después necesito levantarme frecuentemente. Los viajes en auto son incómodos, en trayectos de más de una hora necesito parar a estirarme. He reducido mis salidas sociales a la mitad, solo voy a eventos muy importantes. La relación íntima con mi pareja se ha complicado, tenemos que ser muy cuidadosos con las posiciones. Duermo regular, me despierto 2-3 veces por noche por el dolor y me cuesta volver a dormir." [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como un 7 de 10, lo que representa un dolor moderado a intenso.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo unos 10-15 minutos antes de sentarse debido al dolor.

3. Andar: 3 puntos - Caminar cortas distancias está bien, pero necesita usar un carrito de compras como apoyo.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente tiene dificultades para vestirse y necesita ayuda para cargar las bolsas de la compra.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente no puede levantar las bolsas de la compra.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse durante las primeras horas en el trabajo, pero necesita levantarse frecuentemente.

7. Viajar: 2 puntos - Los viajes en auto son incómodos y necesita parar para estirarse en trayectos de más de una hora.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido drásticamente sus salidas sociales.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La relación íntima se ha complicado debido a la necesidad de ser cuidadosos con las posiciones.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente pero se despierta 2-3 veces por noche por el dolor y tiene dificultades para volver a dormir.

La puntuación total de la entrevista es de 26 puntos. Según el rango de puntuación de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una moderada a severa discapacidad lumbar (22-40 puntos).
Puntuación esperada: 22 | Modelo: 27 | Diferencia: 5

4% | 5/126 [02:08<52:10, 25.87s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 5

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi problema de espalda comenzó hace seis meses de manera gradual. Al principio era solo una molestia, pero ahora es un dolor intenso, entre 8 y 9 de 10. Estar de pie es muy difícil, máximo puedo aguantar 5 minutos antes de que el dolor sea insoportable. Caminar más de 20-30 metros me resulta extremadamente doloroso, tengo que parar y buscar donde sentarme. Para mi higiene personal necesito mucha ayuda, mi esposo me ayuda a bañarme porque no puedo inclinarme. Vestirme es una tortura diaria, especialmente la ropa interior y los zapatos, me toma casi media hora. Levantar cualquier cosa, incluso un plato, me causa dolor severo. Sentarme también es problemático, después de 10 minutos el dolor se

intensifica muchísimo. No puedo viajar para nada, el último intento en auto fue hace dos meses y tuve que regresar. Mi vida social ha desaparecido completamente, no salgo de casa salvo para citas médicas. La intimidad es imposible, cualquier movimiento me duele. Las noches son terribles, duermo máximo 2-3 horas seguidas, el dolor me despierta constantemente." [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso, de magnitud entre 8 y 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede aguantar más de 5 minutos de estar de pie debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso y requiere que parar y buscar donde sentarme.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar cuidados personales, como bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier cosa, incluso un plato.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse, pero el dolor se intensifica después de 10 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido completamente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es imposible debido al dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme máximo 2-3 horas seguidas y el dolor le despierta constantemente.

Según la escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 15 puntos (suma de los puntos obtenidos en cada ítem). Una puntuación total superior a 30 indica una gran discapacidad. En este caso, el paciente presenta una discapacidad grave.

Puntuación esperada: 44 | Modelo: 26 | Diferencia: 18

5% | 6/126 [02:20<42:23, 21.19s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 6

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, llevo aproximadamente tres semanas con dolor en la parte baja de la espalda. Comenzó después de ayudar a mi hermano a mudarse, cargando cajas pesadas. Al principio pensé que era solo cansancio, pero el dolor ha ido aumentando gradualmente. Por las mañanas me cuesta trabajo levantarme de la cama, siento rigidez y dolor que mejora un poco cuando camino. Durante el día, especialmente cuando estoy sentado en mi trabajo de oficina por más de una hora, el dolor se intensifica. He tenido que tomar ibuprofeno cada 6 horas para poder funcionar. Caminar distancias largas se ha vuelto difícil, antes podía caminar sin problemas al centro comercial, ahora tengo que detenerme a descansar. Para vestirme necesito sentarme, ya no puedo inclinarme fácilmente. El fin de semana tuve que cancelar una cita porque no me sentía cómodo para salir. Por las noches, encontrar una posición cómoda para dormir es complicado, me despierto varias veces por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Maximum intensity)

2. Estar de pie: 3 puntos (Requires some modification of activities)

3. Andar: 2 puntos (Moderate difficulty)

4. Cuidados personales: 4 puntos (Some limitation)
5. Levantar peso: 5 puntos (Unable to perform)
6. Estar sentado: 3 puntos (Requires some modification of activities)
7. Viajar: 1 puntos (No travel limitation)
8. Vida social: 2 puntos (Moderate social interference)
9. Actividad sexual: 3 puntos (Some limitation)
10. Dormir: 3 puntos (Some difficulty)

Total: 25 points out of 50 (50 being no disability). The patient reports significant disability due to low back pain.

Puntuación esperada: 15 | Modelo: 23 | Diferencia: 8

6% | 7/126 [02:41<41:55, 21.13s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 7

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días, doctor. Vengo porque desde hace dos días tengo una ligera molestia en la espalda baja. Creo que fue por haber dormido en una posición extraña el fin de semana cuando me quedé en casa de mis padres en un sofá cama que no era muy cómodo. Es más bien una sensación de tirantez que un dolor fuerte. Puedo hacer todas mis actividades normales sin problemas: trabajo, caminar, hacer ejercicio ligero. No he necesitado tomar ningún medicamento porque realmente no me molesta tanto. Duermo perfectamente en mi cama, solo siento la molestia cuando me levanto por las mañanas, pero desaparece rápidamente después de unos minutos. Ayer fui al gimnasio y pude hacer mi rutina normal sin inconvenientes, aunque evité levantar pesas muy pesadas por precaución. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una sensación de tirantez, no un dolor fuerte.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente puede caminar normalmente.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente evitó levantar pesas muy pesadas por precaución.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al estar sentado.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente puede participar en su vida social normalmente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informa de problemas en la actividad sexual.

10. Dormir: 1 punto - El paciente solo siente la molestia al despertar, que desaparece rápidamente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 3 puntos. El puntaje total puede variar desde 0 (sin discapacidad) hasta 50 (discapacidad máxima). En este caso, el paciente presenta una leve discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

6% | 8/126 [03:13<48:12, 24.52s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 8

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es terrible, llevo dos meses así y cada día empeora. Comenzó después de un accidente menor que tuve en el trabajo, me resbalé y caí. El dolor es constante, incluso estando en reposo siento punzadas intensas. No puedo estar de pie más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar más de media cuadra es imposible, tengo que usar bastón. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, no puedo inclinarme ni girarme. Levantar cualquier cosa, incluso una taza de café, me causa dolor severo. Estar sentado también es problemático, no aguanto más de 20 minutos. He tenido que faltar al trabajo constantemente. Mi vida social ha desaparecido completamente, no puedo ir a ningún lado. La intimidad con mi pareja es impensable por el dolor. Duermo muy mal, me despierto cada hora por el dolor, he probado diferentes posiciones y ninguna funciona. Tomo analgésicos fuertes cada 4 horas pero apenas me alivian. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como terrible y constante, incluso cuando reposa. El dolor es intolerable después de 10 minutos de estar de pie y hace que caminar menos de media cuadra sea imposible. El paciente necesita ayuda para realizar tareas personales y levantar objetos pequeños, y el dolor también le impide sentarse por más de 20 minutos. El paciente ha tenido que faltar al trabajo y ha perdido su vida social debido al dolor. El dolor hace que la intimidad con su pareja sea impensable y le impide dormir adecuadamente. El paciente está tomando analgésicos fuertes regularmente, pero ellos no le alivian suficientemente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar más de media cuadra debido al dolor.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda de su esposa para bañarse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente describe que levantar cualquier cosa causa dolor severo.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse por unos 20 minutos, pero describe que es problemático.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido su vida social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad con su pareja es impensable debido al dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta cada hora por el dolor.

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente tiene un puntaje total de 21 puntos. El puntaje total puede variar desde 0 a 50 puntos, con un puntaje
Puntuación esperada: 40 | Modelo: 21 | Diferencia: 19

7% | 9/126 [03:44<51:58, 26.66s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 9

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, desde hace una semana tengo dolor en la zona lumbar que me está afectando moderadamente. Empezó después de hacer jardinería el fin de pasado, estuve agachado mucho tiempo plantando flores. El dolor es más notorio por las mañanas al levantarme y cuando llevo mucho tiempo en la misma posición. Puedo trabajar normalmente, pero tengo que cambiar de posición frecuentemente.

Caminar no me duele, pero después de caminar más de 6 cuerdas empiezo a sentir molestias. Para vestirme y bañarme no tengo grandes problemas, aunque me toma un poco más de tiempo de lo normal porque trato de evitar movimientos bruscos. He evitado cargar cosas pesadas como las bolsas del supermercado, le pido ayuda a mi familia. Estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo. No he cancelado planes sociales, pero sí he rechazado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie. Duermo relativamente bien, aunque a veces tengo que acomodarme varias veces durante la noche. [INST] 1.

Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede caminar sin dolor, pero solo por cortas distancias y necesita cambiar de posición frecuentemente, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

3. Andar: 3 puntos - El paciente tiene dolor al caminar después de caminar más de 6 cuerdas, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente tiene algún dificultad en vestirse y bañarse, pero no especifica que sea un problema significativo, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente evita levantar cosas pesadas, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente se encuentra desconfortable sentado por más de una hora, por lo que se le asigna un puntaje de 4.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente no especifica problemas al viajar, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha rechazado algunas invitaciones debido a estar mucho tiempo de pie, pero no ha cancelado planes sociales, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no menciona problemas en la actividad sexual, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme relativamente bien, aunque necesita acomodarse varias veces durante la noche, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

La puntuación total es de 22 puntos, lo que corresponde a un grado moderado de discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 10 | Modelo: 21 | Diferencia: 11

8% | 10/126 [04:10<51:18, 26.54s/it] You seem to be using the pipelines sequentially on GPU. In order to maximize efficiency please use a dataset
Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 10

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días. Tengo dolor lumbar desde hace un mes y medio que está interfiriendo significativamente con mi vida diaria. Todo comenzó cuando me agaché para recoger algo del suelo en la oficina y sentí como un tirón fuerte. El dolor es intenso, especialmente por las mañanas y al final del día. Estar de pie es muy problemático, no puedo mantenerme erguido por más de 15-20 minutos sin que el dolor se intensifique considerablemente. Caminar se ha vuelto difícil, puedo hacerlo pero con dolor constante, evito salir a menos que sea necesario. Para las actividades básicas como ducharme o vestirme necesito tomarme mucho más tiempo y hacerlo muy lentamente, a veces mi pareja me ayuda con los zapatos. No puedo levantar nada pesado, incluso las bolsas de la compra me causan dolor. Sentarme también es problemático, especialmente en sillas normales, necesito cojines especiales. He cancelado varios compromisos sociales porque no me siento cómodo fuera de casa. La vida íntima se ha visto muy afectada. El sueño es irregular, me despierto varias veces por el dolor y me cuesta encontrar posiciones cómodas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso y constante, especialmente por las mañanas y al final del día.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente puede mantenerse de pie, pero solo por 15-20 minutos antes de que el dolor se intensifique considerablemente.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar, pero con dolor constante.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita tomarse mucho más tiempo para realizar actividades básicas como ducharse o vestirse, y a veces necesita ayuda de su pareja con los zapatos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra sentarse problemático, especialmente en sillas normales, y necesita cojines especiales.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha cancelado compromisos sociales debido a su dolor lumbar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado varios compromisos sociales debido a su dolor lumbar.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente ha indicado que la vida íntima se ha visto muy afectada.

10. Dormir: 1 punto - El paciente tiene problemas irregulares al dormir debido al dolor lumbar y tiene dificultades para encontrar posiciones cómodas.

Resumen: El paciente presenta un total de 14 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, lo que indica un nivel de discapacidad moderada a grave.

Puntuación esperada: 23 | Modelo: 10 | Diferencia: 13

9% | 11/126 [04:32<48:13, 25.16s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 11

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, vengo por un dolor en la espalda baja que tengo desde hace cinco días. Creo que fue por cargar mal una maleta pesada cuando regresé de viaje. Es un dolor molesto pero manejable. Puedo hacer la mayoría de mis actividades cotidianas sin mayor problema. En el trabajo, que es principalmente de escritorio, puedo estar sentado sin dolor, aunque noto cierta incomodidad después de varias horas seguidas. Caminar es normal, fui ayer al parque con mis hijos y no tuve problemas. Para la higiene personal y vestirme no tengo dificultades. Sí he notado que levantar cosas pesadas me causa molestia, así que he evitado cargar las compras del supermercado. No he tenido que cancelar ningún plan social, aunque sí fui más precavido en una reunión familiar evitando ciertos movimientos. El sueño ha sido bueno, solo noto la molestia al cambiar de posición durante la noche, pero no me despierta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (el paciente describe el dolor como manejable y molesto, por lo que se puede considerar un nivel bajo de intensidad)

2. Estar de pie: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al caminar)

4. Cuidados personales: 0 puntos (el paciente no reporta dificultades en el cuidado personal)

5. Levantar peso: 1 punto (el paciente reporta que levantar cosas pesadas le causa molestia, por lo que se puede considerar un nivel bajo de dificultad)

6. Estar sentado: 1 punto (el paciente reporta una cierta incomodidad al sentarse durante muchas horas seguidas)

7. Viajar: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al viajar)

8. Vida social: 0 puntos (el paciente no reporta haber cancelado planes sociales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (el paciente no reporta problemas en la actividad sexual)

10. Dormir: 1 punto (el paciente reporta solo una molestia al cambiar de posición durante la noche, por lo que se puede considerar un nivel bajo de problemas)

Basado en la entrevista, el paciente presenta un total de 4 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, lo que indica una baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3

10% | 12/126 [05:02<50:26, 26.55s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 12

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es realmente grave, llevo cuatro meses así y mi calidad de vida se ha deteriorado completamente. El dolor comenzó gradualmente después de una mala caída en las escaleras de mi casa. Ahora el dolor es constante e intenso, una sensación punzante que no me da tregua ni siquiera en reposo. No puedo estar de pie prácticamente nada, máximo 5 minutos antes de que el dolor sea inaguantable. Caminar es extremadamente difícil, uso andador y aún así solo puedo hacerlo distancias muy cortas con mucho sufrimiento. Para las actividades más básicas como bañarme o vestirme necesito ayuda total de mi familia, no puedo hacerlo solo. Levantar cualquier objeto, por más liviano que sea, es imposible. Estar sentado también es muy doloroso, no puedo hacerlo más de 10-15 minutos. He perdido mi trabajo debido a las constantes ausencias. Mi vida social ha desaparecido por completo, no puedo salir de casa. La relación con mi pareja se ha visto severamente afectada en todos los aspectos. El sueño es pésimo, duermo máximo 2-3 horas seguidas antes de que el dolor me despierte, necesito analgésicos muy fuertes. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como constante y intenso, no siendo rellevado en reposo, lo que indica un nivel máximo de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 5 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente utiliza andador y solo puede caminar cortas distancias con mucho sufrimiento.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda total de su familia para realizar actividades básicas como bañarse o vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún objeto debido al dolor.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente solo puede sentarse por 10-15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si el paciente puede viajar, pero debido a la dificultad para caminar y estar de pie, se puede asumir que viajar sería muy difícil.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido por completo.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se especifica si la actividad sexual ha sido afectada, pero se puede suponer que sería muy difícil debido al dolor y la falta de energía.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme máximo 2-3 horas seguidas antes de que el dolor lo despierte, lo que indica dificultades en el dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 12 puntos (5+0+0+5+0+1+0+0+0+1). Un puntaje total superior a 30 indica una gran discapacidad. En este caso, el paciente presenta una discap

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 18 | Diferencia: 32

10% | 13/126 [05:18<43:44, 23.23s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 13

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días, doctor. Llevo dos semanas con molestias en la parte baja de la espalda. Comenzó después de una sesión intensa de ejercicio en el gimnasio, creo que no calenté adecuadamente. Es más una molestia que un dolor propiamente dicho. Puedo trabajar sin problemas, mi trabajo requiere estar de pie atendiendo clientes y no he tenido inconvenientes. Caminar es completamente normal, incluso he seguido con mis caminatas matutinas de 30 minutos. Para mis actividades de cuidado personal no tengo ninguna limitación. He sido más cuidadoso al levantar objetos pesados en el trabajo, pero puedo hacerlo si es necesario. Estar sentado no me causa problemas. Mi vida social no se ha visto afectada para nada, el fin de semana fui a bailar y estuve muy bien. El sueño es normal, ocasionalmente siento la molestia al darme vuelta en la cama, pero no me despierta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molestia sin síntomas de dolor intenso)

2. Estar de pie: 0 puntos (normal)

3. Andar: 0 puntos (normal)

4. Cuidados personales: 0 puntos (normal)

5. Levantar peso: 1 punto (ha tenido cuidado al levantar objetos pesados, pero no ha tenido dificultades)

6. Estar sentado: 0 puntos (normal)

7. Viajar: 0 puntos (no se ha mencionado ninguna dificultad)

8. Vida social: 0 puntos (normal)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no se ha mencionado ninguna dificultad)

10. Dormir: 1 punto (ocasional molestia que no despertaba)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta un total de 3 puntos de discapacidad. Esto indica un bajo grado de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 6 | Diferencia: 6

11% | 14/126 [05:46<46:06, 24.70s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 14

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es muy intenso y me está limitando mucho. Empezó hace seis semanas después de una caída que tuve mientras hacía limpieza en casa, me resbalé con el suelo mojado. El dolor es fuerte y constante, empeora con casi cualquier movimiento. Estar de pie es muy difícil,

no puedo hacerlo más de unos pocos minutos sin experimentar dolor severo. Caminar se ha vuelto una tarea muy complicada, necesito descansar frecuentemente y no puedo ir más allá de distancias muy cortas. Para bañarme y vestirme necesito mucha ayuda, no puedo inclinarme ni girar el torso. Levantar objetos es prácticamente imposible, incluso cosas muy ligeras me causan dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, no aguanto más de 15-20 minutos. He faltado al trabajo múltiples veces. Socialmente estoy muy aislado, he cancelado todas mis actividades. La intimidad con mi pareja se ha visto completamente afectada. El sueño es terrible, me despierto cada hora por el dolor, no logro descansar adecuadamente a pesar de tomar medicamentos para dormir. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo) - El paciente describe el dolor como intenso y constante, que empeora con casi cualquier movimiento, lo que indica un nivel alto de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie solo es posible durante unos pocos minutos antes de experimentar dolor severo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar sin necesidad de descansar frecuentemente y solo puede viajar cortas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar tareas personales como bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que levantar objetos es prácticamente imposible.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente solo puede sentarse por 15-20 minutos antes de experimentar dolor.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a la dificultad de caminar y el terrible sueño.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente se encuentra aislado socialmente debido a su incapacidad para participar en actividades.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad con su pareja se ha visto completamente afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente tiene un terrible sueño y se despierta cada hora debido al dolor, lo que impide que pueda descansar adecuadamente.

Según los criterios de la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total de este paciente sería 13 puntos (el máximo es 50 puntos). Esto indica una discapacidad severa.

Puntuación esperada: 33 | Modelo: 15 | Diferencia: 18

12% | 15/126 [06:13<47:10, 25.50s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 15

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, tengo una molestia en la zona lumbar desde hace una semana. Ocurrió después de estar mucho tiempo sentado trabajando en mi computadora en una silla que no es ergonómica. Es más bien una sensación de tensión y rigidez que dolor agudo. Puedo mantenerme de pie sin problemas, trabajo en ventas y paso muchas horas de pie atendiendo clientes. Caminar es completamente normal, no tengo ninguna limitación. Las actividades de aseo personal las hago normalmente, aunque por las mañanas siento un poco más de rigidez que se quita rápidamente. Puedo levantar objetos sin inconvenientes, aunque trato de usar buena técnica para no empeorar. La posición sentada sí me genera un poco de incomodidad después de estar mucho tiempo, especialmente en sillas duras. No he tenido que modificar mis planes sociales. Duermo bien, solo noto la tensión cuando me acuesto inicialmente, pero no interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (poco intenso) - El paciente describe una sensación de tensión y rigidez en lugar de dolor agudo, lo que sugiere un nivel bajo de intensidad.

2. Estar de pie: 0 puntos (no limitado) - El paciente puede mantenerse de pie sin problemas.
3. Andar: 0 puntos (no limitado) - El paciente no tiene limitaciones en el caminar.
4. Cuidados personales: 0 puntos (no limitado) - El paciente puede realizar actividades de aseo personal normalmente.
5. Levantar peso: 0 puntos (no limitado) - El paciente puede levantar objetos sin inconvenientes.
6. Estar sentado: 1 punto (limitado) - El paciente describe un poco de incomodidad al sentarse, especialmente en sillas duras.
7. Viajar: 0 puntos (no limitado) - El paciente no ha informado de ninguna limitación en viajar.
8. Vida social: 0 puntos (no limitado) - El paciente no ha tenido que modificar sus planes sociales.
9. Actividad sexual: 0 puntos (no limitado) - El paciente no ha informado de ninguna limitación en su actividad sexual.
10. Dormir: 1 punto (limitado) - El paciente nota una cierta tensión al acostarse inicialmente, aunque no interfiere con su descanso.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total para este paciente sería de 4 puntos. La escala Oswestry va desde 0 a 50 puntos, con un puntaje bajo indicando una baja discapacidad. En este caso, el puntaje de 4 puntos indica una baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

13% | 16/126 [06:39<46:45, 25.50s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 16

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha progresado considerablemente en las últimas tres semanas.

Inicialmente era leve después de un mal movimiento en el trabajo, pero ahora es bastante intenso y me limita en muchas actividades. El dolor es punzante y se irradia hacia los glúteos. Estar de pie por períodos prolongados se ha vuelto muy difícil, máximo puedo mantenerme erguido unos 30 minutos antes de necesitar sentarme o recostarme. Caminar largas distancias es problemático, tengo que hacer pausas frecuentes. Para vestirme y bañarme he desarrollado técnicas para evitar agacharme, pero aún me toma considerablemente más tiempo. Levantar objetos pesados es imposible, evito por completo cargar bolsas de compras o mover muebles. Estar sentado por más de 45 minutos se vuelve muy incómodo. He rechazado algunas invitaciones sociales, especialmente aquellas que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar. La intimidad se ha visto afectada por el temor al dolor. El sueño se interrumpe ocasionalmente, necesito cambiar de posición varias veces durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe que el dolor lumbar ha progresado considerablemente y es bastante intenso. El dolor es punzante y se irradia hacia los glúteos.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente solo puede mantenerse de pie unos 30 minutos antes de necesitar sentarse o recostarse.

3. Andar: 2 puntos - Caminar largas distancias es problemático y requiere pausas frecuentes.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha desarrollado técnicas para evitar agacharse pero aún le toma considerablemente más tiempo realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente evita por completo levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se encuentra desconfortable sentado por más de 45 minutos.

7. Viajar: 1 punto - No se especifica si viajar es un problema.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha rechazado algunas invitaciones sociales debido a la dificultad de estar mucho tiempo de pie o caminar.

9. Actividad sexual: 1 punto - La intimidad se ha visto afectada por el temor al dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño se interrumpe ocasionalmente y necesita cambiar de posición varias veces durante la noche.

Según los criterios de la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 16 puntos, lo que indica un grado moderado de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 15 | Modelo: 17 | Diferencia: 2

13% | 17/126 [07:05<46:47, 25.76s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 17

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días, doctor. Vengo porque desde hace cuatro días tengo una leve molestia en la espalda baja. Creo que fue por haber estado pintando el techo de mi cuarto, mantuve el cuello y la espalda en una posición incómoda por varias horas. Es realmente muy leve, más una sensación de tirantez que dolor. Puedo hacer todas mis actividades completamente normal. En mi trabajo de oficina no tengo ningún problema para estar sentado las horas normales. Caminar, correr, hacer ejercicio, todo lo hago sin inconvenientes. Mis rutinas de higiene y cuidado personal son exactamente iguales que siempre. Puedo cargar objetos normalmente, ayer ayudé a un amigo a cargar unas cajas y no tuve problemas. No he tenido que modificar ningún plan social, el fin de semana fui a un concierto donde estuve de pie varias horas y me sentí bien. Duermo perfectamente, a veces siento una ligera molestia al cambiar de posición, pero es mínima. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe una sensación leve de tirantez en la espalda baja, no especifica un dolor intenso.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente informa que no ha tenido inconvenientes al estar de pie durante varias horas en el concierto.
3. Andar: 5 puntos - El paciente no ha reportado problemas al caminar ni correr.
4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente ha informado que sus rutinas de higiene y cuidado personal no se han modificado.
5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente ha levantado objetos normalmente y ha ayudado a un amigo a cargar cajas sin problemas.
6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente no ha reportado problemas al sentarse en su trabajo durante las horas normales.
7. Viajar: 5 puntos - El paciente ha viajado sin modificar ningún plan social.
8. Vida social: 5 puntos - El paciente ha ido a un concierto y ha estado de pie varias horas sin problemas.
9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente no ha especificado si ha tenido problemas en esta categoría.
10. Dormir: 4 puntos - El paciente ha informado de una ligera molestia al cambiar de posición al dormir, pero no especifica que sea un problema significativo.

Según la escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 45 puntos (5 puntos por cada ítem sin problemas, excepto en el ítem 10, donde el paciente obtiene 4 puntos). Este resultado indica una baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 36 | Diferencia: 36

14% | 18/126 [07:27<44:15, 24.59s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 18

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es realmente severa y ha empeorado drásticamente en el último mes. Todo comenzó hace tres meses con una lesión laboral, pero ahora el dolor es extremo y constante. Es un dolor punzante y quemante que no me da respiro ni un segundo. No puedo estar de pie absolutamente nada, incluso intentar pararme me causa dolor insoportable. Caminar es imposible, uso silla de ruedas para moverme. Para todas las actividades básicas como bañarme, vestirme, ir al baño, necesito asistencia completa de cuidadores. No puedo levantar nada, ni siquiera un vaso de agua. Estar sentado también es extremadamente doloroso, solo puedo hacerlo por muy pocos minutos con muchos cojines. He perdido mi empleo y mi independencia completamente. No tengo vida social, no puedo salir de casa. Mi relación de pareja se ha visto destruida por esta situación. El sueño es inexistente, paso las noches despierto por el dolor constante, incluso con medicamentos muy fuertes apenas logro dormir una hora seguida. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (máximo) - El paciente describe el dolor como extremo y constante, no puede estar de pie ni caminar, y necesita asistencia completa para realizar actividades básicas.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente utiliza una silla de ruedas para moverse.

4. Cuidados personales: 5 puntos (máximo) - El paciente necesita asistencia completa para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo por pocos minutos y necesita muchos cojines.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su estado de salud.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no menciona nada sobre su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no puede dormir debido al dolor constante.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 30 puntos (máximo). El paciente presenta una alta discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 22 | Diferencia: 28

15% [REDACTED] | 19/126 [07:49<42:43, 23.96s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 19

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, tengo dolor en la zona lumbar desde hace diez días que me está causando dificultades moderadas. Comenzó después de ayudar a mi hijo a mudarse, estuve cargando muebles pesados sin la técnica adecuada. El dolor es constante pero variable en intensidad, algunos momentos es más tolerable que otros. Estar de pie por períodos largos se ha vuelto complicado, en mi trabajo tengo que alternar entre estar sentado y de pie más frecuentemente. Caminar distancias normales no es problema, pero sí evito caminatas largas que antes disfrutaba. Para las actividades de cuidado personal he tenido que modificar mi rutina, me baño más rápido y evito inclinarme mucho. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, le pido ayuda a otros para las compras. Estar sentado por mucho tiempo también

- se vuelve incómodo, especialmente en sillas duras. He declinado algunas invitaciones que implican actividades físicas. La vida íntima se ha visto algo afectada por precaución. El sueño se interrumpe ocasionalmente cuando me muevo bruscamente durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como constante y variable en intensidad, lo cual se considera moderado a severo según la Escala Oswestry.
2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente reporta que está enfrentando dificultades en estar de pie por períodos largos.
3. Andar: 2 puntos - El paciente no reporta problemas para caminar distancias normales.
4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que modificar su rutina de cuidados personales debido al dolor.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no ha podido levantar objetos pesados.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se encuentra inconveniente sentarse por mucho tiempo, especialmente en sillas duras.
7. Viajar: 1 punto - El paciente no reporta problemas específicos para viajar.
8. Vida social: 1 punto - El paciente ha declinado algunas invitaciones debido al dolor.
9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente ha reportado que la vida íntima ha sido afectada por precaución.
10. Dormir: 2 puntos - El paciente informa que el sueño se interrumpe ocasionalmente durante la noche.

Resumen: El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry, con un total de 16 puntos.

Puntuación esperada: 11 | Modelo: 17 | Diferencia: 6

16% [REDACTED] | 20/126 [08:10<40:48, 23.10s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 20

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, el dolor lumbar que tengo es severo y está afectando gravemente mi vida diaria desde hace dos meses. Comenzó después de levantar una caja pesada en el trabajo de forma incorrecta. El dolor es intenso y constante, siento como si tuviera cuchillos clavados en la espalda baja. Estar de pie es extremadamente difícil, no puedo hacerlo más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es una tortura, necesito bastón y aún así solo puedo recorrer distancias muy cortas. Para bañarme y vestirme necesito ayuda de mi familia, no puedo inclinarme ni hacer movimientos de rotación. Levantar cualquier objeto, incluso muy liviano, me causa dolor severo. Estar sentado también es problemático, no puedo hacerlo más de 20 minutos seguidos. He faltado al trabajo constantemente y temo perder mi empleo. Mi vida social prácticamente no existe, he cancelado todos los compromisos. La relación íntima con mi pareja se ha visto severamente afectada. Duermo muy mal, me despierto múltiples veces por la noche debido al dolor, necesito medicamentos fuertes para poder descansar algo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso y constante, comparable a teniendo cuchillos clavados en la espalda baja.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita un bastón para caminar y solo puede recorrer distancias muy cortas.
4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda de su familia para bañarse y vestirse.
5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, incluso objetos livianos.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente solo puede sentarse por 20 minutos seguidos.
7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si viajar es un problema para el paciente.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado todos sus compromisos sociales.
9. Actividad sexual: 5 puntos - Se describe que la relación íntima con el pareja se ha visto severamente afectada.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente tiene dificultades para dormir debido al dolor y necesita medicamentos fuertes para poder descansar.

Puntuación esperada: 37 | Modelo: 27 | Diferencia: 10

17% [REDACTED] | 21/126 [08:32<39:38, 22.65s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 21

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una molestia leve en la espalda baja desde hace una semana. Empezó después de estar varias horas trabajando en el jardín, removiendo tierra y plantando. Es más una sensación de rigidez matutina que dolor propiamente dicho. Durante el día, especialmente cuando estoy activo, la molestia desaparece casi completamente. Puedo estar de pie sin problemas, trabajo como maestro y paso muchas horas de pie enseñando. Caminar es completamente normal, incluso he continuado con mis ejercicios de rutina. Las actividades de higiene personal las realizo normalmente, solo por las mañanas siento un poco más de rigidez. Puedo levantar objetos sin problemas, aunque he sido más consciente de usar buena postura. Estar sentado no me causa molestias. Mi vida social continúa igual, no he tenido que cancelar ningún plan. El sueño es bueno, ocasionalmente noto la rigidez al levantarme, pero no me despierta durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve) - El paciente describe una sensación de rigidez leve en lugar de dolor intenso.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie sin problemas.
3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es completamente normal.
4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que puede realizar actividades de higiene personal normalmente.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos sin problemas.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado no le causa molestias.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su vida social continúa igual.
9. Actividad sexual: No se menciona - No hay información suficiente para evaluar este ítem.
10. Dormir: 1 punto (ocasionalmente molesto) - El paciente informa que ocasionalmente nota rigidez al levantarse, pero no se despierta durante la noche.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería 3 puntos (1+1+1). Este resultado indica un funcionamiento relativamente normal de la columna lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5

17% [REDACTED] | 22/126 [08:51<37:31, 21.65s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 22

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha evolucionado a algo bastante problemático en las últimas cinco semanas. Inicialmente era solo una molestia después de un día largo de trabajo físico, pero ahora interfiere significativamente con mis actividades. El dolor es moderadamente intenso y persistente. Estar de pie por más de 20-30 minutos se vuelve muy incómodo, tengo que buscar apoyo o sentarme. Caminar distancias largas es difícil, evito ir a centros comerciales o hacer recorridos largos. Para vestirme y bañarme necesito más tiempo y cuidado, especialmente para ponerme los zapatos y calcetines. Levantar objetos pesados es imposible, he delegado esas tareas a otros. Estar sentado por períodos prolongados también se vuelve incómodo, especialmente en el trabajo donde paso muchas horas frente a la computadora. He comenzado a declinar invitaciones que requieren mucha actividad física. La intimidad se ha visto afectada por el temor a empeorar el dolor. El sueño se interrumpe regularmente, tengo que cambiar de posición frecuentemente y a veces me despierto por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos (moderadamente intenso y persistente)

2. Estar de pie: 1 punto (incómodo y requiere apoyo o sentarse después de 20-30 minutos)

3. Andar: 2 puntos (difícil caminar largas distancias)

4. Cuidados personales: 2 puntos (necesita más tiempo y cuidado para vestirse y bañarse)

5. Levantar peso: 0 puntos (imposible levantar objetos pesados)

6. Estar sentado: 2 puntos (incómodo sentarse por períodos prolongados)

7. Viajar: 1 punto (evita viajes que requieran mucha actividad física)

8. Vida social: 1 punto (ha declinado invitaciones que requieran mucha actividad física)

9. Actividad sexual: 1 punto (intimidad se ha visto afectada)

10. Dormir: 2 puntos (suenos se interrumpen regularmente y necesita cambiar de posición frecuentemente)

Total: 12 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada, con un total de 12 puntos en la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 21 | Modelo: 15 | Diferencia: 6

18% [REDACTED] | 23/126 [09:13<37:03, 21.59s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 23

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, desde hace tres días tengo una ligera molestia en la parte baja de la espalda.

Ocurrió después de dormir en el sofá viendo una película, desperté con esta sensación de tirantez. Es realmente muy leve, casi imperceptible durante el día cuando estoy ocupado. Puedo trabajar normalmente, no he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina laboral. Caminar, subir escaleras, hacer ejercicio ligero, todo lo realizo sin ningún problema. Mis actividades de cuidado personal son exactamente las mismas de siempre. Puedo levantar objetos normalmente, ayer cargué las bolsas del supermercado sin inconvenientes. Estar sentado es completamente cómodo. No he tenido que cancelar ningún plan social, el fin de semana salí con amigos y estuve perfectamente bien. Duermo bien, solo al levantarme por las mañanas noto una ligera rigidez que desaparece en pocos minutos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como leve y casi imperceptible, no interfiriendo en su actividad diaria.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa de que caminar, subir escaleras y hacer ejercicio ligero se realizan sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no ha reportado dificultades en andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que sus actividades de cuidado personal siguen siendo exactamente las mismas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha levantado objetos normalmente sin inconvenientes.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa de que estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha reportado problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha salido con amigos y no ha tenido problemas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se mencionó ninguna dificultad en la actividad sexual.

10. Dormir: 1 punto - El paciente nota una ligera rigidez al despertar, pero esta desaparece en pocos minutos.

Total: 1 punto.

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar (bajo rango) según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

19% | 24/126 [09:29<34:02, 20.03s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 24

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es extremadamente severo y ha destruido completamente mi calidad de vida en los últimos cinco meses. Comenzó con una hernia discal que se complicó después de una cirugía fallida. El dolor es constante, intenso y debilitante, como si tuviera fuego en la espalda las 24 horas del día. No puedo estar de pie ni un minuto, inmediatamente siento dolor insoportable. Caminar es imposible, estoy confinado a una silla de ruedas. Para todas las actividades básicas como bañarme, vestirme, usar el baño, necesito cuidado completo de enfermeras. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera objetos de unos gramos. Estar sentado también es agonizante, solo puedo hacerlo por minutos muy cortos con múltiples cojines y medicamentos. He perdido mi trabajo, mi independencia y mi dignidad. No tengo vida social alguna, estoy completamente aislado. Mi matrimonio está en crisis por esta situación. No duermo prácticamente nada, paso las noches en vela por el dolor constante, incluso con morfina el alivio es mínimo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo dolor posible)

2. Estar de pie: 0 puntos (Incapaz de estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (Incapaz de caminar)

4. Cuidados personales: 5 puntos (Total dependencia de cuidados)

5. Levantar peso: 0 puntos (Incapaz de levantar nada)

6. Estar sentado: 1 punto (Solo puede sentarse por cortos períodos con muchos apoyos)

7. Viajar: 0 puntos (Incapaz de viajar)

8. Vida social: 0 puntos (Completamente aislado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Inactivo)

10. Dormir: 0 puntos (Incapaz de dormir)

Basado en la información proporcionada por el paciente, su estado actual según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es muy grave, con un puntaje total de 21 puntos (el puntaje máximo es 50).

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 17 | Diferencia: 33

20% | 25/126 [10:00<39:07, 23.24s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 25

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, tengo dolor lumbar moderado desde hace tres semanas que está interfiriendo bastante con mis actividades diarias. Comenzó gradualmente después de pasar un fin de semana ayudando a renovar la casa de mis padres, cargando materiales y trabajando en posiciones incómodas. El dolor es persistente y se intensifica con ciertos movimientos. Estar de pie por más de 15-20 minutos se vuelve muy incómodo, tengo que buscar donde apoyarme o sentarme. Caminar largas distancias es problemático, evito ir al centro comercial o hacer caminatas. Para bañarme y vestirme necesito más tiempo y mucho cuidado, especialmente para ponerme los calcetines. Levantar objetos pesados es muy difícil, he dejado de cargar las bolsas de compras. Estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo, especialmente en el trabajo. He cancelado algunos planes sociales que implican estar mucho tiempo de pie. La intimidad se ha visto afectada por miedo a empeorar. El sueño se interrumpe, me despierto 2-3 veces por la noche debido al

dolor al cambiar de posición. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado, lo que corresponde a un rango de intensidad entre 4 y 6 en la Escala Oswestry.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente encuentra que estar de pie por más de 15-20 minutos es muy incómodo, lo que indica una limitación moderada en esta categoría.

3. Andar: 2 puntos - El paciente encuentra que caminar largas distancias es problemático, lo que corresponde a una limitación moderada en la categoría de andar.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para bañarse y vestirse, lo que indica una limitación moderada en esta categoría.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente ha dejado de cargar bolsas de compras y encuentra que levantar objetos pesados es muy difícil, lo que corresponde a una limitación total en esta categoría.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra que estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo, lo que corresponde a una limitación moderada en esta categoría.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha cancelado planes sociales que implican estar mucho tiempo de pie, lo que corresponde a una limitación moderada en esta categoría.

8. Vida social: 3 puntos - El paciente ha cancelado algunos planes sociales, lo que indica una limitación moderada en esta categoría.

9. Actividad sexual: 4 puntos - El paciente ha indicado que la intimidad se ha visto afectada por miedo a empeorar, lo que corresponde a una limitación moderada a severa en esta categoría.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente tiene problemas para dormir debido al dolor al cambiar de posición, lo que corresponde a una limitación moderada a severa en esta categoría.

La puntuación total de la entrevista es de

Puntuación esperada: 20 | Modelo: 29 | Diferencia: 9

21% [REDACTED] | 26/126 [10:23<38:43, 23.23s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 26

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días doctor, vengo por una molestia muy leve en la espalda baja que tengo desde hace seis días. Empezó después de una clase de yoga donde probablemente forcé demasiado una postura nueva. Es más una sensación de tensión que dolor real. Puedo hacer absolutamente todas mis actividades normales sin restricciones. En mi trabajo de pie como vendedor no tengo ningún problema. Caminar, correr, hacer

ejercicio, todo completamente normal. Mis rutinas de cuidado personal son idénticas a siempre. Puedo cargar objetos pesados sin problemas, ayer moví muebles en casa. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada para nada, el fin de semana fui a bailar y me sentí excelente. Duermo perfectamente, a veces noto una ligera tensión al acostarme inicialmente, pero no me molesta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe una sensación de tensión en la espalda baja, no una sensación de dolor real.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente informa que no tiene problemas al estar de pie, incluso en su trabajo de vendedor.

3. Andar: 5 puntos - El paciente informa que caminar, correr y hacer ejercicio están completamente normales.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente informa que sus rutinas de cuidado personal siguen siendo idénticas a siempre.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente informa que puede cargar objetos pesados sin problemas.

6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente informa que estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 5 puntos - No se menciona ningún problema con el viajar.

8. Vida social: 5 puntos - El paciente informa que su vida social no se ha visto afectada.

9. Actividad sexual: No se mencionó.

10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que solo nota una ligera tensión al acostarse inicialmente, pero no molesta.

Según los criterios de la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 31 puntos (5 puntos por cada ítem sin problemas y 1 punto por el ítem de dormir con ligera tensión). Esto indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 23 | Diferencia: 23

21% [REDACTED] | 27/126 [10:52<41:01, 24.86s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 27

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es muy severo y me está incapacitando considerablemente desde hace seis semanas. Todo comenzó con un accidente automovilístico menor, pero el dolor ha ido empeorando progresivamente. Es un dolor constante, punzante e intenso que me acompaña todo el día. No puedo estar de pie más de 5-10 minutos sin experimentar dolor severo que me obliga a sentarme o acostarme. Caminar es extremadamente difícil, uso bastón y aún así solo puedo recorrer distancias muy cortas con gran esfuerzo. Para las actividades básicas como ducharme necesito una silla especial y ayuda parcial, vestirme me toma el triple de tiempo normal. Levantar cualquier objeto, incluso muy liviano como un libro, me causa dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin gran incomodidad. He faltado al trabajo casi completamente el último mes. Mi vida social está completamente cancelada, no puedo salir de casa. La relación íntima está muy afectada. Duermo terriblemente, me despierto cada hora por el dolor, necesito medicamentos fuertes que apenas me dan

alivio temporal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso, constante y punzante que lo acompaña todo el día, lo que lo impedía de estar de pie por más de 5-10 minutos sin experimentar dolor severo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 5-10 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente tiene muchas dificultades para caminar y necesita un bastón, lo que indica que no puede andar normalmente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita una silla especial y ayuda parcial para realizar actividades básicas como ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente experimenta dolor intenso al levantar cualquier objeto, incluso livianos.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse por 15 minutos, pero con gran incomodidad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su incapacidad para caminar y su necesidad de estar sentado o acostado.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente está completamente cancelada debido a su incapacidad.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima del paciente está muy afectada debido al dolor lumbar.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme terriblemente y necesita medicamentos fuertes para obtener algún alivio temporal del dolor.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 12 puntos (5+0+0+3+0+1+0+0+0), lo que indica una gran incapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 39 | Modelo: 15 | Diferencia: 24

22% [REDACTED] | 28/126 [11:17<40:56, 25.07s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 28

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, desde hace una semana y media tengo dolor en la zona lumbar que me está causando algunas limitaciones. Comenzó después de cargar unas cajas pesadas durante una mudanza. El dolor es moderado y bastante constante durante el día. Estar de pie por períodos largos se ha vuelto incómodo, en mi trabajo de cajera tengo que cambiar de posición más frecuentemente. Caminar distancias

normales no es gran problema, pero evito caminatas largas que antes hacía regularmente. Para vestirme y bañarme he tenido que ser más cuidadosa, especialmente al inclinarme hacia adelante. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, he tenido que pedir ayuda para las compras. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve molesto, especialmente sin respaldo adecuado. He declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física como senderismo. La vida íntima se ha visto algo comprometida por precaución. El sueño se ve interrumpido ocasionalmente, especialmente cuando me muevo durante la noche, pero logro volver a dormir. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente encuentra inconveniente estar de pie por largos periodos debido a la descomodidad causada por el dolor.

3. Andar: 2 puntos - El paciente no tiene problemas significativos al caminar distancias normales.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que ser más cuidadoso al vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente encuentra inconveniente estar sentado por mucho tiempo, especialmente sin respaldo adecuado.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente no evita viajes regulares, aunque declina invitaciones que requieren mucha actividad física.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones debido a la comprometida vida íntima y la actividad física requerida.

9. Actividad sexual: 1 punto - El paciente ha mencionado que la vida íntima se ha visto comprometida por precaución.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente experimenta interrupciones ocasionales en el sueño, pero logra volver a dormir.

La puntuación total es de 22 puntos. Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, un puntaje de 21 a 40 puntos indica una moderada a severa discapacidad lumbar. El paciente presenta una discapacidad moderada.

Puntuación esperada: 11 | Modelo: 20 | Diferencia: 9

23% [REDACTED] | 29/126 [11:32<35:37, 22.04s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 29

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es crítica y ha empeorado dramáticamente en los últimos dos meses. Inicialmente era manejable después de una lesión deportiva, pero ahora es absolutamente debilitante. El dolor es extremo, constante e implacable, como si tuviera vidrios molidos en la columna. No puedo estar de pie ni siquiera por segundos, cualquier intento de pararme resulta en dolor insoportable. Caminar es completamente imposible, estoy confinado a silla de ruedas para cualquier movimiento. Para absolutamente todas las actividades básicas - bañarme, vestirme, usar el baño - requiero asistencia total de cuidadores profesionales. No puedo levantar nada, ni siquiera una hoja de papel. Estar

sentado es agonizante, solo puedo hacerlo por minutos muy cortos con múltiples almohadones y medicación previa. He perdido mi trabajo, mi independencia y mi autoestima. No existe vida social alguna, estoy completamente aislado del mundo. Mi relación de pareja se ha desintegrado. El sueño es inexistente, paso las noches en agonía constante, incluso con opioides fuertes el alivio es mínimo y temporal. [/INST]

1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máxima intensidad de dolor)
2. Estar de pie: 0 puntos (Incapaz de estar de pie)
3. Andar: 0 puntos (Incapaz de caminar)
4. Cuidados personales: 5 puntos (Total dependencia de cuidadores)
5. Levantar peso: 0 puntos (Incapaz de levantar nada)
6. Estar sentado: 1 punto (Agonizante pero puede sentarse por cortos períodos)
7. Viajar: 0 puntos (Incapaz de viajar)
8. Vida social: 0 puntos (Completamente aislado del mundo)
9. Actividad sexual: 0 puntos (Desconocido en esta entrevista)
10. Dormir: 0 puntos (Incapaz de dormir)

Total: 6 puntos (Máxima discapacidad según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar)

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 17 | Diferencia: 33

24% | 30/126 [11:55<35:29, 22.18s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 30

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una leve molestia en la espalda baja desde hace cuatro días. Creo que fue por pasar muchas horas encorvado trabajando en mi laptop desde la cama durante el fin de semana. Es más una sensación de rigidez que dolor propiamente dicho. Puedo realizar todas mis actividades laborales sin ningún problema, trabajo en oficina y no he tenido que hacer ajustes. Caminar, subir escaleras, hacer mi rutina de ejercicios, todo normal. Las actividades de higiene personal las hago igual que siempre, sin restricciones. Puedo levantar objetos sin dificultad, ayer ayudé a cargar muebles. Estar sentado es cómodo, aunque trato de mantener mejor postura. Mi vida social continúa igual, no he cancelado ningún plan.

Duermo bien, solo noto la rigidez al levantarme por las mañanas, pero se quita rápidamente con movimiento. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe una sensación de rigidez en lugar de dolor intenso.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente informa que no ha experimentado ningún problema al permanecer de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no ha informado de restricciones en sus actividades personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos sin dificultad.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente informa que sentarse es cómodo, pero trata de mantener una mejor postura.

7. Viajar: 5 puntos - El paciente informa que viajar sigue siendo normal.
8. Vida social: 5 puntos - El paciente informa que su vida social sigue igual.
9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente no ha informado de restricciones en su actividad sexual.
10. Dormir: 2 puntos - El paciente informa que solo nota rigidez al despertar, que se quita rápidamente.

Según los criterios de la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 19 puntos (5 puntos por cada ítem sin problemas, y 2 puntos por el ítem de dormir). Este resultado indica una baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 14 | Diferencia: 14

25% [REDACTED] | 31/126 [12:22<37:32, 23.71s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 31

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es bastante intenso y me está limitando significativamente desde hace un mes. Comenzó después de una mala caída en el hielo, inicialmente pensé que era solo un golpe, pero ha empeorado. El dolor es fuerte y constante, con episodios de dolor punzante. Estar de pie es muy problemático, no puedo hacerlo más de 10-15 minutos sin dolor severo. Caminar se ha vuelto muy difícil, uso bastón para distancias cortas y evito salir innecesariamente. Para bañarme necesito una silla de ducha y para vestirme requiero ayuda con zapatos y calcetines. Levantar objetos es prácticamente imposible, incluso cosas ligeras me causan dolor intenso. Estar sentado también es muy incómodo, especialmente sin cojines especiales, no aguanto más de 20 minutos. He faltado al trabajo frecuentemente. Socialmente estoy muy limitado, he cancelado la mayoría de mis compromisos. La intimidad se ha visto severamente afectada. El sueño es muy malo, me despierto múltiples veces por el dolor, necesito medicamentos para dormir que me ayudan parcialmente. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como fuerte y constante, con episodios de dolor punzante.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que está de pie solo durante 10-15 minutos antes de experimentar dolor severo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente utiliza un bastón para caminar y evita salir innecesariamente debido al dolor.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente requiere ayuda para bañarse y vestirse, pero no menciona problemas para realizar otras tareas personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que levantar objetos es prácticamente imposible.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente aguanta sentarse solo 20 minutos, pero necesita cojines especiales.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no especifica si tiene problemas para viajar, pero menciona que evita salir innecesariamente.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente está muy limitado socialmente y ha cancelado la mayoría de sus compromisos.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad se ha visto severamente afectada.

10. Dormir: 1 punto - El paciente tiene problemas para dormir y necesita medicamentos para ayudarlo, pero no especifica si puede dormir completamente.

Basado en la información proporcionada, la puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 12 puntos (5+0+0+3+0+1+0+0). Este puntaje indica una alta discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 29 | Modelo: 15 | Diferencia: 14

25% | 32/126 [12:46<37:22, 23.86s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 32

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, tengo una molestia menor en la zona lumbar desde hace cinco días. Ocurrió después de estar mucho tiempo agachado limpiando el garaje. Es una sensación más de tensión muscular que dolor agudo. Puedo trabajar normalmente, no he tenido que hacer ningún cambio en mi rutina laboral de oficina. Caminar es completamente normal, incluso continúo con mis caminatas diarias. Las actividades de cuidado personal las realizo sin restricciones, aunque por las mañanas siento un poco más de rigidez. Puedo levantar objetos normalmente, solo soy más consciente de usar buena técnica. Estar sentado no me causa problemas. No he tenido que modificar ningún plan social. Duermo bien, ocasionalmente siento la tensión al cambiar de posición, pero no me despierta ni interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (poco o ningún dolor) - El paciente describe una molestia menor, más relacionada con tensión muscular que con dolor agudo.

2. Estar de pie: 0 puntos (normal) - El paciente informa que caminar es completamente normal, incluyendo sus caminatas diarias.

3. Andar: 0 puntos (normal) - El paciente no ha informado de problemas al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos (normal) - El paciente no ha informado de restricciones en realizar sus actividades personales.

5. Levantar peso: 0 puntos (normal) - El paciente puede levantar objetos normalmente, siempre que use buena técnica.

6. Estar sentado: 0 puntos (normal) - El paciente no ha informado de problemas al sentarse.

7. Viajar: 0 puntos (normal) - El paciente no ha informado de restricciones al viajar.

8. Vida social: 0 puntos (normal) - El paciente no ha informado de restricciones en su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos (normal) - No se ha informado de problemas relacionados con la actividad sexual.

10. Dormir: 1 punto (poco o ninguna interferencia) - El paciente solo informa de ocasionalmente sentir tensión al cambiar de posición, pero esto no le impide dormir ni interfiere con su descanso.

Respuesta final: La entrevista del paciente indica una puntuación total de 1 punto en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

Entrevista 33

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha progresado a un nivel muy preocupante en las últimas seis semanas. Inicialmente era tolerable después de un incidente en el trabajo, pero ahora interfiere severamente con mi vida diaria. El dolor es intenso, constante y se irradia hacia las piernas. Estar de pie es extremadamente difícil, máximo 10 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es una lucha constante, necesito descansar frecuentemente y uso bastón para apoyo. Para las actividades básicas como ducharme y vestirme necesito mucha ayuda, no puedo inclinarme ni hacer movimientos de rotación. Levantar cualquier objeto, por liviano que sea, me causa dolor severo. Estar sentado también es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin gran incomodidad. He estado ausente del trabajo la mayor parte del tiempo. Mi vida social prácticamente no existe, he cancelado todo. La relación íntima está completamente afectada por el dolor. Duermo muy mal, me despierto cada 1-2 horas por el dolor, incluso con medicamentos fuertes el alivio es mínimo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como intenso, constante y radiando hacia las piernas, lo que indica un nivel alto de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita apoyo para caminar y necesita descansar frecuentemente, lo que indica una incapacidad total para andar.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar tareas básicas como ducharse y vestirse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, lo que indica una gran dificultad.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente puede sentarse solo por 15 minutos antes de experimentar gran incomodidad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha estado ausente del trabajo la mayor parte del tiempo, lo que indica que viajar es imposible.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado toda su vida social, lo que indica una completa incapacidad en esta área.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima está completamente afectada por el dolor, lo que indica una incapacidad total.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta frecuentemente por el dolor, lo que indica una incapacidad completa en esta área.

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total de este paciente sería 35 puntos, lo que indica una gran incapacidad en la función diaria debido al dolor lumbar.

Puntuación esperada: 36 | Modelo: 22 | Diferencia: 14

27% [REDACTED] | 34/126 [13:39<38:26, 25.07s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 34

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días doctor, desde hace una semana tengo una molestia leve en la parte baja de la espalda. Comenzó después de pasar el día completo trabajando en el jardín, plantando y podando. Es más una sensación de cansancio muscular que dolor. Puedo mantenerme de pie sin problemas durante mi jornada laboral completa. Caminar es totalmente normal, he seguido con mis rutinas de ejercicio habituales. Para mis actividades de higiene y cuidado personal no tengo ninguna limitación. Puedo levantar objetos sin inconvenientes, aunque trato de mantener buena postura por precaución. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada, el fin de semana salí a cenar y al cine sin problemas. Duermo bien, solo al levantarme por las mañanas siento un poco de rigidez que desaparece rápidamente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia leve, similar a cansancio muscular, lo que sugeriría un bajo nivel de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede mantenerse de pie sin problemas durante su jornada laboral completa.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es totalmente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que no tiene limitaciones en sus actividades de higiene y cuidado personal.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos sin inconvenientes.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que su vida social no se ha visto afectada y ha salido a cenar y al cine sin problemas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su vida social no se ha visto afectada.

9. Actividad sexual: No se mencionó en la entrevista.

10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que solo al levantarse por las mañanas siente un poco de rigidez, lo que sugeriría un leve problema en el dormir.

Basado en la información proporcionada, el paciente puede tener un puntaje bajo en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, indicando una baja discapacidad lumbar. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la escala Oswestry solo puede ser administrada y evaluada por un profesional médico calificado.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5

28% [REDACTED] | 35/126 [14:01<36:25, 24.02s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 35

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, el dolor lumbar que tengo es realmente severo y está destruyendo mi calidad de vida desde hace tres meses. Comenzó con una lesión en el gimnasio que no fue tratada adecuadamente y se ha complicado. El dolor es extremo, constante e incapacitante, siento como descargas eléctricas en la espalda. No puedo estar de pie prácticamente nada, incluso intentar pararme me causa dolor insoportable que me hace gritar. Caminar es imposible sin asistencia, uso andador y aún así es agonizante. Para todas las actividades básicas - bañarme, vestirme, usar el baño - necesito ayuda completa de mi familia. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera un papel. Estar sentado es tortuoso, solo puedo hacerlo por pocos minutos con múltiples cojines y medicación previa. He perdido mi trabajo y mi independencia total. No tengo vida social, estoy confinado en casa. Mi matrimonio está en crisis por esta situación. No duermo, paso las noches despierto por el dolor constante, incluso con medicamentos muy fuertes apenas obtengo alivio momentáneo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (máximo) - El paciente describe el dolor como extremo, constante y incapacitante, lo que indica un nivel máximo de intensidad.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin asistencia.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar.

4. Cuidados personales: 5 puntos (máximo) - El paciente necesita ayuda completa de su familia para realizar todos los cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por pocos minutos con múltiples cojines y medicación previa.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se menciona si el paciente tiene problemas con su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme y pasa las noches despierto por el dolor constante.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 25 puntos (máximo). El paciente presenta una alta discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 17 | Diferencia: 33

29% [REDACTED] | 36/126 [14:33<39:49, 26.55s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 36

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, tengo dolor moderado en la zona lumbar desde hace dos semanas que me está causando algunas dificultades. Empezó después de un viaje largo en autobús donde estuve sentado en una posición incómoda por muchas horas. El dolor es persistente pero variable en intensidad. Estar de pie por más de 30 minutos se vuelve incómodo, tengo que buscar apoyo o cambiar de posición. Caminar distancias moderadas es posible pero evito caminatas largas que antes disfrutaba. Para vestirme y bañarme necesito más cuidado y tiempo, especialmente para ponerme los zapatos. Levantar objetos pesados es difícil, he dejado que otros carguen las compras. Estar sentado por períodos prolongados también se vuelve molesto, especialmente en sillas duras. He declinado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie o caminar. La intimidad se ha visto algo afectada por precaución. El sueño se interrumpe ocasionalmente cuando cambio de posición bruscamente durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, lo que corresponde a un rango de 4-6 en la escala Oswestry. 2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra inconveniente estar de pie por más de 30 minutos, lo que corresponde a un rango de 2-4 en la escala Oswestry. 3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, pero evita caminatas largas, lo que corresponde a un rango de 3-5 en la escala Oswestry. 4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para vestirse y bañarse, lo que corresponde a un rango de 3-5 en la escala Oswestry. 5. Levantar peso: 1 punto - El paciente ha dejado que otros carguen las compras, lo que corresponde a un rango de 0-1 en la escala Oswestry. 6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente encuentra inconveniente estar sentado por períodos prolongados, especialmente en sillas duras, lo que corresponde a un rango de 3-5 en la escala Oswestry. 7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie o caminar, lo que corresponde a un rango de 2-4 en la escala Oswestry. 8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones, lo que corresponde a un rango de 2-4 en la escala Oswestry. 9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad se ha visto afectada por precaución, lo que corresponde a un rango de 2-4 en la escala Oswestry. 10. Dormir: 2 puntos - El sueño se interrumpe ocasionalmente, lo que corresponde a un rango de 2-4 en la escala Oswestry.

Según la escala Oswestry, el paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (31-40 puntos).
Puntuación esperada: 11 | Modelo: 21 | Diferencia: 10

29% [REDACTED] | 37/126 [14:46<33:25, 22.54s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 37

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, vengo por una molestia muy leve en la espalda baja que tengo desde hace tres días. Creo que fue por dormir en una cama diferente durante un viaje de trabajo. Es realmente mínimo, más una sensación de tirantez que dolor. Puedo hacer absolutamente todo normal en mi trabajo que requiere estar de pie muchas horas. Caminar, correr, hacer ejercicio, completamente normal. Mis rutinas de cuidado personal son exactamente iguales que siempre. Puedo cargar objetos pesados sin problema alguno. Estar sentado es totalmente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada en lo más mínimo. Duermo perfectamente, solo al despertar noto una ligera rigidez que desaparece inmediatamente con el primer movimiento. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (no existe dolor)

2. Estar de pie: 5 puntos (no hay problemas)

3. Andar: 5 puntos (no hay problemas)

4. Cuidados personales: 5 puntos (no hay problemas)

5. Levantar peso: 5 puntos (no hay problemas)

6. Estar sentado: 5 puntos (no hay problemas)

7. Viajar: 5 puntos (no hay problemas)

8. Vida social: 5 puntos (no hay problemas)

9. Actividad sexual: 5 puntos (no hay problemas)

10. Dormir: 1 punto (mínima rigidez al despertar)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total es de 11 puntos, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 27 | Diferencia: 27

30% [REDACTED] | 38/126 [15:13<34:37, 23.61s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 38

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es bastante severo y me está limitando considerablemente desde hace siete semanas. Todo comenzó gradualmente después de una serie de trabajos de jardinería intensos, pero ha empeorado progresivamente. El dolor es fuerte, constante y punzante. Estar de pie es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin experimentar dolor significativo. Caminar se ha vuelto difícil, evito salir y cuando lo hago necesito descansar frecuentemente. Para bañarme necesito una silla especial y para vestirme requiero ayuda con zapatos y calcetines porque no puedo inclinarme. Levantar objetos pesados es imposible, incluso cosas moderadamente pesadas me causan dolor intenso. Estar sentado también es problemático, especialmente sin soporte lumbar, no aguanto más de 30 minutos. He faltado al trabajo varias veces. Mi vida social se ha reducido significativamente, he cancelado muchos planes. La relación íntima se ha visto muy afectada. El sueño es irregular, me despierto 2-3 veces por la noche debido

- al dolor al moverme. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como fuerte, constante y punzante.
2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie solo puede durar 15 minutos antes de experimentar dolor significativo.
3. Andar: 0 puntos - El paciente evita salir y necesita descansar frecuentemente al caminar.
4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita asistencia para bañarse y vestirse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos moderadamente pesados, y levantar objetos pesados es imposible.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente solo puede aguantar sentarse sin soporte lumbar por 30 minutos.
7. Viajar: 0 puntos - No se menciona si el paciente viaja o no, pero se menciona que el paciente evita salir.
8. Vida social: 0 puntos - La vida social se ha reducido significativamente.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima se ha visto afectada.
10. Dormir: 1 punto - El paciente experimenta dolor al moverse y despertarse 2-3 veces por la noche, lo que sugiere dificultades en el dormir, pero no se especifica si el paciente tiene problemas para caer dormido o mantenerse dormido.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería 12 puntos. Una puntuación total de 10 o más indica una discapacidad moderada a grave.

Puntuación esperada: 23 | Modelo: 16 | Diferencia: 7

31% [REDACTED] | 39/126 [15:34<33:05, 22.82s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 39

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una molestia menor en la zona lumbar desde hace ocho días. Empezó después de pasar varias horas limpiando ventanas, estuve estirándome y en posiciones incómodas. Es más una sensación de cansancio muscular que dolor real. Puedo trabajar completamente normal, no he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina. Caminar es totalmente normal, continúo con mis actividades físicas habituales. Las actividades de cuidado personal las realizo sin ninguna restricción. Puedo levantar objetos normalmente, ayer moví cajas en casa sin problemas. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social continúa igual que siempre, no he tenido que cancelar nada. Duermo bien, ocasionalmente noto una ligera tensión muscular al acostarme, pero no interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia menor o sensación de cansancio muscular, no un dolor real.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar es totalmente normal.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna dificultad al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna restricción en realizar actividades de cuidado personal.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha levantado cajas sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna dificultad al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha informado que su vida social continúa igual que siempre.
9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información suficiente sobre la actividad sexual del paciente.
10. Dormir: 1 punto - El paciente ocasionalmente nota una ligera tensión muscular al acostarse, pero no interfiere con su descanso.

Total: 2 puntos.

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un total de 2 puntos.
Puntuación esperada: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5

32% [REDACTED] | 40/126 [15:47<28:28, 19.86s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 40

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es crítica y ha empeorado dramáticamente en el último mes. Inicialmente era manejable después de una caída en casa, pero ahora es absolutamente incapacitante. El dolor es extremo, constante y despiadado, siento como si tuviera hierros candentes en la columna. No puedo estar de pie ni por segundos, cualquier intento resulta en dolor insoportable. Caminar es completamente imposible, dependo totalmente de silla de ruedas. Para todas las actividades básicas - higiene, vestido, alimentación - requiero asistencia completa de cuidadores. No puedo levantar nada, ni siquiera una pluma. Estar sentado es agonizante, solo puedo hacerlo minutos muy cortos con medicación previa y múltiples almohadones. He perdido todo: trabajo, independencia, dignidad. No existe vida social, estoy completamente aislado. Mi relación de pareja ha colapsado. El sueño es inexistente, las noches son un infierno de dolor constante, incluso los opioides más fuertes apenas proporcionan alivio momentáneo.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (extremo y constante)

2. Estar de pie: 0 puntos (imposible)

3. Andar: 0 puntos (imposible)

4. Cuidados personales: 5 puntos (requiero asistencia completa)

5. Levantar peso: 0 puntos (imposible)

6. Estar sentado: 1 punto (agonizante, pero puede hacerlo brevemente con medicación y múltiples almohadones)

7. Viajar: 0 puntos (imposible)

8. Vida social: 0 puntos (completamente aislado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no existe)

10. Dormir: 0 puntos (inexistente)

Total: 11 puntos (extremo discapacidad lumbar)

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 17 | Diferencia: 33

33% [REDACTED] | 41/126 [16:12<30:31, 21.54s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 41

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hola doctor, desde hace diez días tengo dolor en la espalda baja que me está causando dificultades moderadas en mi vida diaria. Comenzó después de ayudar a un amigo a mudarse, cargando electrodomésticos pesados. El dolor es constante pero con intensidad variable durante el día. Estar de pie por más de 20 minutos se vuelve incómodo, tengo que alternar con períodos sentado. Caminar distancias normales no es mayor problema, pero evito caminatas largas que antes hacía regularmente. Para las actividades de cuidado personal he tenido que modificar mi rutina, me baño más rápido y evito inclinarme mucho hacia adelante. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, le pido ayuda a otros para las tareas que lo requieren. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve molesto, especialmente en superficies duras. He declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física. La vida íntima se ha visto algo comprometida por precaución al dolor. El sueño se ve interrumpido ocasionalmente, especialmente cuando me muevo durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como constante con intensidad variable, lo que sugiere un dolor moderado a intenso. 2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente experimenta inconvenientes al estar de pie por más de 20 minutos, lo que indica un problema moderado. 3. Andar: 2 puntos - El paciente no reporta problemas mayores al caminar distancias normales. 4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que modificar su rutina de cuidados personales, lo que indica un problema moderado. 5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados, lo que sugiere un problema grave. 6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente encuentra inconveniente sentarse por mucho tiempo, especialmente en superficies duras. 7. Viajar: 2 puntos - El paciente no reporta problemas mayores al viajar. 8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones debido a la actividad física requerida, lo que sugiere un problema moderado. 9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente ha indicado que su vida íntima se ha visto comprometida por precaución al dolor, lo que sugiere un problema moderado. 10. Dormir: 2 puntos - El paciente informa que el sueño se ve interrumpido ocasionalmente, lo que indica un problema moderado.

Basado en la entrevista, el paciente puede tener una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 11 | Modelo: 19 | Diferencia: 8

33% [REDACTED] | 42/126 [16:33<29:45, 21.26s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 42

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una molestia en la espalda baja desde hace una semana, empezó después de trabajar en el jardín. Es un dolor leve, máximo un 3 de 10. Puedo estar de pie sin problemas durante mi jornada laboral completa. Camino normal, tanto para ir al trabajo como para hacer ejercicio por las tardes. Me baño y me visto sin ninguna complicación, aunque sí noto un poco la molestia cuando me inclino para atarme los zapatos. Puedo cargar cosas normalmente, ayer ayudé a mi vecino a mover unos muebles y aunque sentí la molestia, pude hacerlo. En la oficina paso 8 horas sentado y estoy cómodo. El fin de semana viajé 4 horas para visitar a mi familia sin problemas. Mis actividades sociales siguen igual, fui al cine y a un concierto esta semana. No ha afectado para nada mi vida íntima. Duermo bien, solo una noche me desperté porque me moví bruscamente, pero me volví a dormir enseguida." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve, menor de 2 puntos)

2. Estar de pie: 2 puntos (puede estar de pie durante toda su jornada laboral sin problemas, no especificó dificultades)

3. Andar: 0 puntos (no especificó problemas al caminar)

4. Cuidados personales: 1 punto (puede bañarse y vestirse sin complicaciones, pero nota un poco de molestia al inclinarse)

5. Levantar peso: 2 puntos (pudo ayudar a su vecino a mover muebles)

6. Estar sentado: 2 puntos (puede pasar 8 horas sentado en la oficina sin descomforto)

7. Viajar: 2 puntos (viajó 4 horas sin problemas)

8. Vida social: 2 puntos (actividades sociales siguen igual)

9. Actividad sexual: 2 puntos (no afectó su vida íntima)

10. Dormir: 1 punto (despertó una sola noche, pero volvió a dormir rápidamente)

Puntaje total: 11 puntos.

La puntuación total de 11 indica una baja discapacidad lumbar. El paciente describe una molestia leve en la espalda baja que no afecta significativamente su vida diaria.

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 14 | Diferencia: 12

34% [REDACTED] | 43/126 [16:59<31:39, 22.88s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 43

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero constante, llevo así dos meses. Lo calificaría como un 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie durante períodos cortos, unos 20-30 minutos, pero después necesito descansar. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas que solía hacer. Para ducharme y vestirme necesito más tiempo y debo ser cuidadoso con los movimientos, especialmente al inclinarme. Cargar cosas pesadas se ha vuelto difícil, ahora mi hijo me ayuda con las compras grandes. Estar sentado es tolerable por períodos de 1-2 horas, pero después tengo que levantarme y moverme. Los viajes largos son incómodos, necesito hacer paradas adicionales para estirarme. He reducido algunas actividades sociales, sobre todo las que requieren estar mucho tiempo de pie. La intimidad con mi pareja requiere más cuidado y a veces evitamos ciertas posiciones. Duermo aceptablemente, aunque me despierto ocasionalmente si me muevo mal durante la noche." [INST] 1.

Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor de espalda como moderado a fuerte, con una intensidad de 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante períodos cortos, pero necesita descansar después.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para ducharse y vestirse.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente ha encontrado difícil cargar cosas pesadas y necesita ayuda.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse por períodos de 1-2 horas, pero luego necesita levantarse y moverse.

7. Viajar: 2 puntos - Los viajes largos son incómodos y requieren paradas adicionales.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales debido a la dificultad de estar mucho tiempo de pie.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad requiere más cuidado y en ocasiones se evitan ciertas posiciones.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme aceptablemente, pero puede despertarse ocasionalmente si se mueve mal durante la noche.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total es la suma de los puntos obtenidos en cada ítem. En este caso, el paciente obtiene un puntaje total de 22 puntos, lo que indica una moderada a severa discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 13 | Modelo: 23 | Diferencia: 10

35% [REDACTED] | 44/126 [17:22<31:13, 22.85s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 44

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi espalda me duele terriblemente desde hace tres meses tras levantar mal una caja en el trabajo. Es un dolor severo, constante de 8-9 de 10. No puedo estar de pie más de unos pocos minutos,

inmediatamente tengo que buscar donde sentarme o recostarme. Caminar incluso distancias muy cortas, como ir al baño, es extremadamente doloroso. Necesito ayuda para bañarme, mi hija me ayuda porque no puedo inclinarme para lavarme los pies. Vestirme es una pesadilla, me toma mucho tiempo y esfuerzo, especialmente ponerme los pantalones y zapatos. No puedo levantar nada de peso, ni siquiera una botella de agua. Estar sentado también duele, solo aguanto 15-20 minutos antes de que sea insoportable. No he podido viajar desde que empezó esto, cancelé unas vacaciones familiares. Mi vida social se acabó, no veo a mis amigos desde hace meses. La intimidad es imposible, cualquier contacto físico me causa dolor. Casi no duermo, me despierto cada hora por el dolor, estoy tomando medicamentos fuertes pero no ayudan mucho." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos (máximo) - El paciente describe un dolor constante y severo de una intensidad muy alta (8-9 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de unos pocos minutos.

3. Andar: 0 puntos - Caminar es extremadamente doloroso, el paciente no puede hacerlo.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar cuidados personales, como bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente solo puede aguantar 15-20 minutos sentado antes de que el dolor sea insoportable.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar desde que comenzó el dolor.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente se ha acabado.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es imposible debido al dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente casi no duerme y se despierta cada hora por el dolor.

La puntuación total de la entrevista es de 21 puntos (máximo de 50). El paciente presenta una discapacidad lumbar muy grave, según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 41 | Modelo: 35 | Diferencia: 6

36% [REDACTED] | 45/126 [17:44<30:30, 22.60s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 45

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo molestias lumbares desde hace dos semanas después de un día intenso de limpieza en casa. El dolor es leve a moderado, alrededor de 4 de 10. Puedo estar de pie durante mi trabajo sin mayor

problema, aunque hacia el final del día siento más molestia. Camino normalmente, hago mis recorridos habituales sin limitaciones importantes. En la ducha y al vestirme noto algo de rigidez matutina, pero puedo hacer todo por mí mismo sin ayuda. Cargar bolsas del supermercado me genera un poco más de molestia, pero aún puedo hacerlo. Sentado en mi escritorio estoy bien durante varias horas, solo ocasionalmente cambio de posición por comodidad. Los viajes en auto son tolerables, en un trayecto reciente de 2 horas solo sentí molestia al final. Mis actividades sociales continúan normales, aunque evito bailar como solía hacer. La vida íntima con mi pareja está bien, solo somos un poco más cuidadosos. Duermo bien la mayoría de las noches, ocasionalmente me despierto si duermo en mala posición."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve a moderado dolor, bajo 5 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (Puede estar de pie durante su trabajo sin problemas)

3. Andar: 0 puntos (Camina normalmente, no hay limitaciones importantes)

4. Cuidados personales: 1 punto (Nota ligeramente más rigidez al despertar, pero puede hacer todo por sí mismo)

5. Levantar peso: 1 punto (Puede cargar bolsas del supermercado con alguna molestia)

6. Estar sentado: 0 puntos (Puede sentarse en su escritorio durante varias horas)

7. Viajar: 1 punto (Viajes en auto son tolerables, pero nota molestia al final)

8. Vida social: 1 punto (Actividades sociales continúan, pero evita bailar)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Vida íntima con su pareja está bien)

10. Dormir: 1 punto (Duerme bien la mayoría de las noches, pero ocasionalmente se despierta si duerme en mala posición)

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es de 6 puntos (0-27 puntos, con un puntaje más bajo indicando mayor gravedad). Esto sugiere una discapacidad lumbar leve.

Puntuación esperada: 8 | Modelo: 7 | Diferencia: 1

37% [REDACTED] | 46/126 [18:11<31:51, 23.89s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 46

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es severo y limitante, comenzó hace cuatro meses tras un accidente de tráfico. El dolor es intenso, entre 7-8 de 10 constantemente. Estar de pie es muy difícil, máximo 10 minutos antes de que el dolor sea inaguantable. Caminar más de 50 metros me resulta extremadamente doloroso, necesito usar un bastón para distancias cortas. Para bañarme instalamos barras de apoyo y un asiento, aun así necesito ayuda ocasional de mi esposa. Vestirme es muy complicado, especialmente calcetines y zapatos, me toma mucho tiempo y esfuerzo. No puedo levantar prácticamente nada, mi esposa hace todas las tareas que requieren cargar peso. Sentarme es problemático, después de 30 minutos el dolor aumenta significativamente. Los viajes son casi imposibles, solo salgo para citas médicas esenciales. He abandonado la mayoría de mis actividades sociales, solo veo a familia cercana ocasionalmente. La intimidad se ha visto muy afectada, es muy difícil encontrar posiciones cómodas. Duermo mal, me

despierto varias veces por noche por el dolor, uso múltiples almohadas para encontrar posición.". [/INST]

1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor lumbar es intenso, con una escala de 7-8 de 10 constantemente.
2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que está de pie solo durante un máximo de 10 minutos antes de que el dolor sea insoportable.
3. Andar: 1 punto - El paciente necesita usar un bastón para caminar más de 50 metros, lo que indica dificultad moderada en el caminar.
4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente requiere ayuda ocasional para realizar tareas de cuidados personales, como bañarse y vestirse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún peso debido a su condición.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra sentarse problemático y después de 30 minutos el dolor aumenta significativamente.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes son casi imposibles.
8. Vida social: 1 punto - El paciente ha abandonado la mayoría de sus actividades sociales, pero sigue viendo a familiares cercanos ocasionalmente.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad se ha visto muy afectada y encuentra difícil encontrar posiciones cómodas.
10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta varias veces por noche por el dolor, lo que indica dificultad moderada en el dormir.

La puntuación total es de 16 puntos, lo que indica una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 31 | Modelo: 10 | Diferencia: 21

37% [REDACTED] | 47/126 [18:31<29:54, 22.72s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 47

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, apenas tengo una ligera molestia en la zona lumbar desde ayer por la noche. Creo que dormí en mala posición. Es muy leve, tal vez un 1 de 10, más que dolor es una sensación extraña. Puedo estar de pie perfectamente durante todas mis actividades normales. Camino sin ningún problema, esta mañana hice mi rutina de ejercicio completa. Me ducho y me visto completamente normal, no noto ninguna limitación. Cargué todas mis cosas pesadas como siempre, incluso ayudé a mi vecina con sus bolsas. En el trabajo paso horas sentado frente al computador sin molestias. Ayer manejé 3 horas para una reunión sin ningún problema. Mis actividades sociales son normales, anoche fui a bailar con mis amigos. No hay ningún problema en mi vida íntima. Duermo excelente, solo ayer me desperté una vez porque noté la molestia, pero me dormí inmediatamente.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (el paciente describe el dolor como leve, equivalente a un 1 de 10)

2. Estar de pie: 5 puntos (el paciente no reporta ninguna dificultad para estar de pie durante todas sus actividades normales)

3. Andar: 5 puntos (el paciente camina sin problemas)
4. Cuidados personales: 5 puntos (el paciente se duchó y se vistió normalmente)
5. Levantar peso: 5 puntos (el paciente levantó cosas pesadas sin problemas)
6. Estar sentado: 5 puntos (el paciente pasó horas sentado en el trabajo sin molestias)
7. Viajar: 5 puntos (el paciente manejó durante 3 horas sin problemas)
8. Vida social: 5 puntos (las actividades sociales son normales)
9. Actividad sexual: 5 puntos (el paciente informa que no hay problema en su vida íntima)
10. Dormir: 4 puntos (el paciente despertó una vez debido a la molestia, pero regresó a dormir inmediatamente)

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el paciente obtiene un total de 45 puntos. Esto indica una baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 41 | Diferencia: 41

38% | 48/126 [18:57<30:58, 23.83s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 48

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Llevo cinco meses con dolor lumbar crónico que comenzó gradualmente sin causa aparente. El dolor fluctúa entre 6-7 de 10 diariamente. Estar de pie más de 15 minutos me resulta muy incómodo, tengo que buscar apoyo o sentarme. Caminar distancias largas es problemático, evito las caminatas que antes disfrutaba. Para ducharme tengo que apoyarme frecuentemente en las paredes, y vestirme por las mañanas me toma el doble de tiempo por la rigidez. Cargar cosas pesadas se ha vuelto imposible, mi familia me ayuda con las compras y tareas domésticas. Estar sentado por períodos largos también es incómodo, en el trabajo tengo que levantarme cada 45 minutos. Los viajes largos son muy difíciles, tuve que cancelar unas vacaciones por esto. Mi vida social se ha reducido considerablemente, evito eventos donde tenga que estar mucho tiempo de pie o sentado. La intimidad con mi pareja se ha complicado, tenemos que planificar y ser muy cuidadosos. Duermo fragmentado, me despierto 3-4 veces por noche por dolor y cambios de posición." [INST] 1. Intensidad dolor: 6 puntos - El paciente experimenta dolor crónico de intensidad moderada a severa, que fluctúa entre 6-7 de 10.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie por más de 15 minutos sin apoyo, lo que indica una gran dificultad.

3. Andar: 2 puntos - Caminar distancias largas es problemático, lo que indica una moderada dificultad.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita apoyo para ducharse y vestirse, lo que indica una dificultad moderada.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha declarado que cargar cosas pesadas es imposible, lo que indica una gran dificultad.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se siente incómodo al sentarse por períodos largos, lo que indica una moderada dificultad.

7. Viajar: 1 punto - Los viajes largos son muy difíciles, lo que indica una gran dificultad.

8. Vida social: 2 puntos - La vida social del paciente se ha reducido considerablemente, lo que indica una moderada dificultad.
9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad con el pareja se ha complicado, lo que indica una dificultad moderada.
10. Dormir: 4 puntos - El paciente duerme fragmentado y se despierta 3-4 veces por noche, lo que indica una dificultad moderada a severa.

Basado en la entrevista, el paciente presenta una discapacidad lumbar moderada a severa según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 24 | Modelo: 27 | Diferencia: 3

39% | 49/126 [19:18<29:23, 22.91s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 49

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor en la espalda baja desde hace tres días después de hacer ejercicio intenso. El dolor es moderado, como un 5 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque siento algo de molestia después de una hora. Camino sin grandes problemas, completé mi rutina matutina de 30 minutos de caminata. Para bañarme y vestirme soy un poco más lento y cuidadoso, pero puedo hacerlo solo. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera molestia, evito las cargas muy pesadas pero puedo manejar bolsas normales. Sentado en mi oficina estoy relativamente cómodo, aunque cambio de posición más frecuentemente. Ayer viajé una hora en auto sin problemas mayores, solo un poco de rigidez al llegar. Mis planes sociales continúan, aunque evité ir a un concierto donde tendría que estar de pie mucho tiempo. La vida íntima está bien, solo somos más cuidadosos con ciertos movimientos. Duermo bien en general, una o dos noches me desperté por cambiar de posición bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos normales, pero con alguna molestia después de una hora)

3. Andar: 0 puntos (Camina sin grandes problemas)

4. Cuidados personales: 1 punto (Solo un poco más lento y cuidadoso)

5. Levantar peso: 2 puntos (Evita cargas muy pesadas)

6. Estar sentado: 2 puntos (Relativamente cómodo, pero cambia de posición más frecuentemente)

7. Viajar: 0 puntos (Viajó una hora en auto sin problemas mayores)

8. Vida social: 1 punto (Evitó ir a un concierto donde tendría que estar de pie mucho tiempo)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Vida íntima está bien)

10. Dormir: 1 punto (Duerme bien en general, pero despertó una o dos noches por cambiar de posición bruscamente)

Puntaje total: 11 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, un puntaje total de 10 o menos indica un bajo nivel de discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 10 | Modelo: 9 | Diferencia: 1

40% [REDACTED] | 50/126 [19:44<30:19, 23.94s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 50

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es absolutamente incapacitante, llevo así desde hace ocho meses tras una hernia discal. El dolor es constante e insoportable, 10 de 10, nunca baja de 8. No puedo estar de pie ni siquiera un minuto, inmediatamente tengo que acostarme. Caminar al baño, que está a 5 metros, es una agonía que me toma varios minutos con descansos. Necesito ayuda total para bañarme, mi esposa me lava porque no puedo moverme. Vestirme es imposible sin ayuda, me toma una hora con ayuda de mi familia. No puedo levantar absolutamente nada, ni un vaso de agua. Estar sentado es tortura, máximo 5 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en meses, los viajes son impensables. Mi vida social ha desaparecido completamente, no recibo visitas porque el dolor es muy severo. La intimidad es inexistente, cualquier contacto físico es doloroso. No duermo prácticamente nada, paso las noches despierto por el dolor severo, los medicamentos más fuertes no me alivian." [INST] 1. Intensidad dolor: 10 puntos (máximo) - El paciente describe el dolor como constante, inesperable, y de intensidad máxima (10 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente requiere ayuda total para realizar cuidados personales como bañarse, vestirse y limpiarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún peso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse pero solo por un corto período de tiempo (5 minutos) antes de que el dolor se vuelva intolerable.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha abandonado toda su vida social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad es inexistente debido al dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme prácticamente nada y pasa las noches despiertos debido al dolor severo.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería 31 puntos (5 puntos por cada ítem en el que no puede realizar la actividad, y 0 puntos en los otros 5 ítems en los que no puede realizar la actividad ni siquiera con ayuda). Esta puntuación indica un nivel muy alto de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 49 | Modelo: 27 | Diferencia: 22

40% [REDACTED] | 51/126 [20:09<30:07, 24.10s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 51

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi problema de espalda comenzó hace seis semanas después de cargar muebles en una mudanza. El dolor es significativo, alrededor de 6-7 de 10. Estar de pie durante mi trabajo de 8 horas se ha vuelto muy difícil, necesito sentarme cada 20-30 minutos. Caminar distancias cortas va bien, pero evito las caminatas largas por el dolor. En la ducha tengo que ser muy cuidadoso, me apoyo en las paredes y uso un banquito para lavarme los pies. Vestirme es lento y doloroso, especialmente ponerme calcetines y zapatos me cuesta mucho. No puedo cargar las bolsas de compras como antes, mi hijo me acompaña para ayudarme. Estar sentado más de una hora se vuelve muy incómodo, tengo que cambiar de posición constantemente. Los viajes largos son problemáticos, el mes pasado tuve que acortar un viaje familiar. He cancelado varias salidas sociales, especialmente las que involucran caminar o estar de pie mucho tiempo. La intimidad se ha complicado, tenemos que ser muy creativos con posiciones que no me duelan. Duermo mal, me despierto frecuentemente por el dolor y me cuesta volver a dormir." [/INST]

1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como significativo, con una intensidad de 6-7 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente tiene dificultades al estar de pie durante 8 horas de trabajo y necesita sentarse cada 20-30 minutos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas sin problemas, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para realizar cuidados personales, especialmente en la ducha y vestirse.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente no puede cargar bolsas de compras como antes y necesita ayuda de su hijo.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente encuentra incómodo sentarse más de una hora y necesita cambiar de posición constantemente.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente tiene problemas con viajes largos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado varias salidas sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad se ha complicado y requiere posiciones que no duelen.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente tiene problemas para dormir debido al dolor y se despierta frecuentemente.

Total: 25 puntos.

El puntaje total de 25 indica una discapacidad moderada a grave según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Puntuación esperada: 20 | Modelo: 28 | Diferencia: 8

41% [REDACTED] | 52/126 [20:22<25:29, 20.67s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 52

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una molestia leve en la zona lumbar desde hace cuatro días. Empezó después de estar mucho tiempo trabajando en el computador en mala posición. El dolor es muy leve, máximo 2-3 de 10. Puedo estar de pie sin problemas durante toda mi jornada laboral. Camino normalmente, incluso hice ejercicio cardiovascular ayer. Me baño y me visto sin limitaciones, solo noto un poco de rigidez matutina que se pasa rápido. Puedo cargar cosas normalmente, ayer cargué todas mis bolsas del supermercado sin problema. Paso muchas horas sentado trabajando y estoy cómodo, solo ajusto mi postura ocasionalmente. Los viajes no me afectan, el fin de semana manejé 2 horas para visitar a mis padres. Mis actividades sociales continúan normales, fui al gimnasio y a cenar con amigos. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo excelente, solo una noche noté un poco de molestia al acostarme pero me dormí bien."

- [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)
2. Estar de pie: 2 puntos (sin problemas)
3. Andar: 2 puntos (normalmente)
4. Cuidados personales: 0 puntos (sin limitaciones)
5. Levantar peso: 2 puntos (normalmente)
6. Estar sentado: 2 puntos (cómodo)
7. Viajar: 2 puntos (sin problemas)
8. Vida social: 2 puntos (normales)
9. Actividad sexual: 2 puntos (sin problemas)
10. Dormir: 1 punto (leve molestia)

Total: 12 puntos.

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar (bajo rango de 0-10 puntos) según la Escala Oswestry. Puntuación esperada: 0 | Modelo: 15 | Diferencia: 15

42% | 53/126 [20:51<28:09, 23.15s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 53

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es severo y constante, llevo así cuatro meses desde una caída en el trabajo. El dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente. No puedo estar de pie más de 5-10 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable. Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso, uso bastón para cualquier distancia. Para bañarme necesito sentarme en una silla especial y mi esposa me ayuda con las partes que no alcanzo. Vestirme es una lucha diaria, me toma 30-40 minutos y a menudo necesito ayuda con calcetines y zapatos. No puedo levantar nada pesado, incluso una jarra de agua me causa dolor intenso. Estar sentado también es problemático, después de 20-30 minutos necesito cambiar de posición urgentemente. No puedo viajar, cancelé todas mis citas que requieren trasladarse lejos. Mi vida social prácticamente no existe, solo veo a familiares cercanos en casa ocasionalmente. La intimidad es muy difícil, hemos tenido que adaptar completamente nuestra vida íntima. Duermo muy mal, me despierto cada 2-3 horas por dolor, necesito medicación fuerte para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente, lo que representa una intensidad severa de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-10 minutos sin que el dolor se vuelva intolerable.

3. Andar: 0 puntos - Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso para el paciente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse, lo que representa alguna dificultad en realizar estas actividades.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, incluso una jarra de agua causa dolor intenso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo durante 20-30 minutos antes de necesitar cambiar de posición urgentemente.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a la dificultad para caminar y el dolor que provoca el desplazamiento.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente casi no existe debido a la dificultad para salir y interactuar con otras personas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es muy difícil para el paciente y han tenido que adaptar completamente su vida íntima.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y necesita medicación fuerte para poder descansar adecuadamente, lo que representa alguna dificultad en el descanso.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una discapacidad severa, con un puntaje total de 15 puntos.

Puntuación esperada: 35 | Modelo: 30 | Diferencia: 5

43% | 54/126 [21:11<26:40, 22.22s/it] Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':2 for open-end generation.

Entrevista 54

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Llevo una semana con dolor lumbar después de un mal movimiento jugando tenis. El dolor es moderado, entre 4-5 de 10. Puedo estar de pie durante períodos razonables, aunque después de 45 minutos empiezo a sentir molestia. Camino sin grandes limitaciones, hice mi caminata matutina habitual aunque un poco más corta. Para ducharme y vestirme necesito ir más despacio, especialmente al inclinarme hacia adelante. Cargar cosas pesadas me resulta incómodo, evito las bolsas muy cargadas pero puedo manejar peso moderado. Estar sentado en mi trabajo es tolerable por 1-2 horas antes de necesitar levantarme y estirarme. Viajé el fin de pasado 90 minutos en auto con algo de molestia pero tolerable. He mantenido la mayoría de mis compromisos sociales, aunque evité una excursión larga que tenía planeada. La vida íntima requiere más cuidado, evitamos algunas posiciones pero seguimos activos. Duermo aceptablemente, me despierto ocasionalmente si me muevo bruscamente pero logro volver a dormir." [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, entre 4-5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos razonables, pero con molestias después de 45 minutos)

3. Andar: 1 punto (Camino sin grandes limitaciones)

4. Cuidados personales: 2 puntos (Necesita ir más despacio al ducharme y vestirme)

5. Levantar peso: 3 puntos (Evita cargas muy pesadas)

6. Estar sentado: 2 puntos (Puede sentarse tolerablemente por 1-2 horas)

7. Viajar: 2 puntos (Puede viajar en automóvil durante 90 minutos con molestias tolerables)

8. Vida social: 2 puntos (He mantenido la mayoría de sus compromisos sociales)

9. Actividad sexual: 2 puntos (Requiere más cuidado y evitan algunas posiciones, pero siguen activos)

10. Dormir: 1 punto (Duerme aceptablemente, pero se despierta ocasionalmente si se mueve bruscamente)

Total: 13 puntos.

La puntuación total de 13 indica que el paciente presenta una leve discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 12 | Modelo: 18 | Diferencia: 6

44% [REDACTED] | 55/126 [21:35<27:08, 22.93s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 55

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda baja es extremadamente severo, empezó hace siete meses tras un accidente automovilístico. El dolor es constante e intenso, 9-10 de 10 sin alivio. Estar de pie es imposible, no puedo mantenerme erguido más de 1-2 minutos. Caminar incluso 5 metros hasta el baño es una tortura que me toma varios minutos con múltiples descansos. Necesito asistencia completa para bañarme, tengo una silla de ducha y mi cuidadora me ayuda. Vestirme requiere ayuda total, no puedo inclinarme ni levantar las piernas. No puedo levantar absolutamente nada, hasta sostener un libro me causa dolor insoportable. Estar sentado es tortura pura, máximo 5-10 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en meses, cualquier viaje es imposible. Mi vida social ha desaparecido por completo, no puedo recibir visitas por el nivel de dolor. La intimidad es imposible, cualquier contacto físico aumenta el dolor. No duermo, paso las noches en vela por el dolor constante, ningún medicamento me proporciona alivio suficiente." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como constante y de intensidad muy alta (9-10 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede mantenerse de pie ni para un momento.
3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar ni 5 metros.
4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente requiere asistencia completa para realizar todas las actividades personales, incluyendo bañarse, vestirse y levantarse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera un libro.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente solo puede sentarse por un corto tiempo (5-10 minutos) antes de que el dolor se vuelva insoportable.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha salido de casa en meses y viajes son imposibles.
8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido por completo.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente describe la intimidad como imposible debido al dolor.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme y pasa las noches en vela por el dolor constante.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta un puntaje total de 25 puntos (5 puntos por cada ítem con puntaje máximo de 5 puntos). Esto indica un alto nivel de discapacidad lumbar. Puntuación esperada: 49 | Modelo: 17 | Diferencia: 32

44% | 56/126 [22:03<28:24, 24.35s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 56

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar desde hace dos meses que comenzó después de levantar una caja pesada mal. El dolor es moderado a severo, entre 6-7 de 10 la mayoría del tiempo. Puedo estar de pie unos 15-20 minutos antes de que el dolor me obligue a sentarme o apoyarme. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminar más de 2-3 cuerdas seguidas. Para ducharme uso barras de apoyo y tengo que ser muy cuidadoso, vestirme me toma mucho más tiempo especialmente los zapatos. Cargar bolsas de supermercado se ha vuelto imposible, mi esposa hace todas las compras pesadas. Estar sentado es tolerable por períodos de 45 minutos a 1 hora antes de volverse muy incómodo. Los viajes largos son muy difíciles, tuve que usar almohadas especiales en mi último viaje de 3 horas. He reducido significativamente mis

salidas sociales, solo voy a eventos realmente importantes. La intimidad se ha complicado mucho, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y a menudo evitamos el contacto. Duermo mal, me despierto 4-5 veces por noche por el dolor, necesito medicación para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado a severo, con una intensidad de 6-7 de 10 la mayoría del tiempo.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo unos 15-20 minutos antes de sentirse obligado a sentarse o apoyarse.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas, pero evita caminar más de 2-3 cuerdas seguidas.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente tiene dificultades para ducharse y vestirse debido a la necesidad de usar barras de apoyo y tomar mucho más tiempo que antes.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha descrito que cargar bolsas de supermercado ha vuelto imposible.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse por períodos de 45 minutos a 1 hora antes de sentirse incómodo.

7. Viajar: 1 punto - Los viajes largos son muy difíciles y requieren el uso de almohadas especiales.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido significativamente sus salidas sociales.

9. Actividad sexual: 1 punto - La intimidad se ha complicado mucho y requiere ser extremadamente cuidadosos, o en algunos casos evitan el contacto.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal y necesita medicación para poder descansar.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar sería de 22 puntos, lo que indica una discapacidad moderada.

Puntuación esperada: 24 | Modelo: 20 | Diferencia: 4

45% | 57/126 [22:27<28:06, 24.45s/it] Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':2 for open-end generation.

Entrevista 57

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, tengo una leve molestia en la espalda baja desde hace tres días. Empezó después de dormir en un sofá incómodo en casa de mis padres. Es más una sensación rara que dolor real, tal vez 1-2 de 10. Puedo estar de pie trabajando todo el día sin problema alguno. Camino completamente normal, esta mañana hice mi rutina de correr 5 kilómetros. Me baño y me visto sin ninguna complicación, solo noto un poquito de rigidez cuando me levanto por las mañanas. Puedo cargar todo lo que normalmente cargo, ayer ayudé a un amigo a cargar cajas pesadas en su mudanza. Paso 8 horas diarias sentado en mi oficina sin molestias. Viajo frecuentemente por trabajo, ayer hice un vuelo de 4 horas sin ningún problema. Mis actividades sociales son completamente normales, este fin de semana jugué fútbol con mis amigos. No hay ningún impacto en mi vida íntima con mi pareja. Duermo perfectamente, solo la primera noche noté un poco la molestia pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (el paciente describe una sensación rara o leve, por lo que podría considerarse como nulo o leve dolor, por lo que se le asigna un punto)

2. Estar de pie: 5 puntos (el paciente afirma que puede estar de pie y trabajar todo el día sin problemas)
3. Andar: 5 puntos (el paciente camina normalmente)
4. Cuidados personales: 0 puntos (el paciente no reporta ninguna dificultad en el baño o vestirse)
5. Levantar peso: 5 puntos (el paciente afirma que puede levantar todo lo que normalmente hace)
6. Estar sentado: 5 puntos (el paciente pasa 8 horas diarias sentado sin problemas)
7. Viajar: 5 puntos (el paciente viaja frecuentemente y no reporta problemas)
8. Vida social: 5 puntos (las actividades sociales son completamente normales)
9. Actividad sexual: 5 puntos (el paciente no reporta ningún impacto en su vida sexual)
10. Dormir: 4 puntos (el paciente solo tuvo problemas al dormir la primera noche, pero no despertó)

Basándose en la información proporcionada, el paciente tiene una puntuación total de 38 puntos (5 puntos por cada ítem sin problemas, menos 2 puntos por la leve molestia reportada en el ítem Intensidad dolor). Según el umbral de puntuaciones, el paciente presenta un nivel de discapacidad lumbar leve a moderada (31-40 puntos).

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 33 | Diferencia: 33

46% | 58/126 [22:51<27:23, 24.17s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 58

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy severo, llevo ocho meses así desde una lesión laboral. El dolor es intenso y constante, 8-9 de 10 todos los días. No puedo estar de pie más de 3-5 minutos, inmediatamente tengo que buscar donde apoyarme o sentarme. Caminar más de 10-15 metros es extremadamente doloroso, uso un andador para distancias cortas. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, tengo asiento especial y barras, pero aún así es muy difícil. Vestirme es una batalla diaria, necesito ayuda para calcetines, zapatos y pantalones, me toma más de 30 minutos. No puedo levantar prácticamente nada, ni siquiera mi medicación sin sentir dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, después de 15-20 minutos el dolor se intensifica mucho. No he podido viajar desde que comenzó, cancelé todas mis citas fuera de la ciudad. Mi vida social ha desaparecido casi completamente, solo recibo visitas cortas de familia. La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones que no causen dolor severo. Duermo terriblemente mal, me despierto cada 1-2 horas por dolor intenso, los medicamentos fuertes apenas me ayudan." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe su dolor como intenso y constante, de nivel 8-9 de 10 todos los días.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie más de 3-5 minutos.
3. Andar: 1 punto - Caminar más de 10-15 metros es extremadamente doloroso.
4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse, vestirse y levantar medicación.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente tiene problemas para sentarse después de 15-20 minutos.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar desde que comenzó el problema.
8. Vida social: 1 punto - La vida social del paciente ha desaparecido casi completamente.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es casi imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta frecuentemente por dolor intenso.

La puntuación total de la entrevista es de 13 puntos. La escala Oswestry de discapacidad lumbar va de 0 a 50 puntos, donde un puntaje más bajo indica mayor discapacidad. En este caso, el paciente tiene una discapacidad severa, con una puntuación total de 13 puntos.

Puntuación esperada: 41 | Modelo: 36 | Diferencia: 5

47% [REDACTED] | 59/126 [23:08<24:44, 22.16s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 59

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo molestias en la zona lumbar desde hace diez días después de una sesión intensa de jardinería. El dolor es leve a moderado, alrededor de 3-4 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque después de una hora empiezo a sentir algo de molestia. Camino sin problemas mayores, completé mis caminatas diarias habituales de 45 minutos. Para ducharme y vestirme soy más cuidadoso con los movimientos bruscos, pero puedo hacer todo independientemente. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera algo de molestia, evito las cargas muy pesadas pero manejo las normales. Estar sentado en mi trabajo es cómodo por períodos de 2-3 horas antes de necesitar cambiar de posición. Los viajes son tolerables, el fin de semana viajé 2 horas con solo un poco de rigidez. Mantengo la mayoría de mis actividades sociales, aunque evité una excursión larga de senderismo. La vida íntima continúa normal, solo somos un poco más cuidadosos con ciertos movimientos. Duermo bien generalmente, ocasionalmente me despierto si cambio de posición bruscamente." [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve)

2. Estar de pie: 4 puntos (Poco a moderadamente limitado)

3. Andar: 0 puntos (Normal)

4. Cuidados personales: 1 punto (Solo levemente más cuidadoso)

5. Levantar peso: 3 puntos (Moderadamente limitado)

6. Estar sentado: 1 punto (Solo levemente cómodo)

7. Viajar: 1 punto (Solo levemente intolerable)

8. Vida social: 1 punto (Solo levemente limitado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Normal)

10. Dormir: 2 puntos (Solo levemente molesto)

Basado en la entrevista proporcionada, el paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry. El total de puntos obtenidos es de 12, y el rango de puntos para una discapacidad leve es entre 0-20 puntos. El paciente puede beneficiarse de terapias complementarias o intervenciones médicas para mejorar sus síntomas.

Puntuación esperada: 9 | Modelo: 12 | Diferencia: 3

48% [REDACTED] | 60/126 [23:32<24:40, 22.43s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 60

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es moderado pero persistente, comenzó hace tres meses después de un episodio de estrés y malas posturas en el trabajo. El dolor fluctúa entre 5-6 de 10 durante el día. Puedo estar de pie por períodos de 30-40 minutos antes de necesitar descansar. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas que solía hacer los fines de semana. En la ducha tengo que apoyarme ocasionalmente y vestirme me toma más tiempo, especialmente al inclinarme. Cargar cosas pesadas se ha vuelto problemático, mi familia me ayuda con las compras grandes y mudanza de muebles. Estar sentado es tolerable por 1-2 horas, pero después necesito levantarme y estirarme. Los viajes largos requieren paradas frecuentes, en mi último viaje de 4 horas tuve que parar tres veces. He reducido algunas actividades sociales, especialmente las que requieren mucho caminar o estar de pie. La intimidad requiere más planificación y cuidado, evitamos ciertas posiciones que me causan dolor. Duermo regular, me despierto 2-3 veces por noche por molestias y me cuesta volver a dormir." [INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado a intenso (5-6 de 10).

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo por 30-40 minutos antes de necesitar descansar.

3. Andar: 3 puntos - Caminar distancias moderadas es tolerable, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para vestirse y tomarse una ducha, pero puede hacerlo con apoyos.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente tiene problemas para levantar cosas pesadas y necesita ayuda de su familia.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede estar sentado solo por 1-2 horas.

7. Viajar: 3 puntos - El paciente requiere paradas frecuentes durante viajes largos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad requiere más planificación y cuidado, evitando ciertas posiciones.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, pero se despierta 2-3 veces por noche y tiene dificultades para volver a dormir.

Según la escala Oswestry, el paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (21-40 puntos).

Puntuación esperada: 16 | Modelo: 25 | Diferencia: 9

48% [REDACTED] | 61/126 [24:00<26:06, 24.11s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 61

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi problema de espalda comenzó hace un mes después de una resbalada en casa. El dolor es significativo, entre 6-7 de 10 especialmente por las mañanas. Estar de pie más de 20 minutos se vuelve muy incómodo, necesito sentarme frecuentemente. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminar más de 3-4 cuadras seguidas por el dolor. Para ducharme instalé barras de apoyo y necesito sentarme para lavarme los pies, vestirme es lento y doloroso. No puedo cargar las bolsas del supermercado como antes, mi hijo me acompaña para ayudarme con las compras. Estar sentado por más de una hora se vuelve muy incómodo, tengo que cambiar de posición constantemente. Los viajes largos son muy problemáticos, cancelé un viaje familiar de fin de semana por esto. He reducido considerablemente mis salidas sociales, solo voy a compromisos muy importantes. La intimidad se ha complicado mucho, tenemos que ser muy creativos y cuidadosos. Duermo mal, me despierto frecuentemente por el dolor y me cuesta encontrar posiciones cómodas." [INST] 1. Intensidad dolor: 6 puntos - El paciente describe el dolor como significativo, con una intensidad entre 6-7 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra que estar de pie más de 20 minutos es incómodo y necesita frecuentemente sentarse.

3. Andar: 4 puntos - Caminar distancias cortas está bien, pero el paciente evita caminar más de 3-4 cuadras seguidas debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita asistencia para ducharse, vestirse y cargar bolsas de compras.

5. Levantar peso: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades específicas para levantar peso, por lo que se asume un punto por debajo del máximo (0 puntos) y se le asigna un punto por la dificultad expresada al cargar las bolsas del supermercado.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente encuentra que estar sentado por más de una hora es incómodo y necesita cambiar de posición constantemente.

7. Viajar: 3 puntos - El paciente encuentra viajes largos problemáticos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido considerablemente sus salidas sociales.

9. Actividad sexual: 5 puntos - La intimidad se ha complicado mucho.

10. Dormir: 5 puntos - El paciente duerme mal, se despierta frecuentemente por el dolor y tiene dificultades para encontrar posiciones cómodas.

Total: 32 puntos. Según la Escala Oswestry, un puntaje total superior a 20 indica una discapacidad moderada a grave. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada a grave.

Puntuación esperada: 22 | Modelo: 35 | Diferencia: 13

49% [REDACTED] | 62/126 [24:16<23:19, 21.87s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 62

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda baja desde hace cinco días. Comenzó después de estar mucho tiempo inclinado arreglando el auto. Es muy suave, máximo 2 de 10, más que dolor es una sensación de tensión. Puedo estar de pie durante toda mi jornada laboral de 9 horas sin problemas. Camino completamente normal, incluso corrí 30 minutos ayer sin molestias. Me baño y me visto sin ninguna limitación, solo noto un poquito de rigidez cuando me levanto de la cama. Puedo cargar todo normalmente, ayer cargué cajas pesadas ayudando a mi hermana. Paso muchas horas sentado en mi oficina sin ninguna molestia. Los viajes no me afectan para nada, el fin de semana manejé 3 horas sin problema. Todas mis actividades sociales continúan normales, fui a una fiesta y bailé toda la noche. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo excelente, solo la primera noche noté un poquito la molestia al acostarme."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (mínimo dolor, no interfiere en actividades diarias)

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay limitación)

3. Andar: 0 puntos (camino normalmente, incluyendo correr)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no hay limitación)

5. Levantar peso: 0 puntos (puede levantar cargas normalmente)

6. Estar sentado: 0 puntos (puede pasar muchas horas sentado sin molestias)

7. Viajar: 0 puntos (viajes no afectan)

8. Vida social: 0 puntos (actividades sociales continuas normales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no hay impacto)

10. Dormir: 1 punto (único día de dificultades al acostarme)

Respuesta final: La entrevista del paciente corresponde a una puntuación total de 2 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, indicando un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 3 | Diferencia: 3

50% | 63/126 [24:40<23:32, 22.43s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 63

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es severo y limitante, llevo seis meses así desde una cirugía que no salió bien. El dolor es intenso, 7-8 de 10 constantemente. No puedo estar de pie más de 10-15 minutos sin que el dolor sea inaguantable. Caminar más de 30-40 metros es extremadamente doloroso, uso bastón para cualquier distancia. Para bañarme tengo una silla especial y necesito ayuda ocasional de mi esposa para las partes difíciles de alcanzar. Vestirme es muy complicado, especialmente calcetines y zapatos, me toma mucho tiempo y esfuerzo. No puedo levantar nada moderadamente pesado, mi esposa hace todo el trabajo doméstico que requiere fuerza. Estar sentado también es problemático, después de 30-45 minutos necesito cambiar de posición por el dolor. Los viajes son muy difíciles, solo salgo para citas médicas esenciales. Mi vida social se ha reducido dramáticamente, solo veo a familia muy cercana en casa. La intimidad es muy

complicada, hemos tenido que adaptar completamente nuestra vida íntima. Duermo fragmentado, me despierto cada 2-3 horas por dolor, uso medicación fuerte para poder descansar." [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe su dolor como intenso y limitante, con un nivel de intensidad de 7-8 de 10 constantemente.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie más de 10-15 minutos sin que el dolor sea intolerable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 30-40 metros es extremadamente doloroso, requiriendo el uso de un bastón para cualquier distancia.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda ocasional para realizar partes difíciles de los cuidados personales, como bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada moderadamente pesado.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente tiene problemas al sentarse, necesitando cambiar de posición después de 30-45 minutos por el dolor.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente solo salgo para citas médicas esenciales.

8. Vida social: 1 punto - La vida social del paciente se ha reducido dramáticamente, solo veo a la familia muy cercana en casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es muy complicada, han tenido que adaptar completamente su vida íntima.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme fragmentado, despertándose cada 2-3 horas por dolor y utilizando medicación fuerte para poder descansar.

Puntuación esperada: 31 | Modelo: 24 | Diferencia: 7

51% | 64/126 [25:10<25:37, 24.79s/it]Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':2 for open-end generation.

Entrevista 64

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Llevo dos semanas con dolor lumbar que empezó después de una mala noche de sueño en un colchón viejo. El dolor es leve, entre 2-3 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie durante mis actividades normales, aunque después de varias horas siento algo de cansancio en la zona. Camino sin problemas, mantengo mi rutina de ejercicio matutino de 45 minutos. Para ducharme y vestirme soy un poco más cuidadoso, pero puedo hacer todo independientemente sin dificultad mayor. Cargar cosas normales no me problema, aunque evito levantar objetos muy pesados por precaución. Estar sentado en mi trabajo es cómodo, solo ocasionalmente cambio de posición por comodidad general. Los viajes cortos son completamente normales, viajé 90 minutos el fin de semana sin molestias. Mis actividades sociales continúan igual, aunque evité una actividad de paintball por precaución. La vida íntima está normal, solo somos un poquito más cuidadosos. Duermo bien la mayoría de las noches, ocasionalmente noto la molestia al cambiar de posición." [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve, con una intensidad entre 2-3 de 10 la mayor parte del tiempo.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente puede estar de pie durante sus actividades normales, incluso manteniendo su rutina de ejercicio, sin problemas significativos.

3. Andar: 5 puntos - El paciente camina sin problemas.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente es un poco más cuidadoso al ducharse y vestirse, pero puede hacerlo independientemente sin dificultad mayor.
5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente puede levantar objetos normales, pero evita levantar objetos muy pesados por precaución.
6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente encuentra cómodo sentarse en su trabajo.
7. Viajar: 5 puntos - El paciente viaja sin problemas, incluso durante largos períodos de tiempo.
8. Vida social: 4 puntos - El paciente evita ciertas actividades sociales por precaución, pero su vida social continúa normalmente en gran medida.
9. Actividad sexual: 5 puntos - La vida sexual del paciente está normal.
10. Dormir: 4 puntos - El paciente duerme bien la mayoría de las noches, pero ocasionalmente nota molestias al cambiar de posición.

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, la puntuación total del paciente es 33 puntos (1+5+5+1+4+5+5+4+5=33). Según la escala, una puntuación total entre 0 y 20 indica una baja discapacidad lumbar, una puntuación entre 21 y 40 indica una moderada discapacidad lumbar, y una puntuación superior a 40 indica una alta discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta una discapacidad lumbar moderada.

Puntuación esperada: 3 | Modelo: 31 | Diferencia: 28

52% [REDACTED] | 65/126 [25:35<25:03, 24.65s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 65

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda baja es extremadamente severo, comenzó hace un año tras un accidente de trabajo. El dolor es constante e insoportable, 9-10 de 10 sin ningún alivio. Estar de pie es completamente imposible, no puedo mantenerme erguido más de 30 segundos. Caminar hasta el baño, que está a 3 metros, me toma 10 minutos con múltiples descansos y es una agonía. Necesito ayuda completa para bañarme, mi cuidadora me asiste totalmente porque no puedo moverme. Vestirme requiere asistencia total, no puedo inclinarme, levantar brazos o piernas sin dolor severo. No puedo sostener ni levantar absolutamente nada, hasta una taza vacía me causa dolor insoportable. Estar sentado es tortura, máximo 2-3 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en 8 meses, cualquier viaje es absolutamente imposible. Mi vida social no existe, no puedo recibir visitas porque el dolor es demasiado severo. La intimidad es completamente imposible, cualquier contacto físico aumenta el dolor. No duermo nada, paso las noches en agonía, ningún medicamento me proporciona alivio." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (máximo) - El paciente describe el dolor como extremadamente severo, 9-10 de 10 sin alivio.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede mantenerse de pie por más de 30 segundos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar, incluso para llegar al baño toma 10 minutos con descansos.

4. Cuidados personales: 5 puntos (máximo) - El paciente necesita asistencia completa para bañarse, vestirse y realizar otras actividades personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera una taza vacía causa alivio.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente solo puede estar sentado por máximo 2-3 minutos antes de que sea insoportable.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha estado recluso en casa durante los últimos 8 meses y viajes son imposibles.
8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente no existe debido al dolor.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es completamente imposible.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme y pasa las noches en agonía.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta un nivel de discapacidad lumbar extremo (total), con un puntaje de 50 puntos (máximo).

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 17 | Diferencia: 33

52% [REDACTED] | 66/126 [26:06<26:39, 26.65s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 66

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, tengo dolor lumbar desde hace seis semanas que comenzó gradualmente sin causa específica. El dolor es moderado, alrededor de 5-6 de 10 la mayor parte del día. Puedo estar de pie por periodos de 20-30 minutos antes de sentir molestia significativa. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas de más de 1 kilómetro. Para ducharme uso barras de apoyo por seguridad y vestirme me toma un poco más de tiempo por precaución. Cargar bolsas pesadas del supermercado me resulta incómodo, ahora uso un carrito o pido ayuda. Estar sentado es tolerable por 1-2 horas antes de necesitar levantarme y moverme. Los viajes largos requieren planificación, necesito parar cada hora para estirarme. He modificado algunas actividades sociales, evito eventos que requieren mucho estar de pie. La intimidad requiere más comunicación y cuidado, pero mantenemos una vida activa. Duermo aceptablemente, me despierto 1-2 veces por noche por molestias pero logro volver a dormir." [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, con un nivel de intensidad entre 5-6 de 10, por lo que se le asignarían 4 puntos.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede estar de pie por periodos de 20-30 minutos antes de sentir molestias significativas, lo que significa que puede tolerar bastante bien estar de pie, por lo que se le asignarían 3 puntos.

3. Andar: 2 puntos - El paciente evita caminatas largas de más de 1 kilómetro y necesita parar cada hora durante viajes largos, lo que indica que tiene dificultades para andar, por lo que se le asignarían 2 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente utiliza barras de apoyo para ducharse y necesita más tiempo para vestirse, lo que indica que tiene cierta dificultad en realizar cuidados personales, por lo que se le asignarían 3 puntos.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente encuentra cargar bolsas pesadas incómodo, por lo que se le asignarían 4 puntos.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse tolerablemente por 1-2 horas antes de necesitar levantarse y moverse, lo que indica que tiene cierta capacidad para sentarse, por lo que se le asignarían 3 puntos.

7. Viajar: 4 puntos - El paciente necesita planificar viajes largos y parar cada hora para estirarse, lo que indica que viajar requiere esfuerzo y planificación, por lo que se le asignarían 4 puntos.

8. Vida social: 3 puntos - El paciente ha tenido que modificar algunas actividades sociales, pero mantiene una vida activa, lo que indica que puede participar en la vida social con algunas adaptaciones, por lo que se le asignarían 3 puntos.

9.

Puntuación esperada: 13 | Modelo: 26 | Diferencia: 13

53% | 67/126 [26:29<25:06, 25.54s/it] Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':2 for open-end generation.

Entrevista 67

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una ligera molestia en la zona lumbar desde ayer por la tarde. Creo que fue por estar mucho tiempo agachado limpiando debajo de la cama. Es muy leve, apenas un 1 de 10, más una sensación extraña que dolor. Puedo estar de pie perfectamente durante todas mis actividades laborales y domésticas. Camino completamente normal, esta mañana hice mi caminata diaria de una hora sin problema. Me baño y me visto sin ninguna complicación, solo noto una muy ligera rigidez al levantarme. Puedo cargar todo lo que normalmente cargo, ayer mismo cargué bolsas pesadas del supermercado. Paso todo el día sentado en mi oficina sin ninguna molestia. Los viajes no me afectan, tengo uno planeado de 5 horas para mañana y no me preocupa. Todas mis actividades sociales son completamente normales, no he cancelado ni modificado nada. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo perfectamente, solo ayer noté un poquito la molestia al acostarme pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una leve molestia, que no supera el nivel 1 de intensidad de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie sin problemas durante todas sus actividades laborales y domésticas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que camina completamente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que puede bañarse y verse sin problemas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede cargar todos los pesos que normalmente carga.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que puede pasar todo el día sentado sin molestia.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes no le afectan.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que todas sus actividades sociales son completamente normales.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que no hay impacto en su vida íntima.
10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que solo notó una leve molestia al acostarse, pero este no despertó ni le impidió dormir.

Según la escala Oswestry, el paciente presenta una discapacidad lumbar de 1 punto en total. Esto indica que el paciente tiene una baja discapacidad lumbar y funciona normalmente en la mayoría de las situaciones.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 3 | Diferencia: 3

54% [REDACTED] | 68/126 [26:49<23:05, 23.89s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 68

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy severo, llevo cinco meses así desde una lesión deportiva. El dolor es intenso, 8 de 10 constantemente. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable. Caminar más de 15-20 metros es extremadamente doloroso, necesito bastón para cualquier distancia. Para bañarme necesito silla especial y mi esposa me ayuda porque no puedo inclinarme.

Vestirme es una lucha diaria, necesito ayuda para calcetines, zapatos y pantalones. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una botella de agua de 2 litros. Estar sentado también es muy problemático, después de 20 minutos el dolor se intensifica mucho. Los viajes son imposibles, he cancelado todas mis citas fuera de la ciudad. Mi vida social prácticamente no existe, solo veo a mi familia inmediata ocasionalmente. La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones cómodas. Duermo terriblemente, me despierto cada hora por el dolor intenso, necesito medicación fuerte." [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos (maximum score) - The patient reports constant severe back pain with an intensity of 8 out of 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - The patient cannot stand for more than 5 minutes without the pain becoming unbearable.

3. Andar: 1 punto - Walking more than 15-20 meters is extremely painful, requiring the use of a cane or assistance.

4. Cuidados personales: 5 puntos - The patient requires assistance for personal care, including dressing and bathing.

5. Levantar peso: 0 puntos - The patient is unable to lift anything heavy, not even a 2-liter water bottle.

6. Estar sentado: 2 puntos - Sitting for more than 20 minutes intensifies the pain significantly.

7. Viajar: 0 puntos - Traveling is impossible for the patient.

8. Vida social: 1 punto - The patient's social life is limited to occasional contact with immediate family members.

9. Actividad sexual: 0 puntos - The patient finds intimacy very difficult or impossible due to back pain.

10. Dormir: 0 puntos - The patient experiences frequent waking due to intense pain and requires strong medication for sleep.

Based on the patient's responses, their total Oswestry Disability Index score would be 26 out of 50 points. This indicates a high level of disability.

Puntuación esperada: 39 | Modelo: 24 | Diferencia: 15

55% | 69/126 [27:00<19:11, 20.20s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 69

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Llevo unos días con una molestia leve en la zona lumbar, probablemente por haber dormido mal. El dolor no me impide trabajar ni caminar, no he tomado medicación y duermo bien. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problema)

3. Andar: 0 puntos (sin problema)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problema)

5. Levantar peso: 0 puntos (sin problema)

6. Estar sentado: 0 puntos (sin problema)

7. Viajar: 0 puntos (sin problema)

8. Vida social: 0 puntos (sin problema)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problema)

10. Dormir: 0 puntos (duermo bien)

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

56% | 70/126 [27:18<17:59, 19.28s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 70

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor en la espalda baja desde hace una semana después de cargar unas cajas pesadas en el trabajo. El dolor es constante pero tolerable, como un 4 de 10. Puedo hacer mis actividades normales aunque con cierta incomodidad. Trabajo en oficina y puedo estar sentado sin problemas. Camino normalmente y duermo bien, solo me molesta un poco al levantarme por las mañanas. [INST] 1.

Intensidad dolor: 1 punto (Dolor de intensidad baja, menos de 2 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (No hay problemas al estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (Puede caminar normalmente)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No hay problemas en realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 1 punto (Un poco difícil al levantar peso, pero logra hacerlo)

6. Estar sentado: 0 puntos (Puede sentarse sin problemas)

7. Viajar: 0 puntos (Puede viajar normalmente)

8. Vida social: 0 puntos (No hay problemas en su vida social)

9. Actividad sexual: 0 puntos (No hay problemas en su actividad sexual)

10. Dormir: 1 punto (Solo le molesta un poco al dormir)

Total: 3 puntos

La puntuación total de 3 puntos indica una leve discapacidad lumbar. El paciente puede continuar con su tratamiento actual y seguir monitoreando el dolor. Si el dolor persiste o se agrava, debe consultar a su médico.

Puntuación esperada: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

56% | 71/126 [27:40<18:36, 20.30s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 71

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda ha empeorado en las últimas dos semanas. Es un dolor moderado, diría que un 5-6 de 10, que se intensifica cuando estoy de pie por más de 30 minutos. Puedo caminar distancias cortas sin problema, pero evito las caminatas largas. En el trabajo tengo que levantarme de la silla cada cierto tiempo porque me duele estar sentado mucho rato. He empezado a tomar ibuprofeno ocasionalmente. [INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado a intenso, con un nivel de 5-6 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede mantenerse de pie durante cortas distancias sin problemas, pero evita caminatas largas debido al dolor.
3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar sin ayuda, pero con dificultades debido al dolor.
4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente sigue siendo capaz de realizar cuidados personales sin problemas.
5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para levantar pesos debido al dolor.
6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para sentarse por mucho tiempo y necesita levantarse de la silla cada cierto tiempo.
7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita viajes largos debido al dolor.
8. Vida social: 2 puntos - El paciente puede participar en actividades sociales en menor medida debido al dolor.
9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no ha expresado información sobre su actividad sexual.
10. Dormir: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para dormir debido al dolor.

Calificación total: 23 puntos. El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada, con una puntuación total entre 20 y 40 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Puntuación esperada: 9 | Modelo: 22 | Diferencia: 13

57% [REDACTED] | 72/126 [28:01<18:26, 20.49s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 72

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor lumbar me está afectando bastante. Es intenso, alrededor de 7 de 10, y me duele constantemente. No puedo estar de pie más de 15 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar me cuesta, especialmente distancias largas. Sentarme también me duele después de un rato. He tenido que faltar al trabajo algunos días y evito salir con amigos. Duermo mal porque me despierto con dolor durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso, con una intensidad de 7 de 10 y presente constantemente.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie más de 15 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 3 puntos - Caminar es difícil, especialmente sobre largas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que faltar al trabajo y evitar salir con amigos debido al dolor.

5. Levantar peso: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades con levantar peso.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente experimenta dolor al sentarse después de un rato.

7. Viajar: 1 punto - No se especifica si viajar es una dificultad.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha tenido que evitar salir con amigos debido al dolor.

9. Actividad sexual: 3 puntos - No se especifica si la actividad sexual está afectada.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal y se despierta con dolor durante la noche.

Calificación total: 21 puntos. El paciente presenta una moderada a severa discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con una puntuación total de 21 puntos.

Puntuación esperada: 21 | Modelo: 21 | Diferencia: 0

58% [REDACTED] | 73/126 [28:21<17:54, 20.28s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 73

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Hace tres meses que sufro de dolor lumbar crónico después de una caída. El dolor es severo, constante, de 8 a 9 de 10. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin apoyarme en algo. Caminar es muy difícil, solo puedo hacerlo muy despacio y distancias muy cortas. Necesito ayuda para vestirme y bañarme. No puedo levantar nada pesado. Estar sentado también me duele mucho. He dejado de trabajar y mi vida social se ha visto muy afectada. No puedo tener relaciones íntimas y duermo muy mal, me despierto cada hora por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como severo y de alto intensidad, que llega a una escala de 8 a 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo por más de 5 minutos.

3. Andar: 1 punto - El paciente solo puede caminar muy despacio y solo a cortas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente describe que sentarse también le duele mucho.

7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si el paciente puede viajar o no.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente se ha visto muy afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones íntimas.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta cada hora por el dolor.

La puntuación total del paciente según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es: 21 puntos. Esta puntuación indica una discapacidad severa.

Puntuación esperada: 38 | Modelo: 24 | Diferencia: 14

59% [REDACTED] | 74/126 [28:42<17:40, 20.39s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 74

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi espalda me molesta un poco cuando hago ejercicio intenso o cuando paso mucho tiempo en la misma posición. Es un dolor leve, como un 2-3 de 10, que aparece y desaparece. Puedo hacer todas mis actividades normales sin problema, trabajo 8 horas al día sentado y no tengo inconvenientes. Solo evito levantar objetos muy pesados por precaución. Mi vida social y personal no se ha visto afectada para nada.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve) - El paciente describe el dolor como leve y solo presente en ciertas situaciones, por lo que se le asigna un punto bajo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas en realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 1 punto (leve) - El paciente evita levantar objetos pesados por precaución, lo que indica un esfuerzo leve en esta categoría.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no reporta que su vida social haya sido afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al dormir.

Basado en la información proporcionada, la puntuación total de este paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 1 punto. Esto sugeriría que el paciente tiene una baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2

60% [REDACTED] | 75/126 [29:00<16:47, 19.76s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 75

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo episodios de dolor lumbar que van y vienen. Cuando tengo dolor, es moderado, unos 5-6 de 10. Puedo estar de pie pero prefiero no hacerlo por períodos largos. Camino sin problemas distancias normales, pero evito las caminatas muy largas. En el trabajo a veces necesito cambiar de posición frecuentemente. He cancelado algunas actividades sociales cuando el dolor es más fuerte. Tomo analgésicos cuando es necesario. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos (moderado)

2. Estar de pie: 2 puntos (puede hacerlo pero prefiere no por largos períodos)

3. Andar: 3 puntos (puede caminar sin problemas distancias normales, pero evita caminatas largas)

4. Cuidados personales: 1 punto (puede realizar cuidados personales normalmente)

5. Levantar peso: 2 puntos (puede levantar peso pero con dificultad o precaución)

6. Estar sentado: 1 punto (puede sentarse sin problemas)

7. Viajar: 2 puntos (puede viajar pero evita viajes largos)

8. Vida social: 1 punto (ha cancelado algunas actividades sociales debido al dolor)

9. Actividad sexual: 1 punto (no especificó si hay problemas con la actividad sexual)

10. Dormir: 2 puntos (puede dormir pero necesita analgésicos o cambiar de posición frecuentemente)

Total: 13 puntos (mínimo de puntos para clasificar como discapacidad leve). El paciente presenta una discapacidad leve según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 9 | Modelo: 15 | Diferencia: 6

60% [REDACTED] | 76/126 [29:15<15:24, 18.49s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 76

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor de espalda es constante y fuerte, alrededor de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 10 minutos seguidos. Caminar distancias cortas está bien, pero cualquier caminata larga me resulta imposible. Sentarme me duele después de 30 minutos. He tenido que reducir mi jornada laboral y uso una silla especial. Mi vida social se ha reducido considerablemente, evito muchas actividades. Las relaciones íntimas son difíciles por el dolor. Duermo con medicación porque si no me despierto varias veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (dolor persistente y intenso, mayor a 7 de 10)

2. Estar de pie: 1 punto (no puedo estar de pie más de 10 minutos)

3. Andar: 2 puntos (puedo caminar distancias cortas, pero caminatas largas son imposibles)

4. Cuidados personales: 3 puntos (necesito reducir mi jornada laboral y uso una silla especial)

5. Levantar peso: No se mencionó

6. Estar sentado: 2 puntos (duele sentarme después de 30 minutos)

7. Viajar: No se mencionó

8. Vida social: 0 puntos (mi vida social se ha reducido considerablemente)

9. Actividad sexual: 0 puntos (relaciones íntimas son difíciles)

10. Dormir: 1 punto (duermo con medicación y despierto varias veces por la noche)

Puntuación total: 15 puntos (muy alta discapacidad lumbar).

Puntuación esperada: 28 | Modelo: 15 | Diferencia: 13

61% [REDACTED] | 77/126 [29:37<15:55, 19.51s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 77

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Siento una molestia ocasional en la zona lumbar, principalmente después de actividades físicas intensas o al final de un día largo de trabajo. El dolor es muy leve, máximo un 2 de 10, y desaparece con descanso. Puedo realizar todas mis actividades sin limitaciones. No he necesitado medicación y mi calidad de vida no se ha visto afectada en absoluto. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe que el dolor es muy leve y desaparece con descanso, por lo que no afecta su capacidad funcional diaria.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente informa que no tiene problemas al estar de pie.

3. Andar: 5 puntos - El paciente no presenta limitaciones al andar.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente no informa de problemas al realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente no informa de problemas al levantar peso.

6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente no informa de problemas al estar sentado.

7. Viajar: 5 puntos - El paciente no informa de problemas al viajar.

8. Vida social: 5 puntos - El paciente informa que su calidad de vida no se ha visto afectada por el dolor lumbar.

9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente no informa de problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 5 puntos - El paciente no informa de problemas al dormir.

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente tiene un puntaje total de 50 puntos, lo que indica un resultado favorable, ya que el puntaje máximo es de 40 puntos en esta escala. El paciente no presenta ninguna limitación funcional significativa debido al dolor lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 42 | Diferencia: 42

62% [REDACTED] | 78/126 [30:00<16:18, 20.39s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 78

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es severo y constante, de 8-9 de 10. No puedo estar de pie ni siquiera para cocinar o lavarme los dientes sin apoyo. Caminar es extremadamente difícil, solo puedo dar unos pocos pasos muy despacio. Necesito ayuda para vestirme y ducharme. No puedo levantar nada, ni siquiera objetos ligeros. Estar sentado es doloroso después de 15 minutos. He dejado de trabajar completamente. No salgo de casa excepto para citas médicas. La intimidad es imposible por el dolor. Duermo muy poco y mal, incluso con medicación fuerte. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como severo y constante, con un nivel de intensidad de 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie ni siquiera para realizar tareas básicas como cocinar o lavarse los dientes.

3. Andar: 0 puntos - El paciente tiene dificultades extremas para caminar y solo puede hacerlo a pocos pasos muy despacio.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera objetos ligeros.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra que sentarse es doloroso después de 15 minutos.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no salida de casa excepto para citas médicas.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar completamente y no salga de casa.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente describe la intimidad como imposible debido al dolor.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y muy poco, incluso con medicación fuerte.

Basado en la información proporcionada, el paciente tiene una alta discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con una puntuación total de 21 puntos (máximo de 50 puntos).

Puntuación esperada: 47 | Modelo: 12 | Diferencia: 35

63% [REDACTED] | 79/126 [30:16<15:06, 19.29s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 79

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar intermitente que me molesta principalmente por las mañanas al levantarme y después de estar sentado mucho tiempo. Es un dolor moderado, como un 4-5 de 10. Puedo estar de pie sin problema para actividades normales, pero evito estar parado mucho tiempo sin movimiento. Camino bien distancias normales. En el trabajo tengo una silla ergonómica que me ayuda. Ocasionalmente cancelo algún plan social si el dolor es más fuerte ese día. [INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos (moderado dolor)

2. Estar de pie: 1 punto (no limita su capacidad de estar de pie para las actividades normales)

3. Andar: 0 puntos (no limita su capacidad de caminar)

4. Cuidados personales: 1 punto (ocasionalmente cancela plan social debido a su dolor)

5. Levantar peso: 1 punto (no menciona problemas específicos al levantar peso)

6. Estar sentado: 1 punto (puede sentarse sin problemas gracias a su silla ergónica)

7. Viajar: 0 puntos (puede viajar sin problemas)

8. Vida social: 1 punto (ocasionalmente cancela planes sociales debido a su dolor)

9. Actividad sexual: No se mencionó

10. Dormir: No se mencionó

Basado en su respuesta, el paciente tiene una puntuación total de 8 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar. Esto indica un funcionamiento relativamente normal, pero con alguna limitación en la vida social debido al dolor.

Puntuación esperada: 7 | Modelo: 8 | Diferencia: 1

63% [REDACTED] | 80/126 [30:41<16:04, 20.96s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 80

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor en mi espalda baja es muy intenso, constante, de 9 de 10. No puedo mantenerme de pie más de 2-3 minutos. Caminar incluso dentro de casa es muy doloroso y lento. Necesito ayuda para casi todo: vestirme, bañarme, cocinar. No puedo levantar absolutamente nada. Sentarme es muy doloroso, no aguanto más de 10 minutos. He tenido que dejar de trabajar y dependo de otros para las tareas básicas. No puedo salir de casa. La vida íntima es imposible. Duermo muy pocas horas seguidas, el dolor me despierta constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe que su dolor es intenso y constante, con una escala de 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede mantenerse de pie más de 2-3 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente encuentra caminar dentro de casa doloroso y lento.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse, bañarse y cocinar.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar absolutamente nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra sentarse doloroso y no aguanta más de 10 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede salir de casa.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede llevar una vida social normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente describe que la actividad sexual es imposible.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme pocas horas seguidas y el dolor lo despierta constantemente.

Según el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar sería de 21 puntos (0 puntos mínimos + 1 punto mínimo por el ítem de sentarse + 18 puntos máximos por los otros 9 ítems). Sin embargo, este paciente presenta una muy alta discapacidad lumbar, y una puntuación tan alta en la escala sugeriría que necesita una atención médica urgente y posible intervención quirúrgica o terapéutica intensiva.

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 6 | Diferencia: 44

64% [REDACTED] | 81/126 [30:54<13:45, 18.35s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 81

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una molestia leve en la zona lumbar que aparece esporádicamente, principalmente cuando hago movimientos bruscos o cargo algo pesado. El dolor es muy tolerable, máximo un 3 de 10. No me limita en mis actividades diarias, puedo trabajar normalmente, hacer ejercicio y todas mis actividades

sociales. Solo tomo precauciones adicionales al levantar objetos pesados. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (normal)

3. Andar: 0 puntos (normal)

4. Cuidados personales: 0 puntos (normal)

5. Levantar peso: 1 punto (leve)

6. Estar sentado: 0 puntos (normal)

7. Viajar: 0 puntos (normal)

8. Vida social: 0 puntos (normal)

9. Actividad sexual: 0 puntos (normal)

10. Dormir: 0 puntos (normal)

Total: 2 puntos.

La puntuación total de 2 puntos indica un funcionamiento relativamente normal según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar. El paciente describe un dolor leve en la zona lumbar que no limita significativamente sus actividades diarias.

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

65% [REDACTED] | 82/126 [31:16<14:17, 19.49s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 82

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es moderado a severo, oscila entre 6-7 de 10 durante el día. Puedo estar de pie para tareas cortas como cocinar, pero necesito sentarme frecuentemente. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminatas largas. Puedo cuidarme solo pero con dificultad y lentitud. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado me duele después de 45 minutos. He reducido mis horas de trabajo y evito muchas actividades sociales. La intimidad se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como moderado a severo, con un rango de intensidad entre 6-7 de 10 durante el día.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para realizar tareas cortas, pero necesita sentarse frecuentemente.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero con dificultad y lentitud.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente duele después de sentarse durante 45 minutos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente reduce sus horas de trabajo y evita muchas actividades sociales, lo que implica limitaciones en el viaje.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha reducido activamente su participación en actividades sociales.

9. Actividad sexual: 1 punto - El paciente ha informado de que la intimidad se ha visto afectada.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 2-3 veces por la noche.

Total: 18 puntos

La puntuación total de 18 indica un grado de discapacidad moderada según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 23 | Modelo: 19 | Diferencia: 4

66% [REDACTED] | 83/126 [31:28<12:26, 17.37s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 83

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Siento dolor lumbar ocasional que aparece principalmente después de jornadas largas de trabajo o cuando hago ejercicio intenso. Es un dolor leve a moderado, como un 3-4 de 10. No me impide realizar mis actividades cotidianas, aunque a veces prefiero no estar de pie por períodos muy largos. Puedo caminar, trabajar y mantener mi vida social normal. Solo evito cargar objetos muy pesados por precaución.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (leve a moderado)

2. Estar de pie: 0 puntos (no impide)

3. Andar: 0 puntos (puede)

4. Cuidados personales: 0 puntos (puede)

5. Levantar peso: 1 punto (evita cargas pesadas)

6. Estar sentado: 0 puntos (puede)

7. Viajar: 0 puntos (puede)

8. Vida social: 0 puntos (puede mantener)

9. Actividad sexual: 0 puntos (puede)

10. Dormir: 0 puntos (puede)

Total: 3 puntos

Según el puntaje total de 3 puntos, la discapacidad lumbar del paciente se clasificaría como leve, según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

67% [REDACTED] | 84/126 [32:01<15:29, 22.12s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 84

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar crónico intenso de 8 de 10. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin apoyo. Caminar es muy limitado, solo distancias muy cortas y muy despacio. Necesito ayuda ocasional para vestirme y siempre para ducharme. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es doloroso después de 20 minutos. He dejado de trabajar. Salgo muy poco de casa y solo para lo esencial. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal con medicación fuerte, me despierto cada 2 horas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (el paciente describe un dolor lumbar crónico intenso, con una intensidad de 8 sobre 10)

2. Estar de pie: 0 puntos - (el paciente no puede estar de pie sin apoyo, por lo que no puede permanecer de pie durante los 5 minutos mínimos requeridos)

3. Andar: 1 punto - (el paciente tiene dificultades para caminar, solo puede hacerlo a cortas distancias y muy despacio, por lo que puede considerarse que solo puede realizar alguna actividad de andar con dificultad)

4. Cuidados personales: 3 puntos - (el paciente necesita ayuda ocasional para vestirse y siempre para ducharse, por lo que puede considerarse que necesita alguna ayuda en sus cuidados personales)

5. Levantar peso: 0 puntos - (el paciente no puede levantar prácticamente nada, por lo que no puede realizar este ítem)

6. Estar sentado: 2 puntos - (el paciente encuentra sentarse doloroso después de 20 minutos, por lo que puede considerarse que tiene alguna limitación en este ítem)

7. Viajar: 0 puntos - (el paciente sale muy poco de casa y solo para lo esencial, por lo que no puede realizar este ítem)

8. Vida social: 0 puntos - (el paciente ha dejado de trabajar y tiene poca actividad social, por lo que no puede realizar este ítem)

9. Actividad sexual: 0 puntos - (el paciente no puede tener relaciones sexuales, por lo que no puede realizar este ítem)

10. Dormir: 1 punto - (el paciente duerme mal y necesita medicación fuerte para poder dormir, por lo que puede considerarse que solo puede dormir con dificultad)

La puntuación total de la entrevista sería de 14 puntos. Según la escala Oswestry, un puntaje total de 0-10 indica una "discapacidad leve", 11-20 indica "discapacidad moderada", 21-30 indica "discapacidad severa", y 31-40 indica "discapacidad muy severa". En este caso, el puntaje total de 14 indica una "discapacidad moderada a severa".

Puntuación esperada: 39 | Modelo: 15 | Diferencia: 24

67% [REDACTED] | 85/126 [32:25<15:31, 22.71s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 85

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi espalda me duele de forma intermitente, principalmente por las mañanas y después de estar mucho tiempo en la misma posición. El dolor es moderado, unos 4-5 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales pero prefiero no hacerlo por más de una hora seguida. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla especial y me levanto cada hora. Algunas veces he cancelado planes si el dolor es más fuerte. Duermo generalmente bien, aunque a veces me despierto si cambio de posición bruscamente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 4-5 de 10)
2. Estar de pie: 3 puntos (Puede hacerlo para actividades normales, pero no más de una hora seguida)
3. Andar: 0 puntos (Camina sin problemas distancias normales)
4. Cuidados personales: 1 punto (No ha reportado dificultades con cuidados personales)
5. Levantar peso: 3 puntos (Requiere asistencia o toma descansos al levantar peso)
6. Estar sentado: 2 puntos (Puede sentarse durante largos períodos, pero necesita una silla especial y se levanta cada hora)
7. Viajar: 0 puntos (No ha reportado problemas al viajar)
8. Vida social: 2 puntos (Alguna vez ha cancelado planes debido al dolor)
9. Actividad sexual: 1 punto (No ha reportado problemas con la actividad sexual)
10. Dormir: 2 puntos (Duerme generalmente bien, pero despertado si cambia de posición bruscamente)

Calificación total: 13 puntos.

La clasificación de acuerdo a la escala Oswestry de discapacidad lumbar:

- Menor discapacidad: 0-20 puntos
- Leve discapacidad: 21-40 puntos
- Moderada discapacidad: 41-60 puntos
- Gran discapacidad: 61-80 puntos
- Extrema discapacidad: 81-100 puntos

En este caso, el paciente presenta una leve discapacidad lumbar (21-40 puntos).

Puntuación esperada: 7 | Modelo: 13 | Diferencia: 6

68% | 86/126 [32:46<14:37, 21.94s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 86

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor lumbar que siento es muy leve, aparece ocasionalmente después de actividades físicas o al final del día. Es como un 1-2 de 10, más bien una molestia que un dolor real. No me limita en absoluto para realizar cualquier actividad. Trabajo, hago deporte, salgo con amigos, todo normal. No he necesitado

tomar medicación ni hacer cambios en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como leve y ocasional, equivalente a un 1-2 de escala de dolor de 0 a 10, y no limita su actividad diaria.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no se ve afectado en su capacidad de estar de pie.
3. Andar: 0 puntos - El paciente no informa de limitaciones en su capacidad de andar.
4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de dificultades en realizar cuidados personales.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa de limitaciones al sentarse.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente no informa de limitaciones en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informa de problemas en su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

69% [REDACTED] | 87/126 [33:04<13:36, 20.95s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 87

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo y constante de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 10 minutos, necesito apoyarme o sentarme. Caminar más de una cuadra es muy difícil y doloroso. Necesito ayuda ocasional para tareas de cuidado personal como ponerme calcetines o zapatos. No puedo levantar objetos pesados, ni siquiera una bolsa de compras llena. Estar sentado me duele después de 30 minutos. He tenido que cambiar a trabajo de medio tiempo. Evito muchas actividades sociales. La intimidad es complicada por el dolor. Duermo con analgésicos pero aún me despierto 2-3 veces. [/INST] 1. Intensidad

- dolor: 8 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y constante, con una intensidad de 7-8 de 10.
2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie más de 10 minutos.
3. Andar: 2 puntos - Caminar más de una cuadra es difícil y doloroso.
4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda ocasional para tareas de cuidado personal.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.
6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente duele después de 30 minutos de sentarse.
7. Viajar: 1 punto - No especificado.
8. Vida social: 1 punto - El paciente evita muchas actividades sociales.
9. Actividad sexual: 1 punto - La intimidad es complicada por el dolor.
10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme con analgésicos pero aún se despierta 2-3 veces.

Total: 19 puntos.

La puntuación total de 19 indica una discapacidad lumbar moderada a severa según la Escala Oswestry.
Puntuación esperada: 29 | Modelo: 20 | Diferencia: 9

70% [REDACTED] | 88/126 [33:20<12:14, 19.32s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 88

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo molestias lumbares leves que aparecen principalmente cuando paso mucho tiempo sentado en el trabajo o después de hacer jardinería. El dolor es muy tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide hacer ninguna actividad, puedo estar de pie, caminar, hacer ejercicio y todas mis actividades sociales normalmente. Solo tomo ibuprofeno ocasionalmente cuando la molestia es más persistente.

[INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molestias leves, equivalen a un 0-2 de 10)

2. Estar de pie: 5 puntos (no hay problemas)

3. Andar: 5 puntos (no hay problemas)

4. Cuidados personales: 5 puntos (no hay problemas)

5. Levantar peso: 5 puntos (no hay problemas)

6. Estar sentado: 3 puntos (puede sentarse algunas horas, pero con molestias lumbares, equivalen a un 3-4 de 10)

7. Viajar: 5 puntos (no hay problemas)

8. Vida social: 5 puntos (puede participar en todas sus actividades sociales normalmente)

9. Actividad sexual: 5 puntos (no hay problemas)

10. Dormir: 4 puntos (puede dormir pero requiere alguna posición específica o medicamentos para aliviar el dolor)

Total: 32 puntos (menos de 40 puntos indica un bajo nivel de discapacidad lumbar)

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 39 | Diferencia: 37

71% [REDACTED] | 89/126 [33:37<11:32, 18.71s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 89

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero persistente, alrededor de 5-6 de 10. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas domésticas, pero no por más de 30-45 minutos seguidos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas o el senderismo que antes hacía. Puedo cuidarme solo pero algunas tareas como limpiar el suelo son difíciles. No puedo levantar objetos pesados como antes. En el trabajo necesito levantarme de la silla cada hora. He reducido algunas actividades sociales, especialmente las que requieren estar mucho tiempo de pie. Duermo regular, a veces me despierto si me muevo mal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos (Moderado)

2. Estar de pie: 2 puntos (Muy limitado, menos de 1 hora)

3. Andar: 3 puntos (Limitado, 1 hora o más)

4. Cuidados personales: 2 puntos (Dificultad moderada)

5. Levantar peso: 1 punto (Extremamente limitado, menos de 5 libras/2,3 kg)

6. Estar sentado: 4 puntos (Mucho dolor, pero pueden pasar largas horas sentado)

7. Viajar: 3 puntos (Limitado, viajes largos o viajes en coche largos)

8. Vida social: 2 puntos (Reducida, evitando actividades sociales que requieren estar mucho tiempo de pie)

9. Actividad sexual: No especificado

10. Dormir: 2 puntos (Regular, pero despierta a veces)

Total: 18 puntos

Según el puntaje obtenido (18 puntos), el paciente presenta una discapacidad moderada (10-20 puntos) según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Puntuación esperada: 12 | Modelo: 19 | Diferencia: 7

71% [REDACTED] | 90/126 [33:56<11:10, 18.64s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 90

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor lumbar es severo y constante, de 8-9 de 10. Solo puedo estar de pie unos pocos minutos para lo más esencial. Caminar dentro de casa es doloroso y lento, salir a la calle es muy difícil. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior del cuerpo y para ducharme. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una olla con agua. Estar sentado me duele mucho después de 15-20 minutos. No puedo trabajar. Prácticamente no salgo de casa excepto para médicos. No hay vida íntima posible. Duermo muy mal incluso con medicación fuerte, me despierto cada hora o dos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (10 being the worst pain) - The patient reports a severe and constant pain of 8-9 out of 10, indicating the highest level of pain.

2. Estar de pie: 0 points - The patient can only stand for a few minutes for essential tasks, indicating a complete inability to stand for long periods.

3. Andar: 0 points - The patient finds walking within the house painful and difficult, and going outside is very challenging, suggesting a complete inability to walk.

4. Cuidados personales: 5 points - The patient requires assistance for dressing the lower body and bathing, indicating a significant need for help in performing personal care activities.
 5. Levantar peso: 0 points - The patient is unable to lift anything heavy, including an empty pot with water.
 6. Estar sentado: 0 points - Sitting causes pain after only 15-20 minutes, indicating an inability to sit for extended periods.
 7. Viajar: 0 points - The patient barely leaves the house except for medical appointments, suggesting a complete inability to travel.
 8. Vida social: 0 points - The patient has no social life due to their condition.
 9. Actividad sexual: 0 points - The patient reports that no sexual activity is possible.
 10. Dormir: 0 points - The patient has a very poor sleep quality, waking up every hour or two, despite taking strong medication.
- Puntuación esperada: 44 | Modelo: 2 | Diferencia: 42

72% [REDACTED] | 91/126 [34:11<10:23, 17.83s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 91

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar que va y viene, principalmente relacionado con el estrés y las malas posturas en el trabajo. Cuando duele, es moderado, unos 4-5 de 10. Puedo estar de pie sin problema para actividades cotidianas, aunque prefiero no hacerlo por períodos muy largos cuando tengo dolor. Camino normalmente. En el trabajo uso una silla ergonómica y hago pausas regulares. Ocasionalmente he tenido que cancelar algún plan social. Tomo analgésicos cuando es necesario y hago ejercicios de estiramiento.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (moderado)

2. Estar de pie: 4 puntos (puede hacerlo normalmente, pero prefiere no hacerlo por largos períodos con dolor)

3. Andar: 0 puntos (camina normalmente)

4. Cuidados personales: 0 puntos (puede hacerlos normalmente)

5. Levantar peso: 0 puntos (no mencionó dificultades específicas con levantar peso)

6. Estar sentado: 0 puntos (puede sentarse normalmente)

7. Viajar: 1 punto (ocasionalmente tuvo que cancelar planes)

8. Vida social: 1 punto (ocasionalmente tuvo que cancelar planes)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no mencionó dificultades)

10. Dormir: 0 puntos (no mencionó dificultades)

Total: 7 puntos

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente tiene una clasificación de discapacidad leve (0-10 puntos).

Puntuación esperada: 6 | Modelo: 4 | Diferencia: 2

73% [REDACTED] | 92/126 [34:34<10:50, 19.12s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 92

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Siento una rigidez y dolor leve en la zona lumbar, especialmente por las mañanas al levantarme.

El dolor es muy tolerable, máximo un 2 de 10, y mejora con el movimiento durante el día. No me limita para nada en mis actividades diarias. Puedo trabajar, hacer ejercicio, salir con amigos, todo con normalidad. Solo noto la molestia cuando he estado mucho tiempo en reposo. [/INST]

1. Intensidad dolor: 1 punto (leve) - El paciente describe el dolor como leve, con un nivel de intensidad de solo 2 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no indica que el dolor le impida estar de pie ni que le cause alguna dificultad.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que puede caminar normalmente sin limitaciones.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de dificultades para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no indica que el dolor le impida viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente puede salir con amigos y participar en actividades sociales sin problemas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no menciona problemas con la actividad sexual.

10. Dormir: 1 punto (leve) - El paciente solo nota molestia cuando ha estado mucho tiempo en reposo, lo que sugeriría un leve efecto del dolor en la calidad del sueño.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 2 puntos, lo que indica un funcionamiento normal en el nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 3 | Diferencia: 3

74% [REDACTED] | 93/126 [34:50<10:08, 18.45s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 93

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es intenso y constante, de 7 de 10. No puedo estar de pie más de 15 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es limitado, solo distancias cortas y necesito descansar frecuentemente. Puedo cuidarme solo pero me toma más tiempo y esfuerzo. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado también me duele después de un rato, uso cojines especiales. He tenido que reducir mi jornada laboral. Evito muchas actividades sociales que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar. La vida íntima se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto varias veces por la noche por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 7 puntos (intenso y constante, 7/10)

2. Estar de pie: 1 punto (no puede estar de pie más de 15 minutos)
3. Andar: 3 puntos (caminar limitado, solo distancias cortas)
4. Cuidados personales: 2 puntos (puede cuidarse solo, pero más tiempo y esfuerzo)
5. Levantar peso: 0 puntos (no puede levantar objetos pesados)
6. Estar sentado: 4 puntos (dolor después de un rato, usa cojines especiales)
7. Viajar: 2 puntos (evita muchas actividades que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar)
8. Vida social: 1 punto (ha reducido muchas actividades sociales)
9. Actividad sexual: 0 puntos (vida íntima afectada)
10. Dormir: 3 puntos (duerme mal, despierta varias veces por la noche por el dolor)

Total: 21 puntos. La puntuación total de 21 indica un nivel significativo de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 23 | Modelo: 20 | Diferencia: 3

75% [REDACTED] | 94/126 [35:12<10:14, 19.22s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 94

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo episodios de dolor lumbar que duran varios días. Cuando no tengo dolor, estoy perfectamente bien. Cuando lo tengo, es moderado a fuerte, unos 6 de 10. Durante los episodios, estar de pie por más de 20-30 minutos es incómodo. Puedo caminar pero prefiero distancias cortas. Evito levantar cosas pesadas durante esos días. En el trabajo tengo que hacer más pausas cuando tengo dolor. Ocasionalmente cancelo planes sociales si coincide con un episodio fuerte. Tomo medicación solo durante los episodios. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe que el dolor lumbar es moderado a fuerte (6 de 10).

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra incómodo estar de pie por más de 20-30 minutos durante los episodios de dolor.
3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar pero prefiere distancias cortas.
4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con cuidados personales.
5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente evita levantar cosas pesadas durante los episodios de dolor.
6. Estar sentado: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con sentarse.
7. Viajar: 2 puntos - El paciente ocasionalmente cancela planes sociales debido a los episodios de dolor.
8. Vida social: 2 puntos - El paciente evita planes sociales durante los episodios de dolor.
9. Actividad sexual: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con la actividad sexual.

10. Dormir: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con el dormir.

Total: 18 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (18-30 puntos) según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Puntuación esperada: 11 | Modelo: 19 | Diferencia: 8

75% [REDACTED] | 95/126 [35:34<10:26, 20.21s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 95

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy leve, aparece solo ocasionalmente después de esfuerzos físicos intensos o malas posturas prolongadas. Es más bien una molestia, como un 1-2 de 10. No interfiere para nada con mis actividades diarias. Trabajo 8 horas sin problema, hago deporte regularmente, salgo y socializo normalmente. No he tenido que hacer ningún cambio en mi estilo de vida. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe que su dolor de espalda es muy leve y ocasional, no interfiere con sus actividades diarias, por lo que se puede considerar que no afecta su puntuación en este ítem.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que está en pie durante su trabajo de ocho horas sin problemas, lo que sugiere que no experimenta problemas significativos al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para caminar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para salir y socializar.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no menciona problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no menciona problemas para dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente puede obtener un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un funcionamiento normal y sin problemas significativos en cuanto a su dolor de espalda y su capacidad funcional.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

76% [REDACTED] | 96/126 [35:57<10:32, 21.07s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 96

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo de 8 de 10 que no me da tregua. No puedo estar de pie ni para preparar una comida simple, necesito sentarme cada pocos minutos. Caminar hasta el baño es doloroso y lento. Necesito ayuda para ponerme los zapatos y calcetines, y para ducharme uso una silla. No puedo levantar absolutamente nada pesado. Estar sentado es doloroso después de 15-20 minutos incluso con almohadas. No puedo trabajar, he solicitado incapacidad. No salgo de casa salvo para citas médicas indispensables. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy poco y mal, incluso con medicación fuerte. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y constante de nivel 8 sobre 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido a que el dolor es intolerable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente tiene dificultades para caminar hasta el baño y no puede salir de casa salvo para citas médicas indispensables.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar tareas básicas como ponerse zapatos y calcetines, y para ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse pero solo por cortos períodos de tiempo, después de 15-20 minutos el dolor se vuelve intolerable.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no viaja debido a su estado de salud.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no sale de casa salvo para citas médicas indispensables, lo que impide una vida social normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no tiene posibilidad de intimidad.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y muy poco, incluso con medicación fuerte.

El paciente presenta una alta discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 7 puntos (máximo de 50 puntos).

Puntuación esperada: 43 | Modelo: 9 | Diferencia: 34

77% | 97/126 [36:14<09:38, 19.96s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 97

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar intermitente que aparece principalmente después de jornadas largas de trabajo físico. Es un dolor moderado, como un 4 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales, pero

evito estar parado sin movimiento por períodos largos. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo soy más cuidadoso con los movimientos y levantamiento de peso. No he tenido que cambiar mis actividades sociales significativamente. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (moderado dolor, 4 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (puede estar de pie para actividades normales)
3. Andar: 0 puntos (camina sin problemas distancias normales)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no ha tenido que cambiar significativamente sus actividades personales)
5. Levantar peso: 1 punto (es más cuidadoso con el levantamiento de peso)
6. Estar sentado: 0 puntos (puede sentarse sin problemas)
7. Viajar: 0 puntos (no hay problemas para viajar)
8. Vida social: 0 puntos (no ha tenido que cambiar significativamente sus actividades sociales)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no ha informado problemas con su actividad sexual)
10. Dormir: 0 puntos (duerme bien la mayoría de las noches)

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es de 2 puntos. Esto indica un nivel bajo de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

78% [REDACTED] | 98/126 [36:30<08:40, 18.59s/it]Setting 'pad_token_id' to 'eos_token_id':2 for open-end generation.

Entrevista 98

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es constante y moderado a severo, entre 6-7 de 10. Puedo estar de pie para tareas cortas como cocinar, pero necesito apoyarme frecuentemente. Caminar distancias largas es difícil, prefiero distancias cortas. Puedo cuidarme solo pero me cuesta trabajo y me toma más tiempo. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado me duele después de 30-40 minutos. He reducido mis horas de trabajo y uso una silla especial. Evito algunas actividades sociales, especialmente las que requieren mucho movimiento. La intimidad se ha visto afectada ocasionalmente. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos (Moderado a severo, 6-7 de 10)

2. Estar de pie: 2 puntos (Puede con pequeñas tareas, necesita apoyo)
3. Andar: 2 puntos (Difícil con largas distancias)
4. Cuidados personales: 3 puntos (Puede hacerlo pero con esfuerzo y más tiempo)
5. Levantar peso: 0 puntos (No puede levantar objetos pesados)
6. Estar sentado: 3 puntos (Dolor después de 30-40 minutos)
7. Viajar: 2 puntos (Evita largas distancias)
8. Vida social: 2 puntos (Evita algunas actividades sociales)
9. Actividad sexual: 2 puntos (Afectada ocasionalmente)
10. Dormir: 2 puntos (Mal dormido, despierta 2-3 veces)

Total: 18 puntos (Moderada a severa discapacidad lumbar)

Puntuación esperada: 21 | Modelo: 19 | Diferencia: 2

79% | 99/126 [36:43<07:39, 17.00s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 99

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda baja que aparece solo después de estar mucho tiempo en la misma posición o después de ejercicio muy intenso. Es una molestia mínima, como un 1-2 de 10. No me limita en absoluto para ninguna actividad. Trabajo normalmente, hago deporte, salgo con amigos, mantengo mi vida íntima normal. Es más bien una sensación de rigidez que un dolor real. [/INST]

1. Intensidad dolor: 1 punto (molestia leve, 0-2 de 10)
2. Estar de pie: 5 puntos (no limita en absoluto)
3. Andar: 5 puntos (no limita en absoluto)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no limita en absoluto)
5. Levantar peso: 5 puntos (no limita en absoluto)
6. Estar sentado: 5 puntos (no limita en absoluto)
7. Viajar: 5 puntos (no limita en absoluto)
8. Vida social: 5 puntos (mantiene su vida social normal)
9. Actividad sexual: 5 puntos (mantiene su actividad sexual normal)
10. Dormir: 2 puntos (rigidez puede interferir levemente con el sueño)

Total: 32 puntos (menor puntaje indica menor discapacidad)

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 34 | Diferencia: 34

79% | 100/126 [37:07<08:13, 18.98s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 100

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor lumbar que experimento es severo, de 8 de 10, y es constante durante el día. No puedo estar de pie más de 5-8 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar es muy limitado, solo dentro de casa y muy despacio. Necesito ayuda para algunas tareas de cuidado personal como ponerme medias o

lavar mi espalda. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es muy doloroso después de 20 minutos. He dejado de trabajar temporalmente. Salgo muy poco de casa, solo para lo indispensable. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal con medicación, me despierto cada 2 horas por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como severo y constante, con una intensidad de 8 de 10.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente puede solo estar de pie durante 5-8 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar muy limitadamente, solo dentro de casa y muy despacio.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente requiere ayuda para realizar algunas tareas de cuidados personales, como ponerse medias o lavar su espalda.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra el sentarse muy doloroso después de 20 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente salga muy poco de casa, solo para lo indispensable.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar temporalmente y tiene poca vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones íntimas.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal con medicación y se despierta cada 2 horas por el dolor.

Basado en la información proporcionada, la puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 18 puntos (suma de puntos de cada ítem). Esto indica una alta discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 38 | Modelo: 18 | Diferencia: 20

80% | 101/126 [37:23<07:32, 18.11s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 101

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es leve a moderado, como un 3-4 de 10, y aparece principalmente después de actividades que requieren estar mucho tiempo de pie o sentado. Puedo estar de pie para actividades normales pero prefiero no hacerlo por más de una hora seguida. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla ergonómica y me levanto cada hora. Ocasionalmente evito algunas actividades sociales si el dolor es más molesto. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 2 puntos (Leve a moderado, 3-4 de 10)

2. Estar de pie: 1 punto (Puedo hacerlo para actividades normales, pero solo por una hora seguida)

3. Andar: 0 puntos (Camino sin problemas distancias normales)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No hay problemas reportados)

5. Levantar peso: 0 puntos (No se especificó si hay dificultad)

6. Estar sentado: 0 puntos (Puede sentarse sin problemas)

7. Viajar: 0 puntos (No se especificó si hay problemas)

8. Vida social: 1 punto (Ocasionalmente evita algunas actividades sociales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (No se especificó si hay problemas)

10. Dormir: 0 puntos (Duerme bien la mayoría de las noches)

Puntuación total: 3 puntos.

El paciente presenta una leve discapacidad lumbar según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 5 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

81% [REDACTED] | 102/126 [37:37<06:43, 16.81s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 102

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Sufro de dolor lumbar muy severo de 9 de 10 que es constante. No puedo estar de pie ni para cepillarme los dientes sin apoyarme. Caminar incluso distancias muy cortas dentro de casa es extremadamente doloroso. Necesito ayuda para vestirme completamente y para ducharme. No puedo levantar nada, ni siquiera un vaso de agua lleno. Estar sentado es insoportable después de 10 minutos. No puedo trabajar ni hacer tareas domésticas. No salgo de casa para nada social. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo)

2. Estar de pie: 0 puntos (Incapacitado)

3. Andar: 0 puntos (Incapacitado)

4. Cuidados personales: 3 puntos (Requiere de mucha ayuda)

5. Levantar peso: 0 puntos (Incapacitado)

6. Estar sentado: 1 punto (Solo 10 minutos)

7. Viajar: 0 puntos (Incapacitado)

8. Vida social: 0 puntos (Incapacitado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Incapacitado)

10. Dormir: 1 punto (Solo pocas horas)

Total: 10 puntos (Máximo)

La puntuación total de 10 puntos indica una discapacidad extremadamente grave según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 11 | Diferencia: 39

82% [REDACTED] | 103/126 [38:02<07:24, 19.35s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 103

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar que fluctúa entre leve y moderado, generalmente un 3-5 de 10 dependiendo del día y las actividades. Algunos días puedo estar de pie sin problema, otros días prefiero sentarme más frecuentemente. Camino normalmente distancias cortas, pero las caminatas largas pueden ser incómodas algunos días. En el trabajo alterno entre estar sentado y de pie. He cancelado algunos planes sociales ocasionalmente cuando el dolor es más fuerte. Tomo analgésicos según necesidad. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como fluctuante entre leve y moderado, lo que corresponde a un nivel 3-5 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie normalmente, pero prefiere sentarse más frecuentemente en días en que el dolor es más intenso.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar normalmente, pero caminatas largas pueden ser incómodas.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no reporta problemas para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente alterna entre estar sentado y de pie en el trabajo, lo que implica levantar peso de manera regular, pero no especifica problemas específicos.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse normalmente, pero prefiere hacerlo en días en que el dolor es más intenso.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, pero cancela planes ocasionalmente debido al dolor.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado planes sociales ocasionalmente debido al dolor.

9. Actividad sexual: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con la actividad sexual.

10. Dormir: 2 puntos - No se especifica si hay problemas para dormir debido al dolor.

Según los criterios de la Escala Oswestry, la puntuación total de este paciente sería de 16 puntos. La puntuación máxima es de 54 puntos, por lo que este paciente se encuentra en el rango de leve a moderada discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 9 | Modelo: 18 | Diferencia: 9

83% | 104/126 [38:25<07:30, 20.48s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 104

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi espalda me molesta muy poco, solo cuando hago actividades físicas muy intensas o paso demasiado tiempo en malas posturas. Es una molestia muy leve, máximo un 2 de 10. No me impide realizar ninguna actividad normal. Trabajo todo el día, hago ejercicio regularmente, salgo con amigos, viajo sin problemas. Solo tengo que ser un poco más cuidadoso con la postura cuando estoy sentado mucho tiempo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve) - El paciente describe que el dolor en la espalda es leve

y solo ocurre durante actividades intensas o prolongadas malas posturas. No supera el nivel de 2 de 10 en la escala de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas para estar de pie.
3. Andar: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas para andar.
4. Cuidados personales: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas para realizar cuidados personales.
5. Levantar peso: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas para levantar peso.
6. Estar sentado: 1 punto (leve) - El paciente reporta que necesita ser un poco más cuidadoso al sentarse mucho tiempo.
7. Viajar: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas al viajar.
8. Vida social: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas en su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos (ninguna dificultad) - El paciente no reporta problemas al dormir.

Según los criterios de la Escala Oswestry, el paciente presenta un total de 1 punto de discapacidad lumbar.
Puntuación esperada: 0 | Modelo: 3 | Diferencia: 3

83% [REDACTED] | 105/126 [38:41<06:42, 19.15s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 105

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "El dolor lumbar que tengo es intenso, alrededor de 7-8 de 10, y es bastante constante. No puedo estar de pie por más de 10-15 minutos sin que se intensifique mucho. Caminar es limitado, solo puedo hacer distancias cortas y lentamente. Puedo cuidarme solo pero me cuesta trabajo y necesito descansos frecuentes. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado también me duele después de 20-30 minutos. He tenido que tomar licencia médica del trabajo. Evito muchas actividades sociales. La vida íntima es muy difícil. Duermo mal incluso con medicación, me despierto varias veces. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 5 puntos (Intenso, 7-8 de 10)

2. Estar de pie: 1 punto (Poco, 0-20 minutos)
3. Andar: 2 puntos (Limitado, 21-40 minutos)
4. Cuidados personales: 3 puntos (Difícil, 41-60 minutos)
5. Levantar peso: 0 puntos (No, ninguno)
6. Estar sentado: 2 puntos (Doloroso, 21-40 minutos)
7. Viajar: 0 puntos (No, no realiza)
8. Vida social: 1 punto (Evita, 41-60 minutos)
9. Actividad sexual: 0 puntos (No, no realiza)
10. Dormir: 1 punto (Mal, 41-60 minutos)

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta un total de 15 puntos, lo que corresponde a una moderada a severa discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 31 | Modelo: 14 | Diferencia: 17

84% [REDACTED] | 106/126 [38:54<05:47, 17.35s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 106

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar leve que aparece esporádicamente, principalmente relacionado con el ciclo menstrual y el estrés laboral. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. Puedo realizar todas mis actividades sin limitaciones importantes. Trabajo normalmente, aunque algunos días prefiero usar una almohadilla lumbar. No he tenido que cancelar actividades sociales por el dolor. Duermo bien la mayoría de las noches. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (normal)

3. Andar: 0 puntos (normal)

4. Cuidados personales: 0 puntos (normal)

5. Levantar peso: 0 puntos (normal)

6. Estar sentado: 0 puntos (normal)

7. Viajar: 0 puntos (normal)

8. Vida social: 0 puntos (normal)

9. Actividad sexual: 0 puntos (normal)

10. Dormir: 0 puntos (normal)

Respuesta final: La entrevista del paciente corresponde a una puntuación total de 0 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar. El paciente informó de un dolor lumbar leve, pero no limitante en su vida diaria, lo que significa que no presenta discapacidad significativa debida a su dolor lumbar.

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

85% [REDACTED] | 107/126 [39:31<07:21, 23.24s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 107

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero persistente, unos 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas domésticas ligeras, pero necesito sentarme cada 30-45 minutos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas que antes disfrutaba. Puedo cuidarme solo aunque algunas tareas como limpiar el baño son más difíciles. No puedo levantar cosas pesadas como antes. En el trabajo necesito una silla ergonómica y pausas regulares. He reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes. Duermo regular, a veces me despierto si me muevo mal durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe su dolor de espalda como moderado a fuerte, con una intensidad de 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo, por lo que se le asigna un puntaje de 4.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para realizar tareas domésticas ligeras, pero necesita sentarse cada 30-45 minutos, lo que indica que puede tolerar un cierto grado de estancia de pie, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias normales, pero evita caminatas largas, lo que indica que tiene alguna dificultad para andar, pero aún puede hacerlo con normalidad a cortas distancias, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero algunas tareas como limpiar el baño son más difíciles, lo que indica que necesita más esfuerzo o tiempo para realizar estas tareas, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente no puede levantar cosas pesadas como antes, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse durante prolongadas períodos, pero necesita una silla ergonómica en el trabajo y pausas regulares, lo que indica que puede sentarse, pero con cierta dificultad, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, aunque ha reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes, lo que indica que puede viajar, pero con alguna dificultad, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes, lo que indica que tiene alguna dificultad para participar en actividades sociales, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

9. Actividad sexual: No se menciona en la entrevista.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, a veces se despierta si se mueve mal durante la noche, lo que indica que puede dormir, pero con cierta d

Puntuación esperada: 13 | Modelo: 19 | Diferencia: 6

86% | 108/126 [39:51<06:38, 22.13s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 108

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Siento una ligera incomodidad en la zona lumbar que aparece ocasionalmente después de días muy activos o cuando duermo en una cama incómoda. Es más bien una sensación de rigidez que dolor real,

máximo un 1-2 de 10. No me limita para nada en mis actividades cotidianas. Puedo trabajar, hacer ejercicio, salir, viajar, todo con total normalidad. No he necesitado medicación ni cambios en mi rutina.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (No hay dolor significativo)

2. Estar de pie: 5 puntos (No hay problemas para estar de pie)

3. Andar: 5 puntos (No hay problemas al andar)

4. Cuidados personales: 5 puntos (No hay problemas en realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 5 puntos (No hay problemas para levantar peso)

6. Estar sentado: 5 puntos (No hay problemas al sentarse)

7. Viajar: 5 puntos (No hay problemas para viajar)

8. Vida social: 5 puntos (No hay problemas en la vida social)

9. Actividad sexual: 5 puntos (No hay problemas en la actividad sexual)

10. Dormir: 2 puntos (Hay un leve problema al dormir debido a la rigidez ocasional en la zona lumbar)

Puntuación total: 22/40 (Baja discapacidad lumbar)

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry. El paciente describe solo un leve problema al dormir debido a la rigidez en la zona lumbar, lo que le otorga una puntuación baja en la escala. El resto de las actividades cotidianas no están afectadas significativamente por el problema.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 34 | Diferencia: 34

87% [REDACTED] | 109/126 [40:09<05:54, 20.88s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 109

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar severo de 8-9 de 10 que no me da respiro. Solo puedo estar de pie unos minutos para lo más básico. Caminar dentro de casa es muy doloroso y requiere descansos frecuentes. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior y para ducharme completamente. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una bolsa de supermercado. Estar sentado es muy doloroso después de 10-15 minutos. He dejado de trabajar indefinidamente. Prácticamente no salgo de casa excepto para médicos. No hay vida íntima posible. Duermo muy mal incluso con medicación fuerte, me despierto constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (10 being the worst pain) - The patient reports a pain level of 8-9 out of 10, indicating the most severe pain.

2. Estar de pie: 0 puntos - The patient can only stand for the most basic tasks and for very short periods of time.

3. Andar: 0 points - The patient finds walking inside the house to be very painful and requires frequent breaks.

4. Cuidados personales: 5 points - The patient needs assistance for lower body dressing and complete bathing.

5. Levantar peso: 0 points - The patient is unable to lift anything heavy, including a grocery bag.

6. Estar sentado: 0 points - Sitting is very painful for the patient after only 10-15 minutes.

7. Viajar: 0 points - The patient almost never leaves the house except for medical appointments.
8. Vida social: 0 points - The patient's social life is non-existent.
9. Actividad sexual: 0 points - No sexual activity is possible for the patient.
10. Dormir: 0 points - The patient has severe difficulty sleeping, even with strong medication.

Based on the patient's responses, their Oswestry Disability Index (ODI) score would be 50 points out of a possible 50, indicating a very high level of disability.

Puntuación esperada: 43 | Modelo: 2 | Diferencia: 41

87% [REDACTED] | 110/126 [40:24<05:09, 19.32s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 110

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar aparece en episodios que duran unos días y luego desaparece por semanas.

Cuando tengo dolor, es moderado, unos 4-5 de 10. Durante esos episodios puedo estar de pie pero prefiero no hacerlo por períodos largos. Camino normalmente pero evito ejercicios intensos. En el trabajo soy más cuidadoso durante esos días. Ocasionalmente he cancelado algún plan si coincide con un episodio fuerte.

Entre episodios estoy completamente normal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (moderado, 4-5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (puede hacerlo, pero prefiere no por largos períodos)

3. Andar: 1 punto (normal)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no reporta dificultades)

5. Levantar peso: 2 puntos (ocasionalmente evita, por lo que no puede calificar con 0)

6. Estar sentado: 1 punto (normal)

7. Viajar: 1 punto (no reporta dificultades)

8. Vida social: 1 punto (normal)

9. Actividad sexual: 1 punto (normal)

10. Dormir: 2 puntos (ocasionalmente evita planear debido a los episodios de dolor)

El puntaje total es de 11 puntos. Según la Escala Oswestry, un puntaje menor a 20 indica un bajo nivel de discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 4 | Modelo: 11 | Diferencia: 7

88% [REDACTED] | 111/126 [40:47<05:02, 20.17s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 111

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar constante y severo de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 8-10 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar está muy limitado, solo distancias muy cortas dentro de casa. Necesito ayuda ocasional para cuidado personal, especialmente para cosas que requieren agacharse. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado me duele después de 25-30 minutos incluso con cojines. He solicitado incapacidad temporal en el trabajo. Salgo muy poco, solo para citas médicas esenciales. La intimidad es muy complicada. Duermo muy mal con medicación, me despierto cada 2-3 horas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe un dolor lumbar constante y severo de 7-8 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 8-10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 1 punto - Caminar está muy limitado, solo distancias muy cortas dentro de casa.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente requiere ayuda ocasional para cuidados personales, especialmente para cosas que requieren agacharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados en absoluto.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente duele después de 25-30 minutos incluso con cojines.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente sale muy poco, solo para citas médicas esenciales.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente tiene una vida social muy limitada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es muy complicada.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal con medicación y se despierta cada 2-3 horas.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un total de 15 puntos. Una puntuación total superior a 20 indica una discapacidad moderada a grave. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada a grave.

Puntuación esperada: 35 | Modelo: 14 | Diferencia: 21

89% [REDACTED] | 112/126 [40:57<04:03, 17.40s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 112

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi espalda me duele de forma leve e intermitente, principalmente después de jornadas largas de trabajo o cuando hago actividades físicas intensas. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide realizar mis actividades diarias normales. Puedo trabajar, hacer ejercicio moderado, salir con amigos. Solo tengo que ser más cuidadoso al levantar objetos pesados y tomar descansos más frecuentes en trabajos físicos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (no afecta)
3. Andar: 0 puntos (no afecta)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no afecta)
5. Levantar peso: 1 punto (levemente afecta)
6. Estar sentado: 0 puntos (no afecta)
7. Viajar: 0 puntos (no afecta)
8. Vida social: 0 puntos (no afecta)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no afecta)
10. Dormir: 0 puntos (no afecta)

Total: 1-2 puntos (mínimo de discapacidad lumbar)

Puntuación esperada: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

90% [REDACTED] | 113/126 [41:18<03:57, 18.30s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 113

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Sufro de dolor lumbar moderado a severo que oscila entre 6-7 de 10 durante el día. Puedo estar de pie para tareas básicas pero necesito sentarme frecuentemente después de 20-30 minutos. Caminar distancias cortas está bien, pero las caminatas largas son muy incómodas. Puedo cuidarme solo pero tareas como limpiar el suelo o hacer la cama son difíciles. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado también me molesta después de un rato. He reducido mis horas de trabajo a medio tiempo. Evito actividades sociales que requieren mucho movimiento. La vida íntima se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar moderado a severo, con una intensidad entre 6-7 de 10 durante el día.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas básicas, pero necesita sentarse después de 20-30 minutos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero caminatas largas son incómodas.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero tareas como limpiar el suelo o hacer la cama son difíciles.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente se encuentra molesto después de un rato sentado.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita viajes que requieran mucho movimiento.

8. Vida social: 1 punto - El paciente evita actividades sociales que requieren mucho movimiento.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La vida íntima se ha visto afectada.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 2-3 veces por dolor.

Calificación total: 21 puntos (severa discapacidad lumbar).

Puntuación esperada: 23 | Modelo: 21 | Diferencia: 2

90% [REDACTED] | 114/126 [41:38<03:44, 18.73s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 114

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda que aparece solo después de esfuerzos físicos muy intensos o cuando paso muchas horas en una mala postura. Es más bien una sensación de cansancio muscular que dolor, máximo un 1 de 10. No interfiere para nada con mis actividades. Trabajo, hago deporte, salgo, mantengo mi vida normal completamente. No he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina. [INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (No hay dolor constante ni intermitente, ni ha necesitado medicación para controlar el dolor)

2. Estar de pie: 5 puntos (No hay problema reportado para estar de pie, puede hacerlo durante largos periodos sin problemas)

3. Andar: 5 puntos (No hay dificultad reportada para andar, puede caminar normalmente)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No hay problemas reportados para realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 5 puntos (No hay dificultad reportada para levantar peso)

6. Estar sentado: 5 puntos (No hay problema reportado para sentarse, puede sentarse durante largos periodos)

7. Viajar: 5 puntos (No hay problemas reportados para viajar)

8. Vida social: 5 puntos (No hay problemas reportados para participar en actividades sociales)

9. Actividad sexual: 5 puntos (No hay problemas reportados para la actividad sexual)

10. Dormir: 5 puntos (No hay problemas reportados para dormir)

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta un nivel de discapacidad lumbar muy bajo, con un puntaje total de 50 puntos (la puntuación mínima posible es 0 y la puntuación máxima es 50).

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 37 | Diferencia: 37

91% [REDACTED] | 115/126 [41:48<02:59, 16.31s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 115

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es muy intenso, de 8-9 de 10, y prácticamente constante. No puedo estar de pie más de 3-5 minutos sin apoyo. Caminar es extremadamente limitado y doloroso, solo unos pocos pasos muy lentos. Necesito ayuda para vestirme y ducharme. No puedo levantar absolutamente nada. Estar sentado es insoportable después de 10-15 minutos. No puedo trabajar para nada. No salgo de casa excepto para emergencias médicas. No hay posibilidad de vida íntima. Duermo muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte, el dolor me despierta constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo)

2. Estar de pie: 0 puntos

3. Andar: 0 puntos

4. Cuidados personales: 5 puntos (Máximo)

5. Levantar peso: 0 puntos

6. Estar sentado: 1 punto

7. Viajar: 0 puntos

8. Vida social: 0 puntos

9. Actividad sexual: 0 puntos

10. Dormir: 0 puntos

Total: 11 puntos (Máximo: 50 puntos)

El paciente presenta un alto nivel de discapacidad lumbar, con un total de 11 puntos en la Escala Oswestry. Puntuación esperada: 49 | Modelo: 12 | Diferencia: 37

92% [REDACTED] 116/126 [42:07<02:48, 16.90s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 116

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar que aparece principalmente después de actividades físicas o al final de días muy activos. Es un dolor leve a moderado, como un 3-4 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales, aunque prefiero no hacerlo por más de 45 minutos seguidos. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla ergonómica y hago pausas. Ocasionalmente he evitado alguna actividad social muy física. Duermo bien la mayoría de las noches, solo a veces me molesta si me acuesto en mala posición. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (leve)

2. Estar de pie: 3 puntos (puede hacerlo para actividades normales, pero solo por 45 minutos)

3. Andar: 0 puntos (camina sin problemas distancias normales)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no reporta dificultades)

5. Levantar peso: 0 puntos (no se especificó dificultad)

6. Estar sentado: 0 puntos (no reporta dificultades)

7. Viajar: 0 puntos (no se especificó dificultad)

8. Vida social: 1 punto (ha evitado alguna actividad social física)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no se especificó dificultad)

10. Dormir: 1 punto (duerme bien la mayoría de las noches, pero puede molestarle si se acuesta mal)

Total: 7 puntos

Según la Escala Oswestry, un puntaje total de 0-10 indica que la discapacidad lumbar es leve, 11-20 es moderada y 21-40 es severa. En este caso, el paciente presenta una leve discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 5 | Modelo: 4 | Diferencia: 1

93% [REDACTED] 117/126 [42:27<02:42, 18.05s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 117

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero constante, alrededor de 5 de 10. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas ligeras, pero necesito descansar cada 30-40 minutos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas. Puedo cuidarme solo aunque algunas tareas son más lentas y difíciles. No puedo levantar cosas pesadas como antes. En el trabajo alterno entre estar sentado y de pie cada hora. He reducido algunas actividades deportivas y sociales. La intimidad a veces se ve afectada. Duermo regular, me despierto ocasionalmente por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe su dolor como moderado, por lo que se asigna un puntaje intermedio.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para realizar tareas ligeras, pero necesita descansar frecuentemente.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar distancias normales, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero algunas tareas son más lentas y difíciles.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente no puede levantar cosas pesadas como antes.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede trabajar sentado, alternando con estar de pie.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, pero reduce algunas actividades deportivas y sociales.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente reduce algunas actividades sociales.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad está a veces afectada.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme regularmente, pero se despierta ocasionalmente por el dolor.

Total: 16 puntos

El puntaje total de 16 puntos indica un grado moderado de discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 13 | Modelo: 19 | Diferencia: 6

94% [REDACTED] 118/126 [42:47<02:28, 18.55s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 118

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo molestias lumbares muy ocasionales que aparecen solo después de esfuerzos físicos muy intensos o malas posturas prolongadas. Es una molestia muy leve, máximo un 2 de 10. No me limita en absoluto para ninguna actividad cotidiana. Trabajo normalmente, hago ejercicio regularmente, mantengo mi vida social activa. Solo soy un poco más consciente de mi postura cuando estoy sentado por períodos largos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molestias leves, menor de 3 de 10)

2. Estar de pie: 5 puntos (no limita la actividad, puede estar de pie durante largos períodos)

3. Andar: 5 puntos (no limita la actividad, puede caminar normalmente)

4. Cuidados personales: 5 puntos (puede realizar todas las actividades personales sin dificultad)

5. Levantar peso: 5 puntos (puede levantar pesos sin problemas)

6. Estar sentado: 3 puntos (consciente de su postura, pero no limita su actividad)

7. Viajar: 5 puntos (puede viajar sin problemas)

8. Vida social: 5 puntos (mantiene una vida social activa)

9. Actividad sexual: 5 puntos (puede realizar actividades sexuales sin problemas)

10. Dormir: 4 puntos (puede dormir pero puede tener problemas de postura que le impiden dormir completamente a menudo)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total es la suma de todos los puntos individuales. En este caso, el paciente obtiene un puntaje total de 31 puntos, lo que indica un funcionamiento generalmente normal y baja discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 35 | Diferencia: 35

94% [REDACTED] 119/126 [43:10<02:20, 20.03s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 119

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo de 8 de 10 que es constante y debilitante. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es muy limitado, solo dentro de casa y muy despacio con descansos. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior del cuerpo y para ducharme. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es muy doloroso después de 15-20 minutos. He dejado de trabajar temporalmente. Salgo muy poco de casa, solo para citas médicas importantes. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal incluso con medicación, me despierto cada 2 horas por el dolor.

- [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo) - El paciente describe un dolor lumbar constante y severo de 8 de 10, lo que indica un dolor intenso y persistente.
2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.
3. Andar: 0 puntos - El paciente solo puede andar muy limitadamente y despacio dentro de su casa.
4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse la parte inferior del cuerpo y para ducharse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra el sentarse doloroso después de 15-20 minutos.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente salga muy poco de casa y solo para citas médicas importantes.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar temporalmente y tiene una vida social muy limitada.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones íntimas.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación y se despierta cada 2 horas por el dolor.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 8 puntos (5+0+0+2+0+1+0+0), lo que indica una gran discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 39 | Modelo: 9 | Diferencia: 30

95% [REDACTED] | 120/126 [43:23<01:46, 17.75s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 120

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es leve e intermitente, aparece principalmente después de días de mucha actividad física o cuando duermo en una cama incómoda. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide realizar mis actividades normales. Puedo trabajar todo el día, hacer ejercicio moderado, salir con amigos. Solo evito cargar objetos muy pesados por precaución y uso una buena almohada lumbar cuando estoy sentado mucho tiempo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita)
3. Andar: 0 puntos (no limita)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no limita)
5. Levantar peso: 1 punto (evita cargas pesadas)
6. Estar sentado: 1 punto (uso de almohada lumbar)
7. Viajar: 0 puntos (no limita)
8. Vida social: 0 puntos (puede salir con amigos)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no limita)
10. Dormir: 1 punto (evita cama incómoda)

Total: 4 puntos

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un total de 4 puntos.
Puntuación esperada: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3

96% [REDACTED] | 121/126 [43:40<01:27, 17.44s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 121

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo dolor lumbar moderado a severo que fluctúa entre 5-7 de 10 según el día. Puedo estar de pie para tareas cortas pero necesito sentarme cada 20-30 minutos. Caminar distancias cortas está bien, pero las largas son difíciles. Puedo cuidarme solo pero me toma más tiempo y esfuerzo. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado también me duele después de un rato, uso cojines especiales. He reducido mi jornada laboral. Evito muchas actividades sociales que requieren mucho movimiento. La vida íntima se ha visto afectada significativamente. Duermo mal, me despierto 3-4 veces por la noche. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 4 puntos (moderado a severo)

2. Estar de pie: 2 puntos (puede con pequeñas tareas, pero necesita frecuentes descansos)

3. Andar: 3 puntos (puede caminar cortas distancias, pero largas son difíciles)

4. Cuidados personales: 3 puntos (puede cuidarse solo, pero toma más tiempo y esfuerzo)

5. Levantar peso: 0 puntos (no puede levantar objetos pesados)

6. Estar sentado: 3 puntos (puede sentarse, pero duele después de un rato)

7. Viajar: 2 puntos (evita largas distancias)

8. Vida social: 1 punto (evita muchas actividades sociales que requieren mucho movimiento)

9. Actividad sexual: 1 punto (vida íntima se ha visto afectada significativamente)

10. Dormir: 2 puntos (mal dormido, despierta 3-4 veces por la noche)

Total: 21 puntos (severa discapacidad lumbar)

Puntuación esperada: 23 | Modelo: 18 | Diferencia: 5

97% [REDACTED] | 122/126 [43:53<01:05, 16.36s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 122

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Siento una rigidez y molestia muy leve en la zona lumbar, especialmente por las mañanas al levantarme. Es más bien una sensación de tensión que dolor real, máximo un 1-2 de 10. Mejora completamente con el movimiento durante el día. No me limita para nada en mis actividades. Trabajo, hago ejercicio, salgo, mantengo mi vida completamente normal. No he necesitado medicación ni cambios en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (mínimo dolor)

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay dificultad)
3. Andar: 0 puntos (no hay dificultad)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no hay dificultad)
5. Levantar peso: 0 puntos (no hay dificultad)
6. Estar sentado: 0 puntos (no hay dificultad)
7. Viajar: 0 puntos (no hay dificultad)
8. Vida social: 0 puntos (no hay dificultad)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no hay dificultad)
10. Dormir: 0 puntos (no hay dificultad)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un funcionamiento normal y no hay discapacidad lumbar significativa.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

98% [REDACTED] 123/126 [44:08<00:47, 15.88s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 123

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Mi dolor lumbar es muy severo, de 9 de 10, y constante las 24 horas. No puedo estar de pie ni para actividades básicas como cepillarme los dientes. Caminar incluso dentro de casa es extremadamente doloroso y limitado. Necesito ayuda para vestirme completamente y para todas las actividades de higiene personal. No puedo levantar absolutamente nada. Estar sentado es insoportable después de 5-10 minutos. No puedo trabajar ni hacer tareas domésticas. No salgo de casa para nada social o recreativo. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy poco incluso con medicación muy fuerte, me despierto constantemente por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos (Máximo de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (Incapacitado completamente)
3. Andar: 0 puntos (Incapacitado completamente)
4. Cuidados personales: 3 puntos (Requiere mucha asistencia)
5. Levantar peso: 0 puntos (Incapacitado completamente)
6. Estar sentado: 1 punto (Poderoso malestar después de 5-10 minutos)
7. Viajar: 0 puntos (No puede viajar)
8. Vida social: 0 puntos (No participa en actividades sociales)
9. Actividad sexual: 0 puntos (No hay posibilidad)
10. Dormir: 0 puntos (Durante poco tiempo y con medicación fuerte)

Total: 4 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar severa, con un puntaje total de 4 puntos en la Escala Oswestry.

Puntuación esperada: 50 | Modelo: 14 | Diferencia: 36

98% [REDACTED] 124/126 [44:29<00:34, 17.28s/it]Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 124

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Llevo cuatro días con dolor lumbar después de hacer ejercicio intenso sin calentamiento adecuado. El dolor es moderado, alrededor de 4 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque después de 45 minutos empiezo a sentir molestia. Camino sin grandes problemas, completé mi rutina de caminata matutina aunque a ritmo más lento. Para ducharme y vestirme soy más cuidadoso con los movimientos bruscos, pero puedo hacer todo solo. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera molestia, evito las cargas muy pesadas pero manejo las normales. Estar sentado en mi trabajo es cómodo por períodos de 2 horas antes de necesitar cambiar de posición. Los viajes cortos son tolerables, ayer viajé 90 minutos con solo un poco de rigidez al llegar. Mantengo mis actividades sociales principales, aunque cancelé una clase de baile por precaución. La vida íntima continúa bien, solo somos más cuidadosos con movimientos bruscos. Duermo bien en general, una noche me desperté por cambiar de posición mal."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 4 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos normales, pero comienza a sentir molestia después de 45 minutos)

3. Andar: 1 punto (Camina sin grandes problemas)

4. Cuidados personales: 1 punto (Solo es más cuidadoso con movimientos bruscos)

5. Levantar peso: 2 puntos (Evita cargas muy pesadas, pero maneja las normales)

6. Estar sentado: 1 punto (Cómodo durante períodos de 2 horas)

7. Viajar: 1 punto (Tolerables viajes cortos)

8. Vida social: 2 puntos (Mantiene sus actividades sociales principales, canceló una clase de baile por precaución)

9. Actividad sexual: 1 punto (La vida íntima continúa bien, solo son más cuidadosos con movimientos bruscos)

10. Dormir: 1 punto (Dorme bien en general, despertó una noche por cambiar de posición mal)

Calificación total: 11 puntos

El paciente presenta una clasificación Oswestry de discapacidad lumbar de 11 puntos, lo que indica un grado leve de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 9 | Modelo: 13 | Diferencia: 4

99% [REDACTED] 125/126 [44:57<00:20, 20.57s/it] Setting `pad_token_id` to `eos_token_id`:2 for open-end generation.

Entrevista 125

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda baja es severo y constante, llevo nueve meses así desde una hernia discal. El dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente. Estar de pie más de 10 minutos es insoportable, necesito sentarme o acostarme inmediatamente. Caminar más de 25 metros es extremadamente doloroso, uso andador para cualquier distancia. Para bañarme tengo asiento especial y necesito ayuda de mi hija para lavarme la espalda y pies. Vestirme requiere ayuda, especialmente para calcetines, zapatos y ropa interior, me toma más de 45 minutos. No puedo levantar prácticamente nada, hasta una revista me causa dolor. Estar sentado también es problemático, después de 15-20 minutos el dolor aumenta significativamente. No he podido viajar, cancelé vacaciones familiares importantes. Mi vida social ha desaparecido casi por completo, solo recibo visitas muy cortas. La intimidad es extremadamente difícil, casi imposible sin causar dolor severo. Duermo muy mal, me despierto cada 1-2 horas por dolor intenso, los medicamentos no me alivian suficiente." [INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor de espalda baja es severo y constante, con una intensidad diaria entre 7-8 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie más de 10 minutos es insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar más de 25 metros es extremadamente doloroso y utiliza andador para cualquier distancia.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse, pero no especifica si necesita ayuda continua o si se limita a ciertas tareas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que no puede levantar prácticamente nada sin causar dolor.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que sentarse también es problemático, pero no especifica si el dolor es insoportable después de 15-20 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que no ha podido viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su vida social ha desaparecido casi por completo.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad es extremadamente difícil, casi imposible sin causar dolor severo.

10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que duerme mal y se despierta cada 1-2 horas por dolor intenso, pero no especifica si el problema de dormir es debido a la dolor o a la dependencia de medicamentos.

Total: 5 puntos

El paciente presenta una discapacidad lumbar severa, según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 5 puntos.

Puntuación esperada: 41 | Modelo: 29 | Diferencia: 12

100% [REDACTED] 126/126 [45:20<00:00, 21.59s/it]

Entrevista 126

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el

siguiente formato para cada ítem: "1. Intensidad dolor: 2 puntos -"

Paciente: "Tengo molestias lumbares leves desde hace una semana después de pasar mucho tiempo en una mala posición trabajando en mi computadora. El dolor es muy suave, máximo 2-3 de 10. Puedo estar de pie durante toda mi jornada laboral sin problemas significativos. Camino normalmente, incluso mantuve mi rutina de trotar 20 minutos diarios. Me baño y me visto sin limitaciones, solo noto un poquito de rigidez matutina que desaparece rápido. Puedo cargar cosas normalmente, ayer cargué todas mis bolsas de compras sin problema. Paso muchas horas sentado trabajando y estoy cómodo, solo ajusto mi postura ocasionalmente. Los viajes no me afectan, este fin de semana tengo planeado un viaje de 3 horas. Mis actividades sociales continúan completamente normales, no he cancelado ningún plan. No hay ningún impacto en mi vida íntima con mi pareja. Duermo muy bien, solo la primera noche noté un poquito la molestia pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve, máximo 2-3 de 10, por lo que se puede considerar un nivel mínimo de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie durante toda su jornada laboral sin problemas significativos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina normalmente y ha mantenido su rutina de trotar diariamente.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que no tiene limitaciones al realizar sus cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha podido cargar cosas normalmente.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que pasa muchas horas sentado trabajando y está cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes no le afectan.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que sus actividades sociales continúan completamente normales.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que no hay impacto en su vida íntima.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme muy bien, solo notó un poquito de molestia la primera noche pero no se despertó.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente tiene un total de 0 puntos, lo que indica un nivel muy bajo de discapacidad lumbar.

Puntuación esperada: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

Evaluación por entrevista completa

Media de error total por entrevista: 13.79 puntos

Desviación estándar del error total: 12.80 puntos