

Entrevista 1

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, desde hace tres semanas tengo un dolor constante en la parte baja de la espalda que apareció después de ayudar a mi hijo a mudarse. El dolor es moderado, como un 6 de 10, y empeora cuando me quedo mucho tiempo de pie en el trabajo. Puedo caminar distancias cortas sin problema, pero después de 10-15 minutos necesito sentarme. Para lavarme los dientes o vestirme por las mañanas tengo que hacerlo más despacio y a veces me apoyo en la pared. No puedo cargar las bolsas del supermercado como antes, ahora le pido ayuda a mi esposa. Cuando estoy sentado en la oficina estoy bien las primeras horas, pero después de mediodía el dolor aumenta. Los viajes largos en coche son un problema, tuve que parar tres veces en mi último viaje de dos horas. He cancelado algunas salidas con amigos porque no me siento cómodo. La intimidad con mi pareja se ha visto afectada por el dolor. Duermo bien la mayor parte de las noches, aunque a veces me despierto si me giro bruscamente." [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, un 6 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias sin problemas, pero necesita sentarse después de 10-15 minutos.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede andar sin problemas, pero con lentitud debido al dolor.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para realizar tareas personales como lavarse los dientes o vestirse debido al dolor.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente no puede cargar bolsas del supermercado como antes y necesita ayuda.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse durante las primeras horas en la oficina, pero el dolor aumenta después de mediodía.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente tiene problemas durante viajes largos en coche y ha tenido que parar durante el viaje.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado salidas con amigos debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad con la pareja se ha visto afectada por el dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme bien la mayor parte de las noches, excepto cuando se gira bruscamente.

Total: 22 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry, con un total de 22 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

2%|| | 2/126 [00:49<50:39, 24.51s/it]

Entrevista 2

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo dos días con una pequeña molestia en la zona lumbar izquierda. Creo que fue por el ejercicio del fin de semana, hice una rutina nueva en el gimnasio. Es más una molestia que un dolor real, tal vez un 2 de 10. Puedo estar de pie trabajando en mi taller sin problemas, camino normal tanto distancias cortas como largas. Me visto y me aseo sin ninguna dificultad. Ayer cargué unas cajas pesadas sin problema, aunque sí noté un poquito más la molestia. En el trabajo paso muchas horas sentado frente al computador y no me molesta para nada. El fin de semana fui a visitar a mis padres, un viaje de 3 horas, y llegué perfecto. Anoche salí a cenar con unos amigos y la pasé muy bien, sin pensar en la espalda. Con mi pareja todo normal, no hay ningún impedimento. Duermo excelente, no me ha despertado ni una sola vez.".

[INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (El paciente describe un dolor leve, por debajo de un 3 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al caminar)

4. Cuidados personales: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 1 punto (El paciente notó un poco más de molestia al levantar pesas, pero no reportó dificultades)

6. Estar sentado: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al sentarse)

7. Viajar: 0 puntos (El paciente viajó por tres horas sin problemas)

8. Vida social: 0 puntos (El paciente no ha reportado impedimentos en su vida social)

9. Actividad sexual: 0 puntos (El paciente no ha reportado impedimentos en su actividad sexual)

10. Dormir: 0 puntos (El paciente duerme excelente y no ha tenido problemas para dormir)

Basado en la entrevista, el paciente presenta un puntaje total de 1 punto en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar. Esto sugeriría un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

2%|| | 3/126 [01:10<46:47, 22.82s/it]

Entrevista 3

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda baja es insoportable, llevo así cuatro meses desde mi accidente laboral. El dolor es constante, un 9 de 10, y nunca desaparece completamente. No puedo estar de pie más de 2-3 minutos porque el dolor se vuelve inaguantable. Caminar más de 10 metros es imposible, necesito sentarme o recostarme inmediatamente. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, me siento en una silla especial, y vestirme me toma 20 minutos con mucha dificultad. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera una taza de café sin que el dolor se dispare. Estar sentado también es problemático, después de 15-20 minutos el dolor aumenta terriblemente. Los viajes son imposibles, no he salido de casa en semanas. He perdido contacto con todos mis amigos, no puedo participar en ninguna actividad social. La intimidad con mi pareja es inexistente desde el accidente. Duermo fatal, me despierto cada hora por el dolor, necesito analgésicos fuertes para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante, con una intensidad de 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 2-3 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar más de 10 metros.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar cuidados personales como bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse pero solo por 15-20 minutos antes de que el dolor aumente terriblemente.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a los problemas de movilidad.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido contacto con todos sus amigos debido a su incapacidad.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad con su pareja es inexistente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y necesita analgésicos fuertes para poder descansar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

3% | 4/126 [01:39<51:43, 25.44s/it]

Entrevista 4

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar desde hace un mes después de una caída en casa. El dolor es considerable, como un 7 de 10 en los momentos más intensos. Puedo estar de pie unos 10-15 minutos antes de que el dolor me obligue a sentarme. Caminar distancias cortas está bien, pero para ir al supermercado necesito usar el carrito como apoyo. En el baño tengo que ir más despacio, especialmente para ducharme, a veces me apoyo en las paredes. Vestirme por las mañanas es complicado, sobre todo ponerme los calcetines y zapatos. No puedo cargar las bolsas de la compra, mi hija me ayuda con eso. En el trabajo, donde paso mucho tiempo sentado, las primeras horas van bien pero después necesito levantarme frecuentemente. Los viajes en auto son incómodos, en trayectos de más de una hora necesito parar a estirarme. He reducido mis salidas sociales a la mitad, solo voy a eventos muy importantes. La relación íntima con mi pareja se ha complicado, tenemos que ser muy cuidadosos con las posiciones. Duermo regular, me despierto 2-3 veces por noche por el dolor y me cuesta volver a dormir." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como un 7 de 10, lo que corresponde a una intensidad significativa.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo unos 10-15 minutos antes de sentarse debido al dolor.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero necesita apoyo para ir al supermercado.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente tiene dificultades para vestirse y necesita ayuda para cargar las bolsas de la compra.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente no puede levantar pesas, por lo que necesita ayuda para realizar esta actividad.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse durante las primeras horas en el trabajo, pero necesita levantarse frecuentemente.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente encuentra viajes en auto incómodos y necesita pararse para estirarse en trayectos de más de una hora.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido sus salidas sociales a la mitad.

9. Actividad sexual: 3 puntos - El paciente ha informado que su relación íntima se ha complicado debido al dolor.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, pero se despierta 2-3 veces por noche por el dolor y tiene dificultades para volver a dormir.

La puntuación total es de 25 puntos. Según la Escala Oswestry, un puntaje de 20-25 puntos indica una moderada a grave discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi problema de espalda comenzó hace seis meses de manera gradual. Al principio era solo una molestia, pero ahora es un dolor intenso, entre 8 y 9 de 10. Estar de pie es muy difícil, máximo puedo aguantar 5 minutos antes de que el dolor sea insoportable. Caminar más de 20-30 metros me resulta extremadamente doloroso, tengo que parar y buscar donde sentarme. Para mi higiene personal necesito mucha ayuda, mi esposo me ayuda a bañarme porque no puedo inclinarme. Vestirme es una tortura diaria, especialmente la ropa interior y los zapatos, me toma casi media hora. Levantar cualquier cosa, incluso un plato, me causa dolor severo. Sentarme también es problemático, después de 10 minutos el dolor se intensifica muchísimo. No puedo viajar para nada, el último intento en auto fue hace dos meses y tuve que regresar. Mi vida social ha desaparecido completamente, no salgo de casa salvo para citas médicas. La intimidad es imposible, cualquier movimiento me duele. Las noches son terribles, duermo máximo 2-3 horas seguidas, el dolor me despierta constantemente." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso, de nivel 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente solo puede aguantar 5 minutos de estar de pie antes de que el dolor sea insoportable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso y requiere paradas frecuentes.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar actividades personales como bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier cosa.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente tiene problemas para sentarse y el dolor se intensifica después de 10 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar por carretera.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido completamente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme máximo 2-3 horas seguidas y el dolor despertándolo constantemente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un total de 18 puntos. Una puntuación total de 20-30 puntos indica una discapacidad moderada a severa. En este caso, el paciente presenta una discapacidad severa.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

Entrevista 6

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, llevo aproximadamente tres semanas con dolor en la parte baja de la espalda. Comenzó después de ayudar a mi hermano a mudarse, cargando cajas pesadas. Al principio pensé que era solo cansancio, pero el dolor ha ido aumentando gradualmente. Por las mañanas me cuesta trabajo levantarme de la cama, siento rigidez y dolor que mejora un poco cuando camino. Durante el día, especialmente cuando estoy sentado en mi trabajo de oficina por más de una hora, el dolor se intensifica. He tenido que tomar ibuprofeno cada 6 horas para poder funcionar. Caminar distancias largas se ha vuelto difícil, antes podía caminar sin problemas al centro comercial, ahora tengo que detenerme a descansar. Para vestirme necesito sentarme, ya no puedo inclinarme fácilmente. El fin de semana tuve que cancelar una cita porque no me sentía cómodo para salir. Por las noches, encontrar una posición cómoda para dormir es complicado, me despierto varias veces por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor constante y aumentado durante las tres últimas semanas, que afecta su capacidad diaria y requiere el uso de analgésicos.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para caminar largas distancias y necesita detenerse a descansar.

3. Andar: 3 puntos - El paciente experimenta dificultades al caminar, lo cual se refleja en su necesidad de detenerse para descansar.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita sentarse para vestirse.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente menciona dificultades al levantarse de la cama y cargar cajas pesadas, lo cual sugiere un problema significativo al levantar peso.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente describe que el dolor se intensifica cuando está sentado por más de una hora.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente no especifica problemas específicos al viajar.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha tenido que cancelar una cita social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - No hay detalles específicos sobre cómo el dolor afecta su actividad sexual.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente tiene problemas para encontrar una posición cómoda para dormir y despertar varias veces por el dolor.

La puntuación total de la entrevista es de 24 puntos, lo cual indica una discapacidad moderada según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3

Entrevista 7

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días, doctor. Vengo porque desde hace dos días tengo una ligera molestia en la espalda baja. Creo que fue por haber dormido en una posición extraña el fin de semana cuando me quedé en casa de mis padres en un sofá cama que no era muy cómodo. Es más bien una sensación de tirantez que un dolor fuerte. Puedo hacer todas mis actividades normales sin problemas: trabajo, caminar, hacer ejercicio ligero. No he necesitado tomar ningún medicamento porque realmente no me molesta tanto. Duermo perfectamente en mi cama, solo siento la molestia cuando me levanto por las mañanas, pero desaparece rápidamente después de unos minutos. Ayer fui al gimnasio y pude hacer mi rutina normal sin inconvenientes, aunque evité levantar pesas muy pesadas por precaución. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una sensación de tirantez, lo que sugiere un bajo nivel de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente puede caminar normalmente.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente evitó levantar pesas pesadas, pero no reporta problemas para levantar objetos de peso normal.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente puede sentarse normalmente.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente puede participar en actividades sociales normalmente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme bien y solo siente la molestia al despertar, que desaparece rápidamente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtuvo un puntaje de 0 puntos en total, lo que indica un estado funcional muy bien.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 8

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es terrible, llevo dos meses así y cada día empeora. Comenzó después de un accidente menor que tuve en el trabajo, me resbalé y caí. El dolor es constante, incluso estando en reposo siento punzadas intensas. No puedo estar de pie más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar más de media cuadra es imposible, tengo que usar bastón. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, no puedo inclinarme ni girarme. Levantar cualquier cosa, incluso una taza de café, me causa dolor severo. Estar sentado también es problemático, no aguanto más de 20 minutos. He tenido que faltar al trabajo constantemente. Mi vida social ha desaparecido completamente, no puedo ir a ningún lado. La intimidad con mi pareja es impensable por el dolor. Duermo muy mal, me despierto cada hora por el dolor, he probado diferentes posiciones y ninguna funciona. Tomo analgésicos fuertes cada 4 horas pero apenas me alivian. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como terrible, constante y insoportable, incluso en reposo. El dolor impide que esté de pie por más de 10 minutos y caminar más de media cuadra. El paciente necesita asistencia para realizar actividades personales, levantar objetos y bañarse. El dolor también lo impide sentarse por más de 20 minutos y dormir sin interrupciones. El paciente utiliza analgésicos fuertes con regularidad, pero éstos no le alivian completamente el dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar más de media cuadra debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita asistencia para realizar actividades personales como bañarse y levantarse debido al dolor.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, incluso una taza de café.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse por 20 minutos, pero solo con dificultad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido completamente su vida social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad con su pareja es impensable debido al dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente experimenta dolor durante el sueño y no duerme bien.

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una discapacidad severa (puntaje total de 45 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

7%■ | 9/126 [04:03<57:47, 29.64s/it]

Entrevista 9

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, desde hace una semana tengo dolor en la zona lumbar que me está afectando moderadamente. Empezó después de hacer jardinería el fin de pasado, estuve agachado mucho tiempo plantando flores. El dolor es más notorio por las mañanas al levantarme y cuando llevo mucho tiempo en la misma posición. Puedo trabajar normalmente, pero tengo que cambiar de posición frecuentemente. Caminar no me duele, pero después de caminar más de 6 cuadras empiezo a sentir molestias. Para vestirme y bañarme no tengo grandes problemas, aunque me toma un poco más de tiempo de lo normal porque trato de evitar movimientos bruscos. He evitado cargar cosas pesadas como las bolsas del supermercado, le pido ayuda a mi familia. Estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo. No he cancelado planes sociales, pero sí he rechazado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie. Duermo relativamente bien, aunque a veces tengo que acomodarme varias veces durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede caminar normalmente, pero se vuelve incómodo después de caminar más de 6 cuadras, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede andar normalmente, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no tiene problemas significativos para vestirse y bañarse, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente ha evitado cargar cosas pesadas y le pide ayuda a su familia, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se vuelve incómodo al sentarse por más de una hora, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente no ha cancelado planes sociales, pero ha rechazado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

8. Vida social: 1 punto - El paciente no ha cancelado planes sociales, por lo que no se le asigna un puntaje significativo.

9. Actividad sexual: No se menciona en la entrevista, por lo que no se puede calificar.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme relativamente bien, aunque a veces tiene que acomodarse varias veces durante la noche, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

Basado en la información proporcionada, el paciente obtiene un puntaje total de 13 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar. Un puntaje total de 10-20 puntos se considera leve a moderada discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

8% ■ | 10/126 [04:30<55:57, 28.94s/it]

Entrevista 10

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días. Tengo dolor lumbar desde hace un mes y medio que está interfiriendo significativamente con mi vida diaria. Todo comenzó cuando me agaché para recoger algo del suelo en la oficina y sentí como un tirón fuerte. El dolor es intenso, especialmente por las mañanas y al final del día. Estar de pie es muy problemático, no puedo mantenerme erguido por más de 15-20 minutos sin que el dolor se intensifique considerablemente. Caminar se ha vuelto difícil, puedo hacerlo pero con dolor constante, evito salir a menos que sea necesario. Para las actividades básicas como ducharme o vestirme necesito tomarme mucho más tiempo y hacerlo muy lentamente, a veces mi pareja me ayuda con los zapatos. No puedo levantar nada pesado, incluso las bolsas de la compra me causan dolor. Sentarme también es problemático, especialmente en sillas normales, necesito cojines especiales. He cancelado varios compromisos sociales porque no me siento cómodo fuera de casa. La vida íntima se ha visto muy afectada. El sueño es irregular, me despierto varias veces por el dolor y me cuesta encontrar posiciones cómodas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como intenso y constante, especialmente por las mañanas y al final del día.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede mantenerse de pie por más de 15-20 minutos sin que el dolor se intensifique considerablemente.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar, pero con dolor constante.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita tomarse mucho más tiempo y hacerlo muy lentamente para realizar actividades básicas como ducharse o vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra sentarse problemático, especialmente en sillas normales, y necesita cojines especiales.

7. Viajar: 0 puntos - No se menciona si el paciente viaja o no, pero se describe que ha cancelado compromisos sociales debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado varios compromisos sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se menciona si la actividad sexual ha sido afectada o no.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente tiene un sueño irregular y despertarse varias veces por el dolor.

Total: 14 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de 14 indica un nivel moderado a alto de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

9% | 11/126 [04:52<51:06, 26.67s/it]

Entrevista 11

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, vengo por un dolor en la espalda baja que tengo desde hace cinco días. Creo que fue por cargar mal una maleta pesada cuando regresé de viaje. Es un dolor molesto pero manejable. Puedo hacer la mayoría de mis actividades cotidianas sin mayor problema. En el trabajo, que es principalmente de escritorio, puedo estar sentado sin dolor, aunque noto cierta incomodidad después de varias horas seguidas. Caminar es normal, fui ayer al parque con mis hijos y no tuve problemas. Para la higiene personal y vestirme no tengo dificultades. Sí he notado que levantar cosas pesadas me causa molestia, así que he evitado cargar las compras del supermercado. No he tenido que cancelar ningún plan social, aunque sí fui más precavido en una reunión familiar evitando ciertos movimientos. El sueño ha sido bueno, solo noto la molestia al cambiar de posición durante la noche, pero no me despierta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (el dolor es descrito como molesto pero manejable, lo que sugeriría un nivel de intensidad bajo)
2. Estar de pie: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al estar de pie)
3. Andar: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al andar)
4. Cuidados personales: 0 puntos (el paciente no reporta dificultades para realizar cuidados personales)
5. Levantar peso: 2 puntos (el paciente ha evitado levantar cosas pesadas debido a la molestia que causa)
6. Estar sentado: 1 punto (el paciente puede sentarse sin dolor, pero nota cierta incomodidad después de varias horas)
7. Viajar: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al viajar)
8. Vida social: 0 puntos (el paciente no ha cancelado planes sociales)
9. Actividad sexual: 0 puntos (el paciente no ha reportado problemas en la actividad sexual)
10. Dormir: 1 punto (el paciente solo nota molestia al cambiar de posición durante la noche)

Puntuación total: 5 puntos. El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

10% | 12/126 [05:15<48:34, 25.57s/it]

Entrevista 12

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es realmente grave, llevo cuatro meses así y mi calidad de vida se ha deteriorado completamente. El dolor comenzó gradualmente después de una mala caída en las escaleras de mi casa. Ahora el dolor es constante e intenso, una sensación punzante que no me da tregua ni siquiera en reposo. No puedo estar de pie prácticamente nada, máximo 5 minutos antes de que el dolor sea inaguantable. Caminar es extremadamente difícil, uso andador y aún así solo puedo hacerlo distancias muy cortas con mucho sufrimiento. Para las actividades más básicas como bañarme o vestirme necesito ayuda total de mi familia, no puedo hacerlo solo. Levantar cualquier objeto, por más liviano que sea, es imposible. Estar sentado también es muy doloroso, no puedo hacerlo más de 10-15 minutos. He perdido mi trabajo debido a las constantes ausencias. Mi vida social ha desaparecido por completo, no puedo salir de casa. La relación con mi pareja se ha visto severamente afectada en todos los aspectos. El sueño es pésimo, duermo máximo 2-3 horas seguidas antes de que el dolor me despierte, necesito analgésicos muy fuertes. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como constante e intenso, no hay relieve ni en reposo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 5 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita un andador y solo puede caminar cortas distancias con mucho sufrimiento.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda total de su familia para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún objeto.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse pero solo por 10-15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido por completo su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información suficiente en la entrevista para evaluar esta categoría.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme máximo 2-3 horas seguidas antes de que el dolor lo despertara.

Basado en la información proporcionada, el paciente presenta una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 1 | Diferencia: 4

10% | 13/126 [05:43<49:45, 26.42s/it]

Entrevista 13

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días, doctor. Llevo dos semanas con molestias en la parte baja de la espalda. Comenzó después de una sesión intensa de ejercicio en el gimnasio, creo que no calenté adecuadamente. Es más una molestia que un dolor propiamente dicho. Puedo trabajar sin problemas, mi trabajo requiere estar de pie atendiendo clientes y no he tenido inconvenientes. Caminar es completamente normal, incluso he seguido con mis caminatas matutinas de 30 minutos. Para mis actividades de cuidado personal no tengo ninguna limitación. He sido más cuidadoso al levantar objetos pesados en el trabajo, pero puedo hacerlo si es necesario. Estar sentado no me causa problemas. Mi vida social no se ha visto afectada para nada, el fin de semana fui a bailar y estuve muy bien. El sueño es normal, ocasionalmente siento la molestia al darme vuelta en la cama, pero no me despierta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia en lugar de un dolor intenso, por lo que se le asigna un punto bajo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido inconvenientes al estar de pie, por lo que no se le asignan puntos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina normalmente, por lo que no se le asignan puntos.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones en sus actividades personales, por lo que no se le asignan puntos.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente ha sido más cuidadoso al levantar objetos pesados, por lo que se le asigna un punto bajo.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que no tiene problemas al sentarse, por lo que no se le asignan puntos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha informado de problemas al viajar, por lo que no se le asignan puntos.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha podido mantener su vida social normal, por lo que no se le asignan puntos.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha informado de problemas en su actividad sexual, por lo que no se le asignan puntos.

10. Dormir: 1 punto - El paciente informa de ocasionalmente sentir molestias al darme vuelta en la cama, por lo que se le asigna un punto bajo.

En total, el paciente obtiene 3 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

11% | 14/126 [06:17<53:30, 28.67s/it]

Entrevista 14

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es muy intenso y me está limitando mucho. Empezó hace seis semanas después de una caída que tuve mientras hacía limpieza en casa, me resbalé con el suelo mojado. El dolor es fuerte y constante, empeora con casi cualquier movimiento. Estar de pie es muy difícil, no puedo hacerlo más de unos pocos minutos sin experimentar dolor severo. Caminar se ha vuelto una tarea muy complicada, necesito descansar frecuentemente y no puedo ir más allá de distancias muy cortas. Para bañarme y vestirme necesito mucha ayuda, no puedo inclinarme ni girar el torso. Levantar objetos es prácticamente imposible, incluso cosas muy ligeras me causan dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, no aguanto más de 15-20 minutos. He faltado al trabajo múltiples veces. Socialmente estoy muy aislado, he cancelado todas mis actividades. La intimidad con mi pareja se ha visto completamente afectada. El sueño es terrible, me despierto cada hora por el dolor, no logro descansar adecuadamente a pesar de tomar medicamentos para dormir. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como fuerte y constante, que empeora con casi cualquier movimiento, lo que indica una intensidad máxima de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie es muy difícil y no puede hacerlo más de unos pocos minutos sin experimentar dolor severo, lo que indica que no puede estar de pie por mucho tiempo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es una tarea muy complicada y necesita descansar frecuentemente, no puede ir más allá de distancias muy cortas, lo que indica que no puede andar por mucho tiempo.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente informa que necesita mucha ayuda para bañarse y vestirse, lo que indica que tiene dificultades moderadas en realizar estas actividades.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que levantar objetos es prácticamente imposible, lo que indica que no puede levantar peso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que estar sentado también es muy problemático, pero puede aguantar más de 15-20 minutos, lo que indica que puede estar sentado por un poco más de media hora.
7. Viajar: 0 puntos - No se menciona específicamente si el paciente tiene dificultades para viajar, por lo que se asume que no puede viajar por mucho tiempo debido a su dolor.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que está muy aislado socialmente y ha cancelado todas sus actividades, lo que indica que tiene dificultades en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad con su pareja se ha visto completamente afectada, lo que indica que tiene dificultades en esta área.
10. Dormir: 0 puntos - El pac

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 4 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

12% | 15/126 [06:40<49:57, 27.01s/it]

Entrevista 15

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo una molestia en la zona lumbar desde hace una semana. Ocurrió después de estar mucho tiempo sentado trabajando en mi computadora en una silla que no es ergonómica. Es más bien una sensación de tensión y rigidez que dolor agudo. Puedo mantenerme de pie sin problemas, trabajo en ventas y paso muchas horas de pie atendiendo clientes. Caminar es completamente normal, no tengo ninguna limitación. Las actividades de aseo personal las hago normalmente, aunque por las mañanas siento un poco más de rigidez que se quita rápidamente. Puedo levantar objetos sin inconvenientes, aunque trato de usar buena técnica para no empeorar. La posición sentada sí me genera un poco de incomodidad después de estar mucho tiempo, especialmente en sillas duras. No he tenido que modificar mis planes sociales. Duermo bien, solo noto la tensión cuando me acuesto inicialmente, pero no interfiere con mi descanso. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una sensación de tensión y rigidez en lugar de dolor agudo, por lo que se le asigna un punto bajo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede mantenerse de pie sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es completamente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que puede hacer sus actividades de aseo personal normalmente, aunque tiene un poco más de rigidez por las mañanas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos sin inconvenientes.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que la posición sentada genera un poco de incomodidad después de estar mucho tiempo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha indicado ninguna limitación en viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido que modificar sus planes sociales.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha proporcionado información relevante sobre su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme bien.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente tiene un total de 2 puntos de discapacidad.
Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

13% | 16/126 [07:06<48:51, 26.65s/it]

Entrevista 16

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha progresado considerablemente en las últimas tres semanas.

Inicialmente era leve después de un mal movimiento en el trabajo, pero ahora es bastante intenso y me limita en muchas actividades. El dolor es punzante y se irradia hacia los glúteos. Estar de pie por períodos prolongados se ha vuelto muy difícil, máximo puedo mantenerme erguido unos 30 minutos antes de necesitar sentarme o recostarme. Caminar largas distancias es problemático, tengo que hacer pausas frecuentes. Para vestirme y bañarme he desarrollado técnicas para evitar agacharme, pero aún me toma considerablemente más tiempo. Levantar objetos pesados es imposible, evito por completo cargar bolsas de compras o mover muebles. Estar sentado por más de 45 minutos se vuelve muy incómodo. He rechazado algunas invitaciones sociales, especialmente aquellas que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar. La intimidad se ha visto afectada por el temor al dolor. El sueño se interrumpe ocasionalmente, necesito cambiar de posición varias veces durante la noche. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso y limitante, que irradia hacia los glúteos.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente puede mantenerse de pie solo por unos 30 minutos antes de necesitar sentarse o recostarse.

3. Andar: 2 puntos - Caminar largas distancias es problemático y requiere pausas frecuentes.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha desarrollado técnicas para evitar agacharse durante las actividades personales, pero estas toman mucho más tiempo.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente evita completamente levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se siente incómodo sentado por más de 45 minutos.

7. Viajar: 1 punto - No se especifica si viajar es problemático o no.


8. Vida social: 1 punto - El paciente ha rechazado algunas invitaciones sociales debido a la dificultad de estar mucho tiempo de pie o caminar.
9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad se ha visto afectada por el temor al dolor.
10. Dormir: 2 puntos - El sueño se interrumpe ocasionalmente y necesita cambiar de posición varias veces durante la noche.

Calificación total: 15 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 5 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

13%  | 17/126 [07:29<46:39, 25.69s/it]

Entrevista 17

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días, doctor. Vengo porque desde hace cuatro días tengo una leve molestia en la espalda baja. Creo que fue por haber estado pintando el techo de mi cuarto, mantuve el cuello y la espalda en una posición incómoda por varias horas. Es realmente muy leve, más una sensación de tirantez que dolor. Puedo hacer todas mis actividades completamente normal. En mi trabajo de oficina no tengo ningún problema para estar sentado las horas normales. Caminar, correr, hacer ejercicio, todo lo hago sin inconvenientes. Mis rutinas de higiene y cuidado personal son exactamente iguales que siempre. Puedo cargar objetos normalmente, ayer ayudé a un amigo a cargar unas cajas y no tuve problemas. No he tenido que modificar ningún plan social, el fin de semana fui a un concierto donde estuve de pie varias horas y me sentí bien. Duermo perfectamente, a veces siento una ligera molestia al cambiar de posición, pero es mínima. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve molestia o sensación de tirantez, pero no es una sensación de dolor intenso.

2. Estar de pie: 0 puntos - No hay problemas reportados al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - No hay problemas reportados al caminar, correr o hacer ejercicio.

4. Cuidados personales: 0 puntos - Las rutinas de higiene y cuidado personal siguen siendo exactas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha levantado objetos normalmente sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no ha reportado problemas al sentarse durante las horas normales en el trabajo.

7. Viajar: 0 puntos - El fin de semana, el paciente pudo viajar a un concierto y no tuvo problemas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tuvo que modificar ningún plan social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información sobre problemas reportados en esta área.
10. Dormir: 1 punto - El paciente reporta una ligera molestia al cambiar de posición al dormir, pero es mínima.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta un puntaje total de 2 puntos, lo que indica un funcionamiento normal en la mayoría de las actividades evaluadas.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

14% | 18/126 [07:57<47:27, 26.37s/it]

Entrevista 18

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es realmente severa y ha empeorado drásticamente en el último mes. Todo comenzó hace tres meses con una lesión laboral, pero ahora el dolor es extremo y constante. Es un dolor punzante y quemante que no me da respiro ni un segundo. No puedo estar de pie absolutamente nada, incluso intentar pararme me causa dolor insoportable. Caminar es imposible, uso silla de ruedas para moverme. Para todas las actividades básicas como bañarme, vestirme, ir al baño, necesito asistencia completa de cuidadores. No puedo levantar nada, ni siquiera un vaso de agua. Estar sentado también es extremadamente doloroso, solo puedo hacerlo por muy pocos minutos con muchos cojines. He perdido mi empleo y mi independencia completamente. No tengo vida social, no puedo salir de casa. Mi relación de pareja se ha visto destruida por esta situación. El sueño es inexistente, paso las noches despierto por el dolor constante, incluso con medicamentos muy fuertes apenas logro dormir una hora seguida. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo) - El paciente describe un dolor extremo y constante, que impide que pueda estar de pie ni caminar, y lo obliga a utilizar una silla de ruedas. El paciente no puede realizar actividades básicas de la vida diaria sin asistencia y no puede levantar nada, ni siquiera un vaso de agua. El paciente no puede estar sentado por mucho tiempo y no tiene vida social ni relación sexual. El dolor interfiere gravemente en su dormido, haciendo que quede despertado durante las noches.

2. Estar de pie: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede estar de pie debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede caminar.

4. Cuidados personales: 5 puntos (Máximo) - El paciente necesita asistencia completa para realizar todos los cuidados personales básicos.

5. Levantar peso: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por muy pocos minutos y con muchos cojines.

7. Viajar: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no tiene vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede tener relaciones sexuales.

10. Dormir: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede dormir debido al dolor constante.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0

15% | 19/126 [08:32<51:10, 28.70s/it]

Entrevista 19

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo dolor en la zona lumbar desde hace diez días que me está causando dificultades moderadas. Comenzó después de ayudar a mi hijo a mudarse, estuve cargando muebles pesados sin la técnica adecuada. El dolor es constante pero variable en intensidad, algunos momentos es más tolerable que otros. Estar de pie por períodos largos se ha vuelto complicado, en mi trabajo tengo que alternar entre estar sentado y de pie más frecuentemente. Caminar distancias normales no es problema, pero sí evito caminatas largas que antes disfrutaba. Para las actividades de cuidado personal he tenido que modificar mi rutina, me baño más rápido y evito inclinarme mucho. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, le pido ayuda a otros para las compras. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve incómodo, especialmente en sillas duras. He declinado algunas invitaciones que implican actividades físicas. La vida íntima se ha visto algo afectada por precaución. El sueño se interrumpe ocasionalmente cuando me muevo bruscamente durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como constante y variable, lo que indica un grado moderado de intensidad.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente tiene dificultades al estar de pie por largos períodos, lo que sugiere una limitación moderada en esta área.
3. Andar: 1 punto - El paciente no reporta problemas para caminar distancias normales, por lo que no se aplica puntos en este ítem.
4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente ha tenido que modificar su rutina de cuidados personales, lo que indica una limitación moderada.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados y necesita ayuda, lo que corresponde a una limitación total en este ítem.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra incómodo sentarse por mucho tiempo, especialmente en sillas duras, lo que sugiere una limitación moderada.
7. Viajar: 1 punto - El paciente no reporta problemas específicos para viajar, por lo que no se aplica puntos en este ítem.
8. Vida social: 1 punto - El paciente ha declinado algunas invitaciones debido a las limitaciones físicas, pero no especifica problemas generales en su vida social, por lo que se le asigna un punto.
9. Actividad sexual: 1 punto - El paciente ha indicado que la vida sexual ha sido afectada por precaución, pero no especifica problemas graves, por lo que se le asigna un punto.
10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que el sueño se interrumpe ocasionalmente, pero no especifica problemas graves con el sueño, por lo que se le asigna un punto.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 11 puntos (4+2+1+0+2+1+1+1). Un puntaje total

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

16% | 20/126 [08:57<48:44, 27.59s/it]

Entrevista 20

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor lumbar que tengo es severo y está afectando gravemente mi vida diaria desde hace dos meses. Comenzó después de levantar una caja pesada en el trabajo de forma incorrecta. El dolor es intenso y constante, siento como si tuviera cuchillos clavados en la espalda baja. Estar de pie es extremadamente difícil, no puedo hacerlo más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es una tortura, necesito bastón y aún así solo puedo recorrer distancias muy cortas. Para bañarme y vestirme necesito ayuda de mi familia, no puedo inclinarme ni hacer movimientos de rotación. Levantar cualquier objeto, incluso muy liviano, me causa dolor severo. Estar sentado también es problemático, no

puedo hacerlo más de 20 minutos seguidos. He faltado al trabajo constantemente y temo perder mi empleo. Mi vida social prácticamente no existe, he cancelado todos los compromisos. La relación íntima con mi pareja se ha visto severamente afectada. Duermo muy mal, me despierto múltiples veces por la noche debido al dolor, necesito medicamentos fuertes para poder descansar algo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso y constante, con sensación de cuchillos clavados en la espalda baja.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede hacerlo más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita bastón y solo puede recorrer distancias muy cortas.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda de su familia para bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, incluso livianos.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no puede hacerlo más de 20 minutos seguidos.

7. Viajar: No se mencionó.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado todos los compromisos.

9. Actividad sexual: 5 puntos - No se especificó si está afectada, pero se mencionó que la relación íntima se ha visto severamente afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y necesita medicamentos fuertes para poder descansar.

El total de puntos obtenidos por el paciente es de 25 puntos, lo que corresponde a una discapacidad severa según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

17% | 21/126 [09:11<41:37, 23.78s/it]

Entrevista 21

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una molestia leve en la espalda baja desde hace una semana. Empezó después de estar varias horas trabajando en el jardín, removiendo tierra y plantando. Es más una sensación de rigidez matutina que dolor propiamente dicho. Durante el día, especialmente cuando estoy activo, la molestia desaparece casi completamente. Puedo estar de pie sin problemas, trabajo como maestro y paso muchas horas de pie enseñando. Caminar es completamente normal, incluso he continuado con mis ejercicios de rutina. Las actividades de higiene personal las realizo normalmente, solo por las mañanas siento un poco más de rigidez. Puedo levantar objetos sin problemas, aunque he sido más consciente de

usar buena postura. Estar sentado no me causa molestias. Mi vida social continúa igual, no he tenido que cancelar ningún plan. El sueño es bueno, ocasionalmente noto la rigidez al levantarme, pero no me despierta durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve molestia o sensación de rigidez, sin necesidad de medicación.

2. Estar de pie: 0 puntos - Normal.

3. Andar: 0 puntos - Normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - Normal.

5. Levantar peso: 0 puntos - Normal.

6. Estar sentado: 0 puntos - Normal.

7. Viajar: 0 puntos - Normal.

8. Vida social: 0 puntos - Normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - Normal.

10. Dormir: 0 puntos - Normal.

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, basado en la información proporcionada por el paciente, se puede evaluar que su puntuación total es de 0 puntos, lo que indica un funcionamiento normal en todos los aspectos evaluados.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

17% | 22/126 [09:40<43:41, 25.21s/it]

Entrevista 22

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha evolucionado a algo bastante problemático en las últimas cinco semanas. Inicialmente era solo una molestia después de un día largo de trabajo físico, pero ahora interfiere significativamente con mis actividades. El dolor es moderadamente intenso y persistente. Estar de pie por más de 20-30 minutos se vuelve muy incómodo, tengo que buscar apoyo o sentarme. Caminar distancias largas es difícil, evito ir a centros comerciales o hacer recorridos largos. Para vestirme y bañarme necesito más tiempo y cuidado, especialmente para ponerme los zapatos y calcetines. Levantar objetos pesados es imposible, he delegado esas tareas a otros. Estar sentado por períodos prolongados también se vuelve incómodo, especialmente en el trabajo donde paso muchas horas frente a la computadora. He comenzado a declinar invitaciones que requieren mucha actividad física. La intimidad se ha visto afectada por el temor a empeorar el dolor. El sueño se interrumpe regularmente, tengo que cambiar de posición frecuentemente y a

veces me despierto por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderadamente intenso y persistente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie por 20-30 minutos es incómodo.

3. Andar: 2 puntos - El paciente encuentra difícil caminar largas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra incómodo sentarse por períodos prolongados, especialmente en el trabajo.

7. Viajar: 1 punto - El paciente evita ir a centros comerciales o hacer recorridos largos.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha declinado invitaciones que requieren mucha actividad física.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad se ha visto afectada por el temor a empeorar el dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño se interrumpe regularmente y el paciente tiene que cambiar de posición frecuentemente o despertarse por el dolor.

Según la Escala Oswestry, el puntaje total obtenido por el paciente es 15 puntos. La escala va desde 0 a 50 puntos, con 0 puntos representando no discapacidad y 50 puntos representando una discapacidad máxima. Por lo tanto, el paciente presenta una discapacidad moderada lumbar según las respuestas proporcionadas.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

18% | 23/126 [10:17<49:09, 28.64s/it]

Entrevista 23

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, desde hace tres días tengo una ligera molestia en la parte baja de la espalda. Ocurrió después de dormir en el sofá viendo una película, desperté con esta sensación de tirantez. Es realmente muy leve, casi imperceptible durante el día cuando estoy ocupado. Puedo trabajar normalmente, no he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina laboral. Caminar, subir escaleras, hacer ejercicio ligero, todo lo realizo sin ningún problema. Mis actividades de cuidado personal son exactamente las mismas de siempre. Puedo levantar objetos normalmente, ayer cargué las bolsas del supermercado sin inconvenientes. Estar sentado es completamente cómodo. No he tenido que cancelar ningún plan social, el fin de semana salí con amigos y estuve perfectamente bien. Duermo bien, solo al levantarme por las mañanas noto una ligera rigidez que desaparece en pocos minutos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente

describe el dolor como leve y casi imperceptible durante el día, por lo que según los criterios de la Escala Oswestry, se le asigna un puntaje de 0 puntos.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar sin problemas y subir escaleras es posible, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente describe que andar normalmente y realizar ejercicios ligeros sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que sus actividades de cuidado personal son exactamente las mismas de siempre, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos normalmente, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado es cómodo, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido que cancelar ningún plan social y ha viajado sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que ha ido a salir con amigos y ha estado bien, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se informa ninguna restricción en la actividad sexual, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que solo al levantarse por las mañanas nota una ligera rigidez que desaparece rápidamente, por lo que se le asigna un puntaje de 1 punto.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry es de 1 punto, lo que indica un funcionamiento generalmente normal.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

19% | 24/126 [10:43<47:32, 27.96s/it]

Entrevista 24

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es extremadamente severo y ha destruido completamente mi calidad de vida en los últimos cinco meses. Comenzó con una hernia discal que se complicó después de una cirugía fallida. El dolor es constante, intenso y debilitante, como si tuviera fuego en la espalda las 24 horas del día. No puedo estar de pie ni un minuto, inmediatamente siento dolor insoportable. Caminar es imposible, estoy confinado a una silla de ruedas. Para todas las actividades básicas como bañarme, vestirme, usar el baño, necesito cuidado completo de enfermeras. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera objetos de unos gramos. Estar sentado también es agonizante, solo puedo hacerlo por minutos muy cortos con múltiples cojines y medicamentos. He perdido mi trabajo, mi independencia y mi dignidad. No tengo vida social alguna, estoy completamente aislado. Mi matrimonio está en crisis por esta situación. No duermo prácticamente nada, paso las noches en vela por el dolor constante, incluso con morfina el alivio es mínimo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo) - El paciente describe el dolor como extremadamente severo y constante, no puede estar de pie ni sentado por mucho tiempo debido al dolor, y no puede realizar ninguna actividad básica sin ayuda.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar.

4. Cuidados personales: 5 puntos (Máximo) - El paciente requiere cuidados completo de enfermeras para realizar todas las actividades básicas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún peso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por cortos períodos de tiempo con muchos cojines y medicamentos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su estado actual.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social alguna.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha mencionado ninguna actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme prácticamente nada.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 25 puntos (5 puntos por cada ítem). Esto indica una alta discapacidad lumbar y un grave impacto en la calidad de vida del paciente.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

20% | 25/126 [11:13<48:17, 28.68s/it]

Entrevista 25

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, tengo dolor lumbar moderado desde hace tres semanas que está interfiriendo bastante con mis actividades diarias. Comenzó gradualmente después de pasar un fin de semana ayudando a renovar la casa de mis padres, cargando materiales y trabajando en posiciones incómodas. El dolor es persistente y se intensifica con ciertos movimientos. Estar de pie por más de 15-20 minutos se vuelve muy incómodo, tengo que buscar donde apoyarme o sentarme. Caminar largas distancias es problemático, evito ir al centro comercial o hacer caminatas. Para bañarme y vestirme necesito más tiempo y mucho cuidado, especialmente para ponerme los calcetines. Levantar objetos pesados es muy difícil, he dejado de cargar las bolsas de compras. Estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo, especialmente en el trabajo. He cancelado algunos planes sociales que implican estar mucho tiempo de pie. La intimidad se ha visto afectada por miedo a empeorar. El sueño se interrumpe, me despierto 2-3 veces por la noche debido al dolor al cambiar de posición. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe un dolor lumbar moderado a intenso que persiste y se intensifica con ciertos movimientos.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente se encuentra incómodo después de estar de pie por 15-20 minutos.

3. Andar: 2 puntos - Caminar largas distancias es problemático para el paciente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente ha dejado de cargar bolsas de compras debido a la dificultad de levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente se encuentra incómodo después de estar sentado por más de una hora.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha cancelado planes sociales que implican estar mucho tiempo de pie.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado algunos planes sociales.

9. Actividad sexual: 4 puntos - La intimidad se ha visto afectada por miedo a empeorar.

10. Dormir: 3 puntos - El sueño se interrumpe y el paciente despierta 2-3 veces por la noche debido al dolor.

Calificación total: 25 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, una puntuación total entre 0 y 10 puntos indica un bajo nivel de discapacidad, 11-20 puntos un moderado nivel, y 21 o más puntos un alto nivel de discapacidad. En este caso, el paciente presenta un nivel moderado a alto de discapacidad lumbar (puntuación total de 25).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

Entrevista 26

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, vengo por una molestia muy leve en la espalda baja que tengo desde hace seis días. Empezó después de una clase de yoga donde probablemente forcé demasiado una postura nueva. Es más una sensación de tensión que dolor real. Puedo hacer absolutamente todas mis actividades normales sin restricciones. En mi trabajo de pie como vendedor no tengo ningún problema. Caminar, correr, hacer ejercicio, todo completamente normal. Mis rutinas de cuidado personal son idénticas a siempre. Puedo cargar objetos pesados sin problemas, ayer moví muebles en casa. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada para nada, el fin de semana fui a bailar y me sentí excelente. Duermo perfectamente, a veces noto una ligera tensión al acostarme inicialmente, pero no me molesta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - No reporta dolor, solo sensación de tensión.

2. Estar de pie: 0 puntos - No reporta problemas al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - No reporta problemas al caminar, correr o hacer ejercicio.

4. Cuidados personales: 0 puntos - No reporta cambios en sus rutinas de cuidado personal.

5. Levantar peso: 0 puntos - No reporta problemas al levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 0 puntos - Reporta que estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - No reporta problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - Reporta que su vida social no ha sido afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No mencionó ningún problema en esta área.

10. Dormir: 1 punto - Reporta una ligera tensión al acostarse inicialmente, pero no molesta.

Total: 1 punto.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una puntuación total de 1 punto, lo que indica un bajo grado de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

Entrevista 27

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es muy severo y me está incapacitando considerablemente desde hace seis semanas. Todo comenzó con un accidente automovilístico menor, pero el dolor ha ido empeorando progresivamente. Es un dolor constante, punzante e intenso que me acompaña todo el día. No puedo estar de pie más de 5-10 minutos sin experimentar dolor severo que me obliga a sentarme o acostarme. Caminar es extremadamente difícil, uso bastón y aún así solo puedo recorrer distancias muy cortas con gran esfuerzo. Para las actividades básicas como ducharme necesito una silla especial y ayuda parcial, vestirme me toma el triple de tiempo normal. Levantar cualquier objeto, incluso muy liviano como un libro, me causa dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin gran incomodidad. He faltado al trabajo casi completamente el último mes. Mi vida social está completamente cancelada, no puedo salir de casa. La relación íntima está muy afectada. Duermo terriblemente, me despierto cada hora por el dolor, necesito medicamentos fuertes que apenas me dan alivio temporal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso y constante que lo acompaña todo el día, lo que lo impide estar de pie durante más de 5-10 minutos y caminar con mucho esfuerzo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-10 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente tiene muchas dificultades para caminar y necesita un bastón.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita una silla especial y ayuda parcial para realizar actividades básicas como ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente experimenta dolor intenso al levantar cualquier objeto, incluyendo cosas livianas como un libro.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente puede sentarse solo durante 15 minutos sin gran incomodidad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha faltado al trabajo casi completamente el último mes y su vida social está completamente cancelada, lo que sugiere que viajar es una actividad que no puede realizar.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente está completamente cancelada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima está muy afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme terriblemente y necesita medicamentos fuertes que apenas le dan alivio temporal.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 11 puntos (0-47 puntos). Esto indica un nivel alto de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

Entrevista 28

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, desde hace una semana y media tengo dolor en la zona lumbar que me está causando algunas limitaciones. Comenzó después de cargar unas cajas pesadas durante una mudanza. El dolor es moderado y bastante constante durante el día. Estar de pie por períodos largos se ha vuelto incómodo, en mi trabajo de cajera tengo que cambiar de posición más frecuentemente. Caminar distancias normales no es gran problema, pero evito caminatas largas que antes hacía regularmente. Para vestirme y bañarme he tenido que ser más cuidadosa, especialmente al inclinarme hacia adelante. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, he tenido que pedir ayuda para las compras. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve molesto, especialmente sin respaldo adecuado. He declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física como senderismo. La vida íntima se ha visto algo comprometida por precaución. El sueño se ve interrumpido ocasionalmente, especialmente cuando me muevo durante la noche, pero logro volver a dormir. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra inconveniente estar de pie por períodos largos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias normales, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que ser más cuidadosa al vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra inconveniente sentarse por mucho tiempo, especialmente sin respaldo adecuado.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha declinado invitaciones que requieren mucha actividad física.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado invitaciones.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La vida sexual ha sido algo comprometida por precaución.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño se ve interrumpido ocasionalmente.

Calificación total: 18 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (10-40 puntos) según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3

23% | 29/126 [12:40<36:18, 22.46s/it]

Entrevista 29

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es crítica y ha empeorado dramáticamente en los últimos dos meses. Inicialmente era manejable después de una lesión deportiva, pero ahora es absolutamente debilitante. El dolor es extremo, constante e implacable, como si tuviera vidrios molidos en la columna. No puedo estar de pie ni siquiera por segundos, cualquier intento de pararme resulta en dolor insoportable. Caminar es completamente imposible, estoy confinado a silla de ruedas para cualquier movimiento. Para absolutamente todas las actividades básicas - bañarme, vestirme, usar el baño - requiero asistencia total de cuidadores profesionales. No puedo levantar nada, ni siquiera una hoja de papel. Estar sentado es agonizante, solo puedo hacerlo por minutos muy cortos con múltiples almohadones y medicación previa. He perdido mi trabajo, mi independencia y mi autoestima. No existe vida social alguna, estoy completamente aislado del mundo. Mi relación de pareja se ha desintegrado. El sueño es inexistente, paso las noches en agonía constante, incluso con opioides fuertes el alivio es mínimo y temporal. [/INST]

1. Intensidad dolor: 5 puntos (extremo y constante)
2. Estar de pie: 0 puntos (imposible)
3. Andar: 0 puntos (imposible)
4. Cuidados personales: 5 puntos (requiere asistencia total)
5. Levantar peso: 0 puntos (imposible)
6. Estar sentado: 2 puntos (agonizante, solo cortas duraciones)
7. Viajar: 0 puntos (imposible)
8. Vida social: 0 puntos (completamente aislado del mundo)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no aplicable, dada la falta de vida social)
10. Dormir: 0 puntos (inexistente)

La puntuación total es de 12 puntos, lo que indica una discapacidad severa según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

24% | 30/126 [12:57<33:09, 20.72s/it]

Entrevista 30

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una leve molestia en la espalda baja desde hace cuatro días. Creo que fue por pasar muchas horas encorvado trabajando en mi laptop desde la cama durante el fin de semana. Es más una sensación de rigidez que dolor propiamente dicho. Puedo realizar todas mis actividades laborales sin ningún problema, trabajo en oficina y no he tenido que hacer ajustes. Caminar, subir escaleras, hacer mi rutina de ejercicios, todo normal. Las actividades de higiene personal las hago igual que siempre, sin restricciones. Puedo levantar objetos sin dificultad, ayer ayudé a cargar muebles. Estar sentado es cómodo, aunque trato de mantener mejor postura. Mi vida social continúa igual, no he cancelado ningún plan. Duermo bien, solo noto la rigidez al levantarme por las mañanas, pero se quita rápidamente con movimiento. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (mínimo dolor o ninguno).

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay dificultad).
3. Andar: 0 puntos (no hay dificultad).
4. Cuidados personales: 0 puntos (no hay dificultad).
5. Levantar peso: 0 puntos (no hay dificultad).
6. Estar sentado: 1 punto (ligeramente cómodo).
7. Viajar: 0 puntos (no hay dificultad).
8. Vida social: 0 puntos (no hay restricción).
9. Actividad sexual: 0 puntos (no hay dificultad).
10. Dormir: 1 punto (mínimo problema, solo rigidez al despertar).

En total, el paciente tiene una puntuación de 3 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, lo que indica un funcionamiento generalmente normal con un mínimo de problemas relacionados con la espalda.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

25% [REDACTED] | 31/126 [13:29<38:09, 24.10s/it]

Entrevista 31

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es bastante intenso y me está limitando significativamente desde hace un mes. Comenzó después de una mala caída en el hielo, inicialmente pensé que era solo un golpe, pero ha empeorado. El dolor es fuerte y constante, con episodios de dolor punzante. Estar de pie es muy problemático, no puedo hacerlo más de 10-15 minutos sin dolor severo. Caminar se ha vuelto muy difícil, uso bastón para distancias cortas y evito salir innecesariamente. Para bañarme necesito una silla de ducha y para vestirme requiero ayuda con zapatos y calcetines. Levantar objetos es prácticamente imposible, incluso cosas ligeras me causan dolor intenso. Estar sentado también es muy incómodo, especialmente sin cojines especiales, no aguanto más de 20 minutos. He faltado al trabajo frecuentemente. Socialmente estoy muy limitado, he cancelado la mayoría de mis compromisos. La intimidad se ha visto severamente afectada. El sueño es muy malo, me despierto múltiples veces por el dolor, necesito medicamentos para dormir que me ayudan parcialmente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como fuerte y constante, con episodios de dolor punzante, lo que indica una intensidad alta de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede hacerlo más de 10-15 minutos sin dolor severo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente utiliza un bastón para cortas distancias y evita salir innecesariamente debido al dolor.

4. Cuidados personales: 2-3 puntos - El paciente necesita asistencia para bañarse y vestirse, lo que puede indicar una dificultad moderada en realizar estas tareas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos, incluso cosas ligeras, lo que indica una incapacidad total.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no aguanta más de 20 minutos sentado, lo que indica una incapacidad total.

7. Viajar: No se mencionó en la entrevista.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente está muy limitado socialmente y ha cancelado la mayoría de sus compromisos.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad se ha visto severamente afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente tiene malos sueños y necesita medicamentos para dormir, lo que indica una incapacidad total.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su estado actual según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es probablemente alto. El paciente presenta una incapacidad significativa en la mayoría de las áreas evaluadas, lo que sugiere una discapacidad moderada a grave. Es recomendable que el paciente se evalúe por un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

25% [32/126 [13:53<38:01, 24.27s/it]

Entrevista 32

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo una molestia menor en la zona lumbar desde hace cinco días. Ocurrió después de estar mucho tiempo agachado limpiando el garaje. Es una sensación más de tensión muscular que dolor agudo. Puedo trabajar normalmente, no he tenido que hacer ningún cambio en mi rutina laboral de oficina. Caminar es completamente normal, incluso continúo con mis caminatas diarias. Las actividades de cuidado personal las realizo sin restricciones, aunque por las mañanas siento un poco más de rigidez. Puedo levantar objetos normalmente, solo soy más consciente de usar buena técnica. Estar sentado no me causa problemas. No he tenido que modificar ningún plan social. Duermo bien, ocasionalmente siento la tensión al cambiar de posición, pero no me despierta ni interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia menor, similar a tensión muscular, por lo que el nivel de dolor se clasificaría en el rango 0-2 puntos. Sin embargo, el paciente no especificó un número exacto, por lo que se asume un valor de 1 punto como una estimación conservadora.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar es completamente normal.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que realiza todos los cuidados personales sin restricciones.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos normalmente.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que sentarse no le causa problemas.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no mencionó restricciones en viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido que modificar ningún plan social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no mencionó problemas en la actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme bien.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 1 punto. La baja puntuación total indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

26% | 33/126 [14:21<39:14, 25.31s/it]

Entrevista 33

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha progresado a un nivel muy preocupante en las últimas seis semanas. Inicialmente era tolerable después de un incidente en el trabajo, pero ahora interfiere severamente con mi vida diaria. El dolor es intenso, constante y se irradia hacia las piernas. Estar de pie es extremadamente difícil, máximo 10 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es una lucha constante, necesito descansar frecuentemente y uso bastón para apoyo. Para las actividades básicas como ducharme y vestirme necesito mucha ayuda, no puedo inclinarme ni hacer movimientos de rotación. Levantar cualquier objeto, por liviano que sea, me causa dolor severo. Estar sentado también es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin gran incomodidad. He estado ausente del trabajo la mayor parte del tiempo. Mi vida social prácticamente no existe, he cancelado todo. La relación íntima está completamente afectada por el dolor. Duermo muy mal, me despierto cada 1-2 horas por el dolor, incluso con medicamentos fuertes el alivio es mínimo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como intenso, constante y radicado en las piernas, lo que indica un nivel alto de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita descansar frecuentemente y utiliza un bastón para caminar, lo que indica una dificultad extrema en la locomoción.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar actividades básicas como ducharse y vestirse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, lo que indica una gran dificultad en este aspecto.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente solo puede sentarse por 15 minutos sin gran incomodidad.

7. Viajar: No se menciona en la entrevista.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado toda su vida social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima está completamente afectada por el dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta frecuentemente por el dolor, incluso con medicamentos fuertes.

Basado en la información proporcionada, el paciente presenta una discapacidad lumbar severa, con un total de 35 puntos en la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

27% | 34/126 [14:40<35:39, 23.25s/it]

Entrevista 34

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, desde hace una semana tengo una molestia leve en la parte baja de la espalda. Comenzó después de pasar el día completo trabajando en el jardín, plantando y podando. Es más una sensación de cansancio muscular que dolor. Puedo mantenerme de pie sin problemas durante mi jornada laboral completa. Caminar es totalmente normal, he seguido con mis rutinas de ejercicio habituales. Para mis actividades de higiene y cuidado personal no tengo ninguna limitación. Puedo levantar objetos sin inconvenientes, aunque trato de mantener buena postura por precaución. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada, el fin de semana salí a cenar y al cine sin problemas. Duermo bien, solo al levantarme por las mañanas siento un poco de rigidez que desaparece rápidamente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve cansancio muscular sin dolor real.

2. Estar de pie: 0 puntos - Puede mantenerse de pie durante su jornada laboral completa sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - Caminar es totalmente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - No tiene limitaciones para sus actividades de higiene y cuidado personal.

5. Levantar peso: 0 puntos - Puede levantar objetos sin inconvenientes.

6. Estar sentado: 0 puntos - Estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - Su vida social no se ha visto afectada, ha salido a cenar y al cine sin problemas.

8. Vida social: 0 puntos - Vida social normal.

9. Actividad sexual: No se mencionó en la entrevista.

10. Dormir: 0 puntos - Duerme bien.

Puntuación total: 1 punto.

La puntuación total de 1 indica un estado funcional relativamente normal según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

28% [REDACTED] | 35/126 [15:05<36:02, 23.76s/it]

Entrevista 35

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor lumbar que tengo es realmente severo y está destruyendo mi calidad de vida desde hace tres meses. Comenzó con una lesión en el gimnasio que no fue tratada adecuadamente y se ha complicado. El dolor es extremo, constante e incapacitante, siento como descargas eléctricas en la espalda. No puedo estar de pie prácticamente nada, incluso intentar pararme me causa dolor insoportable que me hace gritar. Caminar es imposible sin asistencia, uso andador y aún así es agonizante. Para todas las actividades básicas - bañarme, vestirme, usar el baño - necesito ayuda completa de mi familia. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera un papel. Estar sentado es tortuoso, solo puedo hacerlo por pocos minutos con múltiples cojines y medicación previa. He perdido mi trabajo y mi independencia total. No tengo vida social, estoy confinado en casa. Mi matrimonio está en crisis por esta situación. No duermo, paso las noches despierto por el dolor constante, incluso con medicamentos muy fuertes apenas obtengo alivio momentáneo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como extremo, constante, incapacitante, y comparándolo a descargas eléctricas.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por mucho que intente, ya que el simple acto de intentarlo causa dolor insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente requiere asistencia para caminar y utiliza un andador.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita completa ayuda de su familia para realizar tareas básicas de higiene y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera un papel.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por pocos minutos y con la necesidad de múltiples cojines y medicación previa.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su incapacidad para caminar y el dolor constante.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social debido a su confinamiento en casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información suficiente en la entrevista para evaluar la actividad sexual del paciente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme y pasa las noches despierto debido al dolor constante, incluso con medicamentos fuertes.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

29% [REDACTED] | 36/126 [15:27<35:04, 23.38s/it]

Entrevista 36

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo dolor moderado en la zona lumbar desde hace dos semanas que me está causando algunas dificultades. Empezó después de un viaje largo en autobús donde estuve sentado en una posición incómoda por muchas horas. El dolor es persistente pero variable en intensidad. Estar de pie por más de 30 minutos se vuelve incómodo, tengo que buscar apoyo o cambiar de posición. Caminar distancias moderadas es posible pero evito caminatas largas que antes disfrutaba. Para vestirme y bañarme necesito más cuidado y tiempo, especialmente para ponerme los zapatos. Levantar objetos pesados es difícil, he dejado que otros carguen las compras. Estar sentado por períodos prolongados también se vuelve molesto, especialmente en sillas duras. He declinado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie o caminar. La intimidad se ha visto algo afectada por precaución. El sueño se interrumpe ocasionalmente cuando cambio de posición bruscamente durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor como moderado.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra que estar de pie por más de 30 minutos es incómodo.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente encuentra difícil levantar objetos pesados y ha dejado que otros carguen las compras.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente encuentra que sentarse por períodos prolongados es molesto, especialmente en sillas duras.

7. Viajar: 3 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie o caminar.

8. Vida social: 2 puntos - The patient has declined some social invitations.

9. Actividad sexual: 3 puntos - The patient reports that intimacy has been affected to some degree by caution.

10. Dormir: 2 puntos - The patient's sleep is occasionally interrupted by changing positions during the night.

Total: 22 puntos. The patient's total score is 22 points, which falls within the moderate disability range on the Oswestry Disability Index.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

29% [REDACTED] | 37/126 [15:51<34:54, 23.53s/it]

Entrevista 37

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, vengo por una molestia muy leve en la espalda baja que tengo desde hace tres días. Creo que fue por dormir en una cama diferente durante un viaje de trabajo. Es realmente mínimo, más una sensación de tirantez que dolor. Puedo hacer absolutamente todo normal en mi trabajo que requiere estar de pie muchas horas. Caminar, correr, hacer ejercicio, completamente normal. Mis rutinas de cuidado personal son exactamente iguales que siempre. Puedo cargar objetos pesados sin problema alguno. Estar sentado es totalmente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada en lo más mínimo. Duermo perfectamente, solo al despertar noto una ligera rigidez que desaparece inmediatamente con el primer movimiento. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como mínimo y menciona que es más una sensación de tirantez que un dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede hacer absolutamente todo normal en su trabajo que requiere estar de pie durante muchas horas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar, correr y hacer ejercicio están completamente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que sus rutinas de cuidado personal siguen siendo exactamente iguales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede cargar objetos pesados sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado es totalmente cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no menciona problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su vida social no se ha visto afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se mencionó información relevante en este apartado.

10. Dormir: 1 punto - El paciente solo nota una ligera rigidez al despertar, que desaparece inmediatamente.

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtuvo un puntaje de 1 punto en total, lo que indica una baja discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 38

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es bastante severo y me está limitando considerablemente desde hace siete semanas. Todo comenzó gradualmente después de una serie de trabajos de jardinería intensos, pero ha empeorado progresivamente. El dolor es fuerte, constante y punzante. Estar de pie es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin experimentar dolor significativo. Caminar se ha vuelto difícil, evito salir y cuando lo hago necesito descansar frecuentemente. Para bañarme necesito una silla especial y para vestirme requiero ayuda con zapatos y calcetines porque no puedo inclinarme. Levantar objetos pesados es imposible, incluso cosas moderadamente pesadas me causan dolor intenso. Estar sentado también es problemático, especialmente sin soporte lumbar, no aguanto más de 30 minutos. He faltado al trabajo varias veces. Mi vida social se ha reducido significativamente, he cancelado muchos planes. La relación íntima se ha visto muy afectada. El sueño es irregular, me despierto 2-3 veces por la noche debido al dolor al moverme. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como fuerte, constante y punzante.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede hacerlo más de 15 minutos sin experimentar dolor significativo.

3. Andar: 1 punto - Caminar se ha vuelto difícil y el paciente evita salir y necesita descansar frecuentemente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse debido a la dificultad de inclinarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente describe que levantar objetos pesados es imposible.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente no aguanta más de 30 minutos sentado sin soporte lumbar.

7. Viajar: 0 puntos - No se menciona específicamente el problema con el viajar en esta entrevista.

8. Vida social: 2 puntos - La vida social se ha reducido significativamente.

9. Actividad sexual: 1 punto - La relación íntima se ha visto muy afectada.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño es irregular y el paciente despierta 2-3 veces por la noche debido al dolor.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

Entrevista 39

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una molestia menor en la zona lumbar desde hace ocho días. Empezó después de pasar varias horas limpiando ventanas, estuve estirándome y en posiciones incómodas. Es más una sensación de cansancio muscular que dolor real. Puedo trabajar completamente normal, no he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina. Caminar es totalmente normal, continúo con mis actividades físicas habituales. Las actividades de cuidado personal las realizo sin ninguna restricción. Puedo levantar objetos normalmente, ayer moví cajas en casa sin problemas. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social continúa igual que siempre, no he tenido que cancelar nada. Duermo bien, ocasionalmente noto una ligera tensión muscular al acostarme, pero no interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia menor o sensación de cansancio muscular en lugar de un dolor real, por lo que se puede calificar con un punto.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar es totalmente normal.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna dificultad para andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente puede realizar todas las actividades de cuidado personal sin restricción.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha levantado cajas sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente encuentra sentarse completamente cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - La vida social continúa igual que siempre, no ha tenido que cancelar nada.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social continúa igual que siempre.

9. Actividad sexual: No se mencionó - No hay información suficiente sobre la actividad sexual para calificar este ítem.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme bien, solo nota ocasionalmente una ligera tensión muscular al acostarse que no interfiere con su descanso.

La puntuación total es de 1 punto. El paciente presenta una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 40

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es crítica y ha empeorado dramáticamente en el último mes. Inicialmente era manejable después de una caída en casa, pero ahora es absolutamente incapacitante. El dolor es extremo, constante y despiadado, siento como si tuviera hierros candentes en la columna. No puedo estar de pie ni por segundos, cualquier intento resulta en dolor insoportable. Caminar es completamente imposible, dependo totalmente de silla de ruedas. Para todas las actividades básicas - higiene, vestido, alimentación - requiero asistencia completa de cuidadores. No puedo levantar nada, ni siquiera una pluma. Estar sentado es agonizante, solo puedo hacerlo minutos muy cortos con medicación previa y múltiples almohadones. He perdido todo: trabajo, independencia, dignidad. No existe vida social, estoy completamente aislado. Mi relación de pareja ha colapsado. El sueño es inexistente, las noches son un infierno de dolor constante, incluso los opioides más fuertes apenas proporcionan alivio momentáneo. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como extremo, constante y despiadado, no puede estar de pie ni sentirse en pie a pesar de que menciona una caída reciente, lo que sugiere que el dolor es más que solo debido a la lesión inicial.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie ni por segundos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente requiere asistencia completa para realizar todas las actividades básicas de la higiene, vestirse y alimentarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera una pluma.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente solo puede sentarse minutos muy cortos con medicación previa y múltiples almohadones, lo que sugiere que el dolor es todavía significativo incluso cuando está sentado.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su estado actual de salud.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social debido a su incapacidad.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación sexual ha colapsado debido a la incapacidad del paciente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no puede dormir debido al dolor constante.

La puntuación total es de 17 puntos, lo que indica una desabilidad muy grave según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

33% [REDACTED] | 41/126 [17:35<37:16, 26.32s/it]

Entrevista 41

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, desde hace diez días tengo dolor en la espalda baja que me está causando dificultades moderadas en mi vida diaria. Comenzó después de ayudar a un amigo a mudarse, cargando electrodomésticos pesados. El dolor es constante pero con intensidad variable durante el día. Estar de pie por más de 20 minutos se vuelve incómodo, tengo que alternar con períodos sentado. Caminar distancias normales no es mayor problema, pero evito caminatas largas que antes hacía regularmente. Para las actividades de cuidado personal he tenido que modificar mi rutina, me baño más rápido y evito inclinarme mucho hacia adelante. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, le pido ayuda a otros para las tareas que lo requieren. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve molesto, especialmente en superficies duras. He declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física. La vida íntima se ha visto algo comprometida por precaución al dolor. El sueño se ve interrumpido ocasionalmente, especialmente cuando me muevo durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como constante con intensidad variable, lo que significa que la intensidad es mayor que leve pero menor que moderada.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente informa que se vuelve incómodo después de estar de pie por más de 20 minutos.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar distancias normales sin mayor problema.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que modificar su rutina de cuidados personales, lo que significa que requiere algunas limitaciones.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente se encuentra molesto al estar sentado por mucho tiempo, especialmente en superficies duras.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física, lo que puede indicar algunas limitaciones en viajar.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones, lo que sugiere que la vida social se ha visto comprometida.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La vida sexual se ha visto comprometida por precaución al dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño se ve interrumpido ocasionalmente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total para este paciente sería de 24 puntos. La puntuación total varía de 0 a 50 puntos, con un puntaje más bajo indicando mayor discapacidad. En este caso, el paciente presenta una moderada discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

33% [REDACTED] | 42/126 [17:53<33:35, 24.00s/it]

Entrevista 42

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia en la espalda baja desde hace una semana, empezó después de trabajar en el jardín. Es un dolor leve, máximo un 3 de 10. Puedo estar de pie sin problemas durante mi jornada laboral completa. Camino normal, tanto para ir al trabajo como para hacer ejercicio por las tardes. Me baño y me visto sin ninguna complicación, aunque sí noto un poco la molestia cuando me inclino para atarme los zapatos. Puedo cargar cosas normalmente, ayer ayudé a mi vecino a mover unos muebles y aunque sentí la molestia, pude hacerlo. En la oficina paso 8 horas sentado y estoy cómodo. El fin de semana viajé 4 horas para visitar a mi familia sin problemas. Mis actividades sociales siguen igual, fui al cine y a un concierto esta semana. No ha afectado para nada mi vida íntima. Duermo bien, solo una noche me desperté porque me moví bruscamente, pero me volví a dormir enseguida." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve, menor de 3 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay problemas).

3. Andar: 0 puntos (camino normal).

4. Cuidados personales: 1 punto (puede realizarlo con dificultad leve, como atar suela de zapatos).

5. Levantar peso: 0 puntos (puede cargar cosas normalmente).

6. Estar sentado: 0 puntos (puede pasar 8 horas sentado sin problemas).

7. Viajar: 0 puntos (puede viajar 4 horas sin problemas).

8. Vida social: 0 puntos (actividades sociales siguen igual).

9. Actividad sexual: 0 puntos (no afectado).

10. Dormir: 1 punto (despertó una noche por moverse bruscamente, pero volvió a dormir rápidamente).

Total: 4 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un total de 4 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

34% [REDACTED] | 43/126 [18:26<36:57, 26.72s/it]

Entrevista 43

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero constante, llevo así dos meses. Lo calificaría como un 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie durante períodos cortos, unos 20-30 minutos, pero después necesito descansar. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas que solía hacer. Para ducharme y vestirme necesito más tiempo y debo ser cuidadoso con los movimientos, especialmente al inclinarme. Cargar cosas pesadas se ha vuelto difícil, ahora mi hijo me ayuda con las compras grandes. Estar sentado es tolerable por períodos de 1-2 horas, pero después tengo que levantarme y moverme. Los viajes largos son incómodos, necesito hacer paradas adicionales para estirarme. He reducido algunas actividades sociales, sobre todo las que requieren estar mucho tiempo de pie. La intimidad con mi pareja requiere más cuidado y a veces evitamos ciertas posiciones. Duermo aceptablemente, aunque me despierto ocasionalmente si me muevo mal durante la noche." [INST] 1. Intensidad dolor: 5-6 puntos - El paciente describe su dolor de espalda como moderado a intenso, lo cual corresponde a un puntaje de 5-6 en la escala de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante períodos cortos, por lo que podemos asignarle un puntaje de 2 puntos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, por lo que puede asignarse un puntaje de 3 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para ducharse y vestirse, por lo que puede asignarse un puntaje de 3 puntos.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente ha dicho que cargar cosas pesadas es difícil y necesita ayuda, por lo que puede asignarse un puntaje de 1 punto.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede estar sentado por períodos de 1-2 horas, por lo que puede asignarse un puntaje de 2 puntos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente encuentra viajes largos incómodos, por lo que puede asignarse un puntaje de 2 puntos.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, por lo que puede asignarse un puntaje de 1 punto.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente requiere más cuidado y en ocasiones evita ciertas posiciones, por lo que puede asignarse un puntaje de 2 puntos.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme aceptablemente, por lo que puede asignarse un puntaje de 3 puntos.

El puntaje total de la entrevista es 18 puntos, lo que corresponde a una moderada a alta discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

35% [REDACTED] | 44/126 [18:50<35:13, 25.77s/it]

Entrevista 44

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi espalda me duele terriblemente desde hace tres meses tras levantar mal una caja en el trabajo. Es un dolor severo, constante de 8-9 de 10. No puedo estar de pie más de unos pocos minutos, inmediatamente tengo que buscar donde sentarme o recostarme. Caminar incluso distancias muy cortas, como ir al baño, es extremadamente doloroso. Necesito ayuda para bañarme, mi hija me ayuda porque no puedo inclinarme para lavarme los pies. Vestirme es una pesadilla, me toma mucho tiempo y esfuerzo, especialmente ponerme los pantalones y zapatos. No puedo levantar nada de peso, ni siquiera una botella de agua. Estar sentado también duele, solo aguanto 15-20 minutos antes de que sea insoportable. No he podido viajar desde que empezó esto, cancelé unas vacaciones familiares. Mi vida social se acabó, no veo a mis amigos desde hace meses. La intimidad es imposible, cualquier contacto físico me causa dolor. Casi no duermo, me despierto cada hora por el dolor, estoy tomando medicamentos fuertes pero no ayudan mucho." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante de nivel 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de unos pocos minutos.

3. Andar: 0 puntos - Caminar es extremadamente doloroso para el paciente.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar cuidados personales, como bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada de peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente solo puede aguantar 15-20 minutos sentado antes de que el dolor sea insoportable.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar desde que empezó el dolor.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente se ha acabado.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es imposible debido al dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente casi no duerme y se despierta regularmente por el dolor, pero aún logra dormir algún tiempo.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 14 puntos, lo que indica una alta discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

36% | 45/126 [19:04<30:04, 22.28s/it]

Entrevista 45

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares desde hace dos semanas después de un día intenso de limpieza en casa. El dolor es leve a moderado, alrededor de 4 de 10. Puedo estar de pie durante mi trabajo sin mayor problema, aunque hacia el final del día siento más molestia. Camino normalmente, hago mis recorridos habituales sin limitaciones importantes. En la ducha y al vestirme noto algo de rigidez matutina, pero puedo hacer todo por mí mismo sin ayuda. Cargar bolsas del supermercado me genera un poco más de molestia, pero aún puedo hacerlo. Sentado en mi escritorio estoy bien durante varias horas, solo ocasionalmente cambio de posición por comodidad. Los viajes en auto son tolerables, en un trayecto reciente de 2 horas solo sentí molestia al final. Mis actividades sociales continúan normales, aunque evito bailar como solía hacer. La vida íntima con mi pareja está bien, solo somos un poco más cuidadosos. Duermo bien la mayoría de las noches, ocasionalmente me despierto si duermo en mala posición."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (No limitación)

3. Andar: 0 puntos (No limitación)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No limitación)

5. Levantar peso: 1 punto (Ligeramente limitado)

6. Estar sentado: 0 puntos (No limitación)

7. Viajar: 1 punto (Ligeramente limitado)

8. Vida social: 1 punto (Ligeramente limitada)

9. Actividad sexual: 0 puntos (No limitación)

10. Dormir: 0 puntos (No problemas específicos)

Puntuación total: 4 puntos

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con una puntuación total de 4 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

37% | 46/126 [19:31<31:43, 23.79s/it]

Entrevista 46

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es severo y limitante, comenzó hace cuatro meses tras un accidente de tráfico. El dolor es intenso, entre 7-8 de 10 constantemente. Estar de pie es muy difícil, máximo 10 minutos antes de que el dolor sea inaguantable. Caminar más de 50 metros me resulta extremadamente doloroso, necesito usar un bastón para distancias cortas. Para bañarme instalamos barras de apoyo y un asiento, aun así necesito ayuda ocasional de mi esposa. Vestirme es muy complicado, especialmente calcetines y zapatos, me toma mucho tiempo y esfuerzo. No puedo levantar prácticamente nada, mi esposa hace todas las tareas que requieren cargar peso. Sentarme es problemático, después de 30 minutos el dolor aumenta significativamente. Los viajes son casi imposibles, solo salgo para citas médicas esenciales. He abandonado la mayoría de mis actividades sociales, solo veo a familia cercana ocasionalmente. La intimidad se ha visto muy afectada, es muy difícil encontrar posiciones cómodas. Duermo mal, me despierto varias veces por noche por el dolor, uso múltiples almohadas para encontrar posición." [INST]

1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como intenso y limitante, con una intensidad de 7-8 de 10 constantemente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie solo es posible durante máximo 10 minutos antes de que el dolor sea inaguantable.

3. Andar: 0 puntos - Caminar más de 50 metros es extremadamente doloroso para el paciente y necesita usar un bastón.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda ocasional para realizar tareas de cuidados personales, como bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra sentarse problemático y el dolor aumenta significativamente después de 30 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - Los viajes son casi imposibles.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha abandonado la mayoría de sus actividades sociales, solo ve a familia cercana ocasionalmente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad se ha visto muy afectada y encontrar posiciones cómodas es difícil.
10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal y se despierta varias veces por noche por el dolor.

El total de puntos obtenidos por el paciente es de 16 puntos, lo que indica una discapacidad severa según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

37% [REDACTED] | 47/126 [19:56<31:45, 24.11s/it]

Entrevista 47

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, apenas tengo una ligera molestia en la zona lumbar desde ayer por la noche. Creo que dormí en mala posición. Es muy leve, tal vez un 1 de 10, más que dolor es una sensación extraña. Puedo estar de pie perfectamente durante todas mis actividades normales. Camino sin ningún problema, esta mañana hice mi rutina de ejercicio completa. Me ducho y me visto completamente normal, no noto ninguna limitación. Cargué todas mis cosas pesadas como siempre, incluso ayudé a mi vecina con sus bolsas. En el trabajo paso horas sentado frente al computador sin molestias. Ayer manejé 3 horas para una reunión sin ningún problema. Mis actividades sociales son normales, anoche fui a bailar con mis amigos. No hay ningún problema en mi vida íntima. Duermo excelente, solo ayer me desperté una vez porque noté la molestia, pero me dormí inmediatamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve, equivalente a un 1 de 10, y afirma que no limita sus actividades.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie perfectamente durante todas sus actividades normales.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina sin problemas.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de ninguna dificultad para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente carga todos sus objetos pesados sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente pasa horas sentado sin molestias.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente manejó durante 3 horas sin problemas.
8. Vida social: 0 puntos - Las actividades sociales son normales.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa de ningún problema en su vida sexual.
10. Dormir: 1 punto - El paciente despertó una vez por la noche debido a la molestia, pero logró volver a dormir inmediatamente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje de 2 puntos en total (1 punto por Intensidad dolor y 1 punto por Dormir). Este puntaje indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

38% | 48/126 [20:24<32:46, 25.21s/it]

Entrevista 48

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo cinco meses con dolor lumbar crónico que comenzó gradualmente sin causa aparente. El dolor fluctúa entre 6-7 de 10 diariamente. Estar de pie más de 15 minutos me resulta muy incómodo, tengo que buscar apoyo o sentarme. Caminar distancias largas es problemático, evito las caminatas que antes disfrutaba. Para ducharme tengo que apoyarme frecuentemente en las paredes, y vestirme por las mañanas me toma el doble de tiempo por la rigidez. Cargar cosas pesadas se ha vuelto imposible, mi familia me ayuda con las compras y tareas domésticas. Estar sentado por períodos largos también es incómodo, en el trabajo tengo que levantarme cada 45 minutos. Los viajes largos son muy difíciles, tuve que cancelar unas vacaciones por esto. Mi vida social se ha reducido considerablemente, evito eventos donde tenga que estar mucho tiempo de pie o sentado. La intimidad con mi pareja se ha complicado, tenemos que planificar y ser muy cuidadosos. Duermo fragmentado, me despierto 3-4 veces por noche por dolor y cambios de posición." [INST] 1. Intensidad dolor: 6 puntos - El paciente informa que su dolor lumbar crónico fluctúa entre 6-7 de 10 diariamente.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente informa que está de pie más de 15 minutos es incómodo.

3. Andar: 2 puntos - Caminar distancias largas es problemático.
4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente informa que se necesita apoyo para ducharse y vestirse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que cargar cosas pesadas es imposible.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente informa que estar sentado por períodos largos también es incómodo.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes largos son muy difíciles.
8. Vida social: 1 punto - La vida social se ha reducido considerablemente.
9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad con el pareja se ha complicado.
10. Dormir: 3 puntos - El paciente informa que duerme fragmentado y se despierta 3-4 veces por noche por dolor y cambios de posición.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar sería de 21 puntos ($6+1+2+3+0+2+0+1+3=16$, luego multiplicando por 2 para obtener el total). Un puntaje total de 21-30 suele indicar una moderada a severa discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

39% [REDACTED] | 49/126 [20:50<32:39, 25.44s/it]

Entrevista 49

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor en la espalda baja desde hace tres días después de hacer ejercicio intenso. El dolor es moderado, como un 5 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque siento algo de molestia después de una hora. Camino sin grandes problemas, completé mi rutina matutina de 30 minutos de caminata. Para bañarme y vestirme soy un poco más lento y cuidadoso, pero puedo hacerlo solo. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera molestia, evito las cargas muy pesadas pero puedo manejar bolsas normales. Sentado en mi oficina estoy relativamente cómodo, aunque cambio de posición más frecuentemente. Ayer viajé una hora en auto sin problemas mayores, solo un poco de rigidez al llegar. Mis planes sociales continúan, aunque evité ir a un concierto donde tendría que estar de pie mucho tiempo. La vida íntima está bien, solo somos más cuidadosos con ciertos movimientos. Duermo bien en general, una o dos noches me desperté por cambiar de posición bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 3-5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos - Puede estar de pie durante períodos normales, pero con molestia después de una hora.

3. Andar: 0 puntos - Camina sin grandes problemas.
4. Cuidados personales: 1 punto - Es un poco más lento y cuidadoso en bañarse y vestirse.
5. Levantar peso: 3 puntos - Evita cargas muy pesadas, pero puede manejar bolsas normales.
6. Estar sentado: 1 punto - Está relativamente cómodo sentado, pero cambia de posición más frecuentemente.
7. Viajar: 0 puntos - Viajó una hora en auto sin problemas mayores.
8. Vida social: 1 punto - Evitó ir a un concierto donde tendría que estar de pie mucho tiempo.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida íntima está bien.
10. Dormir: 2 puntos - Duerme bien en general, pero despertó una o dos noches por cambiar de posición bruscamente.

Total: 12 puntos. Según la Escala Oswestry, un puntaje total de 0-10 indica un bajo grado de discapacidad lumbar, 11-20 indica un moderado grado de discapacidad lumbar, y 21 o más indica un alto grado de discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta un moderado grado de discapacidad lumbar (12 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

40% [REDACTED] | 50/126 [21:13<31:24, 24.79s/it]

Entrevista 50

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es absolutamente incapacitante, llevo así desde hace ocho meses tras una hernia discal. El dolor es constante e insoportable, 10 de 10, nunca baja de 8. No puedo estar de pie ni siquiera un minuto, inmediatamente tengo que acostarme. Caminar al baño, que está a 5 metros, es una agonía que me toma varios minutos con descansos. Necesito ayuda total para bañarme, mi esposa me lava porque no puedo moverme. Vestirme es imposible sin ayuda, me toma una hora con ayuda de mi familia. No puedo levantar absolutamente nada, ni un vaso de agua. Estar sentado es tortura, máximo 5 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en meses, los viajes son impensables. Mi vida social ha desaparecido completamente, no recibo visitas porque el dolor es muy severo. La intimidad es inexistente, cualquier contacto físico es doloroso. No duermo prácticamente nada, paso las noches despierto por el dolor severo, los medicamentos más fuertes no me alivian." [INST] 1. Intensidad dolor: 10 de 10, 0 puntos - The patient reports that their low back pain is completely disabling and constant,

rating it as a 10 out of 10, with no relief even at its lowest. They are unable to stand for any length of time and must lie down immediately.

2. Estar de pie: 0 puntos - The patient reports that they are unable to stand at all due to the severity of their pain.

3. Andar: 0 puntos - The patient reports that walking is an agony and impossible for them due to the pain.

4. Cuidados personales: 5 puntos - The patient requires assistance with basic personal care tasks such as bathing and dressing.

5. Levantar peso: 0 puntos - The patient reports that they are unable to lift any weight whatsoever.

6. Estar sentado: 1 punto - The patient reports that sitting is a form of torture for them, and they can only tolerate it for a maximum of 5 minutes.

7. Viajar: 0 puntos - The patient reports that traveling is impossible due to the pain.

8. Vida social: 0 puntos - The patient reports that their social life has completely disappeared due to the pain and they do not receive visits from anyone.

9. Actividad sexual: 0 puntos - The patient reports that intimacy is non-existent due to the pain.

10. Dormir: 0 puntos - The patient reports that they hardly sleep at all due to the severity of their pain.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

40% | 51/126 [21:39<31:35, 25.27s/it]

Entrevista 51

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi problema de espalda comenzó hace seis semanas después de cargar muebles en una mudanza. El dolor es significativo, alrededor de 6-7 de 10. Estar de pie durante mi trabajo de 8 horas se ha vuelto muy difícil, necesito sentarme cada 20-30 minutos. Caminar distancias cortas va bien, pero evito las caminatas largas por el dolor. En la ducha tengo que ser muy cuidadoso, me apoyo en las paredes y uso un

banquito para lavarme los pies. Vestirme es lento y doloroso, especialmente ponerme calcetines y zapatos me cuesta mucho. No puedo cargar las bolsas de compras como antes, mi hijo me acompaña para ayudarme. Estar sentado más de una hora se vuelve muy incómodo, tengo que cambiar de posición constantemente. Los viajes largos son problemáticos, el mes pasado tuve que acortar un viaje familiar. He cancelado varias salidas sociales, especialmente las que involucran caminar o estar de pie mucho tiempo. La intimidad se ha complicado, tenemos que ser muy creativos con posiciones que no me duelan. Duermo mal, me despierto frecuentemente por el dolor y me cuesta volver a dormir." [/INST] 1. Intensidad dolor: 6 puntos - El paciente describe el dolor como moderado a severo, con una intensidad de 6-7 de 10.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas, pero necesita pararse y descansar regularmente debido al dolor.

3. Andar: 4 puntos - El paciente puede andar, pero evita caminatas largas debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente tiene dificultades para realizar cuidados personales, como lavarse en la ducha, vestirse y usar zapatos.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente no puede cargar bolsas de compras como antes y necesita ayuda para levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente solo puede sentarse comodo durante una hora antes de necesitar cambiar de posición.

7. Viajar: 3 puntos - El paciente tiene dificultades con viajes largos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado varias salidas sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad se ha complicado y requiere posiciones creativas para no causar dolor.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente tiene problemas para dormir debido al dolor y necesita despertarse frecuentemente.

Total: 34 puntos.

Según la Escala Oswestry, el paciente tiene una discapacidad lumbar moderada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4

41% [REDACTED] | 52/126 [21:53<26:52, 21.79s/it]

Entrevista 52

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia leve en la zona lumbar desde hace cuatro días. Empezó después de estar mucho tiempo trabajando en el computador en mala posición. El dolor es muy leve, máximo 2-3 de 10. Puedo estar de pie sin problemas durante toda mi jornada laboral. Camino normalmente, incluso hice ejercicio cardiovascular ayer. Me baño y me visto sin limitaciones, solo noto un poco de rigidez matutina que se pasa rápido. Puedo cargar cosas normalmente, ayer cargué todas mis bolsas del supermercado sin problema. Paso muchas horas sentado trabajando y estoy cómodo, solo ajusto mi postura ocasionalmente. Los viajes no me afectan, el fin de semana manejé 2 horas para visitar a mis padres. Mis actividades sociales continúan normales, fui al gimnasio y a cenar con amigos. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo excelente, solo una noche noté un poco de molestia al acostarme pero me dormí bien.".

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problemas)

3. Andar: 0 puntos (normalmente)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin limitaciones)

5. Levantar peso: 0 puntos (normalmente)

6. Estar sentado: 0 puntos (cómodo)

7. Viajar: 0 puntos (sin efecto)

8. Vida social: 0 puntos (normales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin impacto)

10. Dormir: 1 punto (leve molestia)

Puntaje total: 2 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 2 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

42% [REDACTED] | 53/126 [22:22<29:11, 23.99s/it]

Entrevista 53

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es severo y constante, llevo así cuatro meses desde una caída en el trabajo. El dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente. No puedo estar de pie más de 5-10 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable. Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso, uso bastón para

cualquier distancia. Para bañarme necesito sentarme en una silla especial y mi esposa me ayuda con las partes que no alcanco. Vestirme es una lucha diaria, me toma 30-40 minutos y a menudo necesito ayuda con calcetines y zapatos. No puedo levantar nada pesado, incluso una jarra de agua me causa dolor intenso. Estar sentado también es problemático, después de 20-30 minutos necesito cambiar de posición urgentemente. No puedo viajar, cancelé todas mis citas que requieren trasladarse lejos. Mi vida social prácticamente no existe, solo veo a familiares cercanos en casa ocasionalmente. La intimidad es muy difícil, hemos tenido que adaptar completamente nuestra vida íntima. Duermo muy mal, me despierto cada 2-3 horas por dolor, necesito medicación fuerte para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor oscila entre 7-8 de 10, lo que corresponde a un gran nivel de intensidad.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-10 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede andar, pero solo 20-30 metros y con mucho dolor y el uso de un bastón.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse, lo que representa un gran desafío en la autosuficiencia.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, incluyendo una jarra de agua.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo durante 20-30 minutos antes de necesitar cambiar de posición.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a la incapacidad para andar y el dolor.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente casi no existe debido a la incapacidad para salir y interactuar con otras personas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es difícil o imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y necesita medicación fuerte para descansar algo, lo que representa un nivel moderado de problemas con el dormir.

La puntuación total de este paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 19 puntos, lo que corresponde a un nivel severo de discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 4 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

43% [REDACTED] | 54/126 [22:44<27:49, 23.19s/it]

Entrevista 54

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo una semana con dolor lumbar después de un mal movimiento jugando tenis. El dolor es moderado, entre 4-5 de 10. Puedo estar de pie durante períodos razonables, aunque después de 45 minutos empiezo a sentir molestia. Camino sin grandes limitaciones, hice mi caminata matutina habitual aunque un poco más corta. Para ducharme y vestirme necesito ir más despacio, especialmente al inclinarme hacia adelante. Cargar cosas pesadas me resulta incómodo, evito las bolsas muy cargadas pero puedo manejar peso moderado. Estar sentado en mi trabajo es tolerable por 1-2 horas antes de necesitar levantarme y estirarme. Viajé el fin de pasado 90 minutos en auto con algo de molestia pero tolerable. He mantenido la mayoría de mis compromisos sociales, aunque evité una excursión larga que tenía planeada. La vida íntima requiere más cuidado, evitamos algunas posiciones pero seguimos activos. Duermo aceptablemente, me despierto ocasionalmente si me muevo bruscamente pero logro volver a dormir.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, entre 4-5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos razonables, pero con molestia después de 45 minutos)

3. Andar: 1 punto (Camina sin grandes limitaciones)

4. Cuidados personales: 2 puntos (Necesita ir más despacio al ducharse y vestirse)

5. Levantar peso: 3 puntos (Evita cargas pesadas)

6. Estar sentado: 2 puntos (Tolerable por 1-2 horas)

7. Viajar: 2 puntos (Tuvo un viaje de 90 minutos con molestia tolerable)

8. Vida social: 1 punto (Ha mantenido la mayoría de sus compromisos sociales)

9. Actividad sexual: 2 puntos (Requiere más cuidado, evita algunas posiciones pero siguen activos)

10. Dormir: 2 puntos (Duerme aceptablemente, pero se despierta ocasionalmente si se mueve bruscamente)

Total: 14 puntos. Según el umbral de puntuación de la Escala Oswestry, el paciente tiene una discapacidad lumbar leve (11-20 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

44% [REDACTED] | 55/126 [23:16<30:53, 26.10s/it]

Entrevista 55

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda baja es extremadamente severo, empezó hace siete meses tras un accidente automovilístico. El dolor es constante e intenso, 9-10 de 10 sin alivio. Estar de pie es imposible, no puedo

mantenerme erguido más de 1-2 minutos. Caminar incluso 5 metros hasta el baño es una tortura que me toma varios minutos con múltiples descansos. Necesito asistencia completa para bañarme, tengo una silla de ducha y mi cuidadora me ayuda. Vestirme requiere ayuda total, no puedo inclinarme ni levantar las piernas. No puedo levantar absolutamente nada, hasta sostener un libro me causa dolor insoportable. Estar sentado es tortura pura, máximo 5-10 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en meses, cualquier viaje es imposible. Mi vida social ha desaparecido por completo, no puedo recibir visitas por el nivel de dolor. La intimidad es imposible, cualquier contacto físico aumenta el dolor. No duermo, paso las noches en vela por el dolor constante, ningún medicamento me proporciona alivio suficiente.".

[/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (10 es el máximo de dolor y el paciente describe un dolor constante e intenso de 9-10 de 10, por lo que se le asigna 0 puntos).

2. Estar de pie: 0 puntos (El paciente no puede mantenerse de pie más de 1-2 minutos, por lo que se le asigna 0 puntos).

3. Andar: 0 puntos (El paciente no puede caminar 5 metros sin descansos y está confinado a la casa, por lo que se le asigna 0 puntos).

4. Cuidados personales: 5 puntos (El paciente necesita asistencia completa para realizar cuidados personales como bañarse, vestirse y levantarse, por lo que se le asigna 5 puntos).

5. Levantar peso: 0 puntos (El paciente no puede levantar nada sin causarle dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

6. Estar sentado: 0 puntos (El paciente solo puede sentarse por 5-10 minutos antes de que sea intolerable, por lo que se le asigna 0 puntos).

7. Viajar: 0 puntos (El paciente ha estado confinado a casa durante meses y no ha podido viajar, por lo que se le asigna 0 puntos).

8. Vida social: 0 puntos (El paciente ha perdido por completo su vida social debido al dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

9. Actividad sexual: 0 puntos (El paciente informa que la intimidad es imposible debido al dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

10. Dormir: 0 puntos (El paciente no duerme y pasa las noches en vela debido al dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad L

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

44% [REDACTED] | 56/126 [23:49<32:49, 28.13s/it]

Entrevista 56

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar desde hace dos meses que comenzó después de levantar una caja pesada mal. El dolor es moderado a severo, entre 6-7 de 10 la mayoría del tiempo. Puedo estar de pie unos 15-20 minutos antes de que el dolor me obligue a sentarme o apoyarme. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminar más de 2-3 cuadras seguidas. Para ducharme uso barras de apoyo y tengo que ser muy cuidadoso, vestirme me toma mucho más tiempo especialmente los zapatos. Cargar bolsas de supermercado se ha vuelto imposible, mi esposa hace todas las compras pesadas. Estar sentado es tolerable por períodos de 45 minutos a 1 hora antes de volverse muy incómodo. Los viajes largos son muy difíciles, tuve que usar almohadas especiales en mi último viaje de 3 horas. He reducido significativamente mis salidas sociales, solo voy a eventos realmente importantes. La intimidad se ha complicado mucho, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y a menudo evitamos el contacto. Duermo mal, me despierto 4-5 veces por noche por el dolor, necesito medicación para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado a severo, lo que corresponde a un rango de 6-7 en la escala de dolor de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo unos 15-20 minutos antes de sentirse obligado a sentarse o apoyarse.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas, pero evita caminar más de 2-3 cuadras seguidas.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente tiene dificultades para ducharse y vestirse debido a la necesidad de usar barras de apoyo y tomar mucho más tiempo que antes.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha declarado que cargar bolsas de supermercado se ha vuelto imposible.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse por períodos de 45 minutos a 1 hora antes de sentirse incómodo.

7. Viajar: 2 puntos - Los viajes largos son muy difíciles para el paciente, lo que implica que viajes de más de 1 hora son casi imposibles.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido significativamente sus salidas sociales, solo va a eventos realmente importantes.

9. Actividad sexual: 3 puntos - El paciente ha informado que la intimidad se ha complicado mucho y requiere ser extremadamente cuidadoso, lo que sugiere alguna dificultad en esta área.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente tiene dificultades para dormir debido al dolor, lo que lo obliga a despertarse 4-5 veces por noche y necesitar medicación para poder descansar.

Según la escala Oswestry, el puntaje total de este paciente sería de 2

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

45% | 57/126 [24:24<34:29, 29.99s/it]

Entrevista 57

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, tengo una leve molestia en la espalda baja desde hace tres días. Empezó después de dormir en un sofá incómodo en casa de mis padres. Es más una sensación rara que dolor real, tal vez 1-2 de 10. Puedo estar de pie trabajando todo el día sin problema alguno. Camino completamente normal, esta mañana hice mi rutina de correr 5 kilómetros. Me baño y me visto sin ninguna complicación, solo noto un poquito de rigidez cuando me levanto por las mañanas. Puedo cargar todo lo que normalmente cargo, ayer ayudé a un amigo a cargar cajas pesadas en su mudanza. Paso 8 horas diarias sentado en mi oficina sin molestias. Viajo frecuentemente por trabajo, ayer hice un vuelo de 4 horas sin ningún problema. Mis actividades sociales son completamente normales, este fin de semana jugué fútbol con mis amigos. No hay ningún impacto en mi vida íntima con mi pareja. Duermo perfectamente, solo la primera noche noté un poco la molestia pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe la sensación de molestia en la espalda baja como leve y más una sensación rara que un dolor real, por lo que se puede considerar un nivel 1 de intensidad de dolor.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente informa que puede estar de pie trabajando todo el día sin problemas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de estar de pie.

3. Andar: 5 puntos - El paciente camina completamente normal, lo que indica un nivel 5 de capacidad de andar.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente informa que puede bañarse y ver himself sin problemas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente informa que puede cargar todo lo que normalmente cargo y ayudó a un amigo a cargar cajas pesadas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de levantar peso.

6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente pasa 8 horas diarias sentado en su oficina sin molestias, lo que indica un nivel 5 de capacidad de estar sentado.

7. Viajar: 5 puntos - El paciente viaja frecuentemente por trabajo y hizo un vuelo de 4 horas sin problemas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de viajar.

8. Vida social: 5 puntos - El paciente informa que sus actividades sociales son completamente normales, lo que indica un nivel 5 de capacidad de participar en actividades sociales.

9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente informa que no hay impacto en su vida íntima con su pareja, lo que indica un nivel 5 de capacidad de participar en actividades sexuales.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente notó un poco de molestia la primera noche, pero no se despertó, lo que indica un n

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

46% | 58/126 [24:48<32:00, 28.24s/it]

Entrevista 58

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy severo, llevo ocho meses así desde una lesión laboral. El dolor es intenso y constante, 8-9 de 10 todos los días. No puedo estar de pie más de 3-5 minutos, inmediatamente tengo que buscar donde apoyarme o sentarme. Caminar más de 10-15 metros es extremadamente doloroso, uso un andador para distancias cortas. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, tengo asiento especial y barras, pero aún así es muy difícil. Vestirme es una batalla diaria, necesito ayuda para calcetines, zapatos y pantalones, me toma más de 30 minutos. No puedo levantar prácticamente nada, ni siquiera mi medicación sin sentir dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, después de 15-20 minutos el dolor se intensifica mucho. No he podido viajar desde que comenzó, cancelé todas mis citas fuera de la ciudad. Mi vida social ha desaparecido casi completamente, solo recibo visitas cortas de familia. La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones que no causen dolor severo. Duermo terriblemente mal, me despierto cada 1-2 horas por dolor intenso, los medicamentos fuertes apenas me ayudan.". [/INST] 1.

Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe que su dolor es intenso y constante, con una intensidad de 8-9 de 10 todos los días.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 3-5 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita un andador para caminar cortas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse, vestirse y levantarse de la cama.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente experimenta intensificación de dolor después de 15-20 minutos de sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar desde que comenzó el dolor.

8. Vida social: 1 punto - El paciente solo recibió visitas cortas de familia.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es casi imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta cada 1-2 horas por dolor intenso.

La puntuación total es de 18 puntos, lo que indica una discapacidad severa según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

47% [REDACTED] | 59/126 [25:13<30:21, 27.19s/it]

Entrevista 59

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias en la zona lumbar desde hace diez días después de una sesión intensa de jardinería. El dolor es leve a moderado, alrededor de 3-4 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque después de una hora empiezo a sentir algo de molestia. Camino sin problemas mayores, completé mis caminatas diarias habituales de 45 minutos. Para ducharme y vestirme soy más cuidadoso con los movimientos bruscos, pero puedo hacer todo independientemente. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera algo de molestia, evito las cargas muy pesadas pero manejo las normales. Estar sentado en mi trabajo es cómodo por períodos de 2-3 horas antes de necesitar cambiar de posición. Los viajes son tolerables, el fin de semana viajé 2 horas con solo un poco de rigidez. Mantengo la mayoría de mis actividades sociales, aunque evité una excursión larga de senderismo. La vida íntima continúa normal, solo somos un poco más cuidadosos con ciertos movimientos. Duermo bien generalmente, ocasionalmente me despierto si cambio de posición bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve) - El paciente describe el dolor como leve a moderado, lo que corresponde a puntos 2 en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie durante períodos normales sin problemas mayores.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que camina sin problemas mayores.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente puede hacer todo independientemente, sin necesidad de ayuda.

5. Levantar peso: 1 punto (Muy leve) - El paciente evita cargas muy pesadas, pero puede manejar las cargas moderadas.
6. Estar sentado: 1 punto (Muy leve) - El paciente puede sentarse cómodamente durante períodos de 2-3 horas, pero necesita cambiar de posición.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes son tolerables.
8. Vida social: 1 punto (Muy leve) - El paciente mantiene la mayoría de sus actividades sociales, pero evitó una excursión larga.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida sexual continúa normal.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme bien generalmente.

Resumen: El paciente presenta una discapacidad lumbar leve, con un total de 5 puntos en la escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

48% [REDACTED] | 60/126 [25:45<31:44, 28.86s/it]

Entrevista 60

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es moderado pero persistente, comenzó hace tres meses después de un episodio de estrés y malas posturas en el trabajo. El dolor fluctúa entre 5-6 de 10 durante el día. Puedo estar de pie por períodos de 30-40 minutos antes de necesitar descansar. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas que solía hacer los fines de semana. En la ducha tengo que apoyarme ocasionalmente y vestirme me toma más tiempo, especialmente al inclinarme. Cargar cosas pesadas se ha vuelto problemático, mi familia me ayuda con las compras grandes y mudanza de muebles. Estar sentado es tolerable por 1-2 horas, pero después necesito levantarme y estirarme. Los viajes largos requieren paradas frecuentes, en mi último viaje de 4 horas tuve que parar tres veces. He reducido algunas actividades sociales, especialmente las que requieren mucho caminar o estar de pie. La intimidad requiere más planificación y cuidado, evitamos ciertas posiciones que me causan dolor. Duermo regular, me

despierto 2-3 veces por noche por molestias y me cuesta volver a dormir." [INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado a fuerte (5-6 de 10), por lo que se asigna un puntaje de 4.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante 30-40 minutos antes de necesitar descansar, por lo que se asigna un puntaje de 2.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, pero evita caminatas largas, por lo que se asigna un puntaje de 3.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para vestirse y tomarse una ducha, por lo que se asigna un puntaje de 3.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente ha encontrado difícil cargar cosas pesadas y necesita ayuda de su familia, por lo que se asigna un puntaje de 5.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede estar sentado por 1-2 horas, por lo que se asigna un puntaje de 2.

7. Viajar: 4 puntos - El paciente necesita paradas frecuentes durante viajes largos, por lo que se asigna un puntaje de 4.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, pero no especifica que las haya abandonado por completo, por lo que se asigna un puntaje de 2.

9. Actividad sexual: 4 puntos - El paciente requiere más planificación y cuidado en la intimidad, evitando ciertas posiciones, por lo que se asigna un puntaje de 4.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, pero se despierta 2-3 veces por noche por molestias, por lo que se asigna un puntaje de 3.

Para obt

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2

48% | 61/126 [26:20<33:00, 30.48s/it]

Entrevista 61

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi problema de espalda comenzó hace un mes después de una resbalada en casa. El dolor es significativo, entre 6-7 de 10 especialmente por las mañanas. Estar de pie más de 20 minutos se vuelve muy incómodo, necesito sentarme frecuentemente. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminar más de 3-4 cuadras seguidas por el dolor. Para ducharme instalé barras de apoyo y necesito sentarme para

lavarme los pies, vestirme es lento y doloroso. No puedo cargar las bolsas del supermercado como antes, mi hijo me acompaña para ayudarme con las compras. Estar sentado por más de una hora se vuelve muy incómodo, tengo que cambiar de posición constantemente. Los viajes largos son muy problemáticos, cancelé un viaje familiar de fin de semana por esto. He reducido considerablemente mis salidas sociales, solo voy a compromisos muy importantes. La intimidad se ha complicado mucho, tenemos que ser muy creativos y cuidadosos. Duermo mal, me despierto frecuentemente por el dolor y me cuesta encontrar posiciones cómodas.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 7 puntos - El paciente describe que su dolor es significativo y está entre 6-7 de 10, por lo que se le asignarían 7 puntos.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente informa que estar de pie más de 20 minutos es incómodo, por lo que se le asignarían 3 puntos.

3. Andar: 4 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero evita caminar largas distancias por el dolor, por lo que se le asignarían 4 puntos.

4. Cuidados personales: 8 puntos - El paciente necesita asistencia para ducharse y vestirse, lo que le resulta lento y doloroso, por lo que se le asignarían 8 puntos.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente informa que no puede cargar las bolsas del supermercado como antes, por lo que se le asignarían 5 puntos.

6. Estar sentado: 6 puntos - El paciente informa que sentarse por más de una hora se vuelve muy incómodo y necesita cambiar de posición constantemente, por lo que se le asignarían 6 puntos.

7. Viajar: 9 puntos - El paciente canceló un viaje familiar por el dolor y describe que viajes largos son muy problemáticos, por lo que se le asignarían 9 puntos.

8. Vida social: 6 puntos - El paciente ha reducido considerablemente sus salidas sociales, por lo que se le asignarían 6 puntos.

9. Actividad sexual: 10 puntos - El paciente describe que la intimidad se ha complicado mucho y requiere ser muy creativos y cuidadosos, lo que indica un impacto significativo en esta categoría, por lo que se le asignarían 10 puntos.

10. Dormir: 8 puntos - El paciente duerme mal y se despierta frecuentemente por el dolor, por lo que se le asignarían 8 puntos

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 8 | Diferencia: 6
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 7 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 10 | Diferencia: 8
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda baja desde hace cinco días. Comenzó después de estar mucho tiempo inclinado arreglando el auto. Es muy suave, máximo 2 de 10, más que dolor es una sensación de tensión. Puedo estar de pie durante toda mi jornada laboral de 9 horas sin problemas. Camino completamente normal, incluso corrí 30 minutos ayer sin molestias. Me baño y me visto sin ninguna limitación, solo noto un poquito de rigidez cuando me levanto de la cama. Puedo cargar todo normalmente, ayer cargué cajas pesadas ayudando a mi hermana. Paso muchas horas sentado en mi oficina sin ninguna molestia. Los viajes no me afectan para nada, el fin de semana manejé 3 horas sin problema. Todas mis actividades sociales continúan normales, fui a una fiesta y bailé toda la noche. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo excelente, solo la primera noche noté un poquito la molestia al acostarme."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia leve, que no supera el nivel 2 de 10, por lo que se puede considerar sin dolor real.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna limitación al estar de pie durante su jornada laboral.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina completamente normal y ha corrido sin problemas.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna limitación al bañarse o vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha cargado cajas pesadas sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente pasa muchas horas sentado sin molestias.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha viajado durante tres horas sin problemas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha continuado con todas sus actividades sociales normales.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna limitación en su vida íntima.

10. Dormir: 1 punto - El paciente solo notó un poquito de molestia al acostarse la primera noche.

La puntuación total de la entrevista es de 1 punto. Según la Escala Oswestry, una puntuación total menor a 10 indica una baja discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta una discapacidad lumbar leve.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

50% [REDACTED] | 63/126 [27:11<29:36, 28.20s/it]

Entrevista 63

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es severo y limitante, llevo seis meses así desde una cirugía que no salió bien. El dolor es intenso, 7-8 de 10 constantemente. No puedo estar de pie más de 10-15 minutos sin que el dolor sea inaguantable. Caminar más de 30-40 metros es extremadamente doloroso, uso bastón para cualquier distancia. Para bañarme tengo una silla especial y necesito ayuda ocasional de mi esposa para las partes difíciles de alcanzar. Vestirme es muy complicado, especialmente calcetines y zapatos, me toma mucho tiempo y esfuerzo. No puedo levantar nada moderadamente pesado, mi esposa hace todo el trabajo doméstico que requiere fuerza. Estar sentado también es problemático, después de 30-45 minutos necesito cambiar de posición por el dolor. Los viajes son muy difíciles, solo salgo para citas médicas esenciales. Mi vida social se ha reducido dramáticamente, solo veo a familia muy cercana en casa. La intimidad es muy complicada, hemos tenido que adaptar completamente nuestra vida íntima. Duermo fragmentado, me despierto cada 2-3 horas por dolor, uso medicación fuerte para poder descansar.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante, con una intensidad de 7-8 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10-15 minutos sin que el dolor sea intolerable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 30-40 metros es extremadamente doloroso.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse, especialmente para las partes difíciles.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada moderadamente pesado.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo por 30-45 minutos antes de necesitar cambiar de posición por el dolor.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente solo salía para citas médicas esenciales.

8. Vida social: 1 punto - La vida social se ha reducido dramáticamente, solo ve el paciente a familia cercana en casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es muy complicada y han tenido que adaptar completamente su vida íntima.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme fragmentado y necesita medicación fuerte para poder descansar.

La puntuación total de la entrevista es 16 puntos, lo que indica una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 8 | Diferencia: 6

- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

51% | 64/126 [27:37<28:13, 27.32s/it]

Entrevista 64

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo dos semanas con dolor lumbar que empezó después de una mala noche de sueño en un colchón viejo. El dolor es leve, entre 2-3 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie durante mis actividades normales, aunque después de varias horas siento algo de cansancio en la zona. Camino sin problemas, mantengo mi rutina de ejercicio matutino de 45 minutos. Para ducharme y vestirme soy un poco más cuidadoso, pero puedo hacer todo independientemente sin dificultad mayor. Cargar cosas normales no me problema, aunque evito levantar objetos muy pesados por precaución. Estar sentado en mi trabajo es cómodo, solo ocasionalmente cambio de posición por comodidad general. Los viajes cortos son completamente normales, viajé 90 minutos el fin de semana sin molestias. Mis actividades sociales continúan igual, aunque evité una actividad de paintball por precaución. La vida íntima está normal, solo somos un poquito más cuidadosos. Duermo bien la mayoría de las noches, ocasionalmente noto la molestia al cambiar de posición." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve, entre 2-3 de 10, lo que corresponde a un punto en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente puede estar de pie durante sus actividades normales sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina sin problemas.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente puede hacer todo independientemente para cuidarse, incluyendo ducharse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente puede levantar objetos normales sin problemas, pero evita levantar objetos pesados por precaución.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente encuentra cómodo sentarse en su trabajo.

7. Viajar: 0 puntos - Los viajes cortos son completamente normales para el paciente.

8. Vida social: 0 puntos - Las actividades sociales continúan igual para el paciente, aunque evitó una actividad por precaución.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida íntima está normal para el paciente, solo son un poquito más cuidadosos.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme bien la mayoría de las noches.

Según la escala Oswestry, el paciente tiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica que no presenta ninguna discapacidad lumbar significativa.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

52% [REDACTED] | 65/126 [27:54<24:36, 24.21s/it]

Entrevista 65

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda baja es extremadamente severo, comenzó hace un año tras un accidente de trabajo. El dolor es constante e insoportable, 9-10 de 10 sin ningún alivio. Estar de pie es completamente imposible, no puedo mantenerme erguido más de 30 segundos. Caminar hasta el baño, que está a 3 metros, me toma 10 minutos con múltiples descansos y es una agonía. Necesito ayuda completa para bañarme, mi cuidadora me asiste totalmente porque no puedo moverme. Vestirme requiere asistencia total, no puedo inclinarme, levantar brazos o piernas sin dolor severo. No puedo sostener ni levantar absolutamente nada, hasta una taza vacía me causa dolor insoportable. Estar sentado es tortura, máximo 2-3 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en 8 meses, cualquier viaje es absolutamente imposible. Mi vida social no existe, no puedo recibir visitas porque el dolor es demasiado severo. La intimidad es completamente imposible, cualquier contacto físico aumenta el dolor. No duermo nada, paso las noches en agonía, ningún medicamento me proporciona alivio." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (10 being the highest level of pain).

2. Estar de pie: 0 puntos - Cannot stand at all.

3. Andar: 0 puntos - Cannot walk.

4. Cuidados personales: 5 puntos - Complete dependence on caregiver for all personal care.

5. Levantar peso: 0 puntos - Cannot lift anything.

6. Estar sentado: 1 punto - Unable to sit for more than 2-3 minutes.

7. Viajar: 0 puntos - Cannot travel.

8. Vida social: 0 puntos - No social life.

9. Actividad sexual: 0 puntos - Complete impossibility.

10. Dormir: 0 puntos - No sleep at all.

Based on the patient's description, their total Oswestry Disability Index score would be 30 out of 40 (5 points for each of the 6 items they can't perform, and 0 points for the other 4 items they cannot do at all). This represents a severe level of disability.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

52% [REDACTED] | 66/126 [28:28<27:14, 27.24s/it]

Entrevista 66

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, tengo dolor lumbar desde hace seis semanas que comenzó gradualmente sin causa específica. El dolor es moderado, alrededor de 5-6 de 10 la mayor parte del día. Puedo estar de pie por períodos de 20-30 minutos antes de sentir molestia significativa. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas de más de 1 kilómetro. Para ducharme uso barras de apoyo por seguridad y vestirme me toma un poco más de tiempo por precaución. Cargar bolsas pesadas del supermercado me resulta incómodo, ahora uso un carrito o pido ayuda. Estar sentado es tolerable por 1-2 horas antes de necesitar levantarme y moverme. Los viajes largos requieren planificación, necesito parar cada hora para estirarme. He modificado algunas actividades sociales, evito eventos que requieren mucho estar de pie. La intimidad requiere más comunicación y cuidado, pero mantenemos una vida activa. Duermo aceptablemente, me despierto 1-2 veces por noche por molestias pero logro volver a dormir." [INST] 1.

Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe que el dolor lumbar es moderado, con un nivel de intensidad entre 5-6 de 10, lo que corresponde a la mitad del rango de la escala.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede estar de pie por períodos de 20-30 minutos antes de sentir molestias significativas, lo que indica un grado moderado de dificultad.

3. Andar: 3 puntos - Caminar distancias moderadas va bien para el paciente, pero evita caminatas largas de más de 1 kilómetro, lo que indica una dificultad moderada.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita barras de apoyo para ducharse y tomar más tiempo para vestirse, lo que indica una dificultad moderada en realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente encuentra cargar bolsas pesadas incómodo y necesita un carrito o ayuda, lo que indica una dificultad significativa.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse tolerablemente por 1-2 horas antes de necesitar levantarse y moverse, lo que indica una dificultad moderada.

7. Viajar: 3 puntos - Los viajes largos requieren planificación y paradas regulares, lo que indica una dificultad moderada.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha tenido que modificar algunas actividades sociales debido al dolor lumbar, lo que indica una dificultad moderada.
9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente necesita más comunicación y cuidado durante la intimidad, lo que indica una dificultad moderada.
10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme aceptablemente, pero se despierta 1-2 veces por noche por molestias, lo que indica una dificultad moderada.

Basándose en las respuestas del paciente,

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3

53% [REDACTED] | 67/126 [29:03<29:00, 29.50s/it]

Entrevista 67

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una ligera molestia en la zona lumbar desde ayer por la tarde. Creo que fue por estar mucho tiempo agachado limpiando debajo de la cama. Es muy leve, apenas un 1 de 10, más una sensación extraña que dolor. Puedo estar de pie perfectamente durante todas mis actividades laborales y domésticas. Camino completamente normal, esta mañana hice mi caminata diaria de una hora sin problema. Me baño y me visto sin ninguna complicación, solo noto una muy ligera rigidez al levantarme. Puedo cargar todo lo que normalmente cargo, ayer mismo cargué bolsas pesadas del supermercado. Paso todo el día sentado en mi oficina sin ninguna molestia. Los viajes no me afectan, tengo uno planeado de 5 horas para mañana y no me preocupa. Todas mis actividades sociales son completamente normales, no he cancelado ni modificado nada. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo perfectamente, solo ayer noté un poquito la molestia al acostarme pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una ligera molestia, que no supera el nivel 1 de 10 en escala numérica, por lo que se le asigna un puntaje de 1 en este ítem.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie durante todas sus actividades laborales y domésticas sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que camina normalmente y ha hecho su caminata diaria sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que puede bañarse y ver się sin complicaciones, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede cargar todo lo que normalmente carga, incluyendo bolsas pesadas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que pasa todo el día sentado en su oficina sin molestias, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes no le afectan, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que todas sus actividades sociales son completamente normales, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que no hay ningún impacto en su vida íntima, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme perfectamente, solo notó una ligera molestia al acost

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

54% [REDACTED] | 68/126 [29:28<27:23, 28.33s/it]

Entrevista 68

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy severo, llevo cinco meses así desde una lesión deportiva. El dolor es intenso, 8 de 10 constantemente. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable. Caminar más de 15-20 metros es extremadamente doloroso, necesito bastón para cualquier distancia. Para bañarme necesito silla especial y mi esposa me ayuda porque no puedo inclinarme. Vestirme es una lucha diaria, necesito ayuda para calcetines, zapatos y pantalones. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una botella de agua de 2 litros. Estar sentado también es muy problemático, después de 20 minutos el dolor se intensifica mucho. Los viajes son imposibles, he cancelado todas mis citas fuera de

la ciudad. Mi vida social prácticamente no existe, solo veo a mi familia inmediata ocasionalmente. La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones cómodas. Duermo terriblemente, me despierto cada hora por el dolor intenso, necesito medicación fuerte." [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante, con una intensidad de 8 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva intolerable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 15-20 metros es extremadamente doloroso, necesita bastón.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, ni siquiera una botella de agua de 2 litros.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente también encuentra sentarse problemático, después de 20 minutos el dolor se intensifica mucho.

7. Viajar: 0 puntos - Viajes son imposibles.

8. Vida social: 1 punto - La vida social del paciente prácticamente no existe, solo ve a su familia inmediata ocasionalmente.

9. Actividad sexual: 1 punto - La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones cómodas.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme terriblemente, necesita medicación fuerte y se despierta cada hora por el dolor intenso.

Total: 12 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry, con un total de 12 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

55% [REDACTED] | 69/126 [29:49<24:39, 25.95s/it]

Entrevista 69

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo unos días con una molestia leve en la zona lumbar, probablemente por haber dormido mal. El dolor no me impide trabajar ni caminar, no he tomado medicación y duermo bien. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 1 punto (leve) - El paciente describe una molestia leve y no reporta que el dolor impida ninguna de las actividades diarias.

2. Estar de pie: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos (normal) - El paciente no reporta problemas al andar.
4. Cuidados personales: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas al realizar cuidados personales.
5. Levantar peso: 0 puntos (normal) - El paciente no reporta problemas al levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas al estar sentado.
7. Viajar: 0 puntos (normal) - El paciente no reporta problemas al viajar.
8. Vida social: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas en su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos (normal) - El paciente reporta dormir bien.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un estado sin discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

56% [REDACTED] | 70/126 [30:10<22:47, 24.41s/it]

Entrevista 70

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor en la espalda baja desde hace una semana después de cargar unas cajas pesadas en el trabajo. El dolor es constante pero tolerable, como un 4 de 10. Puedo hacer mis actividades normales aunque con cierta incomodidad. Trabajo en oficina y puedo estar sentado sin problemas. Camino normalmente y duermo bien, solo me molesta un poco al levantarme por las mañanas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Dolor persistente pero de intensidad moderada, bajo el umbral de 3 de 10 en el escala de dolor).

2. Estar de pie: 0 puntos (El paciente informa que camina normalmente).
3. Andar: 0 puntos (El paciente informa que camina normalmente).
4. Cuidados personales: 0 puntos (El paciente no informa problemas con cuidados personales).
5. Levantar peso: 1 punto (El paciente informa que tiene problemas leves al levantarse por las mañanas).
6. Estar sentado: 0 puntos (El paciente informa que trabaja sentado sin problemas).
7. Viajar: 0 puntos (El paciente no informa problemas al viajar).
8. Vida social: 0 puntos (El paciente no informa problemas en su vida social).
9. Actividad sexual: 0 puntos (El paciente no informa problemas en su actividad sexual).
10. Dormir: 1 punto (El paciente informa que tiene problemas leves al dormir, solo molesta un poco).

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 3 puntos. Este puntaje indica una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

56% [REDACTED] | 71/126 [30:34<22:29, 24.54s/it]

Entrevista 71

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda ha empeorado en las últimas dos semanas. Es un dolor moderado, diría que un 5-6 de 10, que se intensifica cuando estoy de pie por más de 30 minutos. Puedo caminar distancias cortas sin problema, pero evito las caminatas largas. En el trabajo tengo que levantarme de la silla cada cierto tiempo porque me duele estar sentado mucho rato. He empezado a tomar ibuprofeno ocasionalmente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe su dolor como moderado a fuerte (5-6 de 10).

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante cortas distancias sin problemas.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar sin ayuda, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente sigue siendo capaz de realizar cuidados personales sin problemas.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente puede levantar peso, pero requiere esfuerzo y evita hacerlo con demasiada frecuencia debido al dolor.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo por cortos períodos de tiempo y necesita levantarse regularmente debido al dolor.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, pero evita viajes largos debido al dolor.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente puede participar en actividades sociales, pero solo en medida que no exacerben el dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no ha comentado si el dolor afecta su actividad sexual.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente puede dormir, pero requiere más tiempo que normal para caer en el sueño y suele despertarse durante la noche debido al dolor.

Total: 21 puntos

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (21-40 puntos) según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

57% [REDACTED] | 72/126 [31:05<23:42, 26.35s/it]

Entrevista 72

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar me está afectando bastante. Es intenso, alrededor de 7 de 10, y me duele constantemente. No puedo estar de pie más de 15 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar me cuesta, especialmente distancias largas. Sentarme también me duele después de un rato. He tenido que faltar al trabajo algunos días y evito salir con amigos. Duermo mal porque me despierto con dolor durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso, con una intensidad de 7/10, y presente constantemente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 15 minutos debido a que el dolor se vuelve insoportable.

3. Andar: 2 puntos - El paciente encuentra difícil caminar, especialmente distancias largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que faltar al trabajo y evitar salir con amigos debido al dolor, lo que puede implicar dificultades en realizar algunos cuidados personales.

5. Levantar peso: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades específicamente para levantar peso, por lo que se asigna un puntaje intermedio.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra que sentarse también le duele después de un rato.

7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades para viajar, por lo que se asigna un puntaje de 0.

8. Vida social: 1 punto - El paciente evita salir con amigos debido al dolor, lo que puede afectar su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades para realizar actividades sexuales debido al dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta con dolor durante la noche.

El puntaje total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 15 puntos. El puntaje total puede variar desde 0 a 50 puntos, con un puntaje más alto indicando mayor discapacidad. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

58% [REDACTED] | 73/126 [31:29<22:41, 25.69s/it]

Entrevista 73

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hace tres meses que sufro de dolor lumbar crónico después de una caída. El dolor es severo, constante, de 8 a 9 de 10. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin apoyarme en algo. Caminar es muy difícil, solo puedo hacerlo muy despacio y distancias muy cortas. Necesito ayuda para vestirme y bañarme. No puedo levantar nada pesado. Estar sentado también me duele mucho. He dejado de trabajar y mi vida social se ha visto muy afectada. No puedo tener relaciones íntimas y duermo muy mal, me despierto cada hora por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe que su dolor es severo y constante, con una intensidad de 8 a 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo por más de 5 minutos.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede caminar muy despacio y solo a cortas distancias.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente describe que sentarse también le duele mucho.

7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si el paciente puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente se ha visto muy afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones sexuales.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta cada hora por el dolor.

Total: 15 puntos.

El paciente presenta una alta discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un total de 15 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

59% [REDACTED] | 74/126 [31:47<20:10, 23.28s/it]

Entrevista 74

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me molesta un poco cuando hago ejercicio intenso o cuando paso mucho tiempo en la misma posición. Es un dolor leve, como un 2-3 de 10, que aparece y desaparece. Puedo hacer todas mis actividades normales sin problema, trabajo 8 horas al día sentado y no tengo inconvenientes. Solo evito levantar objetos muy pesados por precaución. Mi vida social y personal no se ha visto afectada para nada.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molesta un poco, leve, 2-3 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita en estar de pie).

3. Andar: 0 puntos (puede caminar normalmente).

4. Cuidados personales: 0 puntos (puede realizar cuidados personales normalmente).

5. Levantar peso: 1 punto (evita levantar objetos pesados por precaución).

6. Estar sentado: 0 puntos (puede sentarse normalmente durante 8 horas al día).

7. Viajar: 0 puntos (puede viajar normalmente).

8. Vida social: 0 puntos (vida social y personal no se han visto afectadas).

9. Actividad sexual: 0 puntos (puede mantener una relación sexual normal).

10. Dormir: 0 puntos (puede dormir normalmente).

Total: 1 punto.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve, con un total de 1 punto en la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

60% [REDACTED] | 75/126 [32:16<21:17, 25.04s/it]

Entrevista 75

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo episodios de dolor lumbar que van y vienen. Cuando tengo dolor, es moderado, unos 5-6 de 10. Puedo estar de pie pero prefiero no hacerlo por períodos largos. Camino sin problemas distancias normales, pero evito las caminatas muy largas. En el trabajo a veces necesito cambiar de posición frecuentemente. He cancelado algunas actividades sociales cuando el dolor es más fuerte. Tomo analgésicos cuando es necesario. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado, con una intensidad de 5-6 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie, pero prefiere no hacerlo por largos períodos.

3. Andar: 1 punto - El paciente camina sin problemas a distancias normales.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no especifica problemas para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente necesita cambiar de posición frecuentemente en el trabajo, lo que sugiere dificultad para levantar peso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente no especifica problemas para estar sentado.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita viajes largos debido al dolor.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha cancelado algunas actividades sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no especifica si el dolor afecta su actividad sexual, pero ha cancelado alguna actividad social debido al dolor, lo que sugiere que puede tener algún grado de impacto en la actividad sexual.

10. Dormir: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas para dormir debido al dolor. Sin embargo, toma analgésicos cuando es necesario, lo que sugiere que el dolor puede interferir en la calidad del sueño.

La puntuación total de la entrevista es de 13 puntos. Según la Escala Oswestry, una puntuación total de 0 a 10 indicaría un rango de discapacidad leve, 11 a 20 moderada, y 21 o más severa. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

60% [REDACTED] | 76/126 [32:35<19:28, 23.36s/it]

Entrevista 76

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor de espalda es constante y fuerte, alrededor de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 10 minutos seguidos. Caminar distancias cortas está bien, pero cualquier caminata larga me resulta imposible. Sentarme me duele después de 30 minutos. He tenido que reducir mi jornada laboral y uso una silla especial. Mi vida social se ha reducido considerablemente, evito muchas actividades. Las relaciones íntimas son difíciles por el dolor. Duermo con medicación porque si no me despierto varias veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (Dolor constante y fuerte, superior a 7 de 10)
2. Estar de pie: 1 punto - (No puede estar de pie más de 10 minutos)
3. Andar: 3 puntos - (Caminata corta está bien, pero largas caminatas imposible)
4. Cuidados personales: 3 puntos - (Redujo su jornada laboral y utiliza una silla especial)
5. Levantar peso: No se especificó en la entrevista
6. Estar sentado: 2 puntos - (Dolor después de 30 minutos)
7. Viajar: No se especificó en la entrevista
8. Vida social: 1 punto - (Evita muchas actividades, redujo considerablemente)
9. Actividad sexual: 1 punto - (Difíciles por el dolor)
10. Dormir: 3 puntos - (Duerme con medicación y despierta varias veces por la noche)

La puntuación total es de 19 puntos. Según el Oswestry Disability Index, una puntuación total superior a 40 indica una discapacidad moderada a grave. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada a grave.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

61% | 77/126 [32:57<18:35, 22.77s/it]

Entrevista 77

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una molestia ocasional en la zona lumbar, principalmente después de actividades físicas intensas o al final de un día largo de trabajo. El dolor es muy leve, máximo un 2 de 10, y desaparece con descanso. Puedo realizar todas mis actividades sin limitaciones. No he necesitado medicación y mi calidad de vida no se ha visto afectada en absoluto. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe un dolor leve y ocasional, que no requiere medicación y desaparece con descanso, por lo que se evalúa en 0 puntos.

- 2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no presenta limitaciones al estar de pie.
- 3. Andar: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones al andar.
- 4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta necesidad de ayuda para realizar cuidados personales.
- 5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no reporta dificultades para levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones al sentarse.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones para viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su calidad de vida no se ha visto afectada en absoluto.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones en su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica una buena funcionalidad lumbar y una baja discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

62% [REDACTED] | 78/126 [33:21<18:29, 23.12s/it]

Entrevista 78

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es severo y constante, de 8-9 de 10. No puedo estar de pie ni siquiera para cocinar o lavarme los dientes sin apoyo. Caminar es extremadamente difícil, solo puedo dar unos pocos pasos muy despacio. Necesito ayuda para vestirme y ducharme. No puedo levantar nada, ni siquiera objetos ligeros. Estar sentado es doloroso después de 15 minutos. He dejado de trabajar completamente. No salgo de casa excepto para citas médicas. La intimidad es imposible por el dolor. Duermo muy poco y mal, incluso con medicación fuerte. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y constante, de nivel 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo para realizar tareas básicas como cocinar o lavarse los dientes.

3. Andar: 0 puntos - El paciente describe que caminar es extremadamente difícil y solo puede dar unos pocos pasos muy despacio.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera objetos ligeros.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente describe que sentarse es doloroso después de 15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no salida de casa excepto para citas médicas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar y no sale de casa, por lo que su vida social se ha vuelto inactiva.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente describe que la intimidad es imposible debido al dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme muy poco y mal, incluso con medicación fuerte.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería 20 puntos. Esta puntuación indica una discapacidad grave.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

63% [REDACTED] | 79/126 [33:42<17:39, 22.54s/it]

Entrevista 79

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar intermitente que me molesta principalmente por las mañanas al levantarme y después de estar sentado mucho tiempo. Es un dolor moderado, como un 4-5 de 10. Puedo estar de pie sin problema para actividades normales, pero evito estar parado mucho tiempo sin movimiento. Camino bien distancias normales. En el trabajo tengo una silla ergonómica que me ayuda. Ocasionalmente cancelo algún plan social si el dolor es más fuerte ese día. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado, un 4-5 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie sin problemas para realizar actividades normales.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina bien distancias normales.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente ocasionalmente cancela planes sociales debido al dolor.

5. Levantar peso: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades específicas para levantar peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente utiliza una silla ergónoma en el trabajo lo que le ayuda a sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente puede viajar normalmente.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ocasionalmente cancela planes sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: No se especifica.

10. Dormir: No se especifica.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 13 puntos. El puntaje total puede variar desde 0 (sin discapacidad) hasta 50 (máxima discapacidad). En este caso, el paciente presenta una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

63% [REDACTED] | 80/126 [34:03<16:52, 22.02s/it]

Entrevista 80

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor en mi espalda baja es muy intenso, constante, de 9 de 10. No puedo mantenerme de pie más de 2-3 minutos. Caminar incluso dentro de casa es muy doloroso y lento. Necesito ayuda para casi todo: vestirme, bañarme, cocinar. No puedo levantar absolutamente nada. Sentarme es muy doloroso, no aguanto más de 10 minutos. He tenido que dejar de trabajar y dependo de otros para las tareas básicas. No puedo salir de casa. La vida íntima es imposible. Duermo muy pocas horas seguidas, el dolor me despierta constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como muy intenso, de nivel 9 sobre 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede mantenerse de pie más de 2-3 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente encuentra caminar dentro de casa doloroso y lento.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente requiere asistencia para vestirse, bañarse y cocinar.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse pero solo aguanta 10 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede salir de casa.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede llevar una vida social normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La actividad sexual es imposible.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme pocas horas seguidas y el dolor lo despertaba constantemente.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta un nivel de discapacidad lumbar extremo (50-100 puntos), lo que indica una grave discapacidad y una gran necesidad de intervención médica.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 1 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

64% [REDACTED] | 81/126 [34:16<14:30, 19.34s/it]

Entrevista 81

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia leve en la zona lumbar que aparece esporádicamente, principalmente cuando hago movimientos bruscos o cargo algo pesado. El dolor es muy tolerable, máximo un 3 de 10. No me limita en mis actividades diarias, puedo trabajar normalmente, hacer ejercicio y todas mis actividades sociales. Solo tomo precauciones adicionales al levantar objetos pesados. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limitado)

3. Andar: 0 puntos (no limitado)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no limitado)

5. Levantar peso: 1 punto (levemente limitado)

6. Estar sentado: 0 puntos (no limitado)

7. Viajar: 0 puntos (no limitado)

8. Vida social: 0 puntos (no limitado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no limitado)

10. Dormir: 0 puntos (no limitado)

Puntaje total: 2 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, con un puntaje total de 2 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

65% | 82/126 [34:44<16:02, 21.88s/it]

Entrevista 82

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es moderado a severo, oscila entre 6-7 de 10 durante el día. Puedo estar de pie para tareas cortas como cocinar, pero necesito sentarme frecuentemente. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminatas largas. Puedo cuidarme solo pero con dificultad y lentitud. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado me duele después de 45 minutos. He reducido mis horas de trabajo y evito muchas actividades sociales. La intimidad se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como moderado a severo, lo que corresponde a un rango de 6-7 en la escala de dolor de 0 a 10.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas cortas, pero necesita sentarse frecuentemente, lo que indica alguna dificultad en esta categoría.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero evita caminatas largas, lo que indica alguna dificultad en esta categoría.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero con dificultad y lentitud.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente duele después de sentarse durante 45 minutos.

7. Viajar: 2 puntos - No se menciona ninguna dificultad específica para viajar.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido sus actividades sociales.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad se ha visto afectada.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 2-3 veces por la noche.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 27 puntos (3 puntos por cada ítem en el que el paciente ha reportado alguna dificultad, más 5 puntos por la intensidad del dolor). Esto correspondería a una moderada a alta discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

66% [REDACTED] | 83/126 [34:56<13:40, 19.08s/it]

Entrevista 83

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento dolor lumbar ocasional que aparece principalmente después de jornadas largas de trabajo o cuando hago ejercicio intenso. Es un dolor leve a moderado, como un 3-4 de 10. No me impide realizar mis actividades cotidianas, aunque a veces prefiero no estar de pie por períodos muy largos. Puedo caminar, trabajar y mantener mi vida social normal. Solo evito cargar objetos muy pesados por precaución. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (leve a moderado)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita)
3. Andar: 0 puntos (no limita)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no limita)
5. Levantar peso: 1 punto (evita cargas pesadas)
6. Estar sentado: 0 puntos (no limita)
7. Viajar: 0 puntos (no limita)
8. Vida social: 0 puntos (no limita)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no limita)
10. Dormir: 0 puntos (no limita)

Respuesta final: La entrevista del paciente corresponde a un puntaje total de 3 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

67% [REDACTED] | 84/126 [35:14<13:01, 18.62s/it]

Entrevista 84

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar crónico intenso de 8 de 10. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin apoyo. Caminar es muy limitado, solo distancias muy cortas y muy despacio. Necesito ayuda ocasional para vestirme y siempre para ducharme. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es doloroso después de 20 minutos. He dejado de trabajar. Salgo muy poco de casa y solo para lo esencial. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal con medicación fuerte, me despierto cada 2 horas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (intensidad de dolor máxima)

2. Estar de pie: 0 puntos - (no puede estar de pie más de 5 minutos)
3. Andar: 1 punto - (caminar muy limitado y despacio)
4. Cuidados personales: 2 puntos - (necesita ayuda ocasional para vestirse)
5. Levantar peso: 0 puntos - (no puede levantar prácticamente nada)
6. Estar sentado: 1 punto - (doloroso después de 20 minutos)
7. Viajar: 0 puntos - (sale muy poco de casa y solo para lo esencial)
8. Vida social: 0 puntos - (no lleva una vida social activa)
9. Actividad sexual: 0 puntos - (no puede tener relaciones íntimas)
10. Dormir: 1 punto - (duerme mal con medicación fuerte, despierta cada 2 horas)

Total: 15 puntos.

El total de 15 puntos indica una discapacidad lumbar muy grave según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

67% [REDACTED] | 85/126 [35:31<12:32, 18.36s/it]

Entrevista 85

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me duele de forma intermitente, principalmente por las mañanas y después de estar mucho tiempo en la misma posición. El dolor es moderado, unos 4-5 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales pero prefiero no hacerlo por más de una hora seguida. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla especial y me levanto cada hora. Algunas veces he cancelado planes si el dolor es más fuerte. Duermo generalmente bien, aunque a veces me despierto si cambio de posición bruscamente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 4-5/10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede hacerlo para actividades normales, pero solo por una hora seguida)

3. Andar: 0 puntos (Camina sin problemas distancias normales)

4. Cuidados personales: 1 punto (No reporta dificultades)

5. Levantar peso: 3 puntos (Levanta con dificultad y necesita asistencia o toma descansos)

6. Estar sentado: 1 punto (No reporta dificultades)

7. Viajar: 0 puntos (No menciona problemas)

8. Vida social: 2 puntos (Algunas veces cancela planes debido al dolor)

9. Actividad sexual: 1 punto (No reporta dificultades)

10. Dormir: 2 puntos (Duerme bien en general, pero despertado si cambia de posición bruscamente)

Total: 12 puntos

Según el puntaje obtenido, el paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

68% [REDACTED] | 86/126 [35:51<12:30, 18.77s/it]

Entrevista 86

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar que siento es muy leve, aparece ocasionalmente después de actividades físicas o al final del día. Es como un 1-2 de 10, más bien una molestia que un dolor real. No me limita en absoluto para realizar cualquier actividad. Trabajo, hago deporte, salgo con amigos, todo normal. No he necesitado tomar medicación ni hacer cambios en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como leve, como un 1-2 de 10 y no limita su actividad.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informa de problemas para estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no informa de problemas en su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informa de problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica una baja discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

69% [REDACTED] | 87/126 [36:10<12:11, 18.75s/it]

Entrevista 87

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo y constante de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 10 minutos, necesito apoyarme o sentarme. Caminar más de una cuadra es muy difícil y doloroso. Necesito ayuda ocasional para tareas de cuidado personal como ponerme calcetines o zapatos. No puedo levantar objetos pesados, ni siquiera una bolsa de compras llena. Estar sentado me duele después de 30 minutos. He tenido que cambiar a trabajo de medio tiempo. Evito muchas actividades sociales. La intimidad es complicada por el dolor. Duermo con analgésicos pero aún me despierto 2-3 veces. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (Severe and constant pain, scoring 7-8 out of 10)

2. Estar de pie: 1 punto - (Unable to stand for more than 10 minutes)

3. Andar: 2 puntos - (Walking more than one city block is difficult and painful)

4. Cuidados personales: 2 puntos - (Occasional need for help with personal care tasks)

5. Levantar peso: 0 puntos - (Unable to lift objects)

6. Estar sentado: 3 puntos - (Sitting causes pain after 30 minutes)

7. Viajar: 1 punto - (Avoiding travel due to difficulty)

8. Vida social: 1 punto - (Evading social activities)

9. Actividad sexual: 1 punto - (Intimacy is complicated due to pain)

10. Dormir: 3 puntos - (Requires analgesics for sleep, wakes up 2-3 times)

Total score: 16/40 (40 points represents no disability, 100 points represents the most severe disability)

Based on the patient's self-reported symptoms, their total score of 16 indicates a moderate level of disability according to the Oswestry Disability Index.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5

- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

70% [REDACTED] | 88/126 [36:23<10:53, 17.21s/it]

Entrevista 88

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares leves que aparecen principalmente cuando paso mucho tiempo sentado en el trabajo o después de hacer jardinería. El dolor es muy tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide hacer ninguna actividad, puedo estar de pie, caminar, hacer ejercicio y todas mis actividades sociales normalmente. Solo tomo ibuprofeno ocasionalmente cuando la molestia es más persistente.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molestias leves, tolerables, 2-3 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limitada)

3. Andar: 0 puntos (no limitada)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no limitada)

5. Levantar peso: 0 puntos (no limitada)

6. Estar sentado: 0 puntos (no limitada)

7. Viajar: 0 puntos (no limitada)

8. Vida social: 0 puntos (no limitada)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no limitada)

10. Dormir: 0 puntos (no limitada)

Total: 0-10 puntos. En este caso, la puntuación total es 0 puntos, lo que indica una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

71% [REDACTED] | 89/126 [36:43<11:05, 18.00s/it]

Entrevista 89

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero persistente, alrededor de 5-6 de 10. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas domésticas, pero no por más de 30-45 minutos seguidos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas o el senderismo que antes hacía. Puedo cuidarme solo pero algunas tareas como limpiar el suelo son difíciles. No puedo levantar objetos pesados como antes. En el trabajo necesito levantarme de la silla cada hora. He reducido algunas actividades sociales, especialmente las que requieren estar mucho tiempo de pie. Duermo regular, a veces me despierto si me muevo mal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - Moderado (4-5/10)

2. Estar de pie: 2 puntos - Pocas horas al día (30-45 minutos)

3. Andar: 3 puntos - Lentamente y con dificultad (normal, pero evita caminatas largas o senderismo)

4. Cuidados personales: 3 puntos - Dificultades con alguna tarea (limpiar suelo)
5. Levantar peso: 4 puntos - Poco o nada (no puede levantar objetos pesados como antes)
6. Estar sentado: 1 punto - Comfortable (siente la necesidad de levantarse de la silla cada hora en el trabajo)
7. Viajar: 2 puntos - Pocas distancias (reducido algunas actividades sociales que requieren estar mucho tiempo de pie)
8. Vida social: 2 puntos - Reducida
9. Actividad sexual: No se especificó
10. Dormir: 2 puntos - Regular, pero despertándose si se mueve mal.

Total: 18 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 18 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

71% | 90/126 [37:24<14:58, 24.96s/it]

Entrevista 90

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar es severo y constante, de 8-9 de 10. Solo puedo estar de pie unos pocos minutos para lo más esencial. Caminar dentro de casa es doloroso y lento, salir a la calle es muy difícil. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior del cuerpo y para ducharme. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una olla con agua. Estar sentado me duele mucho después de 15-20 minutos. No puedo trabajar. Prácticamente no salgo de casa excepto para médicos. No hay vida íntima posible. Duermo muy mal incluso con medicación fuerte, me despierto cada hora o dos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (10-15 es leve, 16-20 es moderada, 21-30 es severa, >30 es muy severa). A partir de la descripción del paciente, el dolor lumbar es muy severo y constantes, por lo que se le asigna 0 puntos en este ítem.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que solo puede estar de pie unos pocos minutos para lo más esencial, por lo que no se le asigna puntos en este ítem.

3. Andar: 5 puntos - El paciente tiene dificultad para caminar dentro de casa, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse la parte inferior del cuerpo y para ducharse, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, por lo que no se le asigna puntos en este ítem.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente duele mucho después de 15-20 minutos sentado, por lo que no se le asigna puntos en este ítem.
7. Viajar: 5 puntos - El paciente prácticamente no salgo de casa excepto para médicos, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
8. Vida social: 5 puntos - El paciente no tiene vida social, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente informa que no hay vida íntima posible, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
10. Dormir: 5 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación fuerte, despertando cada hora o dos, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.

Después de calcular los puntos negativos obtenidos en cada ítem, se les restan a 24, el total máximo de puntos posibles. El puntaje total obtenido por el paciente es de:

$$\text{Total} = 24 - (3 \times 0 + 3 \times 5) = 24 - 15 = 9 \text{ puntos}$$

Según el puntaje obtenido, el paciente presenta una discapac

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1

72% [REDACTED] | 91/126 [37:38<12:34, 21.56s/it]

Entrevista 91

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar que va y viene, principalmente relacionado con el estrés y las malas posturas en el trabajo. Cuando duele, es moderado, unos 4-5 de 10. Puedo estar de pie sin problema para actividades cotidianas, aunque prefiero no hacerlo por períodos muy largos cuando tengo dolor. Camino normalmente. En el trabajo uso una silla ergonómica y hago pausas regulares. Ocasionalmente he tenido que cancelar algún plan social. Tomo analgésicos cuando es necesario y hago ejercicios de estiramiento.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (moderado, 4-5 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay problemas significativos)

3. Andar: 0 puntos (andar normalmente)

4. Cuidados personales: 1 punto (ocasionalmente hay problemas)

5. Levantar peso: 0 puntos (puede levantar peso normalmente)

6. Estar sentado: 0 puntos (sentarse normalmente)

7. Viajar: 1 punto (ocasionalmente cancela viajes)

8. Vida social: 1 punto (ocasionalmente cancela planes sociales)

9. Actividad sexual: No se mencionó

10. Dormir: No se mencionó

Total: 5 puntos

La puntuación total de 5 indica una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

73% [REDACTED] | 92/126 [37:50<10:37, 18.75s/it]

Entrevista 92

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una rigidez y dolor leve en la zona lumbar, especialmente por las mañanas al levantarme. El dolor es muy tolerable, máximo un 2 de 10, y mejora con el movimiento durante el día. No me limita para nada en mis actividades diarias. Puedo trabajar, hacer ejercicio, salir con amigos, todo con normalidad. Solo noto la molestia cuando he estado mucho tiempo en reposo. [/INST] 1. Intensidad dolor:

1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin limitación)

3. Andar: 0 puntos (sin limitación)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin limitación)

5. Levantar peso: 0 puntos (sin limitación)

- 6. Estar sentado: 0 puntos (sin limitación)
- 7. Viajar: 0 puntos (sin limitación)
- 8. Vida social: 0 puntos (sin limitación)
- 9. Actividad sexual: 0 puntos (sin limitación)
- 10. Dormir: 1 punto (leve molestia)

Total: 2 puntos

La puntuación total de 2 puntos indica una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

74% [REDACTED] | 93/126 [38:15<11:14, 20.44s/it]

Entrevista 93

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es intenso y constante, de 7 de 10. No puedo estar de pie más de 15 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es limitado, solo distancias cortas y necesito descansar frecuentemente. Puedo cuidarme solo pero me toma más tiempo y esfuerzo. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado también me duele después de un rato, uso cojines especiales. He tenido que reducir mi jornada laboral. Evito muchas actividades sociales que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar. La vida íntima se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto varias veces por la noche por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso y constante, con un nivel de 7 sobre 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 15 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede caminar, pero solo cortas distancias y necesita descansar frecuentemente.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero le toma más tiempo y esfuerzo.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente duele sentarse después de un rato y utiliza cojines especiales.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente evita viajes que requieran estar mucho tiempo de pie o caminar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha tenido que reducir actividades sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida sexual ha sido afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta varias veces por la noche por el dolor.

Basado en la información proporcionada, la puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es de 11 puntos. Esta puntuación indica un alto nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

75% [REDACTED] | 94/126 [38:43<12:08, 22.76s/it]

Entrevista 94

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo episodios de dolor lumbar que duran varios días. Cuando no tengo dolor, estoy perfectamente bien. Cuando lo tengo, es moderado a fuerte, unos 6 de 10. Durante los episodios, estar de pie por más de 20-30 minutos es incómodo. Puedo caminar pero prefiero distancias cortas. Evito levantar cosas pesadas durante esos días. En el trabajo tengo que hacer más pausas cuando tengo dolor. Ocasionalmente cancelo planes sociales si coincide con un episodio fuerte. Tomo medicación solo durante los episodios. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado a fuerte, lo que corresponde a un rango de 4-6 en la escala de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante cortos períodos de tiempo, pero lo encuentra incómodo durante episodios de dolor.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar, pero prefiere distancias cortas y evita caminar durante los episodios de dolor.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas con realizar cuidados personales durante los episodios de dolor.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente evita levantar cosas pesadas durante episodios de dolor.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse sin problemas, pero prefiere hacerlo menos durante episodios de dolor.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ocasionalmente cancela planes de viaje debido a los episodios de dolor.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente evita planes sociales durante episodios de dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no informa si hay problemas específicos con la actividad sexual durante los episodios de dolor.

10. Dormir: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con el dormir durante los episodios de dolor, pero se menciona que puede tomar medicación solo durante esos períodos.

Total: 17 puntos.

El paciente obtuvo un total de 17 puntos en la escala Oswestry, lo que corresponde a una moderada a severa discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

75% [REDACTED] | 95/126 [38:58<10:37, 20.55s/it]

Entrevista 95

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy leve, aparece solo ocasionalmente después de esfuerzos físicos intensos o malas posturas prolongadas. Es más bien una molestia, como un 1-2 de 10. No interfiere para nada con mis actividades diarias. Trabajo 8 horas sin problema, hago deporte regularmente, salgo y socializo normalmente. No he tenido que hacer ningún cambio en mi estilo de vida. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (Leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (Ninguna dificultad)

3. Andar: 0 puntos (Ninguna dificultad)

4. Cuidados personales: 0 puntos (Ninguna dificultad)

5. Levantar peso: 0 puntos (Ninguna dificultad)

6. Estar sentado: 0 puntos (Ninguna dificultad)

7. Viajar: 0 puntos (Ninguna dificultad)

8. Vida social: 0 puntos (Ninguna dificultad)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Ninguna dificultad)

10. Dormir: 0 puntos (Ninguna dificultad)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente no presenta ninguna dificultad significativa en ninguno de los ítems evaluados, por lo que su puntuación total es 0 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

76% [REDACTED] | 96/126 [39:22<10:49, 21.64s/it]

Entrevista 96

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo de 8 de 10 que no me da tregua. No puedo estar de pie ni para preparar una comida simple, necesito sentarme cada pocos minutos. Caminar hasta el baño es doloroso y lento. Necesito ayuda para ponerme los zapatos y calcetines, y para ducharme uso una silla. No puedo levantar absolutamente nada pesado. Estar sentado es doloroso después de 15-20 minutos incluso con almohadas. No puedo trabajar, he solicitado incapacidad. No salgo de casa salvo para citas médicas indispensables. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy poco y mal, incluso con medicación fuerte. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo de intensidad máxima (10/10).

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido a su intolerancia al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar debido a su dolor.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar algunas tareas de cuidados personales, como ponerse zapatos y calcetines, y para ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por cortos períodos de tiempo (menos de 15-20 minutos) antes de que el dolor lo obligue a sentarse de nuevo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no viaja debido a su incapacidad.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no salida de casa salvo para citas médicas indispensables.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede participar en actividades sexuales.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y poco, incluso con medicación fuerte.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta una discapacidad lumbar severa, con un puntaje total de 12 puntos (el puntaje máximo es 50 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

77% [REDACTED] | 97/126 [39:35<09:06, 18.83s/it]

Entrevista 97

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar intermitente que aparece principalmente después de jornadas largas de trabajo físico. Es un dolor moderado, como un 4 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales, pero evito estar parado sin movimiento por períodos largos. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo soy más cuidadoso con los movimientos y levantamiento de peso. No he tenido que cambiar mis actividades sociales significativamente. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado)

2. Estar de pie: 0 puntos (No limitado)

3. Andar: 0 puntos (No limitado)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No limitado)

5. Levantar peso: 1 punto (Ligeramente limitado)

6. Estar sentado: 0 puntos (No limitado)

7. Viajar: 0 puntos (No limitado)

8. Vida social: 0 puntos (No limitado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (No limitado)

10. Dormir: 0 puntos (No limitado)

Puntuación total: 3 puntos.

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

78% [REDACTED] | 98/126 [40:07<10:44, 23.01s/it]

Entrevista 98

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es constante y moderado a severo, entre 6-7 de 10. Puedo estar de pie para tareas cortas como cocinar, pero necesito apoyarme frecuentemente. Caminar distancias largas es difícil, prefiero distancias cortas. Puedo cuidarme solo pero me cuesta trabajo y me toma más tiempo. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado me duele después de 30-40 minutos. He reducido mis horas de trabajo y uso una silla especial. Evito algunas actividades sociales, especialmente las que requieren mucho movimiento. La intimidad se ha visto afectada ocasionalmente. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como moderado a severo, lo cual corresponde a un puntaje de 5 en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas cortas, pero necesita apoyarse frecuentemente, lo cual corresponde a un puntaje de 2.

3. Andar: 3 puntos - El paciente encuentra caminar distancias cortas difícil, pero puede hacerlo, lo cual corresponde a un puntaje de 3.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero le toma más tiempo y es un esfuerzo, lo cual corresponde a un puntaje de 4.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados, lo cual corresponde a un puntaje de 0.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente duele después de sentarse durante 30-40 minutos, lo cual corresponde a un puntaje de 4.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita viajes largos debido a su dolor, lo cual corresponde a un puntaje de 2.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido su participación en actividades sociales debido al dolor, lo cual corresponde a un puntaje de 2.

9. Actividad sexual: 3 puntos - El paciente ha visto afectada ocasionalmente su intimidad debido al dolor, lo cual corresponde a un puntaje de 3.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 2-3 veces por la noche, lo cual corresponde a un puntaje de 3.

Basado en la información proporcionada, el puntaje total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 26 puntos. Este puntaje indica una moderada a severa discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

Entrevista 99

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda baja que aparece solo después de estar mucho tiempo en la misma posición o después de ejercicio muy intenso. Es una molestia mínima, como un 1-2 de 10. No me limita en absoluto para ninguna actividad. Trabajo normalmente, hago deporte, salgo con amigos, mantengo mi vida íntima normal. Es más bien una sensación de rigidez que un dolor real. [/INST]
1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia leve, similar a un 1-2 de 10, que no limita su actividad diaria. No se trata de un dolor intenso.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informó ninguna dificultad para estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no informó ninguna dificultad para andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informó necesidad de ayuda en cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informó dificultad para levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informó dificultad para sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informó dificultad para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no informó que su dolor afectara su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informó que su dolor afectara su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informó dificultades para dormir debido a su dolor.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 0 puntos. Esto indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 100

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar que experimento es severo, de 8 de 10, y es constante durante el día. No puedo estar de pie más de 5-8 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar es muy limitado, solo dentro de casa y muy despacio. Necesito ayuda para algunas tareas de cuidado personal como ponerme medias o lavar mi espalda. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es muy doloroso después de 20 minutos. He dejado de trabajar temporalmente. Salgo muy poco de casa, solo para lo indispensable. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal con medicación, me despierto cada 2 horas por el dolor. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como severo y de intensidad 8/10, lo que corresponde a una puntuación de 5 según la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-8 minutos, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede andar, pero solo dentro de casa y muy despacio, lo que corresponde a una puntuación de 1.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar algunas tareas de cuidados personales, lo que corresponde a una puntuación de 3.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por 20 minutos antes de que el dolor se vuelva intolerable, lo que corresponde a una puntuación de 1.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente salgo muy poco de casa, solo para lo indispensable, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede tener una vida social normal debido a su estado, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones íntimas, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal con medicación y se despierta cada 2 horas, lo que corresponde a una puntuación de 1.

En base a las respuestas del paciente, su puntuación total en la escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 11 puntos, lo que indica una gran incapacidad en el funcionamiento diario.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

Entrevista 101

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es leve a moderado, como un 3-4 de 10, y aparece principalmente después de actividades que requieren estar mucho tiempo de pie o sentado. Puedo estar de pie para actividades normales pero prefiero no hacerlo por más de una hora seguida. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla ergonómica y me levanto cada hora. Ocasionalmente evito algunas actividades sociales si el dolor es más molesto. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 2 puntos (leve)

2. Estar de pie: 3 puntos (moderado) - El paciente puede estar de pie para actividades normales pero prefiere no hacerlo por más de una hora seguida.

3. Andar: 0 puntos (sin problemas)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problemas)

5. Levantar peso: 1 punto (ligeramente limitado) - Ocasionalmente evita alguna actividad debido al dolor.

6. Estar sentado: 1 punto (ligeramente limitado) - Usa una silla ergonomica y se levanta cada hora.

7. Viajar: 0 puntos (sin problemas)

8. Vida social: 1 punto (ligeramente limitado) - Evita alguna actividad social ocasionalmente debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problemas) - No se menciona problemas en esta área.

10. Dormir: 0 puntos (sin problemas) - Duerme bien la mayoría de las noches.

Total: 8 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve, con un total de 8 puntos en la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 102

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar muy severo de 9 de 10 que es constante. No puedo estar de pie ni para cepillarme los dientes sin apoyarme. Caminar incluso distancias muy cortas dentro de casa es extremadamente doloroso. Necesito ayuda para vestirme completamente y para ducharme. No puedo levantar nada, ni siquiera un vaso de agua lleno. Estar sentado es insoportable después de 10 minutos. No puedo trabajar ni hacer tareas domésticas. No salgo de casa para nada social. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente informa de un dolor lumbar muy severo y constante de 9 de 10, lo que corresponde al máximo nivel de intensidad de dolor en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie ni para cepillarse los dientes, lo que indica que no puede mantenerse de pie por ningún período de tiempo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar incluso distancias cortas dentro de su casa es extremadamente doloroso, lo que indica que no puede andar.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda completa para vestirse y ducharse, lo que corresponde al máximo nivel de necesidad de ayuda en la escala Oswestry.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que no puede levantar nada, ni siquiera un vaso de agua lleno.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que estar sentado es insoportable después de 10 minutos, lo que corresponde al nivel 1 de la escala Oswestry.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no salió de casa para nada social, lo que indica que no puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no participa en ninguna actividad social, lo que indica que no puede llevar una vida social normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que no hay posibilidad de intimidad, lo que indica que no puede participar en actividades sexuales.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte, lo que indica que no puede dormir normalmente.

En resumen, según la escala Oswestry, el paciente presenta un nivel total de discapacidad lumbar de 35 puntos ($5 \times 0 + 0 \times 1 + 5 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0$). Este nivel de discapacidad se considera extremo y significa que el paciente tiene una gran dificultad para realizar las actividades diarias y requiere una atención médica y de cuidados continuos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

82% [REDACTED] | 103/126 [42:36<11:31, 30.08s/it]

Entrevista 103

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar que fluctúa entre leve y moderado, generalmente un 3-5 de 10 dependiendo del día y las actividades. Algunos días puedo estar de pie sin problema, otros días prefiero sentarme más frecuentemente. Camino normalmente distancias cortas, pero las caminatas largas pueden ser incómodas algunos días. En el trabajo alterno entre estar sentado y de pie. He cancelado algunos planes sociales ocasionalmente cuando el dolor es más fuerte. Tomo analgésicos según necesidad. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como fluctuante entre leve y moderado, lo que corresponde a un rango de 3 a 5 en la escala de dolor de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie normalmente para distancias cortas, pero algunas veces necesita sentarse más frecuentemente y encuentra incómodo caminar largas distancias.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar normalmente, pero algunas veces encuentra caminar largas distancias incómodo.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con levantar peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente alterna entre sentarse y estar de pie en el trabajo.

7. Viajar: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con viajar.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha cancelado planes sociales ocasionalmente debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no menciona problemas específicos con la actividad sexual, pero ha tenido que adaptarse a algunos grados debido al dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente no menciona problemas específicos con el dormir, pero toma analgésicos según necesidad.

Según la escala Oswestry, la puntuación total de este paciente sería de 12 puntos. Una puntuación total de 0 a 10 significa que el paciente no presenta discapacidad significativa, una puntuación de 11 a 20 significa que el paciente presenta una discapacidad leve, una puntuación de 21 a 40 significa que el paciente presenta una discapacidad moderada, y una puntuación superior a 40 significa que el paciente presenta una discapacidad grave. En este caso, el paciente presenta una discapacidad leve.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

83% [REDACTED] | 104/126 [43:05<10:54, 29.76s/it]

Entrevista 104

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me molesta muy poco, solo cuando hago actividades físicas muy intensas o paso demasiado tiempo en malas posturas. Es una molestia muy leve, máximo un 2 de 10. No me impide realizar ninguna actividad normal. Trabajo todo el día, hago ejercicio regularmente, salgo con amigos, viajo sin problemas. Solo tengo que ser un poco más cuidadoso con la postura cuando estoy sentado mucho tiempo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve y ocasional, no superior a 2 de 10, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no presenta problemas al estar de pie, por lo que no necesita apoyos ni se ve afectado en esta actividad.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no presenta problemas al andar, por lo que no se le asigna puntaje alguno.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta necesidad de ayuda en cuidados personales debido a su espalda, por lo que no se le asigna puntaje.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no menciona dificultad en levantar peso, por lo que no se le asigna puntaje.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que necesita ser más cuidadoso al sentarse mucho tiempo, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente viaja sin problemas, por lo que no se le asigna puntaje.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente salva con amigos y no presenta problemas en su vida social, por lo que no se le asigna puntaje.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no menciona problemas en su actividad sexual, por lo que no se le asigna puntaje.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no presenta problemas para dormir, por lo que no se le asigna puntaje.

Basado en la entrevista, el paciente obtiene un puntaje total de 2 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

83% [REDACTED] | 105/126 [43:24<09:19, 26.66s/it]

Entrevista 105

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar que tengo es intenso, alrededor de 7-8 de 10, y es bastante constante. No puedo estar de pie por más de 10-15 minutos sin que se intensifique mucho. Caminar es limitado, solo puedo hacer distancias cortas y lentamente. Puedo cuidarme solo pero me cuesta trabajo y necesito descansos frecuentes. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado también me duele después de 20-30 minutos. He tenido que tomar licencia médica del trabajo. Evito muchas actividades sociales. La vida íntima es muy difícil. Duermo mal incluso con medicación, me despierto varias veces. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 5 puntos - El dolor es intenso, con una intensidad de 7-8 de 10.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie por más de 10-15 minutos.

3. Andar: 2 puntos - Caminar es limitado y solo puede hacer distancias cortas y lentamente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - Puede cuidarse solo, pero le cuesta trabajo y necesita descansos frecuentes.

5. Levantar peso: 0 puntos - No puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - Estar sentado también le duele después de 20-30 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - No especificó información relevante sobre viajar.

8. Vida social: 1 punto - Evita muchas actividades sociales.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida íntima es muy difícil.

10. Dormir: 1 punto - Duerme mal incluso con medicación y se despierta varias veces.

Calificación total: 15 puntos.

La puntuación total de 15 indica una discapacidad lumbar severa.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

84% [REDACTED] | 106/126 [43:36<07:20, 22.01s/it]

Entrevista 106

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar leve que aparece esporádicamente, principalmente relacionado con el ciclo menstrual y el estrés laboral. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. Puedo realizar todas mis actividades sin limitaciones importantes. Trabajo normalmente, aunque algunos días prefiero usar una almohadilla lumbar. No he tenido que cancelar actividades sociales por el dolor. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problema)

3. Andar: 0 puntos (sin problema)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problema)

5. Levantar peso: 0 puntos (sin problema)

6. Estar sentado: 0 puntos (sin problema)

7. Viajar: 0 puntos (sin problema)

8. Vida social: 0 puntos (sin problema)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problema)

10. Dormir: 0 puntos (sin problema)

Total: 0-1 puntos (baja discapacidad lumbar)

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

85% [REDACTED] | 107/126 [44:13<08:28, 26.77s/it]

Entrevista 107

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero persistente, unos 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo.

Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas domésticas ligeras, pero necesito sentarme cada 30-45 minutos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas que antes disfrutaba.

Puedo cuidarme solo aunque algunas tareas como limpiar el baño son más difíciles. No puedo levantar cosas pesadas como antes. En el trabajo necesito una silla ergonómica y pausas regulares. He reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes. Duermo regular, a veces me despierto si me muevo mal durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe su dolor de espalda como moderado a fuerte, por lo que se le asignan 4 puntos.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para realizar tareas domésticas ligeras, por lo que se le asignan 2 puntos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias normales, pero evita caminatas largas. Se le asignan 3 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero algunas tareas son más difíciles. Se le asignan 3 puntos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar cosas pesadas como antes, por lo que se le asignan 0 puntos.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse, pero necesita una silla ergonómica en el trabajo y pausas regulares. Se le asignan 3 puntos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, pero evita caminatas largas. Se le asignan 2 puntos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes. Se le asignan 2 puntos.

9. Actividad sexual: 2 puntos - No se proporciona información suficiente sobre la actividad sexual del paciente. Se le asignan 2 puntos por defecto.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, aunque a veces se despierta si se mueve mal durante la noche. Se le asignan 3 puntos.

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 21 puntos. La puntuación total se interpreta como siguiente:

- 0-20 puntos: Bajo a moderado nivel de discapacidad lumbar.
- 21-40 puntos: Moderado a alto nivel de discapacidad lumbar.
- 41-50 puntos: Discapacidad grave lumbar.

En este caso, el paciente presenta un nivel moderado a alto de discapacidad lumbar (21 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

Entrevista 108

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una ligera incomodidad en la zona lumbar que aparece ocasionalmente después de días muy activos o cuando duermo en una cama incómoda. Es más bien una sensación de rigidez que dolor real, máximo un 1-2 de 10. No me limita para nada en mis actividades cotidianas. Puedo trabajar, hacer ejercicio, salir, viajar, todo con total normalidad. No he necesitado medicación ni cambios en mi rutina.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (mínimo nivel de dolor)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita su capacidad)

3. Andar: 0 puntos (no limita su capacidad)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no limita su capacidad)

5. Levantar peso: 0 puntos (no limita su capacidad)

6. Estar sentado: 0 puntos (no limita su capacidad)

7. Viajar: 0 puntos (no limita su capacidad)

8. Vida social: 0 puntos (no limita su capacidad)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no limita su capacidad)

10. Dormir: 1 punto (puede tener dificultades ocasionales al dormir debido a la rigidez)

Total: 2 puntos.

La puntuación total de 2 puntos indica una baja discapacidad lumbar. La persona puede realizar todas las actividades cotidianas sin limitaciones significativas.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

Entrevista 109

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar severo de 8-9 de 10 que no me da respiro. Solo puedo estar de pie unos minutos para lo más básico. Caminar dentro de casa es muy doloroso y requiere descansos frecuentes. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior y para ducharme completamente. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una bolsa de supermercado. Estar sentado es muy doloroso después de 10-15 minutos. He dejado de trabajar indefinidamente. Prácticamente no salgo de casa excepto para médicos. No hay vida íntima posible. Duermo muy mal incluso con medicación fuerte, me despierto constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y persistente, con una intensidad de 8-9 de 10, lo que representa una considerable sufrimiento.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de unos minutos para realizar tareas básicas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente encuentra caminar dentro de casa muy doloroso y requiere descansos frecuentes.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse completamente, lo que representa una considerable dependencia.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, ni siquiera una bolsa de supermercado.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra sentarse muy doloroso después de 10-15 minutos, lo que indica alguna dificultad en esta actividad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente prácticamente no salgo de casa excepto para médicos, lo que indica una falta total de capacidad para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social debido a la severidad de sus síntomas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa de que no hay vida sexual posible debido a sus síntomas.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación fuerte y se despierta constantemente, lo que indica una considerable dificultad en este aspecto.

En base a las respuestas del paciente, la puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es 21 puntos, lo que corresponde a una alta discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

87% [REDACTED] | 110/126 [45:22<06:37, 24.87s/it]

Entrevista 110

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar aparece en episodios que duran unos días y luego desaparece por semanas. Cuando tengo dolor, es moderado, unos 4-5 de 10. Durante esos episodios puedo estar de pie pero prefiero no hacerlo por períodos largos. Camino normalmente pero evito ejercicios intensos. En el trabajo soy más cuidadoso durante esos días. Ocasionalmente he cancelado algún plan si coincide con un episodio fuerte. Entre episodios estoy completamente normal. [INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe que su dolor lumbar es moderado, con una intensidad de 4-5 de 10.
2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante períodos normales, pero prefiere no hacerlo durante episodios de dolor.
3. Andar: 1 punto - El paciente camina normalmente, pero evita ejercicios intensos durante episodios de dolor.
4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas con cuidados personales.
5. Levantar peso: 1 punto - El paciente es más cuidadoso durante episodios de dolor al levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al estar sentado.
7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha cancelado planes debido a episodios de dolor, indicando algunas limitaciones en la capacidad de viajar.
8. Vida social: 1 punto - El paciente evita ejercicios intensos y es más cuidadoso durante episodios de dolor, lo que puede limitar su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta problemas con su actividad sexual.
10. Dormir: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con el dormir durante episodios de dolor.

Total: 11 puntos.

La puntuación total de 11 indica un funcionamiento moderado a limitado en el paciente, según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

88% [REDACTED] | 111/126 [45:41<05:47, 23.14s/it]

Entrevista 111

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar constante y severo de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 8-10 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar está muy limitado, solo distancias muy cortas dentro de casa. Necesito ayuda ocasional para cuidado personal, especialmente para cosas que requieren agacharse. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado me duele después de 25-30 minutos incluso con cojines. He solicitado incapacidad temporal en el trabajo. Salgo muy poco, solo para citas médicas esenciales. La intimidad es muy complicada. Duermo muy mal con medicación, me despierto cada 2-3 horas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (constante y severo, impidiendo el estar de pie por más de 10 minutos)

2. Estar de pie: 0 puntos - (no puede estar de pie más de 8-10 minutos)
3. Andar: 1 punto - (limitado a distancias muy cortas dentro de casa)
4. Cuidados personales: 2 puntos - (ocasionalmente necesita ayuda)
5. Levantar peso: 0 puntos - (no puede levantar objetos pesados)
6. Estar sentado: 1 punto - (duele después de 25-30 minutos, incluso con cojines)
7. Viajar: 0 puntos - (salgo muy poco)
8. Vida social: 0 puntos - (solo para citas médicas esenciales)
9. Actividad sexual: 0 puntos - (complicada)
10. Dormir: 1 punto - (duermo mal y despierto varias veces la noche)

Total: 8 puntos

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una moderada a grave discapacidad lumbar (puntuaciones totales entre 8 y 31).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

89% | 112/126 [45:57<04:52, 20.87s/it]

Entrevista 112

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me duele de forma leve e intermitente, principalmente después de jornadas largas de trabajo o cuando hago actividades físicas intensas. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide realizar mis actividades diarias normales. Puedo trabajar, hacer ejercicio moderado, salir con amigos. Solo tengo que ser más cuidadoso al levantar objetos pesados y tomar descansos más frecuentes en trabajos físicos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve (0-2)

2. Estar de pie: 0 puntos - No hay dificultad (0)

3. Andar: 0 puntos - No hay dificultad (0)

4. Cuidados personales: 0 puntos - No hay dificultad (0)

5. Levantar peso: 1 punto - Solo con dificultad leve (1-2)

6. Estar sentado: 0 puntos - No hay dificultad (0)

7. Viajar: 0 puntos - No hay dificultad (0)

8. Vida social: 0 puntos - No hay dificultad (0)

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay dificultad (0)

10. Dormir: 0 puntos - No hay dificultad (0)

Total: 2 puntos

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 2 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

90% [REDACTED] | 113/126 [46:14<04:14, 19.55s/it]

Entrevista 113

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar moderado a severo que oscila entre 6-7 de 10 durante el día. Puedo estar de pie para tareas básicas pero necesito sentarme frecuentemente después de 20-30 minutos. Caminar distancias cortas está bien, pero las caminatas largas son muy incómodas. Puedo cuidarme solo pero tareas como limpiar el suelo o hacer la cama son difíciles. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado también me molesta después de un rato. He reducido mis horas de trabajo a medio tiempo. Evito actividades sociales que requieren mucho movimiento. La vida íntima se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - The patient reports moderate to severe lower back pain with a pain intensity level between 6-7 out of 10 throughout the day.

2. Estar de pie: 2 puntos - The patient can stand for basic tasks but requires frequent sitting breaks after 20-30 minutes.
3. Andar: 3 puntos - The patient can walk short distances comfortably but long walks are uncomfortable.
4. Cuidados personales: 3 puntos - The patient can care for themselves but finds personal care tasks like cleaning the floor or making the bed difficult.
5. Levantar peso: 0 puntos - The patient is unable to lift heavy objects.
6. Estar sentado: 3 puntos - Sitting also bothers the patient after a certain period.
7. Viajar: 2 puntos - The patient can travel but finds it uncomfortable.
8. Vida social: 1 punto - The patient avoids social activities that require much movement.
9. Actividad sexual: 1 punto - Intimacy has been affected.
10. Dormir: 2 puntos - The patient experiences poor sleep quality, waking up 2-3 times due to pain.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3

90% [REDACTED] | 114/126 [46:38<04:10, 20.90s/it]

Entrevista 114

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda que aparece solo después de esfuerzos físicos muy intensos o cuando paso muchas horas en una mala postura. Es más bien una sensación de cansancio muscular que dolor, máximo un 1 de 10. No interfiere para nada con mis actividades. Trabajo, hago deporte, salgo, mantengo mi vida normal completamente. No he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe una sensación leve de cansancio muscular sin dolor real, por lo que no se aplicará puntaje.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida estar de pie.
3. Andar: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida andar.
4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida realizar cuidados personales.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida sentarse.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su dolor o molestia no interfiere en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida tener actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

91% [REDACTED] 115/126 [47:09<04:23, 23.91s/it]

Entrevista 115

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es muy intenso, de 8-9 de 10, y prácticamente constante. No puedo estar de pie más de 3-5 minutos sin apoyo. Caminar es extremadamente limitado y doloroso, solo unos pocos pasos muy lentos. Necesito ayuda para vestirme y ducharme. No puedo levantar absolutamente nada. Estar sentado es insoportable después de 10-15 minutos. No puedo trabajar para nada. No salgo de casa excepto para emergencias médicas. No hay posibilidad de vida íntima. Duermo muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte, el dolor me despierta constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso y constante, con una escala de 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo por más de 3-5 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente describe que caminar es extremadamente limitado y doloroso, solo unos pocos pasos lentos.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra el sentarse insoportable después de 10-15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no sale de casa excepto para emergencias médicas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede trabajar y no salga de casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay posibilidad de vida sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme pocas horas seguidas incluso con medicación fuerte y el dolor despertándole constantemente.

Según el paciente, su desempeño en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es de 15 puntos (5 puntos por cada ítem con una puntuación de 0-2, y 5 puntos por cada ítem con una puntuación de 3-5). Sin embargo, debido a que el paciente no puede realizar algunas de las actividades básicas de la vida diaria y tiene una intensidad de dolor constante y muy elevada, es probable que su situación sea mucho más grave que lo que indica su puntuación en la escala. Es recomendable que el paciente sea evaluado por un médico especialista para determinar la causa del dolor y tratarlo adecuadamente.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0

- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

92% [REDACTED] 116/126 [47:29<03:48, 22.87s/it]

Entrevista 116

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar que aparece principalmente después de actividades físicas o al final de días muy activos. Es un dolor leve a moderado, como un 3-4 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales, aunque prefiero no hacerlo por más de 45 minutos seguidos. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla ergonómica y hago pausas. Ocasionalmente he evitado alguna actividad social muy física. Duermo bien la mayoría de las noches, solo a veces me molesta si me acuesto en mala posición. [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve)

2. Estar de pie: 4 puntos (Puede estar de pie para actividades normales con limitaciones)

3. Andar: 5 puntos (Camina sin problemas distancias normales)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No hay dificultad para realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 3 puntos (Puede levantar peso con dificultad)

6. Estar sentado: 5 puntos (Puede sentarse sin problemas)

7. Viajar: 5 puntos (Puede viajar sin problemas)

8. Vida social: 3 puntos (Ocasionalmente evita alguna actividad social física)

9. Actividad sexual: 5 puntos (Puede realizar actividades sexuales normalmente)

10. Dormir: 4 puntos (Duerme bien la mayoría de las noches, pero puede molestarle si se acuesta en mala posición)

Total: 27 puntos (Baja discapacidad lumbar)

La puntuación total de 27 indica una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry. El paciente presenta algunos síntomas de dolor lumbar, pero no limita significativamente su actividad diaria.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 5 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

93% [REDACTED] 117/126 [47:47<03:13, 21.47s/it]

Entrevista 117

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero constante, alrededor de 5 de 10. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas ligeras, pero necesito descansar cada 30-40 minutos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas. Puedo cuidarme solo aunque algunas tareas son más lentas y difíciles. No puedo levantar cosas pesadas como antes. En el trabajo alterno entre estar sentado y de pie cada hora. He reducido algunas actividades deportivas y sociales. La intimidad a veces se ve afectada. Duermo regular, me despierto ocasionalmente por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - Moderado (4-6/10)

2. Estar de pie: 2 puntos - Algunas dificultades (1-2 hours)
3. Andar: 2 puntos - Normal (no limita)
4. Cuidados personales: 2 puntos - Algunas dificultades (slowly)
5. Levantar peso: 1 punto - Muchas dificultades (can't do)
6. Estar sentado: 2 puntos - Normal (no limita)
7. Viajar: 2 puntos - Normal (no limita)
8. Vida social: 1 punto - Muchas dificultades (avoided)
9. Actividad sexual: 1 punto - Muchas dificultades (avoided)
10. Dormir: 1 punto - Somewhat difficult (occasional awakening)

Total: 12 points (mild disability)

This patient's self-reported symptoms suggest a mild level of disability based on the Oswestry Disability Index (ODI) scoring system. The total score of 12 points indicates that the patient experiences some limitations in their daily life due to their low back pain, but they can still perform most activities.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

94% [REDACTED] 118/126 [48:04<02:39, 19.99s/it]

Entrevista 118

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares muy ocasionales que aparecen solo después de esfuerzos físicos muy intensos o malas posturas prolongadas. Es una molestia muy leve, máximo un 2 de 10. No me limita en absoluto para ninguna actividad cotidiana. Trabajo normalmente, hago ejercicio regularmente, mantengo mi vida social activa. Solo soy un poco más consciente de mi postura cuando estoy sentado por períodos largos. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - (Leve)

2. Estar de pie: 5 puntos - (No afecta)
3. Andar: 5 puntos - (No afecta)
4. Cuidados personales: 5 puntos - (No afecta)
5. Levantar peso: 5 puntos - (No afecta)
6. Estar sentado: 1 punto - (Leve)
7. Viajar: 5 puntos - (No afecta)
8. Vida social: 5 puntos - (No afecta)
9. Actividad sexual: 5 puntos - (No afecta)
10. Dormir: 4 puntos - (Leve)

Total: 26 puntos

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un total de 26 puntos. Su molestia lumbar levemente afecta solo su postura cuando está sentado por períodos prolongados y su capacidad de dormir ligeramente. No presenta limitaciones significativas en ninguna otra área evaluada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

94% 119/126 [48:40<02:53, 24.86s/it]

Entrevista 119

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo de 8 de 10 que es constante y debilitante. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es muy limitado, solo dentro de casa y muy despacio con descansos. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior del cuerpo y para ducharme. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es muy doloroso después de 15-20 minutos. He dejado de trabajar temporalmente. Salgo muy poco de casa, solo para citas médicas importantes. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal incluso con medicación, me despierto cada 2 horas por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y constante de nivel 8 de 10, lo que significa que este ítem obtiene la puntuación máxima.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable, por lo que no puede realizar este ítem.

3. Andar: 0 puntos - El paciente solo puede andar dentro de su casa y muy despacio, lo que indica que no puede realizar este ítem.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse la parte inferior del cuerpo y para ducharse, lo que corresponde a nivel 2 de dependencia.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada, por lo que no puede realizar este ítem.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo durante 15-20 minutos antes de que el dolor sea intolerable, lo que corresponde a nivel 1 de dependencia.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente salga solo muy poco de casa y solo para citas médicas importantes, por lo que no puede realizar este ítem.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar temporalmente y no sale mucho de casa, lo que indica que no puede realizar este ítem.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones sexuales, por lo que no puede realizar este ítem.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación y se despierta cada 2 horas por el dolor, por lo que no puede realizar este ítem.

Combinando los puntos obtenidos en cada ítem, la puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 12 puntos. La puntuación total puede variar desde 0 a 50 puntos, con puntuaciones más altas indicando mayor grado de discapacidad. En este caso, la puntuación de 12 puntos corresponde a un grado considerable de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

95% [REDACTED] | 120/126 [48:55<02:12, 22.07s/it]

Entrevista 120

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es leve e intermitente, aparece principalmente después de días de mucha actividad física o cuando duermo en una cama incómoda. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide realizar mis actividades normales. Puedo trabajar todo el día, hacer ejercicio moderado, salir con amigos. Solo evito cargar objetos muy pesados por precaución y uso una buena almohada lumbar cuando estoy sentado mucho tiempo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problemas)

3. Andar: 0 puntos (sin problemas)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problemas)

5. Levantar peso: 1 punto (puede levantar objetos de peso con precaución)

6. Estar sentado: 1 punto (puede sentarse largas horas pero con una buena almohada lumbar)

7. Viajar: 0 puntos (sin problemas)

8. Vida social: 0 puntos (puede salir con amigos y participar en actividades sociales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problemas)

10. Dormir: 1 punto (puede dormir con un almohadón lumbar suave)

Total: 4 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un total de 4 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

96% [REDACTED] | 121/126 [49:28<02:06, 25.33s/it]

Entrevista 121

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar moderado a severo que fluctúa entre 5-7 de 10 según el día. Puedo estar de pie para tareas cortas pero necesito sentarme cada 20-30 minutos. Caminar distancias cortas está bien, pero las largas son difíciles. Puedo cuidarme solo pero me toma más tiempo y esfuerzo. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado también me duele después de un rato, uso cojines especiales. He reducido mi jornada laboral. Evito muchas actividades sociales que requieren mucho movimiento. La vida íntima se ha visto afectada significativamente. Duermo mal, me despierto 3-4 veces por la noche. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe un dolor lumbar moderado a severo, fluctuando entre 5-7 de 10, por lo que se le asigna 4 puntos.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas cortas, pero necesita sentarse cada 20-30 minutos, por lo que se le asigna 2 puntos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas bien, pero las largas son difíciles, por lo que se le asigna 3 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero toma más tiempo y esfuerzo, por lo que se le asigna 3 puntos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados, por lo que se le asigna 0 puntos.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente duele después de un rato sentado y utiliza cojines especiales, por lo que se le asigna 4 puntos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita muchas actividades sociales que requieren mucho movimiento, pero no se especifica si evita viajar en automóvil o avión, por lo que se le asigna 2 puntos.

8. Vida social: 1 punto - La vida social se ha visto afectada significativamente, por lo que se le asigna 1 punto.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se especifica si la actividad sexual se ha visto afectada, por lo que se le asigna 0 puntos.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 3-4 veces por la noche, por lo que se le asigna 3 puntos.

Calificación total: 22 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada a severa según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 22 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

97% [REDACTED] 122/126 [49:44<01:29, 22.39s/it]

Entrevista 122

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una rigidez y molestia muy leve en la zona lumbar, especialmente por las mañanas al levantarme. Es más bien una sensación de tensión que dolor real, máximo un 1-2 de 10. Mejora

completamente con el movimiento durante el día. No me limita para nada en mis actividades. Trabajo, hago ejercicio, salgo, mantengo mi vida completamente normal. No he necesitado medicación ni cambios en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve intensidad de dolor reportada.

2. Estar de pie: 0 puntos - No limitación en estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - No limitación en andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - No limitación en realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - No limitación en levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - No limitación en estar sentado.

7. Viajar: 0 puntos - No limitación en viajar.

8. Vida social: 0 puntos - No limitación en la vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No limitación en la actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - No problemas reportados al dormir.

Respuesta final: La entrevista del paciente corresponde a un total de 0 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, lo que indica un resultado favorable.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

98% [REDACTED] 123/126 [50:02<01:03, 21.08s/it]

Entrevista 123

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es muy severo, de 9 de 10, y constante las 24 horas. No puedo estar de pie ni para actividades básicas como cepillarme los dientes. Caminar incluso dentro de casa es extremadamente doloroso y limitado. Necesito ayuda para vestirme completamente y para todas las actividades de higiene personal. No puedo levantar absolutamente nada. Estar sentado es insoportable después de 5-10 minutos. No puedo trabajar ni hacer tareas domésticas. No salgo de casa para nada social o recreativo. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy poco incluso con medicación muy fuerte, me despierto constantemente por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (Dolor intensidad máxima, 10/10)

2. Estar de pie: 0 puntos (Incapaz de estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (Incapaz de andar)

4. Cuidados personales: 5 puntos (Necesita ayuda para vestirse y todos los cuidados personales)

5. Levantar peso: 0 puntos (Incapaz de levantar nada)

6. Estar sentado: 0 puntos (Incapaz de estar sentado por más de 5-10 minutos)

7. Viajar: 0 puntos (No viaja)
8. Vida social: 0 puntos (No sale de casa para nada social o recreativo)
9. Actividad sexual: 0 puntos (No hay posibilidad de intimidad)
10. Dormir: 0 puntos (Durante el día no duerme y duerme mal durante la noche)

Total: 5 puntos (Máximo de puntos posibles en esta escala es 40 puntos, por lo que un total de 5 puntos indica una discapacidad muy severa)

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

98% [REDACTED] 124/126 [50:28<00:45, 22.54s/it]

Entrevista 124

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo cuatro días con dolor lumbar después de hacer ejercicio intenso sin calentamiento adecuado. El dolor es moderado, alrededor de 4 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque después de 45 minutos empiezo a sentir molestia. Camino sin grandes problemas, completé mi rutina de caminata matutina aunque a ritmo más lento. Para ducharme y vestirme soy más cuidadoso con los movimientos bruscos, pero puedo hacer todo solo. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera molestia, evito las cargas muy pesadas pero manejo las normales. Estar sentado en mi trabajo es cómodo por períodos de 2 horas antes de necesitar cambiar de posición. Los viajes cortos son tolerables, ayer viajé 90 minutos con solo un poco de rigidez al llegar. Mantengo mis actividades sociales principales, aunque cancelé una clase de baile por precaución. La vida íntima continúa bien, solo somos más cuidadosos con movimientos bruscos. Duermo bien en general, una noche me desperté por cambiar de posición mal."

[INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, entre 4-6 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos normales, pero con molestias después de 45 minutos)

3. Andar: 1 punto (Camina sin grandes problemas)

4. Cuidados personales: 1 punto (Puede hacer todo solo, pero con más cuidadoso en el movimiento brusco)

5. Levantar peso: 2 puntos (Evita cargas muy pesadas, pero puede manejar las normales)

6. Estar sentado: 1 punto (Cómodo durante períodos de 2 horas)

7. Viajar: 1 punto (Tolerables viajes cortos)

8. Vida social: 1 punto (Mantiene sus actividades sociales principales)

9. Actividad sexual: 1 punto (Vida íntima continúa bien)

10. Dormir: 1 punto (Duerme bien en general, con un despertar por cambiar de posición)

Total: 9 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, un puntaje total entre 0-10 puntos indica un funcionamiento normal, 11-20 puntos indica una leve discapacidad, 21-40 puntos indica una moderada discapacidad y 41-50 puntos indica una severa discapacidad. En este caso, el paciente obtiene un puntaje de 9 puntos, lo que indica un funcionamiento normal a levemente afectado.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

99% ██████████ 125/126 [50:59<00:25, 25.22s/it]

Entrevista 125

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda baja es severo y constante, llevo nueve meses así desde una hernia discal. El dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente. Estar de pie más de 10 minutos es insoportable, necesito sentarme o acostarme inmediatamente. Caminar más de 25 metros es extremadamente doloroso, uso andador para cualquier distancia. Para bañarme tengo asiento especial y necesito ayuda de mi hija para lavarme la espalda y pies. Vestirme requiere ayuda, especialmente para calcetines, zapatos y ropa interior, me toma más de 45 minutos. No puedo levantar prácticamente nada, hasta una revista me causa dolor. Estar sentado también es problemático, después de 15-20 minutos el dolor aumenta significativamente. No he podido viajar, cancelé vacaciones familiares importantes. Mi vida social ha desaparecido casi por completo, solo recibo visitas muy cortas. La intimidad es extremadamente difícil, casi imposible sin causar dolor severo. Duermo muy mal, me despierto cada 1-2 horas por dolor intenso, los medicamentos no me alivian suficiente." [INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor de espalda baja es severo y constante, con un intensidad de 7-8 de 10 diariamente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 10 minutos sin sentirse obligado a sentarse o acostarse debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - Caminar más de 25 metros es extremadamente doloroso para el paciente y requiere el uso de un andador.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse, vestirse y lavarse, lo que le toma más de 45 minutos.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada sin causar dolor.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero el dolor aumenta significativamente después de 15-20 minutos.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar debido al dolor.
8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido casi por completo.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es extremadamente difícil, casi imposible sin causar dolor severo.
10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta cada 1-2 horas por dolor intenso, lo que le impide tener una buena descanso.

Based on the Oswestry Disability Index scoring system, the total score for this patient would be 16 points out of a possible 50. A score of 10 or less is considered severe disability, and a score of 21 or more is considered normal. In this case, the patient's score indicates severe disability due to their low back pain.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 8 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

100% 126/126 [51:33<00:00, 24.55s/it]

Entrevista 126

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares leves desde hace una semana después de pasar mucho tiempo en una mala posición trabajando en mi computadora. El dolor es muy suave, máximo 2-3 de 10. Puedo estar de pie durante toda mi jornada laboral sin problemas significativos. Camino normalmente, incluso mantuve mi rutina de trotar 20 minutos diarios. Me baño y me visto sin limitaciones, solo noto un poquito de rigidez matutina que desaparece rápido. Puedo cargar cosas normalmente, ayer cargué todas mis bolsas de compras sin problema. Paso muchas horas sentado trabajando y estoy cómodo, solo ajusto mi postura ocasionalmente. Los viajes no me afectan, este fin de semana tengo planeado un viaje de 3 horas. Mis

actividades sociales continúan completamente normales, no he cancelado ningún plan. No hay ningún impacto en mi vida íntima con mi pareja. Duermo muy bien, solo la primera noche noté un poquito la molestia pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (Leve) - El paciente describe el dolor como leve, con una intensidad de 2-3 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas significativos al estar de pie durante toda su jornada laboral y ha podido continuar su rutina de trotar diariamente.

3. Andar: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente camina normalmente y no ha reportado problemas al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas al realizar sus cuidados personales, incluyendo bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente ha podido cargar cosas normalmente sin problemas.

6. Estar sentado: 1 punto (Leve) - El paciente pasa muchas horas sentado trabajando y se ajusta ocasionalmente su postura, lo que sugiere un leve grado de dificultad.

7. Viajar: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas al viajar, incluso tiene planeado un viaje de 3 horas.

8. Vida social: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente ha informado que sus actividades sociales continúan completamente normales.

9. Actividad sexual: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas en su vida sexual.

10. Dormir: 1 punto (Leve) - El paciente solo ha notado un poquito de molestias la primera noche, pero estas no lo despertaron.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es 3 puntos. Esto indica una baja discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

Evaluación por ítem (promedio y desviación estándar de error)

- Intensidad dolor | Media error: 1.51 | Desviación estándar: 0.91
- Estar pie | Sin datos suficientes
- Andar | Media error: 1.61 | Desviación estándar: 1.85
- Cuidados personales | Media error: 0.77 | Desviación estándar: 1.06

- Levantar peso | Media error: 2.02 | Desviación estándar: 1.90
- Estar sentado | Media error: 1.65 | Desviación estándar: 1.74
- Viajar | Media error: 1.75 | Desviación estándar: 2.01
- Vida social | Media error: 1.34 | Desviación estándar: 1.81
- Actividad sexual | Media error: 1.84 | Desviación estándar: 1.96
- Dormir | Media error: 1.71 | Desviación estándar: 1.71

Entrevista 1

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, desde hace tres semanas tengo un dolor constante en la parte baja de la espalda que apareció después de ayudar a mi hijo a mudarse. El dolor es moderado, como un 6 de 10, y empeora cuando me quedo mucho tiempo de pie en el trabajo. Puedo caminar distancias cortas sin problema, pero después de 10-15 minutos necesito sentarme. Para lavarme los dientes o vestirme por las mañanas tengo que hacerlo más despacio y a veces me apoyo en la pared. No puedo cargar las bolsas del supermercado como antes, ahora le pido ayuda a mi esposa. Cuando estoy sentado en la oficina estoy bien las primeras horas, pero después de mediodía el dolor aumenta. Los viajes largos en coche son un problema, tuve que parar tres veces en mi último viaje de dos horas. He cancelado algunas salidas con amigos porque no me siento cómodo. La intimidad con mi pareja se ha visto afectada por el dolor. Duermo bien la mayor parte de las noches, aunque a veces me despierto si me giro bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos

- El paciente describe el dolor como moderado, un 6 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias sin problemas, pero necesita sentarse después de 10-15 minutos.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede andar sin problemas, pero con lentitud debido al dolor.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para realizar tareas personales como lavarse los dientes o vestirse debido al dolor.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente no puede cargar bolsas del supermercado como antes y necesita ayuda.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse durante las primeras horas en la oficina, pero el dolor aumenta después de mediodía.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente tiene problemas durante viajes largos en coche y ha tenido que parar durante el viaje.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado salidas con amigos debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad con la pareja se ha visto afectada por el dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme bien la mayor parte de las noches, excepto cuando se gira bruscamente.

Total: 22 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry, con un total de 22 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

2%|| | 2/126 [00:49<50:39, 24.51s/it]

Entrevista 2

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo dos días con una pequeña molestia en la zona lumbar izquierda. Creo que fue por el ejercicio del fin de semana, hice una rutina nueva en el gimnasio. Es más una molestia que un dolor real, tal vez un 2 de 10. Puedo estar de pie trabajando en mi taller sin problemas, camino normal tanto distancias cortas como largas. Me visto y me aseo sin ninguna dificultad. Ayer cargué unas cajas pesadas sin problema, aunque sí noté un poquito más la molestia. En el trabajo paso muchas horas sentado frente al computador y no me molesta para nada. El fin de semana fui a visitar a mis padres, un viaje de 3 horas, y llegué perfecto. Anoche salí a cenar con unos amigos y la pasé muy bien, sin pensar en la espalda. Con mi pareja todo normal, no hay ningún impedimento. Duermo excelente, no me ha despertado ni una sola vez."

[INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (El paciente describe un dolor leve, por debajo de un 3 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al caminar)

4. Cuidados personales: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 1 punto (El paciente notó un poco más de molestia al levantar pesas, pero no reportó dificultades)

6. Estar sentado: 0 puntos (El paciente no ha reportado dificultades al sentarse)

7. Viajar: 0 puntos (El paciente viajó por tres horas sin problemas)

8. Vida social: 0 puntos (El paciente no ha reportado impedimentos en su vida social)

9. Actividad sexual: 0 puntos (El paciente no ha reportado impedimentos en su actividad sexual)

10. Dormir: 0 puntos (El paciente duerme excelente y no ha tenido problemas para dormir)

Basado en la entrevista, el paciente presenta un puntaje total de 1 punto en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar. Esto sugeriría un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

2% | 3/126 [01:10<46:47, 22.82s/it]

Entrevista 3

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda baja es insoportable, llevo así cuatro meses desde mi accidente laboral. El dolor es constante, un 9 de 10, y nunca desaparece completamente. No puedo estar de pie más de 2-3 minutos porque el dolor se vuelve inaguantable. Caminar más de 10 metros es imposible, necesito sentarme o recostarme inmediatamente. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, me siento en una silla especial, y vestirme me toma 20 minutos con mucha dificultad. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera una taza de café sin que el dolor se dispare. Estar sentado también es problemático, después de 15-20 minutos el dolor aumenta terriblemente. Los viajes son imposibles, no he salido de casa en semanas. He perdido contacto con todos mis amigos, no puedo participar en ninguna actividad social. La intimidad con mi pareja es inexistente desde el accidente. Duermo fatal, me despierto cada hora por el dolor, necesito analgésicos fuertes para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante, con una intensidad de 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 2-3 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar más de 10 metros.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar cuidados personales como bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse pero solo por 15-20 minutos antes de que el dolor aumente terriblemente.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a los problemas de movilidad.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido contacto con todos sus amigos debido a su incapacidad.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad con su pareja es inexistente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y necesita analgésicos fuertes para poder descansar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

3% | 4/126 [01:39<51:43, 25.44s/it]

Entrevista 4

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar desde hace un mes después de una caída en casa. El dolor es considerable, como un 7 de 10 en los momentos más intensos. Puedo estar de pie unos 10-15 minutos antes de que el dolor me obligue a sentarme. Caminar distancias cortas está bien, pero para ir al supermercado necesito usar el carrito como apoyo. En el baño tengo que ir más despacio, especialmente para ducharme, a veces me apoyo en las paredes. Vestirme por las mañanas es complicado, sobre todo ponerme los calcetines y zapatos. No puedo cargar las bolsas de la compra, mi hija me ayuda con eso. En el trabajo, donde paso mucho tiempo sentado, las primeras horas van bien pero después necesito levantarme frecuentemente. Los viajes en auto son incómodos, en trayectos de más de una hora necesito parar a estirarme. He reducido mis salidas sociales a la mitad, solo voy a eventos muy importantes. La relación íntima con mi pareja se ha complicado, tenemos que ser muy cuidadosos con las posiciones. Duermo regular, me despierto 2-3 veces por noche por el dolor y me cuesta volver a dormir.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como un 7 de 10, lo que corresponde a una intensidad significativa.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo unos 10-15 minutos antes de sentarse debido al dolor.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero necesita apoyo para ir al supermercado.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente tiene dificultades para vestirse y necesita ayuda para cargar las bolsas de la compra.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente no puede levantar pesas, por lo que necesita ayuda para realizar esta actividad.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse durante las primeras horas en el trabajo, pero necesita levantarse frecuentemente.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente encuentra viajes en auto incómodos y necesita pararse para estirarse en trayectos de más de una hora.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido sus salidas sociales a la mitad.

9. Actividad sexual: 3 puntos - El paciente ha informado que su relación íntima se ha complicado debido al dolor.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, pero se despierta 2-3 veces por noche por el dolor y tiene dificultades para volver a dormir.

La puntuación total es de 25 puntos. Según la Escala Oswestry, un puntaje de 20-25 puntos indica una moderada a grave discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

4% | 5/126 [02:06<52:08, 25.86s/it]

Entrevista 5

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi problema de espalda comenzó hace seis meses de manera gradual. Al principio era solo una molestia, pero ahora es un dolor intenso, entre 8 y 9 de 10. Estar de pie es muy difícil, máximo puedo aguantar 5 minutos antes de que el dolor sea insoportable. Caminar más de 20-30 metros me resulta extremadamente doloroso, tengo que parar y buscar donde sentarme. Para mi higiene personal necesito mucha ayuda, mi esposo me ayuda a bañarme porque no puedo inclinarme. Vestirme es una tortura diaria, especialmente la ropa interior y los zapatos, me toma casi media hora. Levantar cualquier cosa, incluso un plato, me causa dolor severo. Sentarme también es problemático, después de 10 minutos el dolor se intensifica muchísimo. No puedo viajar para nada, el último intento en auto fue hace dos meses y tuve que regresar. Mi vida social ha desaparecido completamente, no salgo de casa salvo para citas médicas. La intimidad es imposible, cualquier movimiento me duele. Las noches son terribles, duermo máximo 2-3 horas seguidas, el dolor me despierta constantemente.". [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso, de nivel 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente solo puede aguantar 5 minutos de estar de pie antes de que el dolor sea insoportable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso y requiere paradas frecuentes.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar actividades personales como bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier cosa.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente tiene problemas para sentarse y el dolor se intensifica después de 10 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar por carretera.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido completamente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme máximo 2-3 horas seguidas y el dolor despertándolo constantemente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un total de 18 puntos. Una puntuación total de 20-30 puntos indica una discapacidad moderada a severa. En este caso, el paciente presenta una discapacidad severa.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3

- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

5% | 6/126 [02:35<53:31, 26.76s/it]

Entrevista 6

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, llevo aproximadamente tres semanas con dolor en la parte baja de la espalda. Comenzó después de ayudar a mi hermano a mudarse, cargando cajas pesadas. Al principio pensé que era solo cansancio, pero el dolor ha ido aumentando gradualmente. Por las mañanas me cuesta trabajo levantarme de la cama, siento rigidez y dolor que mejora un poco cuando camino. Durante el día, especialmente cuando estoy sentado en mi trabajo de oficina por más de una hora, el dolor se intensifica. He tenido que tomar ibuprofeno cada 6 horas para poder funcionar. Caminar distancias largas se ha vuelto difícil, antes podía caminar sin problemas al centro comercial, ahora tengo que detenerme a descansar. Para vestirme necesito sentarme, ya no puedo inclinarme fácilmente. El fin de semana tuve que cancelar una cita porque no me sentía cómodo para salir. Por las noches, encontrar una posición cómoda para dormir es complicado, me despierto varias veces por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor constante y aumentado durante las tres últimas semanas, que afecta su capacidad diaria y requiere el uso de analgésicos.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para caminar largas distancias y necesita detenerse a descansar.

3. Andar: 3 puntos - El paciente experimenta dificultades al caminar, lo cual se refleja en su necesidad de detenerse para descansar.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita sentarse para vestirse.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente menciona dificultades al levantarse de la cama y cargar cajas pesadas, lo cual sugiere un problema significativo al levantar peso.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente describe que el dolor se intensifica cuando está sentado por más de una hora.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente no especifica problemas específicos al viajar.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha tenido que cancelar una cita social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - No hay detalles específicos sobre cómo el dolor afecta su actividad sexual.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente tiene problemas para encontrar una posición cómoda para dormir y despertar varias veces por el dolor.

La puntuación total de la entrevista es de 24 puntos, lo cual indica una discapacidad moderada según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3

6% | 7/126 [02:56<49:31, 24.97s/it]

Entrevista 7

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días, doctor. Vengo porque desde hace dos días tengo una ligera molestia en la espalda baja. Creo que fue por haber dormido en una posición extraña el fin de semana cuando me quedé en casa de mis padres en un sofá cama que no era muy cómodo. Es más bien una sensación de tirantez que un dolor fuerte. Puedo hacer todas mis actividades normales sin problemas: trabajo, caminar, hacer ejercicio ligero. No he necesitado tomar ningún medicamento porque realmente no me molesta tanto. Duermo perfectamente en mi cama, solo siento la molestia cuando me levanto por las mañanas, pero desaparece rápidamente después de unos minutos. Ayer fui al gimnasio y pude hacer mi rutina normal sin inconvenientes, aunque evité levantar pesas muy pesadas por precaución. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una sensación de tirantez, lo que sugiere un bajo nivel de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente puede caminar normalmente.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente evitó levantar pesas pesadas, pero no reporta problemas para levantar objetos de peso normal.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente puede sentarse normalmente.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente puede participar en actividades sociales normalmente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme bien y solo siente la molestia al despertar, que desaparece rápidamente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtuvo un puntaje de 0 puntos en total, lo que indica un estado funcional muy bien.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

6%■ | 8/126 [03:28<53:34, 27.24s/it]

Entrevista 8

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es terrible, llevo dos meses así y cada día empeora.

Comenzó después de un accidente menor que tuve en el trabajo, me resbalé y caí. El dolor es constante, incluso estando en reposo siento punzadas intensas. No puedo estar de pie más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar más de media cuadra es imposible, tengo que usar bastón. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, no puedo inclinarme ni girarme. Levantar cualquier cosa, incluso una taza de café, me causa dolor severo. Estar sentado también es problemático, no aguanto más de 20 minutos. He tenido que faltar al trabajo constantemente. Mi vida social ha desaparecido completamente, no puedo ir a ningún lado. La intimidad con mi pareja es impensable por el dolor. Duermo muy mal, me despierto cada hora por el dolor, he probado diferentes posiciones y ninguna funciona. Tomo analgésicos fuertes cada 4 horas pero apenas me alivian. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como terrible, constante y insoportable, incluso en reposo. El dolor impide que esté de pie por más de 10 minutos y caminar más de media cuadra. El paciente necesita asistencia para realizar actividades personales, levantar objetos y bañarse. El dolor también lo impide sentarse por más de 20 minutos y dormir sin interrupciones. El paciente utiliza analgésicos fuertes con regularidad, pero éstos no le alivian completamente el dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar más de media cuadra debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita asistencia para realizar actividades personales como bañarse y levantarse debido al dolor.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, incluso una taza de café.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse por 20 minutos, pero solo con dificultad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido al dolor.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido completamente su vida social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad con su pareja es impensable debido al dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente experimenta dolor durante el sueño y no duerme bien.

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una discapacidad severa (puntaje total de 45 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

7% | 9/126 [04:03<57:47, 29.64s/it]

Entrevista 9

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, desde hace una semana tengo dolor en la zona lumbar que me está afectando moderadamente. Empezó después de hacer jardinería el fin de pasado, estuve agachado mucho tiempo plantando flores. El dolor es más notorio por las mañanas al levantarme y cuando llevo mucho tiempo en la misma posición. Puedo trabajar normalmente, pero tengo que cambiar de posición frecuentemente.

Caminar no me duele, pero después de caminar más de 6 cuadras empiezo a sentir molestias. Para vestirme y bañarme no tengo grandes problemas, aunque me toma un poco más de tiempo de lo normal porque trato de evitar movimientos bruscos. He evitado cargar cosas pesadas como las bolsas del supermercado, le pido ayuda a mi familia. Estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo. No he cancelado planes sociales, pero sí he rechazado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie. Duermo relativamente bien, aunque a veces tengo que acomodarme varias veces durante la noche. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor como moderado, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede caminar normalmente, pero se vuelve incómodo después de caminar más de 6 cuadras, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede andar normalmente, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no tiene problemas significativos para vestirse y bañarse, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente ha evitado cargar cosas pesadas y le pide ayuda a su familia, por lo que se le asigna un puntaje de 3.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se vuelve incómodo al sentarse por más de una hora, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente no ha cancelado planes sociales, pero ha rechazado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

8. Vida social: 1 punto - El paciente no ha cancelado planes sociales, por lo que no se le asigna un puntaje significativo.

9. Actividad sexual: No se menciona en la entrevista, por lo que no se puede calificar.
10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme relativamente bien, aunque a veces tiene que acomodarse varias veces durante la noche, por lo que se le asigna un puntaje de 2.

Basado en la información proporcionada, el paciente obtiene un puntaje total de 13 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar. Un puntaje total de 10-20 puntos se considera leve a moderada discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

8% ■ | 10/126 [04:30<55:57, 28.94s/it]

Entrevista 10

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días. Tengo dolor lumbar desde hace un mes y medio que está interfiriendo significativamente con mi vida diaria. Todo comenzó cuando me agaché para recoger algo del suelo en la oficina y sentí como un tirón fuerte. El dolor es intenso, especialmente por las mañanas y al final del día. Estar de pie es muy problemático, no puedo mantenerme erguido por más de 15-20 minutos sin que el dolor se intensifique considerablemente. Caminar se ha vuelto difícil, puedo hacerlo pero con dolor constante, evito salir a menos que sea necesario. Para las actividades básicas como ducharme o vestirme necesito tomarme mucho más tiempo y hacerlo muy lentamente, a veces mi pareja me ayuda con los zapatos. No puedo levantar nada pesado, incluso las bolsas de la compra me causan dolor. Sentarme también es problemático, especialmente en sillas normales, necesito cojines especiales. He cancelado varios compromisos sociales porque no me siento cómodo fuera de casa. La vida íntima se ha visto muy afectada. El sueño es irregular, me despierto varias veces por el dolor y me cuesta encontrar posiciones cómodas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como intenso y constante, especialmente por las mañanas y al final del día.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede mantenerse de pie por más de 15-20 minutos sin que el dolor se intensifique considerablemente.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar, pero con dolor constante.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita tomarse mucho más tiempo y hacerlo muy lentamente para realizar actividades básicas como ducharse o vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra sentarse problemático, especialmente en sillas normales, y necesita cojines especiales.

7. Viajar: 0 puntos - No se menciona si el paciente viaja o no, pero se describe que ha cancelado compromisos sociales debido al dolor.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado varios compromisos sociales debido al dolor.
9. Actividad sexual: 0 puntos - No se menciona si la actividad sexual ha sido afectada o no.
10. Dormir: 2 puntos - El paciente tiene un sueño irregular y despertarse varias veces por el dolor.

Total: 14 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de 14 indica un nivel moderado a alto de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

9% ■ | 11/126 [04:52<51:06, 26.67s/it]

Entrevista 11

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, vengo por un dolor en la espalda baja que tengo desde hace cinco días. Creo que fue por cargar mal una maleta pesada cuando regresé de viaje. Es un dolor molesto pero manejable. Puedo hacer la mayoría de mis actividades cotidianas sin mayor problema. En el trabajo, que es principalmente de escritorio, puedo estar sentado sin dolor, aunque noto cierta incomodidad después de varias horas seguidas. Caminar es normal, fui ayer al parque con mis hijos y no tuve problemas. Para la higiene personal y vestirme no tengo dificultades. Sí he notado que levantar cosas pesadas me causa molestia, así que he evitado cargar las compras del supermercado. No he tenido que cancelar ningún plan social, aunque sí fui más precavido en una reunión familiar evitando ciertos movimientos. El sueño ha sido bueno, solo noto la molestia al cambiar de posición durante la noche, pero no me despierta. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (el dolor es descrito como molesto pero manejable, lo que sugeriría un nivel de intensidad bajo)

2. Estar de pie: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al andar)

4. Cuidados personales: 0 puntos (el paciente no reporta dificultades para realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 2 puntos (el paciente ha evitado levantar cosas pesadas debido a la molestia que causa)

6. Estar sentado: 1 punto (el paciente puede sentarse sin dolor, pero nota cierta incomodidad después de varias horas)

7. Viajar: 0 puntos (el paciente no reporta problemas al viajar)

- 8. Vida social: 0 puntos (el paciente no ha cancelado planes sociales)
- 9. Actividad sexual: 0 puntos (el paciente no ha reportado problemas en la actividad sexual)
- 10. Dormir: 1 punto (el paciente solo nota molestia al cambiar de posición durante la noche)

Puntuación total: 5 puntos. El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

10% | 12/126 [05:15<48:34, 25.57s/it]

Entrevista 12

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es realmente grave, llevo cuatro meses así y mi calidad de vida se ha deteriorado completamente. El dolor comenzó gradualmente después de una mala caída en las escaleras de mi casa. Ahora el dolor es constante e intenso, una sensación punzante que no me da tregua ni siquiera en reposo. No puedo estar de pie prácticamente nada, máximo 5 minutos antes de que el dolor sea inaguantable. Caminar es extremadamente difícil, uso andador y aún así solo puedo hacerlo distancias muy cortas con mucho sufrimiento. Para las actividades más básicas como bañarme o vestirme necesito ayuda total de mi familia, no puedo hacerlo solo. Levantar cualquier objeto, por más liviano que sea, es imposible. Estar sentado también es muy doloroso, no puedo hacerlo más de 10-15 minutos. He perdido mi trabajo debido a las constantes ausencias. Mi vida social ha desaparecido por completo, no puedo salir de casa. La relación con mi pareja se ha visto severamente afectada en todos los aspectos. El sueño es pésimo, duermo máximo 2-3 horas seguidas antes de que el dolor me despierte, necesito analgésicos muy fuertes. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como constante e intenso, no hay relieve ni en reposo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 5 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita un andador y solo puede caminar cortas distancias con mucho sufrimiento.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda total de su familia para realizar las actividades básicas de la vida diaria.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún objeto.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse pero solo por 10-15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha perdido por completo su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información suficiente en la entrevista para evaluar esta categoría.
10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme máximo 2-3 horas seguidas antes de que el dolor lo despertara.

Basado en la información proporcionada, el paciente presenta una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 1 | Diferencia: 4

10% | 13/126 [05:43<49:45, 26.42s/it]

Entrevista 13

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días, doctor. Llevo dos semanas con molestias en la parte baja de la espalda. Comenzó después de una sesión intensa de ejercicio en el gimnasio, creo que no calenté adecuadamente. Es más una molestia que un dolor propiamente dicho. Puedo trabajar sin problemas, mi trabajo requiere estar de pie atendiendo clientes y no he tenido inconvenientes. Caminar es completamente normal, incluso he seguido con mis caminatas matutinas de 30 minutos. Para mis actividades de cuidado personal no tengo ninguna limitación. He sido más cuidadoso al levantar objetos pesados en el trabajo, pero puedo hacerlo si es necesario. Estar sentado no me causa problemas. Mi vida social no se ha visto afectada para nada, el fin de semana fui a bailar y estuve muy bien. El sueño es normal, ocasionalmente siento la molestia al darme vuelta en la cama, pero no me despierta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia en lugar de un dolor intenso, por lo que se le asigna un punto bajo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido inconvenientes al estar de pie, por lo que no se le asignan puntos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina normalmente, por lo que no se le asignan puntos.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones en sus actividades personales, por lo que no se le asignan puntos.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente ha sido más cuidadoso al levantar objetos pesados, por lo que se le asigna un punto bajo.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que no tiene problemas al sentarse, por lo que no se le asignan puntos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha informado de problemas al viajar, por lo que no se le asignan puntos.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha podido mantener su vida social normal, por lo que no se le asignan puntos.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha informado de problemas en su actividad sexual, por lo que no se le asignan puntos.
10. Dormir: 1 punto - El paciente informa de ocasionalmente sentir molestias al darse vuelta en la cama, por lo que se le asigna un punto bajo.

En total, el paciente obtiene 3 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

11% | 14/126 [06:17<53:30, 28.67s/it]

Entrevista 14

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es muy intenso y me está limitando mucho. Empezó hace seis semanas después de una caída que tuve mientras hacía limpieza en casa, me resbalé con el suelo mojado. El dolor es fuerte y constante, empeora con casi cualquier movimiento. Estar de pie es muy difícil, no puedo hacerlo más de unos pocos minutos sin experimentar dolor severo. Caminar se ha vuelto una tarea muy complicada, necesito descansar frecuentemente y no puedo ir más allá de distancias muy cortas. Para bañarme y vestirme necesito mucha ayuda, no puedo inclinarme ni girar el torso. Levantar objetos es prácticamente imposible, incluso cosas muy ligeras me causan dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, no aguanto más de 15-20 minutos. He faltado al trabajo múltiples veces. Socialmente estoy muy aislado, he cancelado todas mis actividades. La intimidad con mi pareja se ha visto completamente afectada. El sueño es terrible, me despierto cada hora por el dolor, no logro descansar adecuadamente a pesar de tomar medicamentos para dormir. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como fuerte y constante, que empeora con casi cualquier movimiento, lo que indica una intensidad máxima de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie es muy difícil y no puede hacerlo más de unos pocos minutos sin experimentar dolor severo, lo que indica que no puede estar de pie por mucho tiempo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es una tarea muy complicada y necesita descansar frecuentemente, no puede ir más allá de distancias muy cortas, lo que indica que no puede andar por mucho tiempo.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente informa que necesita mucha ayuda para bañarse y vestirse, lo que indica que tiene dificultades moderadas en realizar estas actividades.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que levantar objetos es prácticamente imposible, lo que indica que no puede levantar peso.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que estar sentado también es muy problemático, pero puede aguantar más de 15-20 minutos, lo que indica que puede estar sentado por un poco más de media hora.
7. Viajar: 0 puntos - No se menciona específicamente si el paciente tiene dificultades para viajar, por lo que se asume que no puede viajar por mucho tiempo debido a su dolor.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que está muy aislado socialmente y ha cancelado todas sus actividades, lo que indica que tiene dificultades en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que la intimidad con su pareja se ha visto completamente afectada, lo que indica que tiene dificultades en esta área.
10. Dormir: 0 puntos - El pac

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 4 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

12% | 15/126 [06:40<49:57, 27.01s/it]

Entrevista 15

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo una molestia en la zona lumbar desde hace una semana. Ocurrió después de estar mucho tiempo sentado trabajando en mi computadora en una silla que no es ergonómica. Es más bien una sensación de tensión y rigidez que dolor agudo. Puedo mantenerme de pie sin problemas, trabajo en ventas y paso muchas horas de pie atendiendo clientes. Caminar es completamente normal, no tengo ninguna limitación. Las actividades de aseo personal las hago normalmente, aunque por las mañanas siento un poco más de rigidez que se quita rápidamente. Puedo levantar objetos sin inconvenientes, aunque trato de usar buena técnica para no empeorar. La posición sentada sí me genera un poco de incomodidad después de estar mucho tiempo, especialmente en sillas duras. No he tenido que modificar mis planes sociales. Duermo bien, solo noto la tensión cuando me acuesto inicialmente, pero no interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una sensación de tensión y rigidez en lugar de dolor agudo, por lo que se le asigna un punto bajo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede mantenerse de pie sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es completamente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que puede hacer sus actividades de aseo personal normalmente, aunque tiene un poco más de rigidez por las mañanas.


5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos sin inconvenientes.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que la posición sentada genera un poco de incomodidad después de estar mucho tiempo.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha indicado ninguna limitación en viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido que modificar sus planes sociales.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha proporcionado información relevante sobre su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme bien.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente tiene un total de 2 puntos de discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

13%  | 16/126 [07:06<48:51, 26.65s/it]

Entrevista 16

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha progresado considerablemente en las últimas tres semanas.

Inicialmente era leve después de un mal movimiento en el trabajo, pero ahora es bastante intenso y me limita en muchas actividades. El dolor es punzante y se irradia hacia los glúteos. Estar de pie por períodos prolongados se ha vuelto muy difícil, máximo puedo mantenerme erguido unos 30 minutos antes de necesitar sentarme o recostarme. Caminar largas distancias es problemático, tengo que hacer pausas frecuentes. Para vestirme y bañarme he desarrollado técnicas para evitar agacharme, pero aún me toma considerablemente más tiempo. Levantar objetos pesados es imposible, evito por completo cargar bolsas de compras o mover muebles. Estar sentado por más de 45 minutos se vuelve muy incómodo. He rechazado algunas invitaciones sociales, especialmente aquellas que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar. La intimidad se ha visto afectada por el temor al dolor. El sueño se interrumpe ocasionalmente, necesito cambiar de posición varias veces durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso y limitante, que irradia hacia los glúteos.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente puede mantenerse de pie solo por unos 30 minutos antes de necesitar sentarse o recostarse.

3. Andar: 2 puntos - Caminar largas distancias es problemático y requiere pausas frecuentes.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha desarrollado técnicas para evitar agacharse durante las actividades personales, pero estas toman mucho más tiempo.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente evita completamente levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente se siente incómodo sentado por más de 45 minutos.
7. Viajar: 1 punto - No se especifica si viajar es problemático o no.
8. Vida social: 1 punto - El paciente ha rechazado algunas invitaciones sociales debido a la dificultad de estar mucho tiempo de pie o caminar.
9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad se ha visto afectada por el temor al dolor.
10. Dormir: 2 puntos - El sueño se interrumpe ocasionalmente y necesita cambiar de posición varias veces durante la noche.

Calificación total: 15 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 5 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

13% | 17/126 [07:29<46:39, 25.69s/it]

Entrevista 17

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días, doctor. Vengo porque desde hace cuatro días tengo una leve molestia en la espalda baja. Creo que fue por haber estado pintando el techo de mi cuarto, mantuve el cuello y la espalda en una posición incómoda por varias horas. Es realmente muy leve, más una sensación de tirantez que dolor. Puedo hacer todas mis actividades completamente normal. En mi trabajo de oficina no tengo ningún problema para estar sentado las horas normales. Caminar, correr, hacer ejercicio, todo lo hago sin inconvenientes. Mis rutinas de higiene y cuidado personal son exactamente iguales que siempre. Puedo cargar objetos normalmente, ayer ayudé a un amigo a cargar unas cajas y no tuve problemas. No he tenido que modificar ningún plan social, el fin de semana fui a un concierto donde estuve de pie varias horas y me sentí bien. Duermo perfectamente, a veces siento una ligera molestia al cambiar de posición, pero es mínima. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve molestia o sensación de tirantez, pero no es una sensación de dolor intenso.

2. Estar de pie: 0 puntos - No hay problemas reportados al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - No hay problemas reportados al caminar, correr o hacer ejercicio.

4. Cuidados personales: 0 puntos - Las rutinas de higiene y cuidado personal siguen siendo exactas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha levantado objetos normalmente sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no ha reportado problemas al sentarse durante las horas normales en el trabajo.
7. Viajar: 0 puntos - El fin de semana, el paciente pudo viajar a un concierto y no tuvo problemas.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tuvo que modificar ningún plan social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información sobre problemas reportados en esta área.
10. Dormir: 1 punto - El paciente reporta una ligera molestia al cambiar de posición al dormir, pero es mínima.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta un puntaje total de 2 puntos, lo que indica un funcionamiento normal en la mayoría de las actividades evaluadas.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

14% | 18/126 [07:57<47:27, 26.37s/it]

Entrevista 18

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es realmente severa y ha empeorado drásticamente en el último mes. Todo comenzó hace tres meses con una lesión laboral, pero ahora el dolor es extremo y constante. Es un dolor punzante y quemante que no me da respiro ni un segundo. No puedo estar de pie absolutamente nada, incluso intentar pararme me causa dolor insoportable. Caminar es imposible, uso silla de ruedas para moverme. Para todas las actividades básicas como bañarme, vestirme, ir al baño, necesito asistencia completa de cuidadores. No puedo levantar nada, ni siquiera un vaso de agua. Estar sentado también es extremadamente doloroso, solo puedo hacerlo por muy pocos minutos con muchos cojines. He perdido mi empleo y mi independencia completamente. No tengo vida social, no puedo salir de casa. Mi relación de pareja se ha visto destruida por esta situación. El sueño es inexistente, paso las noches despierto por el dolor constante, incluso con medicamentos muy fuertes apenas logro dormir una hora seguida. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo) - El paciente describe un dolor extremo y constante, que impide que pueda estar de pie ni caminar, y lo obliga a utilizar una silla de ruedas. El paciente no puede realizar actividades básicas de la vida diaria sin asistencia y no puede levantar nada, ni siquiera un vaso de agua. El paciente no puede estar sentado por mucho tiempo y no tiene vida social ni relación sexual. El dolor interfiere gravemente en su dormido, haciendo que quede despertado durante las noches.

2. Estar de pie: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede estar de pie debido al dolor.
3. Andar: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede caminar.
4. Cuidados personales: 5 puntos (Máximo) - El paciente necesita asistencia completa para realizar todos los cuidados personales básicos.
5. Levantar peso: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede levantar nada.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por muy pocos minutos y con muchos cojines.
7. Viajar: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede viajar.
8. Vida social: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no tiene vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede tener relaciones sexuales.
10. Dormir: 0 puntos (Mínimo) - El paciente no puede dormir debido al dolor constante.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0

15% | 19/126 [08:32<51:10, 28.70s/it]

Entrevista 19

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo dolor en la zona lumbar desde hace diez días que me está causando dificultades moderadas. Comenzó después de ayudar a mi hijo a mudarse, estuve cargando muebles pesados sin la técnica adecuada. El dolor es constante pero variable en intensidad, algunos momentos es más tolerable que otros. Estar de pie por períodos largos se ha vuelto complicado, en mi trabajo tengo que alternar entre estar sentado y de pie más frecuentemente. Caminar distancias normales no es problema, pero sí evito caminatas largas que antes disfrutaba. Para las actividades de cuidado personal he tenido que modificar mi rutina, me baño más rápido y evito inclinarme mucho. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, le pido ayuda a otros para las compras. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve incómodo, especialmente en sillas duras. He declinado algunas invitaciones que implican

- actividades físicas. La vida íntima se ha visto algo afectada por precaución. El sueño se interrumpe ocasionalmente cuando me muevo bruscamente durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como constante y variable, lo que indica un grado moderado de intensidad.
2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente tiene dificultades al estar de pie por largos períodos, lo que sugiere una limitación moderada en esta área.
3. Andar: 1 punto - El paciente no reporta problemas para caminar distancias normales, por lo que no se aplica puntos en este ítem.
4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente ha tenido que modificar su rutina de cuidados personales, lo que indica una limitación moderada.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados y necesita ayuda, lo que corresponde a una limitación total en este ítem.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra incómodo sentarse por mucho tiempo, especialmente en sillas duras, lo que sugiere una limitación moderada.
7. Viajar: 1 punto - El paciente no reporta problemas específicos para viajar, por lo que no se aplica puntos en este ítem.
8. Vida social: 1 punto - El paciente ha declinado algunas invitaciones debido a las limitaciones físicas, pero no especifica problemas generales en su vida social, por lo que se le asigna un punto.
9. Actividad sexual: 1 punto - El paciente ha indicado que la vida sexual ha sido afectada por precaución, pero no especifica problemas graves, por lo que se le asigna un punto.
10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que el sueño se interrumpe ocasionalmente, pero no especifica problemas graves con el sueño, por lo que se le asigna un punto.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 11 puntos (4+2+1+0+2+1+1+1). Un puntaje total

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

16% | 20/126 [08:57<48:44, 27.59s/it]

Entrevista 20

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor lumbar que tengo es severo y está afectando gravemente mi vida diaria desde hace dos meses. Comenzó después de levantar una caja pesada en el trabajo de forma incorrecta. El dolor es intenso y constante, siento como si tuviera cuchillos clavados en la espalda baja. Estar de pie es extremadamente difícil, no puedo hacerlo más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

- Caminar es una tortura, necesito bastón y aún así solo puedo recorrer distancias muy cortas. Para bañarme y vestirme necesito ayuda de mi familia, no puedo inclinarme ni hacer movimientos de rotación. Levantar cualquier objeto, incluso muy liviano, me causa dolor severo. Estar sentado también es problemático, no puedo hacerlo más de 20 minutos seguidos. He faltado al trabajo constantemente y temo perder mi empleo. Mi vida social prácticamente no existe, he cancelado todos los compromisos. La relación íntima con mi pareja se ha visto severamente afectada. Duermo muy mal, me despierto múltiples veces por la noche debido al dolor, necesito medicamentos fuertes para poder descansar algo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso y constante, con sensación de cuchillos clavados en la espalda baja.
2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede hacerlo más de 10 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.
3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita bastón y solo puede recorrer distancias muy cortas.
4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda de su familia para bañarse y vestirse.
5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, incluso livianos.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no puede hacerlo más de 20 minutos seguidos.
7. Viajar: No se mencionó.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado todos los compromisos.
9. Actividad sexual: 5 puntos - No se especificó si está afectada, pero se mencionó que la relación íntima se ha visto severamente afectada.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y necesita medicamentos fuertes para poder descansar.

El total de puntos obtenidos por el paciente es de 25 puntos, lo que corresponde a una discapacidad severa según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

17% | 21/126 [09:11<41:37, 23.78s/it]

Entrevista 21

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una molestia leve en la espalda baja desde hace una semana. Empezó después de estar varias horas trabajando en el jardín, removiendo tierra y plantando. Es más una sensación de rigidez matutina que dolor propiamente dicho. Durante el día, especialmente cuando estoy activo, la molestia desaparece casi completamente. Puedo estar de pie sin problemas, trabajo como maestro y paso

muchas horas de pie enseñando. Caminar es completamente normal, incluso he continuado con mis ejercicios de rutina. Las actividades de higiene personal las realizo normalmente, solo por las mañanas siento un poco más de rigidez. Puedo levantar objetos sin problemas, aunque he sido más consciente de usar buena postura. Estar sentado no me causa molestias. Mi vida social continúa igual, no he tenido que cancelar ningún plan. El sueño es bueno, ocasionalmente noto la rigidez al levantarme, pero no me despierta durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve molestia o sensación de rigidez, sin necesidad de medicación.

2. Estar de pie: 0 puntos - Normal.
3. Andar: 0 puntos - Normal.
4. Cuidados personales: 0 puntos - Normal.
5. Levantar peso: 0 puntos - Normal.
6. Estar sentado: 0 puntos - Normal.
7. Viajar: 0 puntos - Normal.
8. Vida social: 0 puntos - Normal.
9. Actividad sexual: 0 puntos - Normal.
10. Dormir: 0 puntos - Normal.

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, basado en la información proporcionada por el paciente, se puede evaluar que su puntuación total es de 0 puntos, lo que indica un funcionamiento normal en todos los aspectos evaluados.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

17% | 22/126 [09:40<43:41, 25.21s/it]

Entrevista 22

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha evolucionado a algo bastante problemático en las últimas cinco semanas. Inicialmente era solo una molestia después de un día largo de trabajo físico, pero ahora interfiere significativamente con mis actividades. El dolor es moderadamente intenso y persistente. Estar de pie por más de 20-30 minutos se vuelve muy incómodo, tengo que buscar apoyo o sentarme. Caminar distancias largas es difícil, evito ir a centros comerciales o hacer recorridos largos. Para vestirme y bañarme necesito más tiempo y cuidado, especialmente para ponerme los zapatos y calcetines. Levantar objetos pesados es imposible, he delegado esas tareas a otros. Estar sentado por períodos prolongados también se vuelve

incómodo, especialmente en el trabajo donde paso muchas horas frente a la computadora. He comenzado a declinar invitaciones que requieren mucha actividad física. La intimidad se ha visto afectada por el temor a empeorar el dolor. El sueño se interrumpe regularmente, tengo que cambiar de posición frecuentemente y a veces me despierto por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderadamente intenso y persistente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie por 20-30 minutos es incómodo.

3. Andar: 2 puntos - El paciente encuentra difícil caminar largas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra incómodo sentarse por períodos prolongados, especialmente en el trabajo.

7. Viajar: 1 punto - El paciente evita ir a centros comerciales o hacer recorridos largos.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha declinado invitaciones que requieren mucha actividad física.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La intimidad se ha visto afectada por el temor a empeorar el dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño se interrumpe regularmente y el paciente tiene que cambiar de posición frecuentemente o despertarse por el dolor.

Según la Escala Oswestry, el puntaje total obtenido por el paciente es 15 puntos. La escala va desde 0 a 50 puntos, con 0 puntos representando no discapacidad y 50 puntos representando una discapacidad máxima. Por lo tanto, el paciente presenta una discapacidad moderada lumbar según las respuestas proporcionadas.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

18% | 23/126 [10:17<49:09, 28.64s/it]

Entrevista 23

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, desde hace tres días tengo una ligera molestia en la parte baja de la espalda. Ocurrió después de dormir en el sofá viendo una película, desperté con esta sensación de tirantez. Es realmente muy leve, casi imperceptible durante el día cuando estoy ocupado. Puedo trabajar normalmente, no he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina laboral. Caminar, subir escaleras, hacer ejercicio ligero, todo lo realizo sin ningún problema. Mis actividades de cuidado personal son exactamente las mismas de siempre. Puedo levantar objetos normalmente, ayer cargué las bolsas del supermercado sin inconvenientes. Estar sentado es completamente cómodo. No he tenido que cancelar ningún plan social, el fin de semana

salí con amigos y estuve perfectamente bien. Duermo bien, solo al levantarme por las mañanas noto una ligera rigidez que desaparece en pocos minutos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como leve y casi imperceptible durante el día, por lo que según los criterios de la Escala Oswestry, se le asigna un puntaje de 0 puntos.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar sin problemas y subir escaleras es posible, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente describe que andar normalmente y realizar ejercicios ligeros sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que sus actividades de cuidado personal son exactamente las mismas de siempre, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos normalmente, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado es cómodo, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido que cancelar ningún plan social y ha viajado sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que ha ido a salir con amigos y ha estado bien, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.


9. Actividad sexual: 0 puntos - No se informa ninguna restricción en la actividad sexual, por lo que se le asigna un puntaje de 0 puntos.

10. Dormir: 1 punto - El paciente informa que solo al levantarse por las mañanas nota una ligera rigidez que desaparece rápidamente, por lo que se le asigna un puntaje de 1 punto.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry es de 1 punto, lo que indica un funcionamiento generalmente normal.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

19%  | 24/126 [10:43<47:32, 27.96s/it]

Entrevista 24

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es extremadamente severo y ha destruido completamente mi calidad de vida en los últimos cinco meses. Comenzó con una hernia discal que se complicó después de una cirugía fallida. El dolor es constante, intenso y debilitante, como si tuviera fuego en la espalda las 24 horas del día. No puedo estar de pie ni un minuto, inmediatamente siento dolor insoportable. Caminar es imposible, estoy confinado a una silla de ruedas. Para todas las actividades básicas como bañarme, vestirme, usar el baño, necesito cuidado completo de enfermeras. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera objetos de unos gramos. Estar sentado también es agonizante, solo puedo hacerlo por minutos muy cortos con múltiples cojines y medicamentos. He perdido mi trabajo, mi independencia y mi dignidad. No tengo vida social alguna, estoy completamente aislado. Mi matrimonio está en crisis por esta situación. No duermo prácticamente nada, paso las noches en vela por el dolor constante, incluso con morfina el alivio es mínimo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (Máximo) - El paciente describe el dolor como extremadamente severo y constante, no puede estar de pie ni sentado por mucho tiempo debido al dolor, y no puede realizar ninguna actividad básica sin ayuda.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar.

4. Cuidados personales: 5 puntos (Máximo) - El paciente requiere cuidados completo de enfermeras para realizar todas las actividades básicas.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar ningún peso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por cortos períodos de tiempo con muchos cojines y medicamentos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su estado actual.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social alguna.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha mencionado ninguna actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme prácticamente nada.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 25 puntos (5 puntos por cada ítem). Esto indica una alta discapacidad lumbar y un grave impacto en la calidad de vida del paciente.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, tengo dolor lumbar moderado desde hace tres semanas que está interfiriendo bastante con mis actividades diarias. Comenzó gradualmente después de pasar un fin de semana ayudando a renovar la casa de mis padres, cargando materiales y trabajando en posiciones incómodas. El dolor es persistente y se intensifica con ciertos movimientos. Estar de pie por más de 15-20 minutos se vuelve muy incómodo, tengo que buscar donde apoyarme o sentarme. Caminar largas distancias es problemático, evito ir al centro comercial o hacer caminatas. Para bañarme y vestirme necesito más tiempo y mucho cuidado, especialmente para ponerme los calcetines. Levantar objetos pesados es muy difícil, he dejado de cargar las bolsas de compras. Estar sentado por más de una hora se vuelve incómodo, especialmente en el trabajo. He cancelado algunos planes sociales que implican estar mucho tiempo de pie. La intimidad se ha visto afectada por miedo a empeorar. El sueño se interrumpe, me despierto 2-3 veces por la noche debido al dolor al cambiar de posición. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe un dolor lumbar moderado a intenso que persiste y se intensifica con ciertos movimientos.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente se encuentra incómodo después de estar de pie por 15-20 minutos.

3. Andar: 2 puntos - Caminar largas distancias es problemático para el paciente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente ha dejado de cargar bolsas de compras debido a la dificultad de levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente se encuentra incómodo después de estar sentado por más de una hora.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha cancelado planes sociales que implican estar mucho tiempo de pie.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado algunos planes sociales.

9. Actividad sexual: 4 puntos - La intimidad se ha visto afectada por miedo a empeorar.

10. Dormir: 3 puntos - El sueño se interrumpe y el paciente despierta 2-3 veces por la noche debido al dolor.

Calificación total: 25 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, una puntuación total entre 0 y 10 puntos indica un bajo nivel de discapacidad, 11-20 puntos un moderado nivel, y 21 o más puntos un alto nivel de discapacidad. En este caso, el paciente presenta un nivel moderado a alto de discapacidad lumbar (puntuación total de 25).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

Entrevista 26

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, vengo por una molestia muy leve en la espalda baja que tengo desde hace seis días. Empezó después de una clase de yoga donde probablemente forcé demasiado una postura nueva. Es más una sensación de tensión que dolor real. Puedo hacer absolutamente todas mis actividades normales sin restricciones. En mi trabajo de pie como vendedor no tengo ningún problema. Caminar, correr, hacer ejercicio, todo completamente normal. Mis rutinas de cuidado personal son idénticas a siempre. Puedo cargar objetos pesados sin problemas, ayer moví muebles en casa. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada para nada, el fin de semana fui a bailar y me sentí excelente. Duermo perfectamente, a veces noto una ligera tensión al acostarme inicialmente, pero no me molesta. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - No reporta dolor, solo sensación de tensión.

2. Estar de pie: 0 puntos - No reporta problemas al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - No reporta problemas al caminar, correr o hacer ejercicio.

4. Cuidados personales: 0 puntos - No reporta cambios en sus rutinas de cuidado personal.

5. Levantar peso: 0 puntos - No reporta problemas al levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 0 puntos - Reporta que estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - No reporta problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - Reporta que su vida social no ha sido afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No mencionó ningún problema en esta área.

10. Dormir: 1 punto - Reporta una ligera tensión al acostarse inicialmente, pero no molesta.

Total: 1 punto.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una puntuación total de 1 punto, lo que indica un bajo grado de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

Entrevista 27

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es muy severo y me está incapacitando considerablemente desde hace seis semanas. Todo comenzó con un accidente automovilístico menor, pero el dolor ha ido empeorando progresivamente. Es un dolor constante, punzante e intenso que me acompaña todo el día. No puedo estar de pie más de 5-10 minutos sin experimentar dolor severo que me obliga a sentarme o acostarme. Caminar es extremadamente difícil, uso bastón y aún así solo puedo recorrer distancias muy cortas con gran esfuerzo. Para las actividades básicas como ducharme necesito una silla especial y ayuda parcial, vestirme me toma el triple de tiempo normal. Levantar cualquier objeto, incluso muy liviano como un libro, me causa dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin gran incomodidad. He faltado al trabajo casi completamente el último mes. Mi vida social está completamente cancelada, no puedo salir de casa. La relación íntima está muy afectada. Duermo terriblemente, me despierto cada hora por el dolor, necesito medicamentos fuertes que apenas me dan alivio temporal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso y constante que lo acompaña todo el día, lo que lo impide estar de pie durante más de 5-10 minutos y caminar con mucho esfuerzo.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-10 minutos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente tiene muchas dificultades para caminar y necesita un bastón.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita una silla especial y ayuda parcial para realizar actividades básicas como ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente experimenta dolor intenso al levantar cualquier objeto, incluyendo cosas livianas como un libro.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente puede sentarse solo durante 15 minutos sin gran incomodidad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha faltado al trabajo casi completamente el último mes y su vida social está completamente cancelada, lo que sugiere que viajar es una actividad que no puede realizar.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente está completamente cancelada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima está muy afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme terriblemente y necesita medicamentos fuertes que apenas le dan alivio temporal.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 11 puntos (0-47 puntos). Esto indica un nivel alto de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

Entrevista 28

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, desde hace una semana y media tengo dolor en la zona lumbar que me está causando algunas limitaciones. Comenzó después de cargar unas cajas pesadas durante una mudanza. El dolor es moderado y bastante constante durante el día. Estar de pie por períodos largos se ha vuelto incómodo, en mi trabajo de cajera tengo que cambiar de posición más frecuentemente. Caminar distancias normales no es gran problema, pero evito caminatas largas que antes hacía regularmente. Para vestirme y bañarme he tenido que ser más cuidadosa, especialmente al inclinarme hacia adelante. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, he tenido que pedir ayuda para las compras. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve molesto, especialmente sin respaldo adecuado. He declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física como senderismo. La vida íntima se ha visto algo comprometida por precaución. El sueño se ve interrumpido ocasionalmente, especialmente cuando me muevo durante la noche, pero logro volver a dormir. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra inconveniente estar de pie por períodos largos.
3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias normales, pero evita caminatas largas.
4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que ser más cuidadosa al vestirse y bañarse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra inconveniente sentarse por mucho tiempo, especialmente sin respaldo adecuado.
7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha declinado invitaciones que requieren mucha actividad física.
8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado invitaciones.
9. Actividad sexual: 2 puntos - La vida sexual ha sido algo comprometida por precaución.
10. Dormir: 2 puntos - El sueño se ve interrumpido ocasionalmente.

Calificación total: 18 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (10-40 puntos) según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3

23% | 29/126 [12:40<36:18, 22.46s/it]

Entrevista 29

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es crítica y ha empeorado dramáticamente en los últimos dos meses. Inicialmente era manejable después de una lesión deportiva, pero ahora es absolutamente debilitante. El dolor es extremo, constante e implacable, como si tuviera vidrios molidos en la columna. No puedo estar de pie ni siquiera por segundos, cualquier intento de pararme resulta en dolor insoportable. Caminar es completamente imposible, estoy confinado a silla de ruedas para cualquier movimiento. Para absolutamente todas las actividades básicas - bañarme, vestirme, usar el baño - requiero asistencia total de cuidadores profesionales. No puedo levantar nada, ni siquiera una hoja de papel. Estar sentado es agonizante, solo puedo hacerlo por minutos muy cortos con múltiples almohadones y medicación previa. He perdido mi trabajo, mi independencia y mi autoestima. No existe vida social alguna, estoy completamente aislado del mundo. Mi relación de pareja se ha desintegrado. El sueño es inexistente, paso las noches en agonía constante, incluso con opioides fuertes el alivio es mínimo y temporal. [/INST]

1. Intensidad dolor: 5 puntos (extremo y constante)
2. Estar de pie: 0 puntos (imposible)
3. Andar: 0 puntos (imposible)
4. Cuidados personales: 5 puntos (requiere asistencia total)
5. Levantar peso: 0 puntos (imposible)
6. Estar sentado: 2 puntos (agonizante, solo cortas duraciones)
7. Viajar: 0 puntos (imposible)
8. Vida social: 0 puntos (completamente aislado del mundo)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no aplicable, dada la falta de vida social)
10. Dormir: 0 puntos (inexistente)

La puntuación total es de 12 puntos, lo que indica una discapacidad severa según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

24% | 30/126 [12:57<33:09, 20.72s/it]

Entrevista 30

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una leve molestia en la espalda baja desde hace cuatro días. Creo que fue por pasar muchas horas encorvado trabajando en mi laptop desde la cama durante el fin de semana. Es más una sensación de rigidez que dolor propiamente dicho. Puedo realizar todas mis actividades laborales sin ningún problema, trabajo en oficina y no he tenido que hacer ajustes. Caminar, subir escaleras, hacer mi rutina de ejercicios, todo normal. Las actividades de higiene personal las hago igual que siempre, sin restricciones. Puedo levantar objetos sin dificultad, ayer ayudé a cargar muebles. Estar sentado es cómodo, aunque trato de mantener mejor postura. Mi vida social continúa igual, no he cancelado ningún plan. Duermo bien, solo noto la rigidez al levantarme por las mañanas, pero se quita rápidamente con movimiento. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (mínimo dolor o ninguno).

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay dificultad).
3. Andar: 0 puntos (no hay dificultad).
4. Cuidados personales: 0 puntos (no hay dificultad).
5. Levantar peso: 0 puntos (no hay dificultad).
6. Estar sentado: 1 punto (ligeramente cómodo).
7. Viajar: 0 puntos (no hay dificultad).
8. Vida social: 0 puntos (no hay restricción).
9. Actividad sexual: 0 puntos (no hay dificultad).
10. Dormir: 1 punto (mínimo problema, solo rigidez al despertar).

En total, el paciente tiene una puntuación de 3 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, lo que indica un funcionamiento generalmente normal con un mínimo de problemas relacionados con la espalda.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

25% [REDACTED] | 31/126 [13:29<38:09, 24.10s/it]

Entrevista 31

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor en mi espalda baja es bastante intenso y me está limitando significativamente desde hace un mes. Comenzó después de una mala caída en el hielo, inicialmente pensé que era solo un golpe, pero ha empeorado. El dolor es fuerte y constante, con episodios de dolor punzante. Estar de pie es muy problemático, no puedo hacerlo más de 10-15 minutos sin dolor severo. Caminar se ha vuelto muy difícil, uso bastón para distancias cortas y evito salir innecesariamente. Para bañarme necesito una silla de ducha y para vestirme requiero ayuda con zapatos y calcetines. Levantar objetos es prácticamente imposible, incluso cosas ligeras me causan dolor intenso. Estar sentado también es muy incómodo, especialmente sin cojines especiales, no aguanto más de 20 minutos. He faltado al trabajo frecuentemente. Socialmente estoy muy limitado, he cancelado la mayoría de mis compromisos. La intimidad se ha visto severamente afectada. El sueño es muy malo, me despierto múltiples veces por el dolor, necesito medicamentos para dormir que me ayudan parcialmente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como fuerte y constante, con episodios de dolor punzante, lo que indica una intensidad alta de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede hacerlo más de 10-15 minutos sin dolor severo.
3. Andar: 0 puntos - El paciente utiliza un bastón para cortas distancias y evita salir innecesariamente debido al dolor.
4. Cuidados personales: 2-3 puntos - El paciente necesita asistencia para bañarse y vestirse, lo que puede indicar una dificultad moderada en realizar estas tareas.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos, incluso cosas ligeras, lo que indica una incapacidad total.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no aguanta más de 20 minutos sentado, lo que indica una incapacidad total.
7. Viajar: No se mencionó en la entrevista.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente está muy limitado socialmente y ha cancelado la mayoría de sus compromisos.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad se ha visto severamente afectada.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente tiene malos sueños y necesita medicamentos para dormir, lo que indica una incapacidad total.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su estado actual según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es probablemente alto. El paciente presenta una incapacidad significativa en la mayoría de las áreas evaluadas, lo que sugiere una discapacidad moderada a grave. Es recomendable que el paciente se evalúe por un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2

25% [REDACTED] | 32/126 [13:53<38:01, 24.27s/it]

Entrevista 32

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo una molestia menor en la zona lumbar desde hace cinco días. Ocurrió después de estar mucho tiempo agachado limpiando el garaje. Es una sensación más de tensión muscular que dolor agudo. Puedo trabajar normalmente, no he tenido que hacer ningún cambio en mi rutina laboral de oficina. Caminar es completamente normal, incluso continúo con mis caminatas diarias. Las actividades de cuidado personal las realizo sin restricciones, aunque por las mañanas siento un poco más de rigidez. Puedo levantar objetos normalmente, solo soy más consciente de usar buena técnica. Estar sentado no me causa problemas. No he tenido que modificar ningún plan social. Duermo bien, ocasionalmente siento la tensión al cambiar de posición, pero no me despierta ni interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia menor, similar a tensión muscular, por lo que el nivel de dolor se clasificaría en el rango 0-2 puntos. Sin embargo, el paciente no especificó un número exacto, por lo que se asume un valor de 1 punto como una estimación conservadora.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar es completamente normal.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar es normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que realiza todos los cuidados personales sin restricciones.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede levantar objetos normalmente.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que sentarse no le causa problemas.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no mencionó restricciones en viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que no ha tenido que modificar ningún plan social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no mencionó problemas en la actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme bien.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 1 punto. La baja puntuación total indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

26% | 33/126 [14:21<39:14, 25.31s/it]

Entrevista 33

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar ha progresado a un nivel muy preocupante en las últimas seis semanas. Inicialmente era tolerable después de un incidente en el trabajo, pero ahora interfiere severamente con mi vida diaria. El dolor es intenso, constante y se irradia hacia las piernas. Estar de pie es extremadamente difícil, máximo 10 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es una lucha constante, necesito descansar frecuentemente y uso bastón para apoyo. Para las actividades básicas como ducharme y vestirme necesito mucha ayuda, no puedo inclinarme ni hacer movimientos de rotación. Levantar cualquier objeto, por liviano que sea, me causa dolor severo. Estar sentado también es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin gran incomodidad. He estado ausente del trabajo la mayor parte del tiempo. Mi vida social prácticamente no existe, he cancelado todo. La relación íntima está completamente afectada por el dolor. Duermo muy mal, me despierto cada 1-2 horas por el dolor, incluso con medicamentos fuertes el alivio es mínimo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como intenso, constante y radicado en las piernas, lo que indica un nivel alto de dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10 minutos antes de que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita descansar frecuentemente y utiliza un bastón para caminar, lo que indica una dificultad extrema en la locomoción.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita mucha ayuda para realizar actividades básicas como ducharse y vestirse.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente experimenta dolor severo al levantar cualquier objeto, lo que indica una gran dificultad en este aspecto.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente solo puede sentarse por 15 minutos sin gran incomodidad.

7. Viajar: No se menciona en la entrevista.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha cancelado toda su vida social debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación íntima está completamente afectada por el dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta frecuentemente por el dolor, incluso con medicamentos fuertes.

Basado en la información proporcionada, el paciente presenta una discapacidad lumbar severa, con un total de 35 puntos en la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

27% [REDACTED] | 34/126 [14:40<35:39, 23.25s/it]

Entrevista 34

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, desde hace una semana tengo una molestia leve en la parte baja de la espalda. Comenzó después de pasar el día completo trabajando en el jardín, plantando y podando. Es más una sensación de cansancio muscular que dolor. Puedo mantenerme de pie sin problemas durante mi jornada laboral completa. Caminar es totalmente normal, he seguido con mis rutinas de ejercicio habituales. Para mis actividades de higiene y cuidado personal no tengo ninguna limitación. Puedo levantar objetos sin inconvenientes, aunque trato de mantener buena postura por precaución. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada, el fin de semana salí a cenar y al cine sin problemas. Duermo bien, solo al levantarme por las mañanas siento un poco de rigidez que desaparece rápidamente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve cansancio muscular sin dolor real.

2. Estar de pie: 0 puntos - Puede mantenerse de pie durante su jornada laboral completa sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - Caminar es totalmente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - No tiene limitaciones para sus actividades de higiene y cuidado personal.

5. Levantar peso: 0 puntos - Puede levantar objetos sin inconvenientes.

6. Estar sentado: 0 puntos - Estar sentado es cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - Su vida social no se ha visto afectada, ha salido a cenar y al cine sin problemas.

8. Vida social: 0 puntos - Vida social normal.

9. Actividad sexual: No se mencionó en la entrevista.

10. Dormir: 0 puntos - Duerme bien.

Puntuación total: 1 punto.

La puntuación total de 1 indica un estado funcional relativamente normal según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

28% [REDACTED] | 35/126 [15:05<36:02, 23.76s/it]

Entrevista 35

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, el dolor lumbar que tengo es realmente severo y está destruyendo mi calidad de vida desde hace tres meses. Comenzó con una lesión en el gimnasio que no fue tratada adecuadamente y se ha complicado. El dolor es extremo, constante e incapacitante, siento como descargas eléctricas en la espalda. No puedo estar de pie prácticamente nada, incluso intentar pararme me causa dolor insoportable que me hace gritar. Caminar es imposible sin asistencia, uso andador y aún así es agonizante. Para todas las actividades básicas - bañarme, vestirme, usar el baño - necesito ayuda completa de mi familia. No puedo levantar absolutamente nada, ni siquiera un papel. Estar sentado es tortuoso, solo puedo hacerlo por pocos minutos con múltiples cojines y medicación previa. He perdido mi trabajo y mi independencia total. No tengo vida social, estoy confinado en casa. Mi matrimonio está en crisis por esta situación. No duermo, paso las noches despierto por el dolor constante, incluso con medicamentos muy fuertes apenas obtengo alivio momentáneo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como extremo, constante, incapacitante, y comparándolo a descargas eléctricas.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por mucho que intente, ya que el simple acto de intentarlo causa dolor insoportable.

3. Andar: 0 puntos - El paciente requiere asistencia para caminar y utiliza un andador.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita completa ayuda de su familia para realizar tareas básicas de higiene y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera un papel.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por pocos minutos y con la necesidad de múltiples cojines y medicación previa.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su incapacidad para caminar y el dolor constante.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social debido a su confinamiento en casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay información suficiente en la entrevista para evaluar la actividad sexual del paciente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no duerme y pasa las noches despierto debido al dolor constante, incluso con medicamentos fuertes.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

29% [REDACTED] | 36/126 [15:27<35:04, 23.38s/it]

Entrevista 36

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, tengo dolor moderado en la zona lumbar desde hace dos semanas que me está causando algunas dificultades. Empezó después de un viaje largo en autobús donde estuve sentado en una posición incómoda por muchas horas. El dolor es persistente pero variable en intensidad. Estar de pie por más de 30 minutos se vuelve incómodo, tengo que buscar apoyo o cambiar de posición. Caminar distancias moderadas es posible pero evito caminatas largas que antes disfrutaba. Para vestirme y bañarme necesito más cuidado y tiempo, especialmente para ponerme los zapatos. Levantar objetos pesados es difícil, he dejado que otros carguen las compras. Estar sentado por períodos prolongados también se vuelve molesto, especialmente en sillas duras. He declinado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie o caminar. La intimidad se ha visto algo afectada por precaución. El sueño se interrumpe ocasionalmente cuando cambio de posición bruscamente durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor como moderado.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente encuentra que estar de pie por más de 30 minutos es incómodo.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente encuentra difícil levantar objetos pesados y ha dejado que otros carguen las compras.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente encuentra que sentarse por períodos prolongados es molesto, especialmente en sillas duras.

7. Viajar: 3 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones que implican estar mucho tiempo de pie o caminar.

8. Vida social: 2 puntos - The patient has declined some social invitations.

9. Actividad sexual: 3 puntos - The patient reports that intimacy has been affected to some degree by caution.

10. Dormir: 2 puntos - The patient's sleep is occasionally interrupted by changing positions during the night.

Total: 22 puntos. The patient's total score is 22 points, which falls within the moderate disability range on the Oswestry Disability Index.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

29% [REDACTED] | 37/126 [15:51<34:54, 23.53s/it]

Entrevista 37

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, vengo por una molestia muy leve en la espalda baja que tengo desde hace tres días.

Creo que fue por dormir en una cama diferente durante un viaje de trabajo. Es realmente mínimo, más una sensación de tirantez que dolor. Puedo hacer absolutamente todo normal en mi trabajo que requiere estar de pie muchas horas. Caminar, correr, hacer ejercicio, completamente normal. Mis rutinas de cuidado personal son exactamente iguales que siempre. Puedo cargar objetos pesados sin problema alguno. Estar sentado es totalmente cómodo. Mi vida social no se ha visto afectada en lo más mínimo. Duermo perfectamente, solo al despertar noto una ligera rigidez que desaparece inmediatamente con el primer movimiento. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como mínimo y menciona que es más una sensación de tirantez que un dolor.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede hacer absolutamente todo normal en su trabajo que requiere estar de pie durante muchas horas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar, correr y hacer ejercicio están completamente normal.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que sus rutinas de cuidado personal siguen siendo exactamente iguales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede cargar objetos pesados sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que estar sentado es totalmente cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no menciona problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su vida social no se ha visto afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se mencionó información relevante en este apartado.

10. Dormir: 1 punto - El paciente solo nota una ligera rigidez al despertar, que desaparece inmediatamente.

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtuvo un puntaje de 1 punto en total, lo que indica una baja discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 38

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es bastante severo y me está limitando considerablemente desde hace siete semanas. Todo comenzó gradualmente después de una serie de trabajos de jardinería intensos, pero ha empeorado progresivamente. El dolor es fuerte, constante y punzante. Estar de pie es muy problemático, no puedo hacerlo más de 15 minutos sin experimentar dolor significativo. Caminar se ha vuelto difícil, evito salir y cuando lo hago necesito descansar frecuentemente. Para bañarme necesito una silla especial y para vestirme requiero ayuda con zapatos y calcetines porque no puedo inclinarme. Levantar objetos pesados es imposible, incluso cosas moderadamente pesadas me causan dolor intenso. Estar sentado también es problemático, especialmente sin soporte lumbar, no aguanto más de 30 minutos. He faltado al trabajo varias veces. Mi vida social se ha reducido significativamente, he cancelado muchos planes. La relación íntima se ha visto muy afectada. El sueño es irregular, me despierto 2-3 veces por la noche debido al dolor al moverme. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como fuerte, constante y punzante.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede hacerlo más de 15 minutos sin experimentar dolor significativo.

3. Andar: 1 punto - Caminar se ha vuelto difícil y el paciente evita salir y necesita descansar frecuentemente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse debido a la dificultad de inclinarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente describe que levantar objetos pesados es imposible.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente no aguanta más de 30 minutos sentado sin soporte lumbar.

7. Viajar: 0 puntos - No se menciona específicamente el problema con el viajar en esta entrevista.

8. Vida social: 2 puntos - La vida social se ha reducido significativamente.

9. Actividad sexual: 1 punto - La relación íntima se ha visto muy afectada.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño es irregular y el paciente despierta 2-3 veces por la noche debido al dolor.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

Entrevista 39

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Buenos días doctor, tengo una molestia menor en la zona lumbar desde hace ocho días. Empezó después de pasar varias horas limpiando ventanas, estuve estirándome y en posiciones incómodas. Es más una sensación de cansancio muscular que dolor real. Puedo trabajar completamente normal, no he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina. Caminar es totalmente normal, continúo con mis actividades físicas habituales. Las actividades de cuidado personal las realizo sin ninguna restricción. Puedo levantar objetos normalmente, ayer moví cajas en casa sin problemas. Estar sentado es completamente cómodo. Mi vida social continúa igual que siempre, no he tenido que cancelar nada. Duermo bien, ocasionalmente noto una ligera tensión muscular al acostarme, pero no interfiere con mi descanso. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia menor o sensación de cansancio muscular en lugar de un dolor real, por lo que se puede calificar con un punto.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que caminar es totalmente normal.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna dificultad para andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente puede realizar todas las actividades de cuidado personal sin restricción.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha levantado cajas sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente encuentra sentarse completamente cómodo.

7. Viajar: 0 puntos - La vida social continúa igual que siempre, no ha tenido que cancelar nada.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social continúa igual que siempre.

9. Actividad sexual: No se mencionó - No hay información suficiente sobre la actividad sexual para calificar este ítem.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme bien, solo nota ocasionalmente una ligera tensión muscular al acostarse que no interfiere con su descanso.

La puntuación total es de 1 punto. El paciente presenta una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 40

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi situación con el dolor lumbar es crítica y ha empeorado dramáticamente en el último mes. Inicialmente era manejable después de una caída en casa, pero ahora es absolutamente incapacitante. El dolor es extremo, constante y despiadado, siento como si tuviera hierros candentes en la columna. No puedo estar de pie ni por segundos, cualquier intento resulta en dolor insoportable. Caminar es completamente imposible, dependo totalmente de silla de ruedas. Para todas las actividades básicas - higiene, vestido, alimentación - requiero asistencia completa de cuidadores. No puedo levantar nada, ni siquiera una pluma. Estar sentado es agonizante, solo puedo hacerlo minutos muy cortos con medicación previa y múltiples almohadones. He perdido todo: trabajo, independencia, dignidad. No existe vida social, estoy completamente aislado. Mi relación de pareja ha colapsado. El sueño es inexistente, las noches son un infierno de dolor constante, incluso los opioides más fuertes apenas proporcionan alivio momentáneo. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como extremo, constante y despiadado, no puede estar de pie ni sentirse en pie a pesar de que menciona una caída reciente, lo que sugiere que el dolor es más que solo debido a la lesión inicial.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie ni por segundos debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente requiere asistencia completa para realizar todas las actividades básicas de la higiene, vestirse y alimentarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera una pluma.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente solo puede sentarse minutos muy cortos con medicación previa y múltiples almohadones, lo que sugiere que el dolor es todavía significativo incluso cuando está sentado.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a su estado actual de salud.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social debido a su incapacidad.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La relación sexual ha colapsado debido a la incapacidad del paciente.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no puede dormir debido al dolor constante.

La puntuación total es de 17 puntos, lo que indica una desabilidad muy grave según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

33% [REDACTED] | 41/126 [17:35<37:16, 26.32s/it]

Entrevista 41

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hola doctor, desde hace diez días tengo dolor en la espalda baja que me está causando dificultades moderadas en mi vida diaria. Comenzó después de ayudar a un amigo a mudarse, cargando electrodomésticos pesados. El dolor es constante pero con intensidad variable durante el día. Estar de pie por más de 20 minutos se vuelve incómodo, tengo que alternar con períodos sentado. Caminar distancias normales no es mayor problema, pero evito caminatas largas que antes hacía regularmente. Para las actividades de cuidado personal he tenido que modificar mi rutina, me baño más rápido y evito inclinarme mucho hacia adelante. Levantar objetos pesados definitivamente no puedo, le pido ayuda a otros para las tareas que lo requieren. Estar sentado por mucho tiempo también se vuelve molesto, especialmente en superficies duras. He declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física. La vida íntima se ha visto algo comprometida por precaución al dolor. El sueño se ve interrumpido ocasionalmente, especialmente cuando me muevo durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como constante con intensidad variable, lo que significa que la intensidad es mayor que leve pero menor que moderada.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente informa que se vuelve incómodo después de estar de pie por más de 20 minutos.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar distancias normales sin mayor problema.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que modificar su rutina de cuidados personales, lo que significa que requiere algunas limitaciones.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente se encuentra molesto al estar sentado por mucho tiempo, especialmente en superficies duras.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones que requieren mucha actividad física, lo que puede indicar algunas limitaciones en viajar.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha declinado algunas invitaciones, lo que sugiere que la vida social se ha visto comprometida.

9. Actividad sexual: 2 puntos - La vida sexual se ha visto comprometida por precaución al dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El sueño se ve interrumpido ocasionalmente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total para este paciente sería de 24 puntos. La puntuación total varía de 0 a 50 puntos, con un puntaje más bajo indicando mayor discapacidad. En este caso, el paciente presenta una moderada discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

33% [REDACTED] | 42/126 [17:53<33:35, 24.00s/it]

Entrevista 42

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia en la espalda baja desde hace una semana, empezó después de trabajar en el jardín. Es un dolor leve, máximo un 3 de 10. Puedo estar de pie sin problemas durante mi jornada laboral completa. Camino normal, tanto para ir al trabajo como para hacer ejercicio por las tardes. Me baño y me visto sin ninguna complicación, aunque sí noto un poco la molestia cuando me inclino para atarme los zapatos. Puedo cargar cosas normalmente, ayer ayudé a mi vecino a mover unos muebles y aunque sentí la molestia, pude hacerlo. En la oficina paso 8 horas sentado y estoy cómodo. El fin de semana viajé 4 horas para visitar a mi familia sin problemas. Mis actividades sociales siguen igual, fui al cine y a un concierto esta semana. No ha afectado para nada mi vida íntima. Duermo bien, solo una noche me desperté porque me moví bruscamente, pero me volví a dormir enseguida." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve, menor de 3 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay problemas).

3. Andar: 0 puntos (camino normal).

4. Cuidados personales: 1 punto (puede realizarlo con dificultad leve, como atar suela de zapatos).

5. Levantar peso: 0 puntos (puede cargar cosas normalmente).

6. Estar sentado: 0 puntos (puede pasar 8 horas sentado sin problemas).

7. Viajar: 0 puntos (puede viajar 4 horas sin problemas).

8. Vida social: 0 puntos (actividades sociales siguen igual).

9. Actividad sexual: 0 puntos (no afectado).

10. Dormir: 1 punto (despertó una noche por moverse bruscamente, pero volvió a dormir rápidamente).

Total: 4 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un total de 4 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

34% [REDACTED] | 43/126 [18:26<36:57, 26.72s/it]

Entrevista 43

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero constante, llevo así dos meses. Lo calificaría como un 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie durante períodos cortos, unos 20-30 minutos, pero después necesito descansar. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas que solía hacer. Para ducharme y vestirme necesito más tiempo y debo ser cuidadoso con los movimientos, especialmente al inclinarme. Cargar cosas pesadas se ha vuelto difícil, ahora mi hijo me ayuda con las compras grandes. Estar sentado es tolerable por períodos de 1-2 horas, pero después tengo que levantarme y moverme. Los viajes largos son incómodos, necesito hacer paradas adicionales para estirarme. He reducido algunas actividades sociales, sobre todo las que requieren estar mucho tiempo de pie. La intimidad con mi pareja requiere más cuidado y a veces evitamos ciertas posiciones. Duermo aceptablemente, aunque me despierto ocasionalmente si me muevo mal durante la noche." [INST] 1. Intensidad dolor: 5-6 puntos - El paciente describe su dolor de espalda como moderado a intenso, lo cual corresponde a un puntaje de 5-6 en la escala de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante períodos cortos, por lo que podemos asignarle un puntaje de 2 puntos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, por lo que puede asignarse un puntaje de 3 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita más tiempo y cuidado para ducharse y vestirse, por lo que puede asignarse un puntaje de 3 puntos.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente ha dicho que cargar cosas pesadas es difícil y necesita ayuda, por lo que puede asignarse un puntaje de 1 punto.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede estar sentado por períodos de 1-2 horas, por lo que puede asignarse un puntaje de 2 puntos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente encuentra viajes largos incómodos, por lo que puede asignarse un puntaje de 2 puntos.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, por lo que puede asignarse un puntaje de 1 punto.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente requiere más cuidado y en ocasiones evita ciertas posiciones, por lo que puede asignarse un puntaje de 2 puntos.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme aceptablemente, por lo que puede asignarse un puntaje de 3 puntos.

El puntaje total de la entrevista es 18 puntos, lo que corresponde a una moderada a alta discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

35% [REDACTED] | 44/126 [18:50<35:13, 25.77s/it]

Entrevista 44

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi espalda me duele terriblemente desde hace tres meses tras levantar mal una caja en el trabajo. Es un dolor severo, constante de 8-9 de 10. No puedo estar de pie más de unos pocos minutos, inmediatamente tengo que buscar donde sentarme o recostarme. Caminar incluso distancias muy cortas, como ir al baño, es extremadamente doloroso. Necesito ayuda para bañarme, mi hija me ayuda porque no puedo inclinarme para lavarme los pies. Vestirme es una pesadilla, me toma mucho tiempo y esfuerzo, especialmente ponerme los pantalones y zapatos. No puedo levantar nada de peso, ni siquiera una botella de agua. Estar sentado también duele, solo aguanto 15-20 minutos antes de que sea insoportable. No he podido viajar desde que empezó esto, cancelé unas vacaciones familiares. Mi vida social se acabó, no veo a mis amigos desde hace meses. La intimidad es imposible, cualquier contacto físico me causa dolor. Casi no duermo, me despierto cada hora por el dolor, estoy tomando medicamentos fuertes pero no ayudan mucho." [INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante de nivel 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de unos pocos minutos.

3. Andar: 0 puntos - Caminar es extremadamente doloroso para el paciente.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar cuidados personales, como bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada de peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente solo puede aguantar 15-20 minutos sentado antes de que el dolor sea insoportable.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar desde que empezó el dolor.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente se ha acabado.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es imposible debido al dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente casi no duerme y se despierta regularmente por el dolor, pero aún logra dormir algún tiempo.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 14 puntos, lo que indica una alta discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

36% | 45/126 [19:04<30:04, 22.28s/it]

Entrevista 45

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares desde hace dos semanas después de un día intenso de limpieza en casa. El dolor es leve a moderado, alrededor de 4 de 10. Puedo estar de pie durante mi trabajo sin mayor problema, aunque hacia el final del día siento más molestia. Camino normalmente, hago mis recorridos habituales sin limitaciones importantes. En la ducha y al vestirme noto algo de rigidez matutina, pero puedo hacer todo por mí mismo sin ayuda. Cargar bolsas del supermercado me genera un poco más de molestia, pero aún puedo hacerlo. Sentado en mi escritorio estoy bien durante varias horas, solo ocasionalmente cambio de posición por comodidad. Los viajes en auto son tolerables, en un trayecto reciente de 2 horas solo sentí molestia al final. Mis actividades sociales continúan normales, aunque evito bailar como solía hacer. La vida íntima con mi pareja está bien, solo somos un poco más cuidadosos. Duermo bien la mayoría de las noches, ocasionalmente me despierto si duermo en mala posición."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (No limitación)

3. Andar: 0 puntos (No limitación)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No limitación)

5. Levantar peso: 1 punto (Ligeramente limitado)

6. Estar sentado: 0 puntos (No limitación)

7. Viajar: 1 punto (Ligeramente limitado)

8. Vida social: 1 punto (Ligeramente limitada)

9. Actividad sexual: 0 puntos (No limitación)

10. Dormir: 0 puntos (No problemas específicos)

Puntuación total: 4 puntos

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con una puntuación total de 4 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

37% [REDACTED] | 46/126 [19:31<31:43, 23.79s/it]

Entrevista 46

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es severo y limitante, comenzó hace cuatro meses tras un accidente de tráfico. El dolor es intenso, entre 7-8 de 10 constantemente. Estar de pie es muy difícil, máximo 10 minutos antes de que el dolor sea inaguantable. Caminar más de 50 metros me resulta extremadamente doloroso, necesito usar un bastón para distancias cortas. Para bañarme instalamos barras de apoyo y un asiento, aun así necesito ayuda ocasional de mi esposa. Vestirme es muy complicado, especialmente calcetines y zapatos, me toma mucho tiempo y esfuerzo. No puedo levantar prácticamente nada, mi esposa hace todas las tareas que requieren cargar peso. Sentarme es problemático, después de 30 minutos el dolor aumenta significativamente. Los viajes son casi imposibles, solo salgo para citas médicas esenciales. He abandonado la mayoría de mis actividades sociales, solo veo a familia cercana ocasionalmente. La intimidad se ha visto muy afectada, es muy difícil encontrar posiciones cómodas. Duermo mal, me despierto varias veces por noche por el dolor, uso múltiples almohadas para encontrar posición." [INST]

1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como intenso y limitante, con una intensidad de 7-8 de 10 constantemente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que estar de pie solo es posible durante máximo 10 minutos antes de que el dolor sea inaguantable.

3. Andar: 0 puntos - Caminar más de 50 metros es extremadamente doloroso para el paciente y necesita usar un bastón.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda ocasional para realizar tareas de cuidados personales, como bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra sentarse problemático y el dolor aumenta significativamente después de 30 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - Los viajes son casi imposibles.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha abandonado la mayoría de sus actividades sociales, solo ve a familia cercana ocasionalmente.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad se ha visto muy afectada y encontrar posiciones cómodas es difícil.
10. Dormir: 2 puntos - El paciente duerme mal y se despierta varias veces por noche por el dolor.

El total de puntos obtenidos por el paciente es de 16 puntos, lo que indica una discapacidad severa según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

37% [REDACTED] | 47/126 [19:56<31:45, 24.11s/it]

Entrevista 47

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, apenas tengo una ligera molestia en la zona lumbar desde ayer por la noche. Creo que dormí en mala posición. Es muy leve, tal vez un 1 de 10, más que dolor es una sensación extraña. Puedo estar de pie perfectamente durante todas mis actividades normales. Camino sin ningún problema, esta mañana hice mi rutina de ejercicio completa. Me ducho y me visto completamente normal, no noto ninguna limitación. Cargué todas mis cosas pesadas como siempre, incluso ayudé a mi vecina con sus bolsas. En el trabajo paso horas sentado frente al computador sin molestias. Ayer manejé 3 horas para una reunión sin ningún problema. Mis actividades sociales son normales, anoche fui a bailar con mis amigos. No hay ningún problema en mi vida íntima. Duermo excelente, solo ayer me desperté una vez porque noté la molestia, pero me dormí inmediatamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve, equivalente a un 1 de 10, y afirma que no limita sus actividades.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie perfectamente durante todas sus actividades normales.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina sin problemas.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de ninguna dificultad para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente carga todos sus objetos pesados sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente pasa horas sentado sin molestias.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente manejó durante 3 horas sin problemas.
8. Vida social: 0 puntos - Las actividades sociales son normales.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa de ningún problema en su vida sexual.
10. Dormir: 1 punto - El paciente despertó una vez por la noche debido a la molestia, pero logró volver a dormir inmediatamente.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje de 2 puntos en total (1 punto por Intensidad dolor y 1 punto por Dormir). Este puntaje indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

38% | 48/126 [20:24<32:46, 25.21s/it]

Entrevista 48

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo cinco meses con dolor lumbar crónico que comenzó gradualmente sin causa aparente. El dolor fluctúa entre 6-7 de 10 diariamente. Estar de pie más de 15 minutos me resulta muy incómodo, tengo que buscar apoyo o sentarme. Caminar distancias largas es problemático, evito las caminatas que antes disfrutaba. Para ducharme tengo que apoyarme frecuentemente en las paredes, y vestirme por las mañanas me toma el doble de tiempo por la rigidez. Cargar cosas pesadas se ha vuelto imposible, mi familia me ayuda con las compras y tareas domésticas. Estar sentado por períodos largos también es incómodo, en el trabajo tengo que levantarme cada 45 minutos. Los viajes largos son muy difíciles, tuve que cancelar unas vacaciones por esto. Mi vida social se ha reducido considerablemente, evito eventos donde tenga que estar mucho tiempo de pie o sentado. La intimidad con mi pareja se ha complicado, tenemos que planificar y ser muy cuidadosos. Duermo fragmentado, me despierto 3-4 veces por noche por dolor y cambios de posición." [INST] 1. Intensidad dolor: 6 puntos - El paciente informa que su dolor lumbar crónico fluctúa entre 6-7 de 10 diariamente.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente informa que está de pie más de 15 minutos es incómodo.

3. Andar: 2 puntos - Caminar distancias largas es problemático.
4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente informa que se necesita apoyo para ducharse y vestirse.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que cargar cosas pesadas es imposible.
6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente informa que estar sentado por períodos largos también es incómodo.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes largos son muy difíciles.
8. Vida social: 1 punto - La vida social se ha reducido considerablemente.
9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad con el pareja se ha complicado.
10. Dormir: 3 puntos - El paciente informa que duerme fragmentado y se despierta 3-4 veces por noche por dolor y cambios de posición.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar sería de 21 puntos ($6+1+2+3+0+2+0+1+3=16$, luego multiplicando por 2 para obtener el total). Un puntaje total de 21-30 suele indicar una moderada a severa discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

39% [REDACTED] | 49/126 [20:50<32:39, 25.44s/it]

Entrevista 49

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor en la espalda baja desde hace tres días después de hacer ejercicio intenso. El dolor es moderado, como un 5 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque siento algo de molestia después de una hora. Camino sin grandes problemas, completé mi rutina matutina de 30 minutos de caminata. Para bañarme y vestirme soy un poco más lento y cuidadoso, pero puedo hacerlo solo. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera molestia, evito las cargas muy pesadas pero puedo manejar bolsas normales. Sentado en mi oficina estoy relativamente cómodo, aunque cambio de posición más frecuentemente. Ayer viajé una hora en auto sin problemas mayores, solo un poco de rigidez al llegar. Mis planes sociales continúan, aunque evité ir a un concierto donde tendría que estar de pie mucho tiempo. La vida íntima está bien, solo somos más cuidadosos con ciertos movimientos. Duermo bien en general, una o dos noches me desperté por cambiar de posición bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 3-5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos - Puede estar de pie durante períodos normales, pero con molestia después de una hora.

3. Andar: 0 puntos - Camina sin grandes problemas.
4. Cuidados personales: 1 punto - Es un poco más lento y cuidadoso en bañarse y vestirse.
5. Levantar peso: 3 puntos - Evita cargas muy pesadas, pero puede manejar bolsas normales.
6. Estar sentado: 1 punto - Está relativamente cómodo sentado, pero cambia de posición más frecuentemente.
7. Viajar: 0 puntos - Viajó una hora en auto sin problemas mayores.
8. Vida social: 1 punto - Evitó ir a un concierto donde tendría que estar de pie mucho tiempo.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida íntima está bien.
10. Dormir: 2 puntos - Duerme bien en general, pero despertó una o dos noches por cambiar de posición bruscamente.

Total: 12 puntos. Según la Escala Oswestry, un puntaje total de 0-10 indica un bajo grado de discapacidad lumbar, 11-20 indica un moderado grado de discapacidad lumbar, y 21 o más indica un alto grado de discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta un moderado grado de discapacidad lumbar (12 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

40% [REDACTED] | 50/126 [21:13<31:24, 24.79s/it]

Entrevista 50

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es absolutamente incapacitante, llevo así desde hace ocho meses tras una hernia discal. El dolor es constante e insoportable, 10 de 10, nunca baja de 8. No puedo estar de pie ni siquiera un minuto, inmediatamente tengo que acostarme. Caminar al baño, que está a 5 metros, es una agonía que me toma varios minutos con descansos. Necesito ayuda total para bañarme, mi esposa me lava porque no puedo moverme. Vestirme es imposible sin ayuda, me toma una hora con ayuda de mi familia. No puedo levantar absolutamente nada, ni un vaso de agua. Estar sentado es tortura, máximo 5 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en meses, los viajes son impensables. Mi vida social ha desaparecido completamente, no recibo visitas porque el dolor es muy severo. La intimidad es inexistente, cualquier contacto físico es doloroso. No duermo prácticamente nada, paso las noches despierto por el dolor severo, los medicamentos más fuertes no me alivian." [INST] 1. Intensidad dolor: 10 de 10, 0 puntos - The patient reports that their low back pain is completely disabling and constant,

rating it as a 10 out of 10, with no relief even at its lowest. They are unable to stand for any length of time and must lie down immediately.

2. Estar de pie: 0 puntos - The patient reports that they are unable to stand at all due to the severity of their pain.

3. Andar: 0 puntos - The patient reports that walking is an agony and impossible for them due to the pain.

4. Cuidados personales: 5 puntos - The patient requires assistance with basic personal care tasks such as bathing and dressing.

5. Levantar peso: 0 puntos - The patient reports that they are unable to lift any weight whatsoever.

6. Estar sentado: 1 punto - The patient reports that sitting is a form of torture for them, and they can only tolerate it for a maximum of 5 minutes.

7. Viajar: 0 puntos - The patient reports that traveling is impossible due to the pain.

8. Vida social: 0 puntos - The patient reports that their social life has completely disappeared due to the pain and they do not receive visits from anyone.

9. Actividad sexual: 0 puntos - The patient reports that intimacy is non-existent due to the pain.

10. Dormir: 0 puntos - The patient reports that they hardly sleep at all due to the severity of their pain.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

40% | 51/126 [21:39<31:35, 25.27s/it]

Entrevista 51

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi problema de espalda comenzó hace seis semanas después de cargar muebles en una mudanza. El dolor es significativo, alrededor de 6-7 de 10. Estar de pie durante mi trabajo de 8 horas se ha vuelto muy difícil, necesito sentarme cada 20-30 minutos. Caminar distancias cortas va bien, pero evito las caminatas largas por el dolor. En la ducha tengo que ser muy cuidadoso, me apoyo en las paredes y uso un

banquito para lavarme los pies. Vestirme es lento y doloroso, especialmente ponerme calcetines y zapatos me cuesta mucho. No puedo cargar las bolsas de compras como antes, mi hijo me acompaña para ayudarme. Estar sentado más de una hora se vuelve muy incómodo, tengo que cambiar de posición constantemente. Los viajes largos son problemáticos, el mes pasado tuve que acortar un viaje familiar. He cancelado varias salidas sociales, especialmente las que involucran caminar o estar de pie mucho tiempo. La intimidad se ha complicado, tenemos que ser muy creativos con posiciones que no me duelan. Duermo mal, me despierto frecuentemente por el dolor y me cuesta volver a dormir." [/INST] 1. Intensidad dolor: 6 puntos - El paciente describe el dolor como moderado a severo, con una intensidad de 6-7 de 10.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas, pero necesita pararse y descansar regularmente debido al dolor.

3. Andar: 4 puntos - El paciente puede andar, pero evita caminatas largas debido al dolor.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente tiene dificultades para realizar cuidados personales, como lavarse en la ducha, vestirse y usar zapatos.

5. Levantar peso: 4 puntos - El paciente no puede cargar bolsas de compras como antes y necesita ayuda para levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente solo puede sentarse cómodo durante una hora antes de necesitar cambiar de posición.

7. Viajar: 3 puntos - El paciente tiene dificultades con viajes largos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha cancelado varias salidas sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad se ha complicado y requiere posiciones creativas para no causar dolor.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente tiene problemas para dormir debido al dolor y necesita despertarse frecuentemente.

Total: 34 puntos.

Según la Escala Oswestry, el paciente tiene una discapacidad lumbar moderada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4

41% [REDACTED] | 52/126 [21:53<26:52, 21.79s/it]

Entrevista 52

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia leve en la zona lumbar desde hace cuatro días. Empezó después de estar mucho tiempo trabajando en el computador en mala posición. El dolor es muy leve, máximo 2-3 de 10. Puedo estar de pie sin problemas durante toda mi jornada laboral. Camino normalmente, incluso hice ejercicio cardiovascular ayer. Me baño y me visto sin limitaciones, solo noto un poco de rigidez matutina que se pasa rápido. Puedo cargar cosas normalmente, ayer cargué todas mis bolsas del supermercado sin problema. Paso muchas horas sentado trabajando y estoy cómodo, solo ajusto mi postura ocasionalmente. Los viajes no me afectan, el fin de semana manejé 2 horas para visitar a mis padres. Mis actividades sociales continúan normales, fui al gimnasio y a cenar con amigos. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo excelente, solo una noche noté un poco de molestia al acostarme pero me dormí bien.".

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problemas)

3. Andar: 0 puntos (normalmente)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin limitaciones)

5. Levantar peso: 0 puntos (normalmente)

6. Estar sentado: 0 puntos (cómodo)

7. Viajar: 0 puntos (sin efecto)

8. Vida social: 0 puntos (normales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin impacto)

10. Dormir: 1 punto (leve molestia)

Puntaje total: 2 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 2 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

42% [REDACTED] | 53/126 [22:22<29:11, 23.99s/it]

Entrevista 53

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es severo y constante, llevo así cuatro meses desde una caída en el trabajo. El dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente. No puedo estar de pie más de 5-10 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable. Caminar más de 20-30 metros es extremadamente doloroso, uso bastón para

cualquier distancia. Para bañarme necesito sentarme en una silla especial y mi esposa me ayuda con las partes que no alcanco. Vestirme es una lucha diaria, me toma 30-40 minutos y a menudo necesito ayuda con calcetines y zapatos. No puedo levantar nada pesado, incluso una jarra de agua me causa dolor intenso. Estar sentado también es problemático, después de 20-30 minutos necesito cambiar de posición urgentemente. No puedo viajar, cancelé todas mis citas que requieren trasladarse lejos. Mi vida social prácticamente no existe, solo veo a familiares cercanos en casa ocasionalmente. La intimidad es muy difícil, hemos tenido que adaptar completamente nuestra vida íntima. Duermo muy mal, me despierto cada 2-3 horas por dolor, necesito medicación fuerte para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor oscila entre 7-8 de 10, lo que corresponde a un gran nivel de intensidad.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-10 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede andar, pero solo 20-30 metros y con mucho dolor y el uso de un bastón.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse, lo que representa un gran desafío en la autosuficiencia.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, incluyendo una jarra de agua.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo durante 20-30 minutos antes de necesitar cambiar de posición.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede viajar debido a la incapacidad para andar y el dolor.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente casi no existe debido a la incapacidad para salir y interactuar con otras personas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es difícil o imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y necesita medicación fuerte para descansar algo, lo que representa un nivel moderado de problemas con el dormir.

La puntuación total de este paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar es de 19 puntos, lo que corresponde a un nivel severo de discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 4 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

43% [REDACTED] | 54/126 [22:44<27:49, 23.19s/it]

Entrevista 54

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo una semana con dolor lumbar después de un mal movimiento jugando tenis. El dolor es moderado, entre 4-5 de 10. Puedo estar de pie durante períodos razonables, aunque después de 45 minutos empiezo a sentir molestia. Camino sin grandes limitaciones, hice mi caminata matutina habitual aunque un poco más corta. Para ducharme y vestirme necesito ir más despacio, especialmente al inclinarme hacia adelante. Cargar cosas pesadas me resulta incómodo, evito las bolsas muy cargadas pero puedo manejar peso moderado. Estar sentado en mi trabajo es tolerable por 1-2 horas antes de necesitar levantarme y estirarme. Viajé el fin de pasado 90 minutos en auto con algo de molestia pero tolerable. He mantenido la mayoría de mis compromisos sociales, aunque evité una excursión larga que tenía planeada. La vida íntima requiere más cuidado, evitamos algunas posiciones pero seguimos activos. Duermo aceptablemente, me despierto ocasionalmente si me muevo bruscamente pero logro volver a dormir.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, entre 4-5 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos razonables, pero con molestia después de 45 minutos)

3. Andar: 1 punto (Camina sin grandes limitaciones)

4. Cuidados personales: 2 puntos (Necesita ir más despacio al ducharse y vestirse)

5. Levantar peso: 3 puntos (Evita cargas pesadas)

6. Estar sentado: 2 puntos (Tolerable por 1-2 horas)

7. Viajar: 2 puntos (Tuvo un viaje de 90 minutos con molestia tolerable)

8. Vida social: 1 punto (Ha mantenido la mayoría de sus compromisos sociales)

9. Actividad sexual: 2 puntos (Requiere más cuidado, evita algunas posiciones pero siguen activos)

10. Dormir: 2 puntos (Duerme aceptablemente, pero se despierta ocasionalmente si se mueve bruscamente)

Total: 14 puntos. Según el umbral de puntuación de la Escala Oswestry, el paciente tiene una discapacidad lumbar leve (11-20 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

44% [REDACTED] | 55/126 [23:16<30:53, 26.10s/it]

Entrevista 55

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda baja es extremadamente severo, empezó hace siete meses tras un accidente automovilístico. El dolor es constante e intenso, 9-10 de 10 sin alivio. Estar de pie es imposible, no puedo

mantenerme erguido más de 1-2 minutos. Caminar incluso 5 metros hasta el baño es una tortura que me toma varios minutos con múltiples descansos. Necesito asistencia completa para bañarme, tengo una silla de ducha y mi cuidadora me ayuda. Vestirme requiere ayuda total, no puedo inclinarme ni levantar las piernas. No puedo levantar absolutamente nada, hasta sostener un libro me causa dolor insoportable. Estar sentado es tortura pura, máximo 5-10 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en meses, cualquier viaje es imposible. Mi vida social ha desaparecido por completo, no puedo recibir visitas por el nivel de dolor. La intimidad es imposible, cualquier contacto físico aumenta el dolor. No duermo, paso las noches en vela por el dolor constante, ningún medicamento me proporciona alivio suficiente.".

[/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (10 es el máximo de dolor y el paciente describe un dolor constante e intenso de 9-10 de 10, por lo que se le asigna 0 puntos).

2. Estar de pie: 0 puntos (El paciente no puede mantenerse de pie más de 1-2 minutos, por lo que se le asigna 0 puntos).

3. Andar: 0 puntos (El paciente no puede caminar 5 metros sin descansos y está confinado a la casa, por lo que se le asigna 0 puntos).

4. Cuidados personales: 5 puntos (El paciente necesita asistencia completa para realizar cuidados personales como bañarse, vestirse y levantarse, por lo que se le asigna 5 puntos).

5. Levantar peso: 0 puntos (El paciente no puede levantar nada sin causarle dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

6. Estar sentado: 0 puntos (El paciente solo puede sentarse por 5-10 minutos antes de que sea intolerable, por lo que se le asigna 0 puntos).

7. Viajar: 0 puntos (El paciente ha estado confinado a casa durante meses y no ha podido viajar, por lo que se le asigna 0 puntos).

8. Vida social: 0 puntos (El paciente ha perdido por completo su vida social debido al dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

9. Actividad sexual: 0 puntos (El paciente informa que la intimidad es imposible debido al dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

10. Dormir: 0 puntos (El paciente no duerme y pasa las noches en vela debido al dolor, por lo que se le asigna 0 puntos).

Según los criterios de la Escala Oswestry de Discapacidad L

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

44% [REDACTED] | 56/126 [23:49<32:49, 28.13s/it]

Entrevista 56

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar desde hace dos meses que comenzó después de levantar una caja pesada mal. El dolor es moderado a severo, entre 6-7 de 10 la mayoría del tiempo. Puedo estar de pie unos 15-20 minutos antes de que el dolor me obligue a sentarme o apoyarme. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminar más de 2-3 cuadras seguidas. Para ducharme uso barras de apoyo y tengo que ser muy cuidadoso, vestirme me toma mucho más tiempo especialmente los zapatos. Cargar bolsas de supermercado se ha vuelto imposible, mi esposa hace todas las compras pesadas. Estar sentado es tolerable por períodos de 45 minutos a 1 hora antes de volverse muy incómodo. Los viajes largos son muy difíciles, tuve que usar almohadas especiales en mi último viaje de 3 horas. He reducido significativamente mis salidas sociales, solo voy a eventos realmente importantes. La intimidad se ha complicado mucho, tenemos que ser extremadamente cuidadosos y a menudo evitamos el contacto. Duermo mal, me despierto 4-5 veces por noche por el dolor, necesito medicación para poder descansar algo." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado a severo, lo que corresponde a un rango de 6-7 en la escala de dolor de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie solo unos 15-20 minutos antes de sentirse obligado a sentarse o apoyarse.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas, pero evita caminar más de 2-3 cuadras seguidas.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente tiene dificultades para ducharse y vestirse debido a la necesidad de usar barras de apoyo y tomar mucho más tiempo que antes.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha declarado que cargar bolsas de supermercado se ha vuelto imposible.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse por períodos de 45 minutos a 1 hora antes de sentirse incómodo.

7. Viajar: 2 puntos - Los viajes largos son muy difíciles para el paciente, lo que implica que viajes de más de 1 hora son casi imposibles.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido significativamente sus salidas sociales, solo va a eventos realmente importantes.

9. Actividad sexual: 3 puntos - El paciente ha informado que la intimidad se ha complicado mucho y requiere ser extremadamente cuidadoso, lo que sugiere alguna dificultad en esta área.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente tiene dificultades para dormir debido al dolor, lo que lo obliga a despertarse 4-5 veces por noche y necesitar medicación para poder descansar.

Según la escala Oswestry, el puntaje total de este paciente sería de 2

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

45% | 57/126 [24:24<34:29, 29.99s/it]

Entrevista 57

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, tengo una leve molestia en la espalda baja desde hace tres días. Empezó después de dormir en un sofá incómodo en casa de mis padres. Es más una sensación rara que dolor real, tal vez 1-2 de 10. Puedo estar de pie trabajando todo el día sin problema alguno. Camino completamente normal, esta mañana hice mi rutina de correr 5 kilómetros. Me baño y me visto sin ninguna complicación, solo noto un poquito de rigidez cuando me levanto por las mañanas. Puedo cargar todo lo que normalmente cargo, ayer ayudé a un amigo a cargar cajas pesadas en su mudanza. Paso 8 horas diarias sentado en mi oficina sin molestias. Viajo frecuentemente por trabajo, ayer hice un vuelo de 4 horas sin ningún problema. Mis actividades sociales son completamente normales, este fin de semana jugué fútbol con mis amigos. No hay ningún impacto en mi vida íntima con mi pareja. Duermo perfectamente, solo la primera noche noté un poco la molestia pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe la sensación de molestia en la espalda baja como leve y más una sensación rara que un dolor real, por lo que se puede considerar un nivel 1 de intensidad de dolor.

2. Estar de pie: 5 puntos - El paciente informa que puede estar de pie trabajando todo el día sin problemas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de estar de pie.

3. Andar: 5 puntos - El paciente camina completamente normal, lo que indica un nivel 5 de capacidad de andar.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente informa que puede bañarse y ver himself sin problemas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente informa que puede cargar todo lo que normalmente cargo y ayudó a un amigo a cargar cajas pesadas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de levantar peso.

6. Estar sentado: 5 puntos - El paciente pasa 8 horas diarias sentado en su oficina sin molestias, lo que indica un nivel 5 de capacidad de estar sentado.

7. Viajar: 5 puntos - El paciente viaja frecuentemente por trabajo y hizo un vuelo de 4 horas sin problemas, lo que indica un nivel 5 de capacidad de viajar.

8. Vida social: 5 puntos - El paciente informa que sus actividades sociales son completamente normales, lo que indica un nivel 5 de capacidad de participar en actividades sociales.

9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente informa que no hay impacto en su vida íntima con su pareja, lo que indica un nivel 5 de capacidad de participar en actividades sexuales.

10. Dormir: 4 puntos - El paciente notó un poco de molestia la primera noche, pero no se despertó, lo que indica un n

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

46% | 58/126 [24:48<32:00, 28.24s/it]

Entrevista 58

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy severo, llevo ocho meses así desde una lesión laboral. El dolor es intenso y constante, 8-9 de 10 todos los días. No puedo estar de pie más de 3-5 minutos, inmediatamente tengo que buscar donde apoyarme o sentarme. Caminar más de 10-15 metros es extremadamente doloroso, uso un andador para distancias cortas. Para bañarme necesito ayuda de mi esposa, tengo asiento especial y barras, pero aún así es muy difícil. Vestirme es una batalla diaria, necesito ayuda para calcetines, zapatos y pantalones, me toma más de 30 minutos. No puedo levantar prácticamente nada, ni siquiera mi medicación sin sentir dolor intenso. Estar sentado también es muy problemático, después de 15-20 minutos el dolor se intensifica mucho. No he podido viajar desde que comenzó, cancelé todas mis citas fuera de la ciudad. Mi vida social ha desaparecido casi completamente, solo recibo visitas cortas de familia. La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones que no causen dolor severo. Duermo terriblemente mal, me despierto cada 1-2 horas por dolor intenso, los medicamentos fuertes apenas me ayudan.". [/INST] 1.
Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe que su dolor es intenso y constante, con una intensidad de 8-9 de 10 todos los días.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 3-5 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente necesita un andador para caminar cortas distancias.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse, vestirse y levantarse de la cama.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente experimenta intensificación de dolor después de 15-20 minutos de sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar desde que comenzó el dolor.

8. Vida social: 1 punto - El paciente solo recibió visitas cortas de familia.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es casi imposible.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta cada 1-2 horas por dolor intenso.

La puntuación total es de 18 puntos, lo que indica una discapacidad severa según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 9 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

47% [REDACTED] | 59/126 [25:13<30:21, 27.19s/it]

Entrevista 59

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias en la zona lumbar desde hace diez días después de una sesión intensa de jardinería. El dolor es leve a moderado, alrededor de 3-4 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque después de una hora empiezo a sentir algo de molestia. Camino sin problemas mayores, completé mis caminatas diarias habituales de 45 minutos. Para ducharme y vestirme soy más cuidadoso con los movimientos bruscos, pero puedo hacer todo independientemente. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera algo de molestia, evito las cargas muy pesadas pero manejo las normales. Estar sentado en mi trabajo es cómodo por períodos de 2-3 horas antes de necesitar cambiar de posición. Los viajes son tolerables, el fin de semana viajé 2 horas con solo un poco de rigidez. Mantengo la mayoría de mis actividades sociales, aunque evité una excursión larga de senderismo. La vida íntima continúa normal, solo somos un poco más cuidadosos con ciertos movimientos. Duermo bien generalmente, ocasionalmente me despierto si cambio de posición bruscamente." [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve) - El paciente describe el dolor como leve a moderado, lo que corresponde a puntos 2 en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie durante períodos normales sin problemas mayores.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que camina sin problemas mayores.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente puede hacer todo independientemente, sin necesidad de ayuda.

5. Levantar peso: 1 punto (Muy leve) - El paciente evita cargas muy pesadas, pero puede manejar las cargas moderadas.
6. Estar sentado: 1 punto (Muy leve) - El paciente puede sentarse cómodamente durante períodos de 2-3 horas, pero necesita cambiar de posición.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes son tolerables.
8. Vida social: 1 punto (Muy leve) - El paciente mantiene la mayoría de sus actividades sociales, pero evitó una excursión larga.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida sexual continúa normal.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme bien generalmente.

Resumen: El paciente presenta una discapacidad lumbar leve, con un total de 5 puntos en la escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

48% [REDACTED] | 60/126 [25:45<31:44, 28.86s/it]

Entrevista 60

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor lumbar es moderado pero persistente, comenzó hace tres meses después de un episodio de estrés y malas posturas en el trabajo. El dolor fluctúa entre 5-6 de 10 durante el día. Puedo estar de pie por períodos de 30-40 minutos antes de necesitar descansar. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas que solía hacer los fines de semana. En la ducha tengo que apoyarme ocasionalmente y vestirme me toma más tiempo, especialmente al inclinarme. Cargar cosas pesadas se ha vuelto problemático, mi familia me ayuda con las compras grandes y mudanza de muebles. Estar sentado es tolerable por 1-2 horas, pero después necesito levantarme y estirarme. Los viajes largos requieren paradas frecuentes, en mi último viaje de 4 horas tuve que parar tres veces. He reducido algunas actividades sociales, especialmente las que requieren mucho caminar o estar de pie. La intimidad requiere más planificación y cuidado, evitamos ciertas posiciones que me causan dolor. Duermo regular, me

despierto 2-3 veces por noche por molestias y me cuesta volver a dormir." [INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado a fuerte (5-6 de 10), por lo que se asigna un puntaje de 4.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante 30-40 minutos antes de necesitar descansar, por lo que se asigna un puntaje de 2.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias moderadas, pero evita caminatas largas, por lo que se asigna un puntaje de 3.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente tiene dificultades para vestirse y tomarse una ducha, por lo que se asigna un puntaje de 3.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente ha encontrado difícil cargar cosas pesadas y necesita ayuda de su familia, por lo que se asigna un puntaje de 5.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede estar sentado por 1-2 horas, por lo que se asigna un puntaje de 2.

7. Viajar: 4 puntos - El paciente necesita paradas frecuentes durante viajes largos, por lo que se asigna un puntaje de 4.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, pero no especifica que las haya abandonado por completo, por lo que se asigna un puntaje de 2.

9. Actividad sexual: 4 puntos - El paciente requiere más planificación y cuidado en la intimidad, evitando ciertas posiciones, por lo que se asigna un puntaje de 4.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, pero se despierta 2-3 veces por noche por molestias, por lo que se asigna un puntaje de 3.

Para obt

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2

48% | 61/126 [26:20<33:00, 30.48s/it]

Entrevista 61

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi problema de espalda comenzó hace un mes después de una resbalada en casa. El dolor es significativo, entre 6-7 de 10 especialmente por las mañanas. Estar de pie más de 20 minutos se vuelve muy incómodo, necesito sentarme frecuentemente. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminar más de 3-4 cuadras seguidas por el dolor. Para ducharme instalé barras de apoyo y necesito sentarme para

lavarme los pies, vestirme es lento y doloroso. No puedo cargar las bolsas del supermercado como antes, mi hijo me acompaña para ayudarme con las compras. Estar sentado por más de una hora se vuelve muy incómodo, tengo que cambiar de posición constantemente. Los viajes largos son muy problemáticos, cancelé un viaje familiar de fin de semana por esto. He reducido considerablemente mis salidas sociales, solo voy a compromisos muy importantes. La intimidad se ha complicado mucho, tenemos que ser muy creativos y cuidadosos. Duermo mal, me despierto frecuentemente por el dolor y me cuesta encontrar posiciones cómodas.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 7 puntos - El paciente describe que su dolor es significativo y está entre 6-7 de 10, por lo que se le asignarían 7 puntos.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente informa que estar de pie más de 20 minutos es incómodo, por lo que se le asignarían 3 puntos.

3. Andar: 4 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero evita caminar largas distancias por el dolor, por lo que se le asignarían 4 puntos.

4. Cuidados personales: 8 puntos - El paciente necesita asistencia para ducharse y vestirse, lo que le resulta lento y doloroso, por lo que se le asignarían 8 puntos.

5. Levantar peso: 5 puntos - El paciente informa que no puede cargar las bolsas del supermercado como antes, por lo que se le asignarían 5 puntos.

6. Estar sentado: 6 puntos - El paciente informa que sentarse por más de una hora se vuelve muy incómodo y necesita cambiar de posición constantemente, por lo que se le asignarían 6 puntos.

7. Viajar: 9 puntos - El paciente canceló un viaje familiar por el dolor y describe que viajes largos son muy problemáticos, por lo que se le asignarían 9 puntos.

8. Vida social: 6 puntos - El paciente ha reducido considerablemente sus salidas sociales, por lo que se le asignarían 6 puntos.

9. Actividad sexual: 10 puntos - El paciente describe que la intimidad se ha complicado mucho y requiere ser muy creativos y cuidadosos, lo que indica un impacto significativo en esta categoría, por lo que se le asignarían 10 puntos.

10. Dormir: 8 puntos - El paciente duerme mal y se despierta frecuentemente por el dolor, por lo que se le asignarían 8 puntos

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 8 | Diferencia: 6
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 7 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 9 | Diferencia: 6
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 6 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 10 | Diferencia: 8
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5

49% [REDACTED] | 62/126 [26:45<30:51, 28.93s/it]

Entrevista 62

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda baja desde hace cinco días. Comenzó después de estar mucho tiempo inclinado arreglando el auto. Es muy suave, máximo 2 de 10, más que dolor es una sensación de tensión. Puedo estar de pie durante toda mi jornada laboral de 9 horas sin problemas. Camino completamente normal, incluso corrí 30 minutos ayer sin molestias. Me baño y me visto sin ninguna limitación, solo noto un poquito de rigidez cuando me levanto de la cama. Puedo cargar todo normalmente, ayer cargué cajas pesadas ayudando a mi hermana. Paso muchas horas sentado en mi oficina sin ninguna molestia. Los viajes no me afectan para nada, el fin de semana manejé 3 horas sin problema. Todas mis actividades sociales continúan normales, fui a una fiesta y bailé toda la noche. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo excelente, solo la primera noche noté un poquito la molestia al acostarme."

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia leve, que no supera el nivel 2 de 10, por lo que se puede considerar sin dolor real.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna limitación al estar de pie durante su jornada laboral.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina completamente normal y ha corrido sin problemas.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna limitación al bañarse o vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente ha cargado cajas pesadas sin problemas.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente pasa muchas horas sentado sin molestias.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente ha viajado durante tres horas sin problemas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha continuado con todas sus actividades sociales normales.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no ha reportado ninguna limitación en su vida íntima.

10. Dormir: 1 punto - El paciente solo notó un poquito de molestia al acostarse la primera noche.

La puntuación total de la entrevista es de 1 punto. Según la Escala Oswestry, una puntuación total menor a 10 indica una baja discapacidad lumbar. En este caso, el paciente presenta una discapacidad lumbar leve.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

50% [REDACTED] | 63/126 [27:11<29:36, 28.20s/it]

Entrevista 63

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda es severo y limitante, llevo seis meses así desde una cirugía que no salió bien. El dolor es intenso, 7-8 de 10 constantemente. No puedo estar de pie más de 10-15 minutos sin que el dolor sea inaguantable. Caminar más de 30-40 metros es extremadamente doloroso, uso bastón para cualquier distancia. Para bañarme tengo una silla especial y necesito ayuda ocasional de mi esposa para las partes difíciles de alcanzar. Vestirme es muy complicado, especialmente calcetines y zapatos, me toma mucho tiempo y esfuerzo. No puedo levantar nada moderadamente pesado, mi esposa hace todo el trabajo doméstico que requiere fuerza. Estar sentado también es problemático, después de 30-45 minutos necesito cambiar de posición por el dolor. Los viajes son muy difíciles, solo salgo para citas médicas esenciales. Mi vida social se ha reducido dramáticamente, solo veo a familia muy cercana en casa. La intimidad es muy complicada, hemos tenido que adaptar completamente nuestra vida íntima. Duermo fragmentado, me despierto cada 2-3 horas por dolor, uso medicación fuerte para poder descansar.". [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante, con una intensidad de 7-8 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de 10-15 minutos sin que el dolor sea intolerable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 30-40 metros es extremadamente doloroso.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse y vestirse, especialmente para las partes difíciles.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada moderadamente pesado.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo por 30-45 minutos antes de necesitar cambiar de posición por el dolor.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente solo salía para citas médicas esenciales.

8. Vida social: 1 punto - La vida social se ha reducido dramáticamente, solo ve el paciente a familia cercana en casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es muy complicada y han tenido que adaptar completamente su vida íntima.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme fragmentado y necesita medicación fuerte para poder descansar.

La puntuación total de la entrevista es 16 puntos, lo que indica una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 8 | Diferencia: 6

- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

51% | 64/126 [27:37<28:13, 27.32s/it]

Entrevista 64

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo dos semanas con dolor lumbar que empezó después de una mala noche de sueño en un colchón viejo. El dolor es leve, entre 2-3 de 10 la mayor parte del tiempo. Puedo estar de pie durante mis actividades normales, aunque después de varias horas siento algo de cansancio en la zona. Camino sin problemas, mantengo mi rutina de ejercicio matutino de 45 minutos. Para ducharme y vestirme soy un poco más cuidadoso, pero puedo hacer todo independientemente sin dificultad mayor. Cargar cosas normales no me problema, aunque evito levantar objetos muy pesados por precaución. Estar sentado en mi trabajo es cómodo, solo ocasionalmente cambio de posición por comodidad general. Los viajes cortos son completamente normales, viajé 90 minutos el fin de semana sin molestias. Mis actividades sociales continúan igual, aunque evité una actividad de paintball por precaución. La vida íntima está normal, solo somos un poquito más cuidadosos. Duermo bien la mayoría de las noches, ocasionalmente noto la molestia al cambiar de posición." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve, entre 2-3 de 10, lo que corresponde a un punto en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente puede estar de pie durante sus actividades normales sin problemas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina sin problemas.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente puede hacer todo independientemente para cuidarse, incluyendo ducharse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente puede levantar objetos normales sin problemas, pero evita levantar objetos pesados por precaución.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente encuentra cómodo sentarse en su trabajo.

7. Viajar: 0 puntos - Los viajes cortos son completamente normales para el paciente.

8. Vida social: 0 puntos - Las actividades sociales continúan igual para el paciente, aunque evitó una actividad por precaución.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida íntima está normal para el paciente, solo son un poquito más cuidadosos.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme bien la mayoría de las noches.

Según la escala Oswestry, el paciente tiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica que no presenta ninguna discapacidad lumbar significativa.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

52% [REDACTED] | 65/126 [27:54<24:36, 24.21s/it]

Entrevista 65

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda baja es extremadamente severo, comenzó hace un año tras un accidente de trabajo. El dolor es constante e insoportable, 9-10 de 10 sin ningún alivio. Estar de pie es completamente imposible, no puedo mantenerme erguido más de 30 segundos. Caminar hasta el baño, que está a 3 metros, me toma 10 minutos con múltiples descansos y es una agonía. Necesito ayuda completa para bañarme, mi cuidadora me asiste totalmente porque no puedo moverme. Vestirme requiere asistencia total, no puedo inclinarme, levantar brazos o piernas sin dolor severo. No puedo sostener ni levantar absolutamente nada, hasta una taza vacía me causa dolor insoportable. Estar sentado es tortura, máximo 2-3 minutos antes de que sea inaguantable. No he salido de casa en 8 meses, cualquier viaje es absolutamente imposible. Mi vida social no existe, no puedo recibir visitas porque el dolor es demasiado severo. La intimidad es completamente imposible, cualquier contacto físico aumenta el dolor. No duermo nada, paso las noches en agonía, ningún medicamento me proporciona alivio." [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos (10 being the highest level of pain).

2. Estar de pie: 0 puntos - Cannot stand at all.

3. Andar: 0 puntos - Cannot walk.

4. Cuidados personales: 5 puntos - Complete dependence on caregiver for all personal care.

5. Levantar peso: 0 puntos - Cannot lift anything.

6. Estar sentado: 1 punto - Unable to sit for more than 2-3 minutes.

7. Viajar: 0 puntos - Cannot travel.

8. Vida social: 0 puntos - No social life.

9. Actividad sexual: 0 puntos - Complete impossibility.

10. Dormir: 0 puntos - No sleep at all.

Based on the patient's description, their total Oswestry Disability Index score would be 30 out of 40 (5 points for each of the 6 items they can't perform, and 0 points for the other 4 items they cannot do at all). This represents a severe level of disability.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

52% [REDACTED] | 66/126 [28:28<27:14, 27.24s/it]

Entrevista 66

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, tengo dolor lumbar desde hace seis semanas que comenzó gradualmente sin causa específica. El dolor es moderado, alrededor de 5-6 de 10 la mayor parte del día. Puedo estar de pie por períodos de 20-30 minutos antes de sentir molestia significativa. Caminar distancias moderadas va bien, pero evito las caminatas largas de más de 1 kilómetro. Para ducharme uso barras de apoyo por seguridad y vestirme me toma un poco más de tiempo por precaución. Cargar bolsas pesadas del supermercado me resulta incómodo, ahora uso un carrito o pido ayuda. Estar sentado es tolerable por 1-2 horas antes de necesitar levantarme y moverme. Los viajes largos requieren planificación, necesito parar cada hora para estirarme. He modificado algunas actividades sociales, evito eventos que requieren mucho estar de pie. La intimidad requiere más comunicación y cuidado, pero mantenemos una vida activa. Duermo aceptablemente, me despierto 1-2 veces por noche por molestias pero logro volver a dormir." [INST] 1.

Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe que el dolor lumbar es moderado, con un nivel de intensidad entre 5-6 de 10, lo que corresponde a la mitad del rango de la escala.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede estar de pie por períodos de 20-30 minutos antes de sentir molestias significativas, lo que indica un grado moderado de dificultad.

3. Andar: 3 puntos - Caminar distancias moderadas va bien para el paciente, pero evita caminatas largas de más de 1 kilómetro, lo que indica una dificultad moderada.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita barras de apoyo para ducharse y tomar más tiempo para vestirse, lo que indica una dificultad moderada en realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente encuentra cargar bolsas pesadas incómodo y necesita un carrito o ayuda, lo que indica una dificultad significativa.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse tolerablemente por 1-2 horas antes de necesitar levantarse y moverse, lo que indica una dificultad moderada.

7. Viajar: 3 puntos - Los viajes largos requieren planificación y paradas regulares, lo que indica una dificultad moderada.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha tenido que modificar algunas actividades sociales debido al dolor lumbar, lo que indica una dificultad moderada.
9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente necesita más comunicación y cuidado durante la intimidad, lo que indica una dificultad moderada.
10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme aceptablemente, pero se despierta 1-2 veces por noche por molestias, lo que indica una dificultad moderada.

Basándose en las respuestas del paciente,

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3

53% [REDACTED] | 67/126 [29:03<29:00, 29.50s/it]

Entrevista 67

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una ligera molestia en la zona lumbar desde ayer por la tarde. Creo que fue por estar mucho tiempo agachado limpiando debajo de la cama. Es muy leve, apenas un 1 de 10, más una sensación extraña que dolor. Puedo estar de pie perfectamente durante todas mis actividades laborales y domésticas. Camino completamente normal, esta mañana hice mi caminata diaria de una hora sin problema. Me baño y me visto sin ninguna complicación, solo noto una muy ligera rigidez al levantarme. Puedo cargar todo lo que normalmente cargo, ayer mismo cargué bolsas pesadas del supermercado. Paso todo el día sentado en mi oficina sin ninguna molestia. Los viajes no me afectan, tengo uno planeado de 5 horas para mañana y no me preocupa. Todas mis actividades sociales son completamente normales, no he cancelado ni modificado nada. No hay ningún impacto en mi vida íntima. Duermo perfectamente, solo ayer noté un poquito la molestia al acostarme pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una ligera molestia, que no supera el nivel 1 de 10 en escala numérica, por lo que se le asigna un puntaje de 1 en este ítem.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que puede estar de pie durante todas sus actividades laborales y domésticas sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que camina normalmente y ha hecho su caminata diaria sin problemas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente informa que puede bañarse y ver się sin complicaciones, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que puede cargar todo lo que normalmente carga, incluyendo bolsas pesadas, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente informa que pasa todo el día sentado en su oficina sin molestias, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente informa que viajes no le afectan, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que todas sus actividades sociales son completamente normales, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que no hay ningún impacto en su vida íntima, por lo que se le asigna un puntaje de 0 en este ítem.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente informa que duerme perfectamente, solo notó una ligera molestia al acost

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

54% [REDACTED] | 68/126 [29:28<27:23, 28.33s/it]

Entrevista 68

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy severo, llevo cinco meses así desde una lesión deportiva. El dolor es intenso, 8 de 10 constantemente. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva inaguantable. Caminar más de 15-20 metros es extremadamente doloroso, necesito bastón para cualquier distancia. Para bañarme necesito silla especial y mi esposa me ayuda porque no puedo inclinarme. Vestirme es una lucha diaria, necesito ayuda para calcetines, zapatos y pantalones. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una botella de agua de 2 litros. Estar sentado también es muy problemático, después de 20 minutos el dolor se intensifica mucho. Los viajes son imposibles, he cancelado todas mis citas fuera de

la ciudad. Mi vida social prácticamente no existe, solo veo a mi familia inmediata ocasionalmente. La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones cómodas. Duermo terriblemente, me despierto cada hora por el dolor intenso, necesito medicación fuerte." [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe un dolor intenso y constante, con una intensidad de 8 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva intolerable.

3. Andar: 1 punto - Caminar más de 15-20 metros es extremadamente doloroso, necesita bastón.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, ni siquiera una botella de agua de 2 litros.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente también encuentra sentarse problemático, después de 20 minutos el dolor se intensifica mucho.

7. Viajar: 0 puntos - Viajes son imposibles.

8. Vida social: 1 punto - La vida social del paciente prácticamente no existe, solo ve a su familia inmediata ocasionalmente.

9. Actividad sexual: 1 punto - La intimidad es muy difícil, casi imposible encontrar posiciones cómodas.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme terriblemente, necesita medicación fuerte y se despierta cada hora por el dolor intenso.

Total: 12 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar severa según la Escala Oswestry, con un total de 12 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

55% [REDACTED] | 69/126 [29:49<24:39, 25.95s/it]

Entrevista 69

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo unos días con una molestia leve en la zona lumbar, probablemente por haber dormido mal. El dolor no me impide trabajar ni caminar, no he tomado medicación y duermo bien. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 1 punto (leve) - El paciente describe una molestia leve y no reporta que el dolor impida ninguna de las actividades diarias.

2. Estar de pie: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas al estar de pie.

3. Andar: 0 puntos (normal) - El paciente no reporta problemas al andar.
4. Cuidados personales: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas al realizar cuidados personales.
5. Levantar peso: 0 puntos (normal) - El paciente no reporta problemas al levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas al estar sentado.
7. Viajar: 0 puntos (normal) - El paciente no reporta problemas al viajar.
8. Vida social: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos (normal) - El paciente no menciona problemas en su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos (normal) - El paciente reporta dormir bien.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un estado sin discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

56% [REDACTED] | 70/126 [30:10<22:47, 24.41s/it]

Entrevista 70

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor en la espalda baja desde hace una semana después de cargar unas cajas pesadas en el trabajo. El dolor es constante pero tolerable, como un 4 de 10. Puedo hacer mis actividades normales aunque con cierta incomodidad. Trabajo en oficina y puedo estar sentado sin problemas. Camino normalmente y duermo bien, solo me molesta un poco al levantarme por las mañanas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Dolor persistente pero de intensidad moderada, bajo el umbral de 3 de 10 en el escala de dolor).

2. Estar de pie: 0 puntos (El paciente informa que camina normalmente).
3. Andar: 0 puntos (El paciente informa que camina normalmente).
4. Cuidados personales: 0 puntos (El paciente no informa problemas con cuidados personales).
5. Levantar peso: 1 punto (El paciente informa que tiene problemas leves al levantarse por las mañanas).
6. Estar sentado: 0 puntos (El paciente informa que trabaja sentado sin problemas).
7. Viajar: 0 puntos (El paciente no informa problemas al viajar).
8. Vida social: 0 puntos (El paciente no informa problemas en su vida social).
9. Actividad sexual: 0 puntos (El paciente no informa problemas en su actividad sexual).
10. Dormir: 1 punto (El paciente informa que tiene problemas leves al dormir, solo molesta un poco).

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el puntaje total de este paciente sería de 3 puntos. Este puntaje indica una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

56% [REDACTED] | 71/126 [30:34<22:29, 24.54s/it]

Entrevista 71

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda ha empeorado en las últimas dos semanas. Es un dolor moderado, diría que un 5-6 de 10, que se intensifica cuando estoy de pie por más de 30 minutos. Puedo caminar distancias cortas sin problema, pero evito las caminatas largas. En el trabajo tengo que levantarme de la silla cada cierto tiempo porque me duele estar sentado mucho rato. He empezado a tomar ibuprofeno ocasionalmente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe su dolor como moderado a fuerte (5-6 de 10).

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante cortas distancias sin problemas.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar sin ayuda, pero evita caminatas largas.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente sigue siendo capaz de realizar cuidados personales sin problemas.

5. Levantar peso: 3 puntos - El paciente puede levantar peso, pero requiere esfuerzo y evita hacerlo con demasiada frecuencia debido al dolor.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse, pero solo por cortos períodos de tiempo y necesita levantarse regularmente debido al dolor.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, pero evita viajes largos debido al dolor.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente puede participar en actividades sociales, pero solo en medida que no exacerben el dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no ha comentado si el dolor afecta su actividad sexual.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente puede dormir, pero requiere más tiempo que normal para caer en el sueño y suele despertarse durante la noche debido al dolor.

Total: 21 puntos

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada (21-40 puntos) según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

57% [REDACTED] | 72/126 [31:05<23:42, 26.35s/it]

Entrevista 72

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar me está afectando bastante. Es intenso, alrededor de 7 de 10, y me duele constantemente. No puedo estar de pie más de 15 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar me cuesta, especialmente distancias largas. Sentarme también me duele después de un rato. He tenido que faltar al trabajo algunos días y evito salir con amigos. Duermo mal porque me despierto con dolor durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como intenso, con una intensidad de 7/10, y presente constantemente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 15 minutos debido a que el dolor se vuelve insoportable.

3. Andar: 2 puntos - El paciente encuentra difícil caminar, especialmente distancias largas.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente ha tenido que faltar al trabajo y evitar salir con amigos debido al dolor, lo que puede implicar dificultades en realizar algunos cuidados personales.

5. Levantar peso: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades específicamente para levantar peso, por lo que se asigna un puntaje intermedio.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente encuentra que sentarse también le duele después de un rato.

7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades para viajar, por lo que se asigna un puntaje de 0.

8. Vida social: 1 punto - El paciente evita salir con amigos debido al dolor, lo que puede afectar su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades para realizar actividades sexuales debido al dolor.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta con dolor durante la noche.

El puntaje total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 15 puntos. El puntaje total puede variar desde 0 a 50 puntos, con un puntaje más alto indicando mayor discapacidad. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

58% [REDACTED] | 73/126 [31:29<22:41, 25.69s/it]

Entrevista 73

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Hace tres meses que sufro de dolor lumbar crónico después de una caída. El dolor es severo, constante, de 8 a 9 de 10. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin apoyarme en algo. Caminar es muy difícil, solo puedo hacerlo muy despacio y distancias muy cortas. Necesito ayuda para vestirme y bañarme. No puedo levantar nada pesado. Estar sentado también me duele mucho. He dejado de trabajar y mi vida social se ha visto muy afectada. No puedo tener relaciones íntimas y duermo muy mal, me despierto cada hora por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 9 puntos - El paciente describe que su dolor es severo y constante, con una intensidad de 8 a 9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo por más de 5 minutos.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede caminar muy despacio y solo a cortas distancias.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y bañarse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente describe que sentarse también le duele mucho.

7. Viajar: 0 puntos - No se especifica si el paciente puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente se ha visto muy afectada.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones sexuales.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta cada hora por el dolor.

Total: 15 puntos.

El paciente presenta una alta discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un total de 15 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 9 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

59% [REDACTED] | 74/126 [31:47<20:10, 23.28s/it]

Entrevista 74

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me molesta un poco cuando hago ejercicio intenso o cuando paso mucho tiempo en la misma posición. Es un dolor leve, como un 2-3 de 10, que aparece y desaparece. Puedo hacer todas mis actividades normales sin problema, trabajo 8 horas al día sentado y no tengo inconvenientes. Solo evito levantar objetos muy pesados por precaución. Mi vida social y personal no se ha visto afectada para nada.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molesta un poco, leve, 2-3 de 10).

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita en estar de pie).

3. Andar: 0 puntos (puede caminar normalmente).

4. Cuidados personales: 0 puntos (puede realizar cuidados personales normalmente).

5. Levantar peso: 1 punto (evita levantar objetos pesados por precaución).

6. Estar sentado: 0 puntos (puede sentarse normalmente durante 8 horas al día).

7. Viajar: 0 puntos (puede viajar normalmente).

8. Vida social: 0 puntos (vida social y personal no se han visto afectadas).

9. Actividad sexual: 0 puntos (puede mantener una relación sexual normal).

10. Dormir: 0 puntos (puede dormir normalmente).

Total: 1 punto.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve, con un total de 1 punto en la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

60% [REDACTED] | 75/126 [32:16<21:17, 25.04s/it]

Entrevista 75

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo episodios de dolor lumbar que van y vienen. Cuando tengo dolor, es moderado, unos 5-6 de 10. Puedo estar de pie pero prefiero no hacerlo por períodos largos. Camino sin problemas distancias normales, pero evito las caminatas muy largas. En el trabajo a veces necesito cambiar de posición frecuentemente. He cancelado algunas actividades sociales cuando el dolor es más fuerte. Tomo analgésicos cuando es necesario. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado, con una intensidad de 5-6 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie, pero prefiere no hacerlo por largos períodos.

3. Andar: 1 punto - El paciente camina sin problemas a distancias normales.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no especifica problemas para realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente necesita cambiar de posición frecuentemente en el trabajo, lo que sugiere dificultad para levantar peso.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente no especifica problemas para estar sentado.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita viajes largos debido al dolor.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha cancelado algunas actividades sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no especifica si el dolor afecta su actividad sexual, pero ha cancelado alguna actividad social debido al dolor, lo que sugiere que puede tener algún grado de impacto en la actividad sexual.

10. Dormir: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas para dormir debido al dolor. Sin embargo, toma analgésicos cuando es necesario, lo que sugiere que el dolor puede interferir en la calidad del sueño.

La puntuación total de la entrevista es de 13 puntos. Según la Escala Oswestry, una puntuación total de 0 a 10 indicaría un rango de discapacidad leve, 11 a 20 moderada, y 21 o más severa. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

60% [REDACTED] | 76/126 [32:35<19:28, 23.36s/it]

Entrevista 76

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor de espalda es constante y fuerte, alrededor de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 10 minutos seguidos. Caminar distancias cortas está bien, pero cualquier caminata larga me resulta imposible. Sentarme me duele después de 30 minutos. He tenido que reducir mi jornada laboral y uso una silla especial. Mi vida social se ha reducido considerablemente, evito muchas actividades. Las relaciones íntimas son difíciles por el dolor. Duermo con medicación porque si no me despierto varias veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (Dolor constante y fuerte, superior a 7 de 10)
2. Estar de pie: 1 punto - (No puede estar de pie más de 10 minutos)
3. Andar: 3 puntos - (Caminata corta está bien, pero largas caminatas imposible)
4. Cuidados personales: 3 puntos - (Redujo su jornada laboral y utiliza una silla especial)
5. Levantar peso: No se especificó en la entrevista
6. Estar sentado: 2 puntos - (Dolor después de 30 minutos)
7. Viajar: No se especificó en la entrevista
8. Vida social: 1 punto - (Evita muchas actividades, redujo considerablemente)
9. Actividad sexual: 1 punto - (Difíciles por el dolor)
10. Dormir: 3 puntos - (Duerme con medicación y despierta varias veces por la noche)

La puntuación total es de 19 puntos. Según el Oswestry Disability Index, una puntuación total superior a 40 indica una discapacidad moderada a grave. En este caso, el paciente presenta una discapacidad moderada a grave.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

61% | 77/126 [32:57<18:35, 22.77s/it]

Entrevista 77

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una molestia ocasional en la zona lumbar, principalmente después de actividades físicas intensas o al final de un día largo de trabajo. El dolor es muy leve, máximo un 2 de 10, y desaparece con descanso. Puedo realizar todas mis actividades sin limitaciones. No he necesitado medicación y mi calidad de vida no se ha visto afectada en absoluto. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe un dolor leve y ocasional, que no requiere medicación y desaparece con descanso, por lo que se evalúa en 0 puntos.

- 2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no presenta limitaciones al estar de pie.
- 3. Andar: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones al andar.
- 4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta necesidad de ayuda para realizar cuidados personales.
- 5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no reporta dificultades para levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones al sentarse.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones para viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su calidad de vida no se ha visto afectada en absoluto.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta limitaciones en su actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no reporta problemas para dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica una buena funcionalidad lumbar y una baja discapacidad.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

62% [REDACTED] | 78/126 [33:21<18:29, 23.12s/it]

Entrevista 78

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es severo y constante, de 8-9 de 10. No puedo estar de pie ni siquiera para cocinar o lavarme los dientes sin apoyo. Caminar es extremadamente difícil, solo puedo dar unos pocos pasos muy despacio. Necesito ayuda para vestirme y ducharme. No puedo levantar nada, ni siquiera objetos ligeros. Estar sentado es doloroso después de 15 minutos. He dejado de trabajar completamente. No salgo de casa excepto para citas médicas. La intimidad es imposible por el dolor. Duermo muy poco y mal, incluso con medicación fuerte. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y constante, de nivel 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo para realizar tareas básicas como cocinar o lavarse los dientes.

3. Andar: 0 puntos - El paciente describe que caminar es extremadamente difícil y solo puede dar unos pocos pasos muy despacio.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada, ni siquiera objetos ligeros.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente describe que sentarse es doloroso después de 15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no salida de casa excepto para citas médicas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar y no sale de casa, por lo que su vida social se ha vuelto inactiva.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente describe que la intimidad es imposible debido al dolor.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme muy poco y mal, incluso con medicación fuerte.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería 20 puntos. Esta puntuación indica una discapacidad grave.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

63% [REDACTED] | 79/126 [33:42<17:39, 22.54s/it]

Entrevista 79

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar intermitente que me molesta principalmente por las mañanas al levantarme y después de estar sentado mucho tiempo. Es un dolor moderado, como un 4-5 de 10. Puedo estar de pie sin problema para actividades normales, pero evito estar parado mucho tiempo sin movimiento. Camino bien distancias normales. En el trabajo tengo una silla ergonómica que me ayuda. Ocasionalmente cancelo algún plan social si el dolor es más fuerte ese día. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como moderado, un 4-5 de 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie sin problemas para realizar actividades normales.

3. Andar: 0 puntos - El paciente camina bien distancias normales.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente ocasionalmente cancela planes sociales debido al dolor.

5. Levantar peso: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene dificultades específicas para levantar peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente utiliza una silla ergónoma en el trabajo lo que le ayuda a sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente puede viajar normalmente.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ocasionalmente cancela planes sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: No se especifica.

10. Dormir: No se especifica.

La puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 13 puntos. El puntaje total puede variar desde 0 (sin discapacidad) hasta 50 (máxima discapacidad). En este caso, el paciente presenta una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

63% [REDACTED] | 80/126 [34:03<16:52, 22.02s/it]

Entrevista 80

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor en mi espalda baja es muy intenso, constante, de 9 de 10. No puedo mantenerme de pie más de 2-3 minutos. Caminar incluso dentro de casa es muy doloroso y lento. Necesito ayuda para casi todo: vestirme, bañarme, cocinar. No puedo levantar absolutamente nada. Sentarme es muy doloroso, no aguanto más de 10 minutos. He tenido que dejar de trabajar y dependo de otros para las tareas básicas. No puedo salir de casa. La vida íntima es imposible. Duermo muy pocas horas seguidas, el dolor me despierta constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor como muy intenso, de nivel 9 sobre 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede mantenerse de pie más de 2-3 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente encuentra caminar dentro de casa doloroso y lento.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente requiere asistencia para vestirse, bañarse y cocinar.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse pero solo aguanta 10 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no puede salir de casa.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede llevar una vida social normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La actividad sexual es imposible.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme pocas horas seguidas y el dolor lo despertaba constantemente.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta un nivel de discapacidad lumbar extremo (50-100 puntos), lo que indica una grave discapacidad y una gran necesidad de intervención médica.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 1 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

64% [REDACTED] | 81/126 [34:16<14:30, 19.34s/it]

Entrevista 81

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia leve en la zona lumbar que aparece esporádicamente, principalmente cuando hago movimientos bruscos o cargo algo pesado. El dolor es muy tolerable, máximo un 3 de 10. No me limita en mis actividades diarias, puedo trabajar normalmente, hacer ejercicio y todas mis actividades sociales. Solo tomo precauciones adicionales al levantar objetos pesados. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limitado)

3. Andar: 0 puntos (no limitado)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no limitado)

5. Levantar peso: 1 punto (levemente limitado)

6. Estar sentado: 0 puntos (no limitado)

7. Viajar: 0 puntos (no limitado)

8. Vida social: 0 puntos (no limitado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no limitado)

10. Dormir: 0 puntos (no limitado)

Puntaje total: 2 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, con un puntaje total de 2 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

65% | 82/126 [34:44<16:02, 21.88s/it]

Entrevista 82

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es moderado a severo, oscila entre 6-7 de 10 durante el día. Puedo estar de pie para tareas cortas como cocinar, pero necesito sentarme frecuentemente. Caminar distancias cortas está bien, pero evito caminatas largas. Puedo cuidarme solo pero con dificultad y lentitud. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado me duele después de 45 minutos. He reducido mis horas de trabajo y evito muchas actividades sociales. La intimidad se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como moderado a severo, lo que corresponde a un rango de 6-7 en la escala de dolor de 0 a 10.

2. Estar de pie: 3 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas cortas, pero necesita sentarse frecuentemente, lo que indica alguna dificultad en esta categoría.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar cortas distancias, pero evita caminatas largas, lo que indica alguna dificultad en esta categoría.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero con dificultad y lentitud.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente duele después de sentarse durante 45 minutos.

7. Viajar: 2 puntos - No se menciona ninguna dificultad específica para viajar.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido sus actividades sociales.

9. Actividad sexual: 3 puntos - La intimidad se ha visto afectada.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 2-3 veces por la noche.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 27 puntos (3 puntos por cada ítem en el que el paciente ha reportado alguna dificultad, más 5 puntos por la intensidad del dolor). Esto correspondería a una moderada a alta discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

66% [REDACTED] | 83/126 [34:56<13:40, 19.08s/it]

Entrevista 83

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento dolor lumbar ocasional que aparece principalmente después de jornadas largas de trabajo o cuando hago ejercicio intenso. Es un dolor leve a moderado, como un 3-4 de 10. No me impide realizar mis actividades cotidianas, aunque a veces prefiero no estar de pie por períodos muy largos. Puedo caminar, trabajar y mantener mi vida social normal. Solo evito cargar objetos muy pesados por precaución. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (leve a moderado)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita)
3. Andar: 0 puntos (no limita)
4. Cuidados personales: 0 puntos (no limita)
5. Levantar peso: 1 punto (evita cargas pesadas)
6. Estar sentado: 0 puntos (no limita)
7. Viajar: 0 puntos (no limita)
8. Vida social: 0 puntos (no limita)
9. Actividad sexual: 0 puntos (no limita)
10. Dormir: 0 puntos (no limita)

Respuesta final: La entrevista del paciente corresponde a un puntaje total de 3 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

67% [REDACTED] | 84/126 [35:14<13:01, 18.62s/it]

Entrevista 84

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar crónico intenso de 8 de 10. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin apoyo. Caminar es muy limitado, solo distancias muy cortas y muy despacio. Necesito ayuda ocasional para vestirme y siempre para ducharme. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es doloroso después de 20 minutos. He dejado de trabajar. Salgo muy poco de casa y solo para lo esencial. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal con medicación fuerte, me despierto cada 2 horas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (intensidad de dolor máxima)

2. Estar de pie: 0 puntos - (no puede estar de pie más de 5 minutos)
3. Andar: 1 punto - (caminar muy limitado y despacio)
4. Cuidados personales: 2 puntos - (necesita ayuda ocasional para vestirse)
5. Levantar peso: 0 puntos - (no puede levantar prácticamente nada)
6. Estar sentado: 1 punto - (doloroso después de 20 minutos)
7. Viajar: 0 puntos - (sale muy poco de casa y solo para lo esencial)
8. Vida social: 0 puntos - (no lleva una vida social activa)
9. Actividad sexual: 0 puntos - (no puede tener relaciones íntimas)
10. Dormir: 1 punto - (duerme mal con medicación fuerte, despierta cada 2 horas)

Total: 15 puntos.

El total de 15 puntos indica una discapacidad lumbar muy grave según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

67% [REDACTED] | 85/126 [35:31<12:32, 18.36s/it]

Entrevista 85

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me duele de forma intermitente, principalmente por las mañanas y después de estar mucho tiempo en la misma posición. El dolor es moderado, unos 4-5 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales pero prefiero no hacerlo por más de una hora seguida. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla especial y me levanto cada hora. Algunas veces he cancelado planes si el dolor es más fuerte. Duermo generalmente bien, aunque a veces me despierto si cambio de posición bruscamente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, 4-5/10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede hacerlo para actividades normales, pero solo por una hora seguida)

3. Andar: 0 puntos (Camina sin problemas distancias normales)

4. Cuidados personales: 1 punto (No reporta dificultades)

5. Levantar peso: 3 puntos (Levanta con dificultad y necesita asistencia o toma descansos)

6. Estar sentado: 1 punto (No reporta dificultades)

7. Viajar: 0 puntos (No menciona problemas)

8. Vida social: 2 puntos (Algunas veces cancela planes debido al dolor)

9. Actividad sexual: 1 punto (No reporta dificultades)

10. Dormir: 2 puntos (Duerme bien en general, pero despertado si cambia de posición bruscamente)

Total: 12 puntos

Según el puntaje obtenido, el paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

68% [REDACTED] | 86/126 [35:51<12:30, 18.77s/it]

Entrevista 86

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar que siento es muy leve, aparece ocasionalmente después de actividades físicas o al final del día. Es como un 1-2 de 10, más bien una molestia que un dolor real. No me limita en absoluto para realizar cualquier actividad. Trabajo, hago deporte, salgo con amigos, todo normal. No he necesitado tomar medicación ni hacer cambios en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe el dolor como leve, como un 1-2 de 10 y no limita su actividad.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informa de problemas para estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no informa de problemas en su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informa de problemas en su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informa de problemas al dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica una baja discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

69% [REDACTED] | 87/126 [36:10<12:11, 18.75s/it]

Entrevista 87

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo y constante de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 10 minutos, necesito apoyarme o sentarme. Caminar más de una cuadra es muy difícil y doloroso. Necesito ayuda ocasional para tareas de cuidado personal como ponerme calcetines o zapatos. No puedo levantar objetos pesados, ni siquiera una bolsa de compras llena. Estar sentado me duele después de 30 minutos. He tenido que cambiar a trabajo de medio tiempo. Evito muchas actividades sociales. La intimidad es complicada por el dolor. Duermo con analgésicos pero aún me despierto 2-3 veces. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (Severe and constant pain, scoring 7-8 out of 10)

2. Estar de pie: 1 punto - (Unable to stand for more than 10 minutes)

3. Andar: 2 puntos - (Walking more than one city block is difficult and painful)

4. Cuidados personales: 2 puntos - (Occasional need for help with personal care tasks)

5. Levantar peso: 0 puntos - (Unable to lift objects)

6. Estar sentado: 3 puntos - (Sitting causes pain after 30 minutes)

7. Viajar: 1 punto - (Avoiding travel due to difficulty)

8. Vida social: 1 punto - (Evading social activities)

9. Actividad sexual: 1 punto - (Intimacy is complicated due to pain)

10. Dormir: 3 puntos - (Requires analgesics for sleep, wakes up 2-3 times)

Total score: 16/40 (40 points represents no disability, 100 points represents the most severe disability)

Based on the patient's self-reported symptoms, their total score of 16 indicates a moderate level of disability according to the Oswestry Disability Index.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5

- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

70% [REDACTED] | 88/126 [36:23<10:53, 17.21s/it]

Entrevista 88

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares leves que aparecen principalmente cuando paso mucho tiempo sentado en el trabajo o después de hacer jardinería. El dolor es muy tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide hacer ninguna actividad, puedo estar de pie, caminar, hacer ejercicio y todas mis actividades sociales normalmente. Solo tomo ibuprofeno ocasionalmente cuando la molestia es más persistente.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (molestias leves, tolerables, 2-3 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limitada)

3. Andar: 0 puntos (no limitada)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no limitada)

5. Levantar peso: 0 puntos (no limitada)

6. Estar sentado: 0 puntos (no limitada)

7. Viajar: 0 puntos (no limitada)

8. Vida social: 0 puntos (no limitada)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no limitada)

10. Dormir: 0 puntos (no limitada)

Total: 0-10 puntos. En este caso, la puntuación total es 0 puntos, lo que indica una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

71% [REDACTED] | 89/126 [36:43<11:05, 18.00s/it]

Entrevista 89

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero persistente, alrededor de 5-6 de 10. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas domésticas, pero no por más de 30-45 minutos seguidos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas o el senderismo que antes hacía. Puedo cuidarme solo pero algunas tareas como limpiar el suelo son difíciles. No puedo levantar objetos pesados como antes. En el trabajo necesito levantarme de la silla cada hora. He reducido algunas actividades sociales, especialmente las que requieren estar mucho tiempo de pie. Duermo regular, a veces me despierto si me muevo mal. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - Moderado (4-5/10)

2. Estar de pie: 2 puntos - Pocas horas al día (30-45 minutos)

3. Andar: 3 puntos - Lentamente y con dificultad (normal, pero evita caminatas largas o senderismo)

4. Cuidados personales: 3 puntos - Dificultades con alguna tarea (limpiar suelo)
5. Levantar peso: 4 puntos - Poco o nada (no puede levantar objetos pesados como antes)
6. Estar sentado: 1 punto - Comfortable (siente la necesidad de levantarse de la silla cada hora en el trabajo)
7. Viajar: 2 puntos - Pocas distancias (reducido algunas actividades sociales que requieren estar mucho tiempo de pie)
8. Vida social: 2 puntos - Reducida
9. Actividad sexual: No se especificó
10. Dormir: 2 puntos - Regular, pero despertándose si se mueve mal.

Total: 18 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 18 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

71% | 90/126 [37:24<14:58, 24.96s/it]

Entrevista 90

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar es severo y constante, de 8-9 de 10. Solo puedo estar de pie unos pocos minutos para lo más esencial. Caminar dentro de casa es doloroso y lento, salir a la calle es muy difícil. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior del cuerpo y para ducharme. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una olla con agua. Estar sentado me duele mucho después de 15-20 minutos. No puedo trabajar. Prácticamente no salgo de casa excepto para médicos. No hay vida íntima posible. Duermo muy mal incluso con medicación fuerte, me despierto cada hora o dos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (10-15 es leve, 16-20 es moderada, 21-30 es severa, >30 es muy severa). A partir de la descripción del paciente, el dolor lumbar es muy severo y constantes, por lo que se le asigna 0 puntos en este ítem.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que solo puede estar de pie unos pocos minutos para lo más esencial, por lo que no se le asigna puntos en este ítem.

3. Andar: 5 puntos - El paciente tiene dificultad para caminar dentro de casa, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse la parte inferior del cuerpo y para ducharse, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, por lo que no se le asigna puntos en este ítem.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente duele mucho después de 15-20 minutos sentado, por lo que no se le asigna puntos en este ítem.
7. Viajar: 5 puntos - El paciente prácticamente no salgo de casa excepto para médicos, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
8. Vida social: 5 puntos - El paciente no tiene vida social, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
9. Actividad sexual: 5 puntos - El paciente informa que no hay vida íntima posible, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.
10. Dormir: 5 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación fuerte, despertando cada hora o dos, por lo que se le asigna el máximo de puntos negativos posible en este ítem.

Después de calcular los puntos negativos obtenidos en cada ítem, se les restan a 24, el total máximo de puntos posibles. El puntaje total obtenido por el paciente es de:

$$\text{Total} = 24 - (3 \times 0 + 3 \times 5) = 24 - 15 = 9 \text{ puntos}$$

Según el puntaje obtenido, el paciente presenta una discapac

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1

72% [REDACTED] | 91/126 [37:38<12:34, 21.56s/it]

Entrevista 91

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar que va y viene, principalmente relacionado con el estrés y las malas posturas en el trabajo. Cuando duele, es moderado, unos 4-5 de 10. Puedo estar de pie sin problema para actividades cotidianas, aunque prefiero no hacerlo por períodos muy largos cuando tengo dolor. Camino normalmente. En el trabajo uso una silla ergonómica y hago pausas regulares. Ocasionalmente he tenido que cancelar algún plan social. Tomo analgésicos cuando es necesario y hago ejercicios de estiramiento.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (moderado, 4-5 de 10)

2. Estar de pie: 0 puntos (no hay problemas significativos)

3. Andar: 0 puntos (andar normalmente)

4. Cuidados personales: 1 punto (ocasionalmente hay problemas)

5. Levantar peso: 0 puntos (puede levantar peso normalmente)

6. Estar sentado: 0 puntos (sentarse normalmente)

7. Viajar: 1 punto (ocasionalmente cancela viajes)

8. Vida social: 1 punto (ocasionalmente cancela planes sociales)

9. Actividad sexual: No se mencionó

10. Dormir: No se mencionó

Total: 5 puntos

La puntuación total de 5 indica una leve discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1

- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

73% [REDACTED] | 92/126 [37:50<10:37, 18.75s/it]

Entrevista 92

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una rigidez y dolor leve en la zona lumbar, especialmente por las mañanas al levantarme. El dolor es muy tolerable, máximo un 2 de 10, y mejora con el movimiento durante el día. No me limita para nada en mis actividades diarias. Puedo trabajar, hacer ejercicio, salir con amigos, todo con normalidad. Solo noto la molestia cuando he estado mucho tiempo en reposo. [/INST] 1. Intensidad dolor:

1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin limitación)

3. Andar: 0 puntos (sin limitación)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin limitación)

5. Levantar peso: 0 puntos (sin limitación)

- 6. Estar sentado: 0 puntos (sin limitación)
- 7. Viajar: 0 puntos (sin limitación)
- 8. Vida social: 0 puntos (sin limitación)
- 9. Actividad sexual: 0 puntos (sin limitación)
- 10. Dormir: 1 punto (leve molestia)

Total: 2 puntos

La puntuación total de 2 puntos indica una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

74% [REDACTED] | 93/126 [38:15<11:14, 20.44s/it]

Entrevista 93

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es intenso y constante, de 7 de 10. No puedo estar de pie más de 15 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es limitado, solo distancias cortas y necesito descansar frecuentemente. Puedo cuidarme solo pero me toma más tiempo y esfuerzo. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado también me duele después de un rato, uso cojines especiales. He tenido que reducir mi jornada laboral. Evito muchas actividades sociales que requieren estar mucho tiempo de pie o caminar. La vida íntima se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto varias veces por la noche por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso y constante, con un nivel de 7 sobre 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 15 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede caminar, pero solo cortas distancias y necesita descansar frecuentemente.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero le toma más tiempo y esfuerzo.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente duele sentarse después de un rato y utiliza cojines especiales.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente evita viajes que requieran estar mucho tiempo de pie o caminar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha tenido que reducir actividades sociales debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida sexual ha sido afectada.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y se despierta varias veces por la noche por el dolor.

Basado en la información proporcionada, la puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es de 11 puntos. Esta puntuación indica un alto nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3

75% [REDACTED] | 94/126 [38:43<12:08, 22.76s/it]

Entrevista 94

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo episodios de dolor lumbar que duran varios días. Cuando no tengo dolor, estoy perfectamente bien. Cuando lo tengo, es moderado a fuerte, unos 6 de 10. Durante los episodios, estar de pie por más de 20-30 minutos es incómodo. Puedo caminar pero prefiero distancias cortas. Evito levantar cosas pesadas durante esos días. En el trabajo tengo que hacer más pausas cuando tengo dolor. Ocasionalmente cancelo planes sociales si coincide con un episodio fuerte. Tomo medicación solo durante los episodios. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe el dolor como moderado a fuerte, lo que corresponde a un rango de 4-6 en la escala de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante cortos períodos de tiempo, pero lo encuentra incómodo durante episodios de dolor.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar, pero prefiere distancias cortas y evita caminar durante los episodios de dolor.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas con realizar cuidados personales durante los episodios de dolor.

5. Levantar peso: 2 puntos - El paciente evita levantar cosas pesadas durante episodios de dolor.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse sin problemas, pero prefiere hacerlo menos durante episodios de dolor.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente ocasionalmente cancela planes de viaje debido a los episodios de dolor.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente evita planes sociales durante episodios de dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no informa si hay problemas específicos con la actividad sexual durante los episodios de dolor.

10. Dormir: 3 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con el dormir durante los episodios de dolor, pero se menciona que puede tomar medicación solo durante esos períodos.

Total: 17 puntos.

El paciente obtuvo un total de 17 puntos en la escala Oswestry, lo que corresponde a una moderada a severa discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

75% [REDACTED] | 95/126 [38:58<10:37, 20.55s/it]

Entrevista 95

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es muy leve, aparece solo ocasionalmente después de esfuerzos físicos intensos o malas posturas prolongadas. Es más bien una molestia, como un 1-2 de 10. No interfiere para nada con mis actividades diarias. Trabajo 8 horas sin problema, hago deporte regularmente, salgo y socializo normalmente. No he tenido que hacer ningún cambio en mi estilo de vida. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (Leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (Ninguna dificultad)

3. Andar: 0 puntos (Ninguna dificultad)

4. Cuidados personales: 0 puntos (Ninguna dificultad)

5. Levantar peso: 0 puntos (Ninguna dificultad)

6. Estar sentado: 0 puntos (Ninguna dificultad)

7. Viajar: 0 puntos (Ninguna dificultad)

8. Vida social: 0 puntos (Ninguna dificultad)

9. Actividad sexual: 0 puntos (Ninguna dificultad)

10. Dormir: 0 puntos (Ninguna dificultad)

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente no presenta ninguna dificultad significativa en ninguno de los ítems evaluados, por lo que su puntuación total es 0 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

76% [REDACTED] | 96/126 [39:22<10:49, 21.64s/it]

Entrevista 96

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo de 8 de 10 que no me da tregua. No puedo estar de pie ni para preparar una comida simple, necesito sentarme cada pocos minutos. Caminar hasta el baño es doloroso y lento. Necesito ayuda para ponerme los zapatos y calcetines, y para ducharme uso una silla. No puedo levantar absolutamente nada pesado. Estar sentado es doloroso después de 15-20 minutos incluso con almohadas. No puedo trabajar, he solicitado incapacidad. No salgo de casa salvo para citas médicas indispensables. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy poco y mal, incluso con medicación fuerte. [INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo de intensidad máxima (10/10).

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie debido a su intolerancia al dolor.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no puede caminar debido a su dolor.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar algunas tareas de cuidados personales, como ponerse zapatos y calcetines, y para ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por cortos períodos de tiempo (menos de 15-20 minutos) antes de que el dolor lo obligue a sentarse de nuevo.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no viaja debido a su incapacidad.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no sale de casa salvo para citas médicas indispensables.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede participar en actividades sexuales.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal y poco, incluso con medicación fuerte.

Según la Escala Oswestry, el paciente presenta una discapacidad lumbar severa, con un puntaje total de 12 puntos (el puntaje máximo es 50 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1

- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

77% [REDACTED] | 97/126 [39:35<09:06, 18.83s/it]

Entrevista 97

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar intermitente que aparece principalmente después de jornadas largas de trabajo físico. Es un dolor moderado, como un 4 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales, pero evito estar parado sin movimiento por períodos largos. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo soy más cuidadoso con los movimientos y levantamiento de peso. No he tenido que cambiar mis actividades sociales significativamente. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado)

2. Estar de pie: 0 puntos (No limitado)

3. Andar: 0 puntos (No limitado)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No limitado)

5. Levantar peso: 1 punto (Ligeramente limitado)

6. Estar sentado: 0 puntos (No limitado)

7. Viajar: 0 puntos (No limitado)

8. Vida social: 0 puntos (No limitado)

9. Actividad sexual: 0 puntos (No limitado)

10. Dormir: 0 puntos (No limitado)

Puntuación total: 3 puntos.

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

78% [REDACTED] | 98/126 [40:07<10:44, 23.01s/it]

Entrevista 98

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es constante y moderado a severo, entre 6-7 de 10. Puedo estar de pie para tareas cortas como cocinar, pero necesito apoyarme frecuentemente. Caminar distancias largas es difícil, prefiero distancias cortas. Puedo cuidarme solo pero me cuesta trabajo y me toma más tiempo. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado me duele después de 30-40 minutos. He reducido mis horas de trabajo y uso una silla especial. Evito algunas actividades sociales, especialmente las que requieren mucho movimiento. La intimidad se ha visto afectada ocasionalmente. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe su dolor lumbar como moderado a severo, lo cual corresponde a un puntaje de 5 en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas cortas, pero necesita apoyarse frecuentemente, lo cual corresponde a un puntaje de 2.

3. Andar: 3 puntos - El paciente encuentra caminar distancias cortas difícil, pero puede hacerlo, lo cual corresponde a un puntaje de 3.

4. Cuidados personales: 4 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero le toma más tiempo y es un esfuerzo, lo cual corresponde a un puntaje de 4.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados, lo cual corresponde a un puntaje de 0.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente duele después de sentarse durante 30-40 minutos, lo cual corresponde a un puntaje de 4.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita viajes largos debido a su dolor, lo cual corresponde a un puntaje de 2.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido su participación en actividades sociales debido al dolor, lo cual corresponde a un puntaje de 2.

9. Actividad sexual: 3 puntos - El paciente ha visto afectada ocasionalmente su intimidad debido al dolor, lo cual corresponde a un puntaje de 3.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 2-3 veces por la noche, lo cual corresponde a un puntaje de 3.

Basado en la información proporcionada, el puntaje total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 26 puntos. Este puntaje indica una moderada a severa discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 4 | Diferencia: 3
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

Entrevista 99

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda baja que aparece solo después de estar mucho tiempo en la misma posición o después de ejercicio muy intenso. Es una molestia mínima, como un 1-2 de 10. No me limita en absoluto para ninguna actividad. Trabajo normalmente, hago deporte, salgo con amigos, mantengo mi vida íntima normal. Es más bien una sensación de rigidez que un dolor real. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe una molestia leve, similar a un 1-2 de 10, que no limita su actividad diaria. No se trata de un dolor intenso.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informó ninguna dificultad para estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no informó ninguna dificultad para andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informó necesidad de ayuda en cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informó dificultad para levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informó dificultad para sentarse.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informó dificultad para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no informó que su dolor afectara su vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informó que su dolor afectara su actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informó dificultades para dormir debido a su dolor.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, la puntuación total de este paciente sería de 0 puntos. Esto indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 100

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar que experimento es severo, de 8 de 10, y es constante durante el día. No puedo estar de pie más de 5-8 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar es muy limitado, solo dentro de casa y muy despacio. Necesito ayuda para algunas tareas de cuidado personal como ponerme medias o lavar mi espalda. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es muy doloroso después de 20 minutos. He dejado de trabajar temporalmente. Salgo muy poco de casa, solo para lo indispensable. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal con medicación, me despierto cada 2 horas por el dolor.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como severo y de intensidad 8/10, lo que corresponde a una puntuación de 5 según la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5-8 minutos, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

3. Andar: 1 punto - El paciente puede andar, pero solo dentro de casa y muy despacio, lo que corresponde a una puntuación de 1.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para realizar algunas tareas de cuidados personales, lo que corresponde a una puntuación de 3.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo por 20 minutos antes de que el dolor se vuelva intolerable, lo que corresponde a una puntuación de 1.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente salgo muy poco de casa, solo para lo indispensable, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede tener una vida social normal debido a su estado, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones íntimas, lo que indica una total incapacidad en este ítem y una puntuación de 0.

10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal con medicación y se despierta cada 2 horas, lo que corresponde a una puntuación de 1.

En base a las respuestas del paciente, su puntuación total en la escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 11 puntos, lo que indica una gran incapacidad en el funcionamiento diario.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

Entrevista 101

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es leve a moderado, como un 3-4 de 10, y aparece principalmente después de actividades que requieren estar mucho tiempo de pie o sentado. Puedo estar de pie para actividades normales pero prefiero no hacerlo por más de una hora seguida. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla ergonómica y me levanto cada hora. Ocasionalmente evito algunas actividades sociales si el dolor es más molesto. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 2 puntos (leve)

2. Estar de pie: 3 puntos (moderado) - El paciente puede estar de pie para actividades normales pero prefiere no hacerlo por más de una hora seguida.

3. Andar: 0 puntos (sin problemas)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problemas)

5. Levantar peso: 1 punto (ligeramente limitado) - Ocasionalmente evita alguna actividad debido al dolor.

6. Estar sentado: 1 punto (ligeramente limitado) - Usa una silla ergonomica y se levanta cada hora.

7. Viajar: 0 puntos (sin problemas)

8. Vida social: 1 punto (ligeramente limitado) - Evita alguna actividad social ocasionalmente debido al dolor.

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problemas) - No se menciona problemas en esta área.

10. Dormir: 0 puntos (sin problemas) - Duermo bien la mayoría de las noches.

Total: 8 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve, con un total de 8 puntos en la Escala Oswestry.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

Entrevista 102

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar muy severo de 9 de 10 que es constante. No puedo estar de pie ni para cepillarme los dientes sin apoyarme. Caminar incluso distancias muy cortas dentro de casa es extremadamente doloroso. Necesito ayuda para vestirme completamente y para ducharme. No puedo levantar nada, ni siquiera un vaso de agua lleno. Estar sentado es insoportable después de 10 minutos. No puedo trabajar ni hacer tareas domésticas. No salgo de casa para nada social. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente informa de un dolor lumbar muy severo y constante de 9 de 10, lo que corresponde al máximo nivel de intensidad de dolor en la escala Oswestry.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie ni para cepillarse los dientes, lo que indica que no puede mantenerse de pie por ningún período de tiempo.

3. Andar: 0 puntos - El paciente informa que caminar incluso distancias cortas dentro de su casa es extremadamente doloroso, lo que indica que no puede andar.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda completa para vestirse y ducharse, lo que corresponde al máximo nivel de necesidad de ayuda en la escala Oswestry.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente informa que no puede levantar nada, ni siquiera un vaso de agua lleno.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que estar sentado es insoportable después de 10 minutos, lo que corresponde al nivel 1 de la escala Oswestry.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no salió de casa para nada social, lo que indica que no puede viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no participa en ninguna actividad social, lo que indica que no puede llevar una vida social normal.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa que no hay posibilidad de intimidad, lo que indica que no puede participar en actividades sexuales.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte, lo que indica que no puede dormir normalmente.

En resumen, según la escala Oswestry, el paciente presenta un nivel total de discapacidad lumbar de 35 puntos ($5 \times 0 + 0 \times 1 + 5 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0 + 0 \times 0$). Este nivel de discapacidad se considera extremo y significa que el paciente tiene una gran dificultad para realizar las actividades diarias y requiere una atención médica y de cuidados continuos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

82% [REDACTED] | 103/126 [42:36<11:31, 30.08s/it]

Entrevista 103

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar que fluctúa entre leve y moderado, generalmente un 3-5 de 10 dependiendo del día y las actividades. Algunos días puedo estar de pie sin problema, otros días prefiero sentarme más frecuentemente. Camino normalmente distancias cortas, pero las caminatas largas pueden ser incómodas algunos días. En el trabajo alterno entre estar sentado y de pie. He cancelado algunos planes sociales ocasionalmente cuando el dolor es más fuerte. Tomo analgésicos según necesidad. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe el dolor lumbar como fluctuante entre leve y moderado, lo que corresponde a un rango de 3 a 5 en la escala de dolor de 0 a 10.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie normalmente para distancias cortas, pero algunas veces necesita sentarse más frecuentemente y encuentra incómodo caminar largas distancias.

3. Andar: 2 puntos - El paciente puede caminar normalmente, pero algunas veces encuentra caminar largas distancias incómodo.

4. Cuidados personales: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con levantar peso.

6. Estar sentado: 2 puntos - El paciente alterna entre sentarse y estar de pie en el trabajo.

7. Viajar: 1 punto - El paciente no menciona problemas específicos con viajar.

8. Vida social: 1 punto - El paciente ha cancelado planes sociales ocasionalmente debido al dolor.

9. Actividad sexual: 2 puntos - El paciente no menciona problemas específicos con la actividad sexual, pero ha tenido que adaptarse a algunos grados debido al dolor.

10. Dormir: 2 puntos - El paciente no menciona problemas específicos con el dormir, pero toma analgésicos según necesidad.

Según la escala Oswestry, la puntuación total de este paciente sería de 12 puntos. Una puntuación total de 0 a 10 significa que el paciente no presenta discapacidad significativa, una puntuación de 11 a 20 significa que el paciente presenta una discapacidad leve, una puntuación de 21 a 40 significa que el paciente presenta una discapacidad moderada, y una puntuación superior a 40 significa que el paciente presenta una discapacidad grave. En este caso, el paciente presenta una discapacidad leve.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

83% [REDACTED] | 104/126 [43:05<10:54, 29.76s/it]

Entrevista 104

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me molesta muy poco, solo cuando hago actividades físicas muy intensas o paso demasiado tiempo en malas posturas. Es una molestia muy leve, máximo un 2 de 10. No me impide realizar ninguna actividad normal. Trabajo todo el día, hago ejercicio regularmente, salgo con amigos, viajo sin problemas. Solo tengo que ser un poco más cuidadoso con la postura cuando estoy sentado mucho tiempo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - El paciente describe el dolor como leve y ocasional, no superior a 2 de 10, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente informa que no presenta problemas al estar de pie, por lo que no necesita apoyos ni se ve afectado en esta actividad.

3. Andar: 0 puntos - El paciente no presenta problemas al andar, por lo que no se le asigna puntaje alguno.

4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta necesidad de ayuda en cuidados personales debido a su espalda, por lo que no se le asigna puntaje.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no menciona dificultad en levantar peso, por lo que no se le asigna puntaje.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente informa que necesita ser más cuidadoso al sentarse mucho tiempo, por lo que se le asigna un puntaje de 1.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente viaja sin problemas, por lo que no se le asigna puntaje.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente salva con amigos y no presenta problemas en su vida social, por lo que no se le asigna puntaje.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no menciona problemas en su actividad sexual, por lo que no se le asigna puntaje.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente no presenta problemas para dormir, por lo que no se le asigna puntaje.

Basado en la entrevista, el paciente obtiene un puntaje total de 2 puntos en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

83% [REDACTED] | 105/126 [43:24<09:19, 26.66s/it]

Entrevista 105

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "El dolor lumbar que tengo es intenso, alrededor de 7-8 de 10, y es bastante constante. No puedo estar de pie por más de 10-15 minutos sin que se intensifique mucho. Caminar es limitado, solo puedo hacer distancias cortas y lentamente. Puedo cuidarme solo pero me cuesta trabajo y necesito descansos frecuentes. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado también me duele después de 20-30 minutos. He tenido que tomar licencia médica del trabajo. Evito muchas actividades sociales. La vida íntima es muy difícil. Duermo mal incluso con medicación, me despierto varias veces. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 5 puntos - El dolor es intenso, con una intensidad de 7-8 de 10.

2. Estar de pie: 1 punto - El paciente no puede estar de pie por más de 10-15 minutos.

3. Andar: 2 puntos - Caminar es limitado y solo puede hacer distancias cortas y lentamente.

4. Cuidados personales: 3 puntos - Puede cuidarse solo, pero le cuesta trabajo y necesita descansos frecuentes.

5. Levantar peso: 0 puntos - No puede levantar objetos pesados.

6. Estar sentado: 3 puntos - Estar sentado también le duele después de 20-30 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - No especificó información relevante sobre viajar.

8. Vida social: 1 punto - Evita muchas actividades sociales.

9. Actividad sexual: 0 puntos - La vida íntima es muy difícil.

10. Dormir: 1 punto - Duerme mal incluso con medicación y se despierta varias veces.

Calificación total: 15 puntos.

La puntuación total de 15 indica una discapacidad lumbar severa.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 5 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2

84% [REDACTED] | 106/126 [43:36<07:20, 22.01s/it]

Entrevista 106

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar leve que aparece esporádicamente, principalmente relacionado con el ciclo menstrual y el estrés laboral. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. Puedo realizar todas mis actividades sin limitaciones importantes. Trabajo normalmente, aunque algunos días prefiero usar una almohadilla lumbar. No he tenido que cancelar actividades sociales por el dolor. Duermo bien la mayoría de las noches. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problema)

3. Andar: 0 puntos (sin problema)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problema)

5. Levantar peso: 0 puntos (sin problema)

6. Estar sentado: 0 puntos (sin problema)

7. Viajar: 0 puntos (sin problema)

8. Vida social: 0 puntos (sin problema)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problema)

10. Dormir: 0 puntos (sin problema)

Total: 0-1 puntos (baja discapacidad lumbar)

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 0 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

85% [REDACTED] | 107/126 [44:13<08:28, 26.77s/it]

Entrevista 107

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero persistente, unos 5-6 de 10 la mayor parte del tiempo.

Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas domésticas ligeras, pero necesito sentarme cada 30-45 minutos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas que antes disfrutaba.

Puedo cuidarme solo aunque algunas tareas como limpiar el baño son más difíciles. No puedo levantar cosas pesadas como antes. En el trabajo necesito una silla ergonómica y pausas regulares. He reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes. Duermo regular, a veces me despierto si me muevo mal durante la noche. [/INST] 1. Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe su dolor de espalda como moderado a fuerte, por lo que se le asignan 4 puntos.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para realizar tareas domésticas ligeras, por lo que se le asignan 2 puntos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias normales, pero evita caminatas largas. Se le asignan 3 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero algunas tareas son más difíciles. Se le asignan 3 puntos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar cosas pesadas como antes, por lo que se le asignan 0 puntos.

6. Estar sentado: 3 puntos - El paciente puede sentarse, pero necesita una silla ergonómica en el trabajo y pausas regulares. Se le asignan 3 puntos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente puede viajar, pero evita caminatas largas. Se le asignan 2 puntos.

8. Vida social: 2 puntos - El paciente ha reducido algunas actividades sociales, especialmente deportes. Se le asignan 2 puntos.

9. Actividad sexual: 2 puntos - No se proporciona información suficiente sobre la actividad sexual del paciente. Se le asignan 2 puntos por defecto.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme regularmente, aunque a veces se despierta si se mueve mal durante la noche. Se le asignan 3 puntos.

Según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 21 puntos. La puntuación total se interpreta como siguiente:

- 0-20 puntos: Bajo a moderado nivel de discapacidad lumbar.
- 21-40 puntos: Moderado a alto nivel de discapacidad lumbar.
- 41-50 puntos: Discapacidad grave lumbar.

En este caso, el paciente presenta un nivel moderado a alto de discapacidad lumbar (21 puntos).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2

Entrevista 108

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una ligera incomodidad en la zona lumbar que aparece ocasionalmente después de días muy activos o cuando duermo en una cama incómoda. Es más bien una sensación de rigidez que dolor real, máximo un 1-2 de 10. No me limita para nada en mis actividades cotidianas. Puedo trabajar, hacer ejercicio, salir, viajar, todo con total normalidad. No he necesitado medicación ni cambios en mi rutina.

[/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (mínimo nivel de dolor)

2. Estar de pie: 0 puntos (no limita su capacidad)

3. Andar: 0 puntos (no limita su capacidad)

4. Cuidados personales: 0 puntos (no limita su capacidad)

5. Levantar peso: 0 puntos (no limita su capacidad)

6. Estar sentado: 0 puntos (no limita su capacidad)

7. Viajar: 0 puntos (no limita su capacidad)

8. Vida social: 0 puntos (no limita su capacidad)

9. Actividad sexual: 0 puntos (no limita su capacidad)

10. Dormir: 1 punto (puede tener dificultades ocasionales al dormir debido a la rigidez)

Total: 2 puntos.

La puntuación total de 2 puntos indica una baja discapacidad lumbar. La persona puede realizar todas las actividades cotidianas sin limitaciones significativas.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

Entrevista 109

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar severo de 8-9 de 10 que no me da respiro. Solo puedo estar de pie unos minutos para lo más básico. Caminar dentro de casa es muy doloroso y requiere descansos frecuentes. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior y para ducharme completamente. No puedo levantar nada pesado, ni siquiera una bolsa de supermercado. Estar sentado es muy doloroso después de 10-15 minutos. He dejado de trabajar indefinidamente. Prácticamente no salgo de casa excepto para médicos. No hay vida íntima posible. Duermo muy mal incluso con medicación fuerte, me despierto constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y persistente, con una intensidad de 8-9 de 10, lo que representa una considerable sufrimiento.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie por más de unos minutos para realizar tareas básicas.

3. Andar: 0 puntos - El paciente encuentra caminar dentro de casa muy doloroso y requiere descansos frecuentes.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse completamente, lo que representa una considerable dependencia.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada pesado, ni siquiera una bolsa de supermercado.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra sentarse muy doloroso después de 10-15 minutos, lo que indica alguna dificultad en esta actividad.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente prácticamente no salgo de casa excepto para médicos, lo que indica una falta total de capacidad para viajar.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no tiene vida social debido a la severidad de sus síntomas.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente informa de que no hay vida sexual posible debido a sus síntomas.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación fuerte y se despierta constantemente, lo que indica una considerable dificultad en este aspecto.

En base a las respuestas del paciente, la puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es 21 puntos, lo que corresponde a una alta discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

87% [REDACTED] | 110/126 [45:22<06:37, 24.87s/it]

Entrevista 110

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar aparece en episodios que duran unos días y luego desaparece por semanas. Cuando tengo dolor, es moderado, unos 4-5 de 10. Durante esos episodios puedo estar de pie pero prefiero no hacerlo por períodos largos. Camino normalmente pero evito ejercicios intensos. En el trabajo soy más cuidadoso durante esos días. Ocasionalmente he cancelado algún plan si coincide con un episodio fuerte. Entre episodios estoy completamente normal. [INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - El paciente describe que su dolor lumbar es moderado, con una intensidad de 4-5 de 10.
2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie durante períodos normales, pero prefiere no hacerlo durante episodios de dolor.
3. Andar: 1 punto - El paciente camina normalmente, pero evita ejercicios intensos durante episodios de dolor.
4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no reporta problemas con cuidados personales.
5. Levantar peso: 1 punto - El paciente es más cuidadoso durante episodios de dolor al levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no reporta problemas al estar sentado.
7. Viajar: 2 puntos - El paciente ha cancelado planes debido a episodios de dolor, indicando algunas limitaciones en la capacidad de viajar.
8. Vida social: 1 punto - El paciente evita ejercicios intensos y es más cuidadoso durante episodios de dolor, lo que puede limitar su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no reporta problemas con su actividad sexual.
10. Dormir: 2 puntos - No se especifica si el paciente tiene problemas con el dormir durante episodios de dolor.

Total: 11 puntos.

La puntuación total de 11 indica un funcionamiento moderado a limitado en el paciente, según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2

88% [REDACTED] | 111/126 [45:41<05:47, 23.14s/it]

Entrevista 111

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar constante y severo de 7-8 de 10. No puedo estar de pie más de 8-10 minutos sin que se vuelva insoportable. Caminar está muy limitado, solo distancias muy cortas dentro de casa. Necesito ayuda ocasional para cuidado personal, especialmente para cosas que requieren agacharse. No puedo levantar objetos pesados para nada. Estar sentado me duele después de 25-30 minutos incluso con cojines. He solicitado incapacidad temporal en el trabajo. Salgo muy poco, solo para citas médicas esenciales. La intimidad es muy complicada. Duermo muy mal con medicación, me despierto cada 2-3 horas. [/INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - (constante y severo, impidiendo el estar de pie por más de 10 minutos)

2. Estar de pie: 0 puntos - (no puede estar de pie más de 8-10 minutos)
3. Andar: 1 punto - (limitado a distancias muy cortas dentro de casa)
4. Cuidados personales: 2 puntos - (ocasionalmente necesita ayuda)
5. Levantar peso: 0 puntos - (no puede levantar objetos pesados)
6. Estar sentado: 1 punto - (duele después de 25-30 minutos, incluso con cojines)
7. Viajar: 0 puntos - (salgo muy poco)
8. Vida social: 0 puntos - (solo para citas médicas esenciales)
9. Actividad sexual: 0 puntos - (complicada)
10. Dormir: 1 punto - (duermo mal y despierto varias veces la noche)

Total: 8 puntos

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente presenta una moderada a grave discapacidad lumbar (puntuaciones totales entre 8 y 31).

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

89% | 112/126 [45:57<04:52, 20.87s/it]

Entrevista 112

Respuesta generada:

<s>[/INST] <s>[/INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi espalda me duele de forma leve e intermitente, principalmente después de jornadas largas de trabajo o cuando hago actividades físicas intensas. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide realizar mis actividades diarias normales. Puedo trabajar, hacer ejercicio moderado, salir con amigos. Solo tengo que ser más cuidadoso al levantar objetos pesados y tomar descansos más frecuentes en trabajos físicos. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve (0-2)

2. Estar de pie: 0 puntos - No hay dificultad (0)

3. Andar: 0 puntos - No hay dificultad (0)

4. Cuidados personales: 0 puntos - No hay dificultad (0)

5. Levantar peso: 1 punto - Solo con dificultad leve (1-2)

6. Estar sentado: 0 puntos - No hay dificultad (0)

7. Viajar: 0 puntos - No hay dificultad (0)

8. Vida social: 0 puntos - No hay dificultad (0)

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay dificultad (0)

10. Dormir: 0 puntos - No hay dificultad (0)

Total: 2 puntos

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 2 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

90% [REDACTED] | 113/126 [46:14<04:14, 19.55s/it]

Entrevista 113

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar moderado a severo que oscila entre 6-7 de 10 durante el día. Puedo estar de pie para tareas básicas pero necesito sentarme frecuentemente después de 20-30 minutos. Caminar distancias cortas está bien, pero las caminatas largas son muy incómodas. Puedo cuidarme solo pero tareas como limpiar el suelo o hacer la cama son difíciles. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado también me molesta después de un rato. He reducido mis horas de trabajo a medio tiempo. Evito actividades sociales que requieren mucho movimiento. La vida íntima se ha visto afectada. Duermo mal, me despierto 2-3 veces por dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - The patient reports moderate to severe lower back pain with a pain intensity level between 6-7 out of 10 throughout the day.

2. Estar de pie: 2 puntos - The patient can stand for basic tasks but requires frequent sitting breaks after 20-30 minutes.
3. Andar: 3 points - The patient can walk short distances comfortably but long walks are uncomfortable.
4. Cuidados personales: 3 points - The patient can care for themselves but finds personal care tasks like cleaning the floor or making the bed difficult.
5. Levantar peso: 0 points - The patient is unable to lift heavy objects.
6. Estar sentado: 3 points - Sitting also bothers the patient after a certain period.
7. Viajar: 2 points - The patient can travel but finds it uncomfortable.
8. Vida social: 1 point - The patient avoids social activities that require much movement.
9. Actividad sexual: 1 point - Intimacy has been affected.
10. Dormir: 2 points - The patient experiences poor sleep quality, waking up 2-3 times due to pain.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 5 | Diferencia: 3

90% [REDACTED] | 114/126 [46:38<04:10, 20.90s/it]

Entrevista 114

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo una molestia muy leve en la espalda que aparece solo después de esfuerzos físicos muy intensos o cuando paso muchas horas en una mala postura. Es más bien una sensación de cansancio muscular que dolor, máximo un 1 de 10. No interfiere para nada con mis actividades. Trabajo, hago deporte, salgo, mantengo mi vida normal completamente. No he tenido que hacer ningún ajuste en mi rutina. [INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos - El paciente describe una sensación leve de cansancio muscular sin dolor real, por lo que no se aplicará puntaje.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida estar de pie.
3. Andar: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida andar.
4. Cuidados personales: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida realizar cuidados personales.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida levantar peso.
6. Estar sentado: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida sentarse.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida viajar.
8. Vida social: 0 puntos - El paciente informa que su dolor o molestia no interfiere en su vida social.
9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida tener actividad sexual.
10. Dormir: 0 puntos - El paciente no informa que su dolor o molestia le impida dormir.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, el paciente obtiene un puntaje total de 0 puntos, lo que indica un bajo nivel de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

91% [REDACTED] 115/126 [47:09<04:23, 23.91s/it]

Entrevista 115

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es muy intenso, de 8-9 de 10, y prácticamente constante. No puedo estar de pie más de 3-5 minutos sin apoyo. Caminar es extremadamente limitado y doloroso, solo unos pocos pasos muy lentos. Necesito ayuda para vestirme y ducharme. No puedo levantar absolutamente nada. Estar sentado es insoportable después de 10-15 minutos. No puedo trabajar para nada. No salgo de casa excepto para emergencias médicas. No hay posibilidad de vida íntima. Duermo muy pocas horas seguidas incluso con medicación muy fuerte, el dolor me despierta constantemente. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar intenso y constante, con una escala de 8-9 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie sin apoyo por más de 3-5 minutos.

3. Andar: 0 puntos - El paciente describe que caminar es extremadamente limitado y doloroso, solo unos pocos pasos lentos.

4. Cuidados personales: 5 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse y ducharse.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar nada.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente encuentra el sentarse insoportable después de 10-15 minutos.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente no sale de casa excepto para emergencias médicas.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente no puede trabajar y no salga de casa.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No hay posibilidad de vida sexual.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme pocas horas seguidas incluso con medicación fuerte y el dolor despertándole constantemente.

Según el paciente, su desempeño en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es de 15 puntos (5 puntos por cada ítem con una puntuación de 0-2, y 5 puntos por cada ítem con una puntuación de 3-5). Sin embargo, debido a que el paciente no puede realizar algunas de las actividades básicas de la vida diaria y tiene una intensidad de dolor constante y muy elevada, es probable que su situación sea mucho más grave que lo que indica su puntuación en la escala. Es recomendable que el paciente sea evaluado por un médico especialista para determinar la causa del dolor y tratarlo adecuadamente.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0

- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

92% [REDACTED] 116/126 [47:29<03:48, 22.87s/it]

Entrevista 116

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar que aparece principalmente después de actividades físicas o al final de días muy activos. Es un dolor leve a moderado, como un 3-4 de 10. Puedo estar de pie para actividades normales, aunque prefiero no hacerlo por más de 45 minutos seguidos. Camino sin problemas distancias normales. En el trabajo uso una silla ergonómica y hago pausas. Ocasionalmente he evitado alguna actividad social muy física. Duermo bien la mayoría de las noches, solo a veces me molesta si me acuesto en mala posición. [INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Leve)

2. Estar de pie: 4 puntos (Puede estar de pie para actividades normales con limitaciones)

3. Andar: 5 puntos (Camina sin problemas distancias normales)

4. Cuidados personales: 0 puntos (No hay dificultad para realizar cuidados personales)

5. Levantar peso: 3 puntos (Puede levantar peso con dificultad)

6. Estar sentado: 5 puntos (Puede sentarse sin problemas)

7. Viajar: 5 puntos (Puede viajar sin problemas)

8. Vida social: 3 puntos (Ocasionalmente evita alguna actividad social física)

9. Actividad sexual: 5 puntos (Puede realizar actividades sexuales normalmente)

10. Dormir: 4 puntos (Duerme bien la mayoría de las noches, pero puede molestarle si se acuesta en mala posición)

Total: 27 puntos (Baja discapacidad lumbar)

La puntuación total de 27 indica una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry. El paciente presenta algunos síntomas de dolor lumbar, pero no limita significativamente su actividad diaria.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 5 | Diferencia: 4
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

93% [REDACTED] 117/126 [47:47<03:13, 21.47s/it]

Entrevista 117

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor de espalda es moderado pero constante, alrededor de 5 de 10. Puedo estar de pie para cocinar o hacer tareas ligeras, pero necesito descansar cada 30-40 minutos. Caminar distancias normales está bien, pero evito las caminatas largas. Puedo cuidarme solo aunque algunas tareas son más lentas y difíciles. No puedo levantar cosas pesadas como antes. En el trabajo alterno entre estar sentado y de pie cada hora. He reducido algunas actividades deportivas y sociales. La intimidad a veces se ve afectada. Duermo regular, me despierto ocasionalmente por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 3 puntos - Moderado (4-6/10)

2. Estar de pie: 2 puntos - Algunas dificultades (1-2 hours)
3. Andar: 2 puntos - Normal (no limita)
4. Cuidados personales: 2 puntos - Algunas dificultades (slowly)
5. Levantar peso: 1 punto - Muchas dificultades (can't do)
6. Estar sentado: 2 puntos - Normal (no limita)
7. Viajar: 2 puntos - Normal (no limita)
8. Vida social: 1 punto - Muchas dificultades (avoided)
9. Actividad sexual: 1 punto - Muchas dificultades (avoided)
10. Dormir: 1 punto - Somewhat difficult (occasional awakening)

Total: 12 points (mild disability)

This patient's self-reported symptoms suggest a mild level of disability based on the Oswestry Disability Index (ODI) scoring system. The total score of 12 points indicates that the patient experiences some limitations in their daily life due to their low back pain, but they can still perform most activities.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Andar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 2 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

94% [REDACTED] 118/126 [48:04<02:39, 19.99s/it]

Entrevista 118

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:
"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares muy ocasionales que aparecen solo después de esfuerzos físicos muy intensos o malas posturas prolongadas. Es una molestia muy leve, máximo un 2 de 10. No me limita en absoluto para ninguna actividad cotidiana. Trabajo normalmente, hago ejercicio regularmente, mantengo mi vida social activa. Solo soy un poco más consciente de mi postura cuando estoy sentado por períodos largos. [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - (Leve)

2. Estar de pie: 5 puntos - (No afecta)
3. Andar: 5 puntos - (No afecta)
4. Cuidados personales: 5 puntos - (No afecta)
5. Levantar peso: 5 puntos - (No afecta)
6. Estar sentado: 1 punto - (Leve)
7. Viajar: 5 puntos - (No afecta)
8. Vida social: 5 puntos - (No afecta)
9. Actividad sexual: 5 puntos - (No afecta)
10. Dormir: 4 puntos - (Leve)

Total: 26 puntos

El paciente presenta una baja discapacidad lumbar según la Escala Oswestry, con un total de 26 puntos. Su molestia lumbar levemente afecta solo su postura cuando está sentado por períodos prolongados y su capacidad de dormir ligeramente. No presenta limitaciones significativas en ninguna otra área evaluada.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 5 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 4 | Diferencia: 4

94% 119/126 [48:40<02:53, 24.86s/it]

Entrevista 119

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Sufro de dolor lumbar severo de 8 de 10 que es constante y debilitante. No puedo estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable. Caminar es muy limitado, solo dentro de casa y muy despacio con descansos. Necesito ayuda para vestirme la parte inferior del cuerpo y para ducharme. No puedo levantar prácticamente nada. Estar sentado es muy doloroso después de 15-20 minutos. He dejado de trabajar temporalmente. Salgo muy poco de casa, solo para citas médicas importantes. No puedo tener relaciones íntimas. Duermo muy mal incluso con medicación, me despierto cada 2 horas por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 5 puntos - El paciente describe un dolor lumbar severo y constante de nivel 8 de 10, lo que significa que este ítem obtiene la puntuación máxima.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 5 minutos sin que el dolor se vuelva insoportable, por lo que no puede realizar este ítem.

3. Andar: 0 puntos - El paciente solo puede andar dentro de su casa y muy despacio, lo que indica que no puede realizar este ítem.

4. Cuidados personales: 2 puntos - El paciente necesita ayuda para vestirse la parte inferior del cuerpo y para ducharse, lo que corresponde a nivel 2 de dependencia.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada, por lo que no puede realizar este ítem.

6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero solo durante 15-20 minutos antes de que el dolor sea intolerable, lo que corresponde a nivel 1 de dependencia.

7. Viajar: 0 puntos - El paciente salga solo muy poco de casa y solo para citas médicas importantes, por lo que no puede realizar este ítem.

8. Vida social: 0 puntos - El paciente ha dejado de trabajar temporalmente y no sale mucho de casa, lo que indica que no puede realizar este ítem.

9. Actividad sexual: 0 puntos - El paciente no puede tener relaciones sexuales, por lo que no puede realizar este ítem.

10. Dormir: 0 puntos - El paciente duerme mal incluso con medicación y se despierta cada 2 horas por el dolor, por lo que no puede realizar este ítem.

Combinando los puntos obtenidos en cada ítem, la puntuación total de la entrevista según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar sería de 12 puntos. La puntuación total puede variar desde 0 a 50 puntos, con puntuaciones más altas indicando mayor grado de discapacidad. En este caso, la puntuación de 12 puntos corresponde a un grado considerable de discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Estar sentado | Esperado: 4 | Modelo: 5 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4

95% [REDACTED] | 120/126 [48:55<02:12, 22.07s/it]

Entrevista 120

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es leve e intermitente, aparece principalmente después de días de mucha actividad física o cuando duermo en una cama incómoda. Es un dolor tolerable, como un 2-3 de 10. No me impide realizar mis actividades normales. Puedo trabajar todo el día, hacer ejercicio moderado, salir con amigos. Solo evito cargar objetos muy pesados por precaución y uso una buena almohada lumbar cuando estoy sentado mucho tiempo. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (leve)

2. Estar de pie: 0 puntos (sin problemas)

3. Andar: 0 puntos (sin problemas)

4. Cuidados personales: 0 puntos (sin problemas)

5. Levantar peso: 1 punto (puede levantar objetos de peso con precaución)

6. Estar sentado: 1 punto (puede sentarse largas horas pero con una buena almohada lumbar)

7. Viajar: 0 puntos (sin problemas)

8. Vida social: 0 puntos (puede salir con amigos y participar en actividades sociales)

9. Actividad sexual: 0 puntos (sin problemas)

10. Dormir: 1 punto (puede dormir con un almohadón lumbar suave)

Total: 4 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar leve según la Escala Oswestry, con un total de 4 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1

- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

96% [REDACTED] | 121/126 [49:28<02:06, 25.33s/it]

Entrevista 121

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo dolor lumbar moderado a severo que fluctúa entre 5-7 de 10 según el día. Puedo estar de pie para tareas cortas pero necesito sentarme cada 20-30 minutos. Caminar distancias cortas está bien, pero las largas son difíciles. Puedo cuidarme solo pero me toma más tiempo y esfuerzo. No puedo levantar objetos pesados. Estar sentado también me duele después de un rato, uso cojines especiales. He reducido mi jornada laboral. Evito muchas actividades sociales que requieren mucho movimiento. La vida íntima se ha visto afectada significativamente. Duermo mal, me despierto 3-4 veces por la noche. [/INST] 1.

Intensidad dolor: 4 puntos - El paciente describe un dolor lumbar moderado a severo, fluctuando entre 5-7 de 10, por lo que se le asigna 4 puntos.

2. Estar de pie: 2 puntos - El paciente puede estar de pie para tareas cortas, pero necesita sentarse cada 20-30 minutos, por lo que se le asigna 2 puntos.

3. Andar: 3 puntos - El paciente puede caminar distancias cortas bien, pero las largas son difíciles, por lo que se le asigna 3 puntos.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente puede cuidarse solo, pero toma más tiempo y esfuerzo, por lo que se le asigna 3 puntos.

5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar objetos pesados, por lo que se le asigna 0 puntos.

6. Estar sentado: 4 puntos - El paciente duele después de un rato sentado y utiliza cojines especiales, por lo que se le asigna 4 puntos.

7. Viajar: 2 puntos - El paciente evita muchas actividades sociales que requieren mucho movimiento, pero no se especifica si evita viajar en automóvil o avión, por lo que se le asigna 2 puntos.

8. Vida social: 1 punto - La vida social se ha visto afectada significativamente, por lo que se le asigna 1 punto.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No se especifica si la actividad sexual se ha visto afectada, por lo que se le asigna 0 puntos.

10. Dormir: 3 puntos - El paciente duerme mal y se despierta 3-4 veces por la noche, por lo que se le asigna 3 puntos.

Calificación total: 22 puntos.

El paciente presenta una discapacidad lumbar moderada a severa según la Escala Oswestry, con un puntaje total de 22 puntos.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 3 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 2 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 3 | Diferencia: 2
- Levantar peso | Esperado: 3 | Modelo: 0 | Diferencia: 3
- Estar sentado | Esperado: 2 | Modelo: 4 | Diferencia: 2
- Viajar | Esperado: 2 | Modelo: 2 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 3 | Modelo: 1 | Diferencia: 2
- Actividad sexual | Esperado: 2 | Modelo: 0 | Diferencia: 2
- Dormir | Esperado: 3 | Modelo: 3 | Diferencia: 0

97% [REDACTED] 122/126 [49:44<01:29, 22.39s/it]

Entrevista 122

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Siento una rigidez y molestia muy leve en la zona lumbar, especialmente por las mañanas al levantarme. Es más bien una sensación de tensión que dolor real, máximo un 1-2 de 10. Mejora

completamente con el movimiento durante el día. No me limita para nada en mis actividades. Trabajo, hago ejercicio, salgo, mantengo mi vida completamente normal. No he necesitado medicación ni cambios en mi rutina. [/INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto - Leve intensidad de dolor reportada.

2. Estar de pie: 0 puntos - No limitación en estar de pie.

3. Andar: 0 puntos - No limitación en andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos - No limitación en realizar cuidados personales.

5. Levantar peso: 0 puntos - No limitación en levantar peso.

6. Estar sentado: 0 puntos - No limitación en estar sentado.

7. Viajar: 0 puntos - No limitación en viajar.

8. Vida social: 0 puntos - No limitación en la vida social.

9. Actividad sexual: 0 puntos - No limitación en la actividad sexual.

10. Dormir: 0 puntos - No problemas reportados al dormir.

Respuesta final: La entrevista del paciente corresponde a un total de 0 puntos en la Escala Oswestry de discapacidad lumbar, lo que indica un resultado favorable.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0

98% [REDACTED] 123/126 [50:02<01:03, 21.08s/it]

Entrevista 123

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Mi dolor lumbar es muy severo, de 9 de 10, y constante las 24 horas. No puedo estar de pie ni para actividades básicas como cepillarme los dientes. Caminar incluso dentro de casa es extremadamente doloroso y limitado. Necesito ayuda para vestirme completamente y para todas las actividades de higiene personal. No puedo levantar absolutamente nada. Estar sentado es insoportable después de 5-10 minutos. No puedo trabajar ni hacer tareas domésticas. No salgo de casa para nada social o recreativo. No hay posibilidad de intimidad. Duermo muy poco incluso con medicación muy fuerte, me despierto constantemente por el dolor. [/INST] 1. Intensidad dolor: 0 puntos (Dolor intensidad máxima, 10/10)

2. Estar de pie: 0 puntos (Incapaz de estar de pie)

3. Andar: 0 puntos (Incapaz de andar)

4. Cuidados personales: 5 puntos (Necesita ayuda para vestirse y todos los cuidados personales)

5. Levantar peso: 0 puntos (Incapaz de levantar nada)

6. Estar sentado: 0 puntos (Incapaz de estar sentado por más de 5-10 minutos)

7. Viajar: 0 puntos (No viaja)
8. Vida social: 0 puntos (No sale de casa para nada social o recreativo)
9. Actividad sexual: 0 puntos (No hay posibilidad de intimidad)
10. Dormir: 0 puntos (Durante el día no duerme y duerme mal durante la noche)

Total: 5 puntos (Máximo de puntos posibles en esta escala es 40 puntos, por lo que un total de 5 puntos indica una discapacidad muy severa)

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 5 | Modelo: 2 | Diferencia: 3
- Andar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Cuidados personales | Esperado: 5 | Modelo: 5 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Vida social | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Actividad sexual | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Dormir | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5

98% [REDACTED] 124/126 [50:28<00:45, 22.54s/it]

Entrevista 124

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Llevo cuatro días con dolor lumbar después de hacer ejercicio intenso sin calentamiento adecuado. El dolor es moderado, alrededor de 4 de 10. Puedo estar de pie durante períodos normales, aunque después de 45 minutos empiezo a sentir molestia. Camino sin grandes problemas, completé mi rutina de caminata matutina aunque a ritmo más lento. Para ducharme y vestirme soy más cuidadoso con los movimientos bruscos, pero puedo hacer todo solo. Cargar cosas moderadamente pesadas me genera molestia, evito las cargas muy pesadas pero manejo las normales. Estar sentado en mi trabajo es cómodo por períodos de 2 horas antes de necesitar cambiar de posición. Los viajes cortos son tolerables, ayer viajé 90 minutos con solo un poco de rigidez al llegar. Mantengo mis actividades sociales principales, aunque cancelé una clase de baile por precaución. La vida íntima continúa bien, solo somos más cuidadosos con movimientos bruscos. Duermo bien en general, una noche me desperté por cambiar de posición mal."

[INST] 1. Intensidad dolor: 2 puntos (Moderado, entre 4-6 de 10)

2. Estar de pie: 3 puntos (Puede estar de pie durante períodos normales, pero con molestias después de 45 minutos)

3. Andar: 1 punto (Camina sin grandes problemas)

4. Cuidados personales: 1 punto (Puede hacer todo solo, pero con más cuidadoso en el movimiento brusco)

5. Levantar peso: 2 puntos (Evita cargas muy pesadas, pero puede manejar las normales)

6. Estar sentado: 1 punto (Cómodo durante períodos de 2 horas)

7. Viajar: 1 punto (Tolerables viajes cortos)

8. Vida social: 1 punto (Mantiene sus actividades sociales principales)

9. Actividad sexual: 1 punto (Vida íntima continúa bien)

10. Dormir: 1 punto (Duerme bien en general, con un despertar por cambiar de posición)

Total: 9 puntos.

Según la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar, un puntaje total entre 0-10 puntos indica un funcionamiento normal, 11-20 puntos indica una leve discapacidad, 21-40 puntos indica una moderada discapacidad y 41-50 puntos indica una severa discapacidad. En este caso, el paciente obtiene un puntaje de 9 puntos, lo que indica un funcionamiento normal a levemente afectado.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Cuidados personales | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Estar sentado | Esperado: 1 | Modelo: 2 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 1 | Modelo: 1 | Diferencia: 0

99% ██████████ 125/126 [50:59<00:25, 25.22s/it]

Entrevista 125

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales, Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Doctor, mi dolor de espalda baja es severo y constante, llevo nueve meses así desde una hernia discal. El dolor oscila entre 7-8 de 10 diariamente. Estar de pie más de 10 minutos es insoportable, necesito sentarme o acostarme inmediatamente. Caminar más de 25 metros es extremadamente doloroso, uso andador para cualquier distancia. Para bañarme tengo asiento especial y necesito ayuda de mi hija para lavarme la espalda y pies. Vestirme requiere ayuda, especialmente para calcetines, zapatos y ropa interior, me toma más de 45 minutos. No puedo levantar prácticamente nada, hasta una revista me causa dolor. Estar sentado también es problemático, después de 15-20 minutos el dolor aumenta significativamente. No he podido viajar, cancelé vacaciones familiares importantes. Mi vida social ha desaparecido casi por completo, solo recibo visitas muy cortas. La intimidad es extremadamente difícil, casi imposible sin causar dolor severo. Duermo muy mal, me despierto cada 1-2 horas por dolor intenso, los medicamentos no me alivian suficiente." [INST] 1. Intensidad dolor: 8 puntos - El paciente describe que su dolor de espalda baja es severo y constante, con un intensidad de 7-8 de 10 diariamente.

2. Estar de pie: 0 puntos - El paciente no puede estar de pie más de 10 minutos sin sentirse obligado a sentarse o acostarse debido al dolor.

3. Andar: 0 puntos - Caminar más de 25 metros es extremadamente doloroso para el paciente y requiere el uso de un andador.

4. Cuidados personales: 3 puntos - El paciente necesita ayuda para bañarse, vestirse y lavarse, lo que le toma más de 45 minutos.
5. Levantar peso: 0 puntos - El paciente no puede levantar prácticamente nada sin causar dolor.
6. Estar sentado: 1 punto - El paciente puede sentarse, pero el dolor aumenta significativamente después de 15-20 minutos.
7. Viajar: 0 puntos - El paciente no ha podido viajar debido al dolor.
8. Vida social: 0 puntos - La vida social del paciente ha desaparecido casi por completo.
9. Actividad sexual: 0 puntos - La intimidad es extremadamente difícil, casi imposible sin causar dolor severo.
10. Dormir: 1 punto - El paciente duerme mal y se despierta cada 1-2 horas por dolor intenso, lo que le impide tener una buena descanso.

Based on the Oswestry Disability Index scoring system, the total score for this patient would be 16 points out of a possible 50. A score of 10 or less is considered severe disability, and a score of 21 or more is considered normal. In this case, the patient's score indicates severe disability due to their low back pain.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 4 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Cuidados personales | Esperado: 4 | Modelo: 3 | Diferencia: 1
- Levantar peso | Esperado: 5 | Modelo: 0 | Diferencia: 5
- Estar sentado | Esperado: 3 | Modelo: 8 | Diferencia: 5
- Viajar | Esperado: 5 | Modelo: 8 | Diferencia: 3
- Vida social | Esperado: 4 | Modelo: 8 | Diferencia: 4
- Actividad sexual | Esperado: 4 | Modelo: 0 | Diferencia: 4
- Dormir | Esperado: 4 | Modelo: 1 | Diferencia: 3

100% 126/126 [51:33<00:00, 24.55s/it]

Entrevista 126

Respuesta generada:

<s>[INST] <s>[INST] Clasifica la siguiente entrevista médico-paciente según la Escala Oswestry de discapacidad lumbar.

Evalúa la entrevista según los criterios Oswestry de 0 a 5 en cada ítem: Intensidad de dolor, Estar de Pie, Andar, Cuidados Personales,

Levantar peso, Estar sentado, Viajar, Vida Social, Actividad Sexual, Dormir. La respuesta debe de seguir el siguiente formato para cada ítem:

"1. Intensidad dolor: 2 puntos -".

Paciente: "Tengo molestias lumbares leves desde hace una semana después de pasar mucho tiempo en una mala posición trabajando en mi computadora. El dolor es muy suave, máximo 2-3 de 10. Puedo estar de pie durante toda mi jornada laboral sin problemas significativos. Camino normalmente, incluso mantuve mi rutina de trotar 20 minutos diarios. Me baño y me visto sin limitaciones, solo noto un poquito de rigidez matutina que desaparece rápido. Puedo cargar cosas normalmente, ayer cargué todas mis bolsas de compras sin problema. Paso muchas horas sentado trabajando y estoy cómodo, solo ajusto mi postura ocasionalmente. Los viajes no me afectan, este fin de semana tengo planeado un viaje de 3 horas. Mis

actividades sociales continúan completamente normales, no he cancelado ningún plan. No hay ningún impacto en mi vida íntima con mi pareja. Duermo muy bien, solo la primera noche noté un poquito la molestia pero no me despertó." [INST] 1. Intensidad dolor: 1 punto (Leve) - El paciente describe el dolor como leve, con una intensidad de 2-3 de 10.

2. Estar de pie: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas significativos al estar de pie durante toda su jornada laboral y ha podido continuar su rutina de trotar diariamente.

3. Andar: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente camina normalmente y no ha reportado problemas al andar.

4. Cuidados personales: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas al realizar sus cuidados personales, incluyendo bañarse y vestirse.

5. Levantar peso: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente ha podido cargar cosas normalmente sin problemas.

6. Estar sentado: 1 punto (Leve) - El paciente pasa muchas horas sentado trabajando y se ajusta ocasionalmente su postura, lo que sugiere un leve grado de dificultad.

7. Viajar: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas al viajar, incluso tiene planeado un viaje de 3 horas.

8. Vida social: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente ha informado que sus actividades sociales continúan completamente normales.

9. Actividad sexual: 0 puntos (Ninguna dificultad) - El paciente no ha reportado problemas en su vida sexual.

10. Dormir: 1 punto (Leve) - El paciente solo ha notado un poquito de molestias la primera noche, pero estas no lo despertaron.

Basado en la información proporcionada por el paciente, su puntuación total en la Escala Oswestry de Discapacidad Lumbar es 3 puntos. Esto indica una baja discapacidad lumbar.

Diferencias por ítem:

- Intensidad dolor | Esperado: 0 | Modelo: 2 | Diferencia: 2
- Andar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Cuidados personales | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Levantar peso | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Estar sentado | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1
- Viajar | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Vida social | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Actividad sexual | Esperado: 0 | Modelo: 0 | Diferencia: 0
- Dormir | Esperado: 0 | Modelo: 1 | Diferencia: 1

Evaluación por ítem (promedio y desviación estándar de error)

- Intensidad dolor | Media error: 1.51 | Desviación estándar: 0.91
- Estar pie | Sin datos suficientes
- Andar | Media error: 1.61 | Desviación estándar: 1.85
- Cuidados personales | Media error: 0.77 | Desviación estándar: 1.06

- Levantar peso | Media error: 2.02 | Desviación estándar: 1.90
- Estar sentado | Media error: 1.65 | Desviación estándar: 1.74
- Viajar | Media error: 1.75 | Desviación estándar: 2.01
- Vida social | Media error: 1.34 | Desviación estándar: 1.81
- Actividad sexual | Media error: 1.84 | Desviación estándar: 1.96
- Dormir | Media error: 1.71 | Desviación estándar: 1.71