
(a) Matched-λ warm-up effect
$\Delta = K_0 = 200 - K_0 = 0$; negative favors warm-up
Paired Δ transfer SubOpt (10^{-4})
0.5
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
1
2
3
4
6
8
12
16
24
32
Information multiplier λ/η^2
(b) Information after 200 actions
eigenvalue 1
eigenvalue 2
eigenvalue 3
Fixed-expert condition number: 3.6×10^8
Cumulative Fisher eigenvalue
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
Fixed expert
Active, no warm-up
Active, warm-up
(c) Transfer SubOpt distribution
Fraction of seeds ≤ x
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
Averaged transfer SubOpt at 1,600 actions
Active, no warm-up
Zero-sum OLS, exact leader π
Zero-sum OLS, paired samples
Fixed-expert MLE
Follower-only OLS
(d) Zero-sum protocol effect by task
Exact leader distribution
Paired sampled actions
Paired Δ SubOpt (10^{-4})
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Protected transfer task