

Elaborato di **Calcolo Numerico** Anno Accademico 2019/2020

Niccolò Piazzesi - 6335623 - niccolo.piazzesi@stud.unifi.it Pietro Bernabei - 6291312 - pietro.bernabei@stud.unifi.it

Contents

1	Capitolo 1 1.1 Esercizio 1	3
2	Capitolo 2	4
3	Capitolo 3	5
4	Capitolo 4	6
5	Capitoli 5/6	7

1.1 Esercizio 1

Sviluppando in serie di Taylor in x si ottiene:

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4)$$
$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4)$$

Sostituiamo i termini nell'espressione iniziale:

$$\frac{f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) - \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4) - 2f(x) + f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2}f''(x) + \frac{h^3}{6}f'''(x) + O(h^4)}{h^2} = \frac{h^2f''(x) + O(h^4)}{h^2} = f''(x) + O(h^2)$$

5 Capitoli 5/6