

因为 DS 方程在 $D = 0$ 时是代数的，我们可以解析地推导出这种渐近行为：我们代入 $G_{2n} = (-1)^{n+1}(2n-1)!g_{2n}$ ，将第 $2n$ 个 DS 方程乘以 x^{2n} ，从 $n = 1$ 到 ∞ 求和，并定义生成函数 $u(x) \equiv xg_2 + x^3g_4 + x^5g_6 + \dots$ 。 $u(x)$ 满足的微分方程是非线性的：

$$u''(x) = 3u'(x)u(x) - u^3(x) - x,$$

其中 $u(0) = 0$ 和 $u'(0) = G_2$ 。我们通过代入 $u(x) = -y'(x)/y(x)$ 对 (5) 进行线性化，得到 $y'''(x) = xy(x)$ ，其中 $y(0) = 1, y'(0) = 0, y''(0) = -G_2$ 。满足这些初始条件的精确解是

$$y(x) = \frac{2\sqrt{2}}{\Gamma(1/4)} \int_0^\infty dt \cos(xt) e^{-t^4/4}.$$

如果 $y(x) = 0$ ，则生成函数 $u(x)$ 变为无穷大，因此 $|x|$ 的最小值 $y(x) = 0$ 是级数对 $u(x)$ 的收敛半径。一个简单的图显示 $y(x)$ 在 $x_0 = \pm 2.4419682\dots$ [9] 处消失。因此， $r = 1/x_0 = 0.409506\dots$ ，证实了 (4)。

(4) 中的渐近行为表明 G_{2n} 比 γ_{2n} 的 $n \rightarrow \infty$ 增长得快得多：

$$\gamma_{2n} = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} dx x^{2n} e^{-x^4/4}}{\int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-x^4/4}} \sim 2^n \frac{\Gamma(n/2 + 1/4)}{\Gamma(1/4)}$$