

## PROVIDER LETTER: MAGGIORE RISCHIO

### Questo individuo ha un rischio maggiore del cancro colo-retto

Questo individuo ha completato il modulo della valutazione del rischi del cancro colon-retto fornito a tal fine dal U.S. Surgeon General's My Family Health Portrait web-base strumento della storia familiare presso (<https://familyhistory.hhs.gov>). Il modulo è basato su raccomandazioni dal National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and the United States Preventive Services Task Force (USPSTF).

La stima del rischio generato di questo strumento utilizza sull'anamnesi personale e la informazioni medico della famiglia a classificare pazienti nelle categorie del rischio non aumentato o aumentato. La categorie del rischio aumentato del questo paziente può essere attribuito al fatto che un membri del i suoi genitori ha il cancro colo-retto (relativamente comuni) o al fatto che la sua famiglia ha una propensità ai sindromi congeniti del cancro (per esempio diversi parenti con colon-retto, dell'endometrio, o dei altri tumori; l'anamnesi familiare del cancro colon-retto, in particolare nel parente prima dei 50 anni; una storia familiare di un parente con più di un tipo di cancro). La stima del rischio **fa non** riflettere gli altri fattori del rischio tali come dieta, gara, o massa corporea indice.

### I prossimi passi

- **Si prega di rivedere la storia medica dell'individuo e della famiglia del individuo per confermare i fattori del rischio del cancro colon-retto**
- **Si prega di discutere la necessità degli screening con questo paziente**

*Il livello del rischio e le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico e lo screening che potrebbero necessario oltre aie modificazione che si può fare ai suoi abitudini. Il paziente potrebbe beneficiare dello screening per i tumori colon-retto (ad un'età inferiore di 50 anni), e le ulteriore misure preventive come dieta, corretta nutrizione, esercizio fisico e l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei. Quelli cambiamenti può iniziare ad qualsiasi età.*

**Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio per il cancro colo-retto e raccomandazioni di screening vedi:**

- National Cancer Institute Colorectal Cancer PDQ:  
<http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/genetics/colorectal/HealthProfessional>
- United States Preventive Services Task Force (USPSTF) colorectal cancer for screening recommendations:  
<http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Topic/recommendation-summary/colorectal-cancer-screening>

HHS.gov  
Dipartimento di salute e servizi umani