

# PROVIDER LETTERA- NESSUN AUMENTATO DEL RISCHIO

## Rischio familiare di questo individuo per il cancro coloretale non è aumentato.

Se questo individuo ha un età di 50 anni o più egli o lei può beneficio da del colon-retto carcinoma screening. Il prossimo passo per aiutare questo paziente sarebbe una revisione dell'anamnesi personale e la informazioni medico della famiglia.

Questo individuo ha completato il modulo della valutazione del rischi del carcinoma colon-retto di web-based My Family Health Ritratto strumento storia della famiglia della US Surgeon General a (<https://familyhistory.hhs.gov/>). Il modulo è basato su raccomandazioni dal National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e il United States Preventive Services Task Force (USPSTF).

La stima del rischio generato di questo strumento utilizza sull'anamnesi personale e la informazioni medico della famiglia a classificare pazienti nelle categorie del rischio non aumentato o aumentato. La categorie del rischio aumentato del questo paziente può essere attribuito ad fatto che un membri del i suoi genitori ha il carcinoma colo-retto (relativamente comuni) o ad fatto che la sua famiglia ha una propensità ai sindromi congeniti del carcinoma (per esempio diversi parenti con colon-retto, dell'endometrio, o dei altri tumori; L'anamnesi familiare del carcinoma colon-retto, in particolare nel parente prima dei 50 anni; Una storia familiare di un parente con più di un tipo di carcinoma). La stima del rischio **fa non** riflettere gli altri fattori del rischio tali come dieta, gara, o massa corporea indice.

## I prossimi passi

- **Si prega di rivedere la storia medica dell'individuo e della famiglia del individuo per confermare i fattori del rischio del carcinoma colon-retto**
- **Si prega di discutere la necessità degli screening con questo paziente**

Il livello del rischio e le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico e lo screening che potrebbero necessario oltre aie modificazione che si può fare ai suoi abitudini. Il paziente potrebbe beneficiare dello screening per i tumori colon-retto (ad un'età inferiore di 50 anni), e le ulteriore misura preventive come dieta, corretta nutrizione, esercizio fisico e l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei. Quelli cambiamenti può iniziare ad qualsiasi età.

**Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio per il carcinoma colo-retto e raccomandazioni di screening vedi:**

- National Cancer Institute Colorectal Cancer PDQ:  
<http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/genetics/colorectal/HealthProfessional>
- United States Preventive Services Task Force (USPSTF) colorettaie raccomandazioni di screening dei tumori:  
<http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Topic/recommendation-summary/colorectal-cancer-screening>

HHS.gov

U.S. Department of Health and Human Services