

# PROVIDER LETTERA - MAGGIORE RISCHIO

## Questo individuo ha un rischio maggiore del cancro colo-retto

Questo individuo ha completato il modulo della valutazione dei rischi del cancro colon-retto fornito a tal fine dal **U.S. Surgeon General's My Family Health Portrait** web-base strumento della storia familiare presso (<https://familyhistory.hhs.gov>). Il modulo è basato su raccomandazioni dal National Comprehensive Cancer Network (NCCN) and the United States Preventive Services Task Force (USPSTF).

La stima del rischio generata da questo strumento utilizza sull'anamnesi personale e le informazioni mediche della famiglia a classificare i pazienti nelle categorie del rischio non aumentato o aumentato. La categoria del rischio aumentato di questo paziente può essere attribuita al fatto che un membro dei suoi genitori ha il cancro colo-retto (relativamente comuni) o al fatto che la sua famiglia ha una propensione alle sindromi congenite del cancro (per esempio diversi parenti con colon-retto, dell'endometrio, o dei altri tumori; l'anamnesi familiare del cancro colon-retto, in particolare nel parente prima dei 50 anni; una storia familiare di un parente con più di un tipo di cancro). La stima del rischio **fa non** riflettere gli altri fattori del rischio tali come dieta, gara, o massa corporea indice.

### I prossimi passi

- **Si prega di rivedere la storia medica dell'individuo e della famiglia del individuo per confermare i fattori del rischio del cancro colon-retto**
- **Si prega di discutere la necessità degli screening con questo paziente**

Il livello del rischio e le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico e lo screening che potrebbero essere necessario oltre alle modificazioni che si può fare ai suoi abitudini. Il paziente potrebbe beneficiare dello screening per i tumori colon-retto (ad un'età inferiore di 50 anni), e le ulteriori misure preventive come dieta, corretta nutrizione, esercizio fisico e l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei. Quelli cambiamenti può iniziare ad qualsiasi età.

**Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio per il cancro colo-retto e raccomandazioni di screening vedi :**

- National Cancer Institute Colorectal Cancer PDQ:  
<http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/genetics/colorectal/HealthProfessional>

- United States Preventive Services Task Force (USPSTF) colorettaie raccomandazioni di screening dei tumori:

<http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Topic/recommendation-summary/colorectal-cancer-screening>

HHS.gov

U.S. Department of Health and Human Services