

## PROVIDER LETTER NESSUN AUMENTATO DEL RISCHIO

### Questo individuo non ha un rischio maggiore del carcinoma

Se questo individuo ha un'età di 45 anni o più egli o lei può beneficiare del colon-retto carcinoma screening. Il prossimo passo per aiutare questo paziente sarebbe una revisione dell'anamnesi personale e le informazioni mediche della famiglia.

Questo individuo ha completato il modulo della valutazione del rischio del carcinoma colon-retto fornito a tal fine dal the **U.S. Surgeon General's My Family Health Portrait** web-based strumento della storia familiare presso (<https://familyhistory.hhs.gov>). Il modulo è basato su raccomandazioni dal National Comprehensive Cancer Network (NCCN) e il United States Preventive Services Task Force (USPSTF).

La stima del rischio generato da questo strumento utilizza sull'anamnesi personale e le informazioni mediche della famiglia a classificare pazienti nelle categorie del rischio non aumentato o aumentato. La categoria del rischio aumentato di questo paziente può essere attribuita al fatto che un membro dei suoi genitori ha il carcinoma colo-retto (relativamente comuni) o al fatto che la sua famiglia ha una propensione alle sindromi congenite del carcinoma (per esempio diversi parenti con colon-retto, dell'endometrio, o dei altri tumori; L'anamnesi familiare del carcinoma colon-retto, in particolare nel parente prima dei 50 anni; Una storia familiare di un parente con più di un tipo di carcinoma). La stima del rischio **fa non** riflettere gli altri fattori del rischio tali come dieta, obesità, o massa corporea indice.

### I prossimi passi

- **Si prega di rivedere la storia medica dell'individuo e della famiglia dell'individuo per confermare i fattori del rischio del carcinoma colon-retto**
- **Si prega di discutere la necessità degli screening con questo paziente**

Il livello del rischio e le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico e lo screening che potrebbe essere necessario oltre alla modificazione che si può fare ai suoi abitudini. Il paziente potrebbe beneficiare dello screening per i tumori colon-retto (ad un'età inferiore di 50 anni), e le ulteriori misure preventive come dieta, corretta nutrizione, esercizio fisico e l'utilizzo di antinfiammatori non steroidei. Quelli cambiamenti può iniziare ad qualsiasi età.

**Per ulteriori informazioni sui fattori di rischio per il carcinoma colo-retto e raccomandazioni di screening vedi:**

- National Cancer Institute Colorectal Cancer PDQ:  
<http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/genetics/colorectal/HealthProfessional>
- United States Preventive Services Task Force (USPSTF) colorectal cancer screening recommendations:  
<http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/Page/Topic/recommendation-summary/colorectal-cancer-screening>

HHS.gov  
Dipartimento di salute e servizi umani