
Xarxa hidrogràfica

Geografia · Batxillerat · Bloc 2 · Espanya i Catalunya

Tres conceptes per començar

Abans d'estudiar les xarxes fluvials d'Espanya i Catalunya cal tenir clars tres conceptes bàsics que sovint es confonen entre si:

- **Xarxa hidrogràfica**: conjunt de tots els cursos d'aigua (rius, rierols, torrents, afluents...) d'una mateixa zona, i la manera com s'organitzen i es connecten entre ells.
- **Conca hidrogràfica**: territori on tota l'aigua de la pluja desemboca en un mateix riu principal, i finalment al mar o a un llac. Es tracta d'una veritable unitat territorial, delimitada per les línies de carena (divisòries d'aigües).
- **Règim hidrogràfic**: evolució del cabal d'un riu o d'una conca al llarg d'un cicle anual (per exemple, si el cabal depèn sobretot de la pluja, del desgel, o d'una combinació de totes dues coses).



Esquema general d'una conca hidrogràfica: la divisòria d'aigües (línia de carena) delimita el territori que drena cap a un mateix curs principal, alimentat per afluents.

Espanya: tres grans xarxes hidrogràfiques

La xarxa hidrogràfica de la Península Ibèrica es divideix en tres grans vessants, segons la mar o l'oceà on desemboquen les seves conques: la xarxa **Atlàntica**, la xarxa **Mediterrània** i la xarxa **Cantàbrica**.

Xarxa Atlàntica

És la més extensa de les tres, amb els rius més llargs de la península, que desemboquen a l'oceà Atlàntic. Es caracteritza per un cabal important però irregular al llarg de l'any.

- **Duero**: drena la Submeseta Nord.
- **Tajo i Guadiana**: drenen la Submeseta Sud.

- **Guadalquivir**: drena la depressió del Guadalquivir.

Xarxa Mediterrània

- **Ebre**: recull les aigües del Pirineu i del sistema Ibèric. Té un règim **nivopluvial** (combinació de desgel i pluja) i és el riu més cabalós i llarg de la xarxa mediterrània, amb 928 km de recorregut.
- **Fluvià, Ter i Llobregat**: neixen al Pirineu. Tenen un règim pluvial i torrencial, que provoca inundacions a causa dels desnivells importants del seu recorregut.
- **Millars, Túria, Xúquer i Segura**: conques del relleu litoral, també amb règim pluvial i torrencial (aiguats), amb inundacions per desnivells importants.

Xarxa Cantàbrica

Està formada per conques de petita extensió que neixen a la serralada Cantàbrica o al massís Galaicolleonès i desemboquen a la mar Cantàbrica. Els seus rius són curts: Eo, Navia, Narcea, Nalón, Sella, Deva, Nervión i Bidasoa. Tenen un règim nivopluvial o pluvial, amb un cabal regular al llarg de l'any.

A la seva desembocadura, aquests rius solen formar **ries i estuaris**: una desembocadura àmplia i profunda on es barregen les aigües salades del mar amb les aigües dolces del riu.

Catalunya: tres grans xarxes hidrogràfiques

Els rius catalans desemboquen o bé al riu Ebre, o bé directament al mar Mediterrani. S'hi distingeixen tres xarxes:

Xarxa Pirinenca

Formada pels rius **Segre, Noguera Ribagorçana i Noguera Pallaresa**, els més cabalosos de Catalunya. Neixen al Pirineu; les Nogueres desemboquen al Segre, i aquest, a l'Ebre. Tenen un **règim nivopluvial** (combinació de desgel i pluja) i, actualment, molts d'aquests rius es troben **modificats** per la presència de pantans i centrals hidroelèctriques.

Xarxa Pirinenca-Mediterrània

Formada pel **Muga, el Fluvià, el Ter i el Llobregat**. Neixen al Pirineu, tenen un recorregut mitjà o llarg fins al mar i un **règim hidrogràfic pluvial**.

Xarxa Mediterrània

Formada pel **Francolí, el Gaià, el Foix, el Besòs i la Tordera**. Neixen a la Serralada Prelitoral o Litoral: són rius molt curts, amb poc cabal, i tenen un **règim torrencial** (aiguats sobtats després de pluges intenses).

Cas destacat: l'Ebre

L'Ebre recorre la península des de la Serralada Cantàbrica fins al Mediterrani, i és el cas paradigmàtic de la xarxa mediterrània. Al llarg de dos mil anys, els seus sediments han format un gran delta on conviuen els arrossars amb un nombre important d'espècies vegetals i animals pròpies del lloc.

Relleu d'Espanya

Geografia · Batxillerat · Bloc 2 · Característiques, Meseta i serralades

Trets generals del relleu

El relleu de la Península Ibèrica presenta una sèrie de característiques generals que el diferencien de la resta d'Europa i que expliquen bona part de la seva diversitat climàtica i paisatgística.

- **Gran altitud mitjana**: la Península Ibèrica té una altitud mitjana elevada respecte a la resta d'Europa, d'uns **660 m** sobre el nivell del mar.
- **Meseta Central**: és la unitat principal del relleu peninsular, un ampli altiplà envoltat de muntanyes que ocupa gran part de l'interior de la península.
- **Depressions fluvials**: destaquen la depressió de l'Ebre (nord-est) i la depressió del Guadalquivir (sud-oest), dues grans planes creades pels respectius rius.

Pel que fa a les **costes**, al nord predominen les costes abruptes i escarpades, a causa de la proximitat de la muntanya al mar. Al sud i a l'est, en canvi, les costes són més suaus, amb grans platges, especialment a la zona mediterrània.

A més de la Meseta, la península compta amb altres sistemes muntanyosos perifèrics: els **Pirineus** (nord-est), que separen la península de la resta d'Europa, i les **Serralades Bètiques** (sud-est). Aquestes serralades actuen com una barrera que impedeix que l'efecte moderador del mar arribi a l'interior peninsular.

Dues grans famílies de relleu


El relleu espanyol es pot classificar en dues grans famílies, segons la seva antiguitat geològica i el grau d'erosió:

Massissos antics

Tenen poca altura i formes arrodonides, ja que són restes del **plegament hercinià** (fa uns 300 milions d'anys), molt desgastades per l'erosió al llarg del temps. A l'oest de la península formen un **peneplà** (penillanura) (com els Montes de Toledo o el Sistema Central).

Serralades joves

Presenten grans altures, crestes esmolades i valls estretes i profundes. Van sorgir durant el **Plegament Alpí** (a partir de fa uns 65 milions d'anys) i, per tant, encara estan poc erosionades. Solen tenir una litologia calcària: és el cas de la serralada Ibèrica, la Catalana, els Pirineus i els Prepirineus.



Perfil il·lustratiu (no cartogràfic) de la successió de grans unitats del relleu peninsular, de la Cantàbrica al Sistema Bètic, amb les altituds de referència citades al text.

La Meseta

La Meseta ocupa el **43 %** de la superfície peninsular. És un altiplà sobre un sòcol hercinià arrasat, que el moviment alpí (Terciari) va fracturar en dos grans blocs.

Meseta Nord

Té una altitud mitjana de **800-850 m**, està envoltada de muntanyes i és travessada d'est a oest per la xarxa fluvial del riu Duero. Els seus materials, principalment argilosos i margosos (amb menys presència de materials silicis), formen un terreny "suau", fàcilment erosionable. Aquest relleu homogeni afavoreix els cultius herbacis, els cereals i les lleguminoses.

Meseta Sud

Té una altitud mitjana de **500-700 m** i està formada per dos altiplans (el del riu Tajo i el del Guadiana), separats per les muntanyes de Toledo. Entre els dos altiplans s'hi troba la planura més extensa d'Espanya: **la Manxa**. A diferència de la Meseta Nord, hi predominen els materials silicis.

Serralades interiors

Sistema Central

Té uns **600 km** de llargada (de sud-oest a nord-est) i divideix la Meseta en dues parts. És una zona elevada formada pels sistemes de Somossierra, Guadarrama, Gredos i Gata. Hi predominen materials silicis (granit, quarsites i pissarres), que donen formes suaus i arrodonides. El seu pic més alt és l'**Almanzor** (2.592 m), a la serra de Gredos.

Muntanyes de Toledo

Divideixen en dues meitats la Submeseta Sud, alhora que separen les aigües del Tajo i del Guadiana. El seu cim més alt és el pic de Villuercas (**1.601 m**), i hi destaquen les pròpies muntanyes de Toledo i les serralades de Guadalupe, Montánchez i San Pedro. El seu origen es troba en l'evolució del massís ibèric hercinià, trencat pel moviment alpí: es tracta, doncs, de muntanyes molt antigues i erosionades.

Serralades exteriors

Pirineus

S'estenen al llarg de **440 km**, del Golf de Biscaia al cap de Creus, amb més de 100 km d'amplària. Es van formar durant el moviment alpí, pel xoc de plaques que va plegar els materials sedimentaris de les antigues fosses marines. Són muntanyes joves, poc erosionades, amb cims escarpats i forts desnivells al vessant francès, menys pronunciats al vessant peninsular.

Sistema Bètic

Es troba al sud del riu Guadalquivir i està format per dues serralades:

- **Serralada Penibètica**: propera a la costa, formada per materials de l'antic massís hercinià, elevat pel moviment alpí. Hi destaquen el **Mulhacén (3.482 m)**, el pic més alt de tota la península, i el **Veleta (3.398 m)**, tots dos a Sierra Nevada.
- **Serralada Subbètica**: s'estén des de Gibraltar fins al cap de la Nau, on desapareix sota el mar i torna a sortir a les Illes Balears. Combina calcàries dures i margues toves, cosa que li dona un relleu trencat i irregular.

Massís Gallec


És el més antic de la península. Es va erosionar durant l'era Secundària i, més endavant, va ser afectat pel moviment alpí, que el va fracturar en blocs fallats i enfonsats: forma, així, un massís esglaonat, amb formes suaus a causa de l'erosió. Els rius hi circulen en valls profundes, i les fractures arriben fins al mar, cosa que permet la formació de ries en una costa molt retallada.

Relleu de Catalunya

Geografia · Batxillerat · Bloc 2 · Sistema pirinenc, depressió central i sistema mediterrani

Tres unitats morfoestructurals

Catalunya té una superfície de **31.904 km²** i es tracta d'un territori molt accidentat, amb muntanyes abundants i planes escasses. El seu relleu s'organitza en **tres grans unitats morfoestructurals**: el sistema pirinenc (format alhora pel Pirineu axial, el prepirineu i la serralada transversal), la depressió central, i el sistema mediterrani (format per la serralada prelitoral, la depressió prelitoral i la serralada litoral).



Perfil il·lustratiu (no cartogràfic) de les tres grans unitats del relleu català, de nord a sud, amb les principals altituds citades al text.

Sistema pirinenc

Què és el modelat glacial?

Durant els períodes glacials del Quaternari, un gran mantell de gel cobria la serralada pirinenca i en va modelar el paisatge, generant formes característiques que encara avui es poden observar:

- **Grans valls**, com la de la Garona (Vall d'Aran) o la de la Noguera Pallaresa (vall d'Àneu, al Pallars Sobirà).
- **Circs glacials**: depressions muntanyoses de forma semicircular, com un amfiteatre, amb el fons pla i les parets abruptes.
- **Crestes d'arestes**: formades per l'erosió simultània dels dos vessants d'una muntanya, que en deixen la part superior estreta i punxeguda.
- **Estanys**: formats per l'aigua desfeta de les antigues glaceres.

Pirineu Axial

Format per blocs fallats i aixecats de roques molt antigues (llicorelles, granits). És una serralada força abrupta, de paisatge alpí. Cap a l'est, les altituds van decreixent. El seu punt culminant és el **pic d'Aneto (3.404 m)**, al massís de la Maladeta (Osca), que és també el punt més alt de tot el Pirineu. Dins de Catalunya, el cim més alt és la **Pica d'Estats (3.143 m)**.

Prepirineu

Es caracteritza per tons clars, propis de les roques calcàries, i té una altitud menor que el Pirineu Axial: en pocs casos sobrepassa els 2.500 m. Les aigües corrents en són les principals agents modeladors. No arriba fins a la costa gironina; el seu límit oriental és la Serralada Transversal. Alguns cims destacats són el Cadí (2.641 m), el Pedraforca (2.506 m, dins el Parc del Cadí-Moixeró), el Sant Gervàs (1.881 m) i el Puig de Bassegoda (1.376 m).

Serralada Transversal

Es tracta d'un punt de confluència geològica: centrada a la comarca de la Garrotxa, s'estén pel nord de la Selva, el Gironès, l'oest del Pla de l'Estany i el nord-est d'Osona. És, precisament, el punt de trobada entre els Prepirineus catalans, la Serralada Prelitoral i la Depressió Central.

Al nord de la Serralada Transversal es conserven restes d'antiga activitat volcànica: cons volcànics com Santa Margarida i el Croscat, i corrents de lava com la cinglera basàltica de Castellfollit de la Roca. La muntanya més alta d'aquesta unitat és el **Puigsacalm (1.515 m)**.

Depressió Central

Situada entre els Pirineus i les serralades de la costa, la Depressió Central és una plataforma inclinada lleugerament cap a l'Ebre. S'hi troba una successió d'altiplans i plans d'entre **800 i 1.000 m**, que van perdent alçada (fins a 100 m) cap a l'oest, en direcció a la Depressió de l'Ebre. És una zona amb grans extensions agrícoles, tant de secà com de regadiu especialitzat.

Sistema mediterrani

Serralada Prelitoral

Amb un rang d'altituds d'entre **200 i 1.500 m**, presenta un relleu accidentat, amb muntanyes, turons i valls profundes. El punt més alt, el **Turó de l'Home (més de 1.700 m)**, no és habitual per a aquesta serralada. Hi destaquen dues serralades importants: el **Montseny** (de granit, pissarres i quarsites) i **Prades i els Ports de Beseit** (de materials calcaris). El Montserrat i el Montsant s'hi inclouen per proximitat geogràfica, i estan formats per conglomerats molt resistents a l'erosió.

Depressió Prelitoral

És una fossa allargada d'aspecte ondulat, que ocupa les comarques de la Selva, el Vallès i el Penedès. Es va formar per falles de blocs enfonsats, i s'hi han acumulat materials aportats pels rius i pel mar. Es tracta d'una zona molt erosionada pel pas del temps, amb turons i relleus suaus i altituds moderades (100-200 m). És, a més, l'espai idoni per a les principals comunicacions i concentracions de població del territori.

Serralada Litoral

Amb altituds d'entre 500 i 1.000 m, hi destaquen el **Montnegre (759 m)**, **Collserola (512 m)** i el **Montsià (762 m)**, amb extrems que s'acosten a la costa com el Garraf. Tota la carena va desapareixent a prop del Vendrell, on la Serralada Prelitoral arriba directament al mar. Es tracta de massissos antics, formats per esquists, granits i calcàries, que condicionen el creixement de les principals ciutats del país, com Barcelona.

Climes d'Espanya

Geografia · Batxillerat · Bloc 2 · Mediterrani, Atlàntic, Continental i Canàries

Què és el clima?

El clima és el conjunt de condicions atmosfèriques habituals que caracteritzen una regió a llarg termini: no el temps d'un dia concret, sinó la tendència general al llarg dels anys. Els elements que cal tenir en compte per definir-lo són la temperatura, la pressió atmosfèrica, el vent, la humitat i la precipitació.

A Espanya es distingeixen **quatre grans dominis climàtics**: l'oceànic o atlàntic, el continental o d'interior, el mediterrani i el subtropical (present a les Illes Canàries). Tres factors modifiquen aquestes característiques generals i en generen variants: l'**altitud**, la **latitud** i la **proximitat al mar**.

El clima mediterrani

Mediterrani típic

Present a la costa catalana i valenciana, Ceuta, Melilla i les Illes Balears. Les precipitacions són irregulars i es concentren a la tardor i la primavera, amb totals d'entre **400 i 700 mm** anuals; a finals d'estiu són freqüents les **gotes fredes**. Els hiverns són curts i suaus, i els estius, llargs, calorosos i secs. Els rius presenten estiatges llargs i importants, i pateixen pluges de tardor que poden provocar inundacions (com al Ter o al Túria). La vegetació típica és el bosc perenne (pi, alzina, alzina surera), que en degradar-se dona pas a la màquia, la garriga o l'estepa. Els conreus principals hi són el blat, la vinya i l'olivera, més l'horta a les terres de regadiu.

Mediterrani amb influència atlàntica

Present a les conques del Guadiana i el Guadalquivir. L'absència de serralades que impedeixin l'entrada de depressions i fronts atlàntics permet precipitacions més abundants d'octubre a maig (tardor-hivern). Les temperatures d'hivern hi són més baixes que al mediterrani típic, però la baixa latitud (per l'efecte de l'anticicló de les Açores) provoca estius secs i calorosos, més suaus a la costa i molt calorosos a l'interior d'Extremadura i Andalusia. La vegetació és semblant a la del mediterrani típic: alzines i màquies.

Mediterrani àrid

Al sud d'Alacant, Múrcia i Almeria. És un clima estepari (menys de 400 mm) que arriba a ser desèrtic a la costa (menys de 150 mm anuals). Hi predomina la vegetació de farigola i romaní, sense arbres, i les pluges, quan es produeixen, solen ser torrencials i concentrades sobretot a la tardor.

Mediterrani de muntanya

Present al sistema Mediterrani Català, la serra de Tramuntana, les Bètiques, la serra de Segura i Sierra Nevada. Les precipitacions hi oscil·len entre 600 i 800 mm anuals, amb hiverns frescos i estius suaus.

El clima atlàntic

El clima atlàntic, present al nord peninsular, rep entre **1.000 i 2.500 mm** de precipitació anual, repartits en més de 150 dies, i és escàs només durant l'estiu. L'orografia del nord peninsular provoca **pluges orogràfiques** (ascensió d'aire calent i humit que es refreda en pujar), amb humitat i núvols constants: és el que es coneix com l'"Espanya humida". Les temperatures hi són suaus tot l'any, amb poca oscil·lació tèrmica, i els rius, cabalosos, regulars i curts.

Pel que fa a la **vegetació i l'activitat humana**, hi predomina el bosc temperat caducifoli (roures, faig, falgueres), sovint substituït per plantacions de pins i eucaliptus, amb prats de pastura als vessants. Les activitats principals hi són el conreu de patates, blat de moro i pomeres, i la ramaderia bovina.

Variants del clima atlàntic

- **De muntanya oceànica** (Galícia, muntanyes de Lleó, serralada Cantàbrica, muntanyes Basques, i el Pirineu de Navarra i Aragó fins a l'Aran, la Valira i Núria): descens de temperatures i precipitacions superiors a 1.500 mm, amb nevades freqüents.
- **Oceànic de transició** (terres baixes d'Ourense, nord de Castella i Lleó, Àlaba, La Rioja, Navarra, zones properes al Pirineu d'Aragó i Catalunya): transició cap a l'interior, amb menys pluja, estius secs i hiverns freds.


El clima continental

Present a Castella-la Manxa i la Comunitat de Madrid. Es tracta d'una zona de transició entre la influència mediterrània (a l'est) i l'atlàntica (a l'oest), amb una forta continentalitat: hiverns freds i estius calorosos, és a dir, un **fort contrast tèrmic**. Les precipitacions se situen entre 325 i 550 mm anuals, escasses a l'estiu, amb els màxims a l'hivern i la primavera (associats al front polar) i a la tardor (associats a precipitacions d'origen mediterrani).

Quant a la **vegetació i l'activitat humana**, hi predominen l'alzina i el pi a la muntanya, i un arbust més dens a les zones humides, estepari a les més àrides. L'activitat humana principal és el conreu de cereals de secà i la ramaderia de bestiar de llana (ovelles).

Variants del clima continental

- **Meseta Nord** (envoltada de serralades altes: Sistema Central, Cantàbrica, Sistema Ibèric): més de 100 dies d'hivern amb temperatures mínimes sota els 3 ºC, estius curts (juliol-agost) i precipitacions de 325-600 mm.
- **Muntanya d'interior** (Sistemes Ibèric i Central, Muntanyes de Toledo): elevada continentalitat i sequedat extrema a l'estiu; precipitacions de 400-1.000 mm; hiverns llargs, amb glaçades d'octubre a maig.
- **Domini del Cerç** (depressió de l'Ebre, la Rioja, sud de Navarra, bona part d'Aragó, part meridional de Lleida i terres interiors de Tarragona): precipitacions molt escasses, sovint per sota de 400 mm; hiverns freds, amb boires d'inversió, i temperatures altes a l'estiu. El **vent de cerç**, del nord-oest, bufa a la vall de l'Ebre per la canalització dels corrents d'aire atlàntics: és un vent fred i sec, freqüent a l'hivern però possible en qualsevol estació.



Rangs de precipitació anual (mm) dels principals dominis climàtics d'Espanya, segons les dades citades al text.

El clima subtropical (Canàries)

És un clima subtropical oceànic, amb temperatures suaus tot l'any (**18-21 ºC** a la costa) i precipitacions molt escasses, concentrades a l'hivern i gairebé inexistents a l'estiu. Segons l'altitud, s'hi distingeixen tres variants:

- **Varietat de costa** (0-600 m): subdesèrtica i estepària, amb 18-21 ºC i menys de 350 mm (a Lanzarote i Fuerteventura, menys de 150 mm: pràcticament desèrtica).
- **Varietat de muntanyes mitjanes** (600-1.500 m, als vessants nord de les illes de més relleu, com Tenerife, La Gomera o El Hierro): coneguda com el "mar de núvols", amb 500-1.000 mm i 13-16 ºC.
- **Varietat de cims** (1.500-3.700 m): temperatures per sota dels 12 ºC, glaçades a l'hivern, uns 500 mm de precipitació i una forta insolació (com a l'observatori d'Izaña, a Tenerife).

Climes de Catalunya

Geografia · Batxillerat · Bloc 2 · Mediterrani de costa i d'interior, transició i Atlàntic

Quatre grans grups climàtics

A Catalunya es distingeixen **quatre grans grups climàtics**: el mediterrani de costa, el mediterrani d'interior, la zona de transició (mediterrani-atlàntic) i l'atlàntic de muntanya.

La xifra que distingeix la **Catalunya seca** de la **Catalunya humida** és de **700 l/m²** (700 mm) de pluja anuals: els sectors que superen aquest llindar es concentren als Pirineus, els Prepirineus, l'interior de Girona i el nord de Lleida i Barcelona.

Mediterrani de costa

Present a la zona litoral i a part de la prelitoral. Els **hiverns són suaus**: la cadena muntanyosa litoral i prelitoral impedeix que aquest clima avanci cap a l'interior, i molt poques vegades hi glaça (passen diversos anys sense que el termòmetre baixi de zero graus). Les temperatures mitjanes dels mesos més freds (desembre-gener-febrer) oscil·len entre els **9 ºC** (al nord de la costa) i els **12 ºC** (al delta de l'Ebre).

A l'**estiu**, les temperatures mitjanes se situen entre 24 i 25 ºC, amb forta humitat (xafogor), tot i que la marinada evita que les màximes arribin habitualment als 30 ºC. Les **precipitacions** anuals oscil·len entre els 480 mm (a Tarragona) i els 700 mm (al Baix Empordà), amb un màxim a la tardor que comporta risc d'aiguats.

Mediterrani d'interior

Es tracta d'un clima de tendència continental, amb **més contrast tèrmic** que a la costa. Cobreix la Depressió Central Catalana, el Priorat, la Plana de Vic, i l'interior de les Terres de l'Ebre (Ribera d'Ebre), la Conca de Barberà i l'Alt Camp.

La variació tèrmica anual hi és més gran que a la costa, i la precipitació anual és d'uns 350-650 mm. A l'hivern, les temperatures mínimes es donen a la Plana de Vic, per una **inversió tèrmica** molt acusada. A l'estiu, les màximes hi són més altes que a la costa, però les mínimes són uns 7-8 ºC més baixes, amb menys sensació de xafogor.


Zona de transició (mediterrani-atlàntic)

També anomenada clima prepirinenc, es dona a la zona de l'Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà fora del Parc d'Aigüestortes, i a la zona al voltant de la Pobla de Segur (Pallars Jussà).

Les temperatures hi són d'uns 20 ºC a l'estiu, i properes als 0 ºC a l'hivern. Les precipitacions superen els 700 mm, sense arribar normalment als 1.000 mm. És, en definitiva, un clima de **caràcter mixt**: plou més que al mediterrani normal, amb períodes secs i humits.

Atlàntic de muntanya

Es dona a la Vall d'Aran (**vessant nord dels Pirineus**) i a l'alta muntanya del Pallars i l'Alta Ribagorça: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (al Pallars Sobirà, l'est de l'Alta Ribagorça i el nord del Pallars Jussà) i la Vall Fosca. Rep més de **1.000 mm** de pluja anuals, amb un règim regular durant tot l'any i sense períodes de sequera. Les temperatures mitjanes d'estiu se situen per sota dels 15 ºC.



Rangs de precipitació anual (mm) dels climes de Catalunya, segons les dades citades al text, i el llindar de 700 l/any que distingeix la Catalunya seca de la humida.