

GAGAL JANTUNG PADA PEREMPUAN

SITI ELKANA NAULI, MD

HEART FAILURE AND CARDIOMETABOLIC DISEASES WORKING GROUP

INDONESIAN HEART ASSOCIATION

Perempuan.




Marah : 30minit
Merajuk : 1hari
Mengungkit : Sampai tua



Apa yang dimaksud dengan Gagal Jantung?


Suatu kondisi dimana **jantung tidak dapat memompa darah dengan cukup** untuk memenuhi kebutuhan tubuh






Penurunan fungsi organ vital tubuh








NORMAL



ABNORMAL = GAGAL JANTUNG





PREVALENSI
Gagal Jantung

>500.000 penderita

Dari total penduduk berusia 18 tahun ke atas (Riskesdas Kemenkes RI 2013)

parapuan Tumbuh bersama kekuatan mimpi perempuan Indonesia

Selain Gagal Jantung, Terungkap Penyebab Lain yang Membuat Hanna Kirana Meninggal Dunia di Usia Muda

Kirana Riyantika - Rabu, 3 November 2021 | 18:15 WIB



Adapun yang dialami Hanna Kirana, menurut Icha, kerabat dan orang yang selalu menemani Hana syuting, almarhumah memang memiliki riwayat sakit lambung.

"Almarhumah semasa hidupnya ngeluh sakit enggak pernah sama sekali setiap saya datangin ke lokasi. Palingan ya maag dan lambung *aja sih* ," ujar Icha saat dihubungi *Tribunnews.com*, Rabu (3/11/2021).

Selain karena gagal jantung, menurut Icha, kematian Hanna ini ternyata juga didiagnosa memiliki flek di paru-parunya.

“Meninggal karena sakit flek paru-paru dan gagal jantung,” kata Icha.



GAGAL JANTUNG pada PEREMPUAN

FAKTOR RISIKO

Penyakit penyerta

- Penyakit jantung koroner
- Hipertensi
- Penyakit jantung katup
- Infeksi
- Kemoterapi
- Komplikasi kehamilan
- Nadi yang tinggi
- Tidak diketahui

Perilaku tidak sehat



GAYA HIDUP MALAS

Perempuan gemuk berisiko mjd GJ 50%



GARAM dan CAIRAN

Konsumsi garam dan cairan berlebihan dapat menimbulkan bengkak
Kurangi asupan cairan sampai 2 liter/hari



ALKOHOL DAN OBAT2AN

© 2015 WomenHeart: The National Coalition for Women with Heart Disease. Supported by grants from St. Jude Medical Foundation and Novartis Pharmaceuticals Corporation, and sponsored by Amgen.

FAKTA-1

- KOLESTEROL – Kolesterol tinggi lebih banyak pada perempuan
- TEKANAN DARAH – Kehamilan dan beberapa obat pengontrol kehamilan dapat meningkatkan tekanan darah
- DIABETES – Meningkatkan kemunkinan terkena penyakit jantung dan gagal jantung sampai 7 kali (pria 3 kali)
- USIA – Timbulnya keluhan pada perempuan lebih lambat
- AKTIVITAS FISIK – Osteoporosis dan kondisi penuaan membatasi aktivitas fisik

FAKTA-2

- Perempuan selalu lebih lambat mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit karena datang dalam kondisi yang terlambat

- Keluhan perempuan tidak khas dan sering diabaikan

- Perempuan yang sakit akan terus melakukan aktivitasnya sebagai "pekerja RT" di kala sakit



Tekanan Darah

	Sistolik mm Hg		Diastolik mm Hg
Tekanan Darah Rendah (Hipotensi)	kurang dari 80	atau	kurang dari 60
Normal	80-120	dan	60-80
Prehipertensi	120-139	atau	80-89
Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi Tahap 1)	140-159	atau	90-99
Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi Tahap 2)	160 atau lebih	atau	100 atau lebih
Krisis Hipertensi	Lebih dari 180	atau	Lebih dari 110

GEJALA *Diabetes* PADA WANITA YANG HARUS DI *Waspadai*



Selalu merasa haus



Pandangan buram



Selalu merasa lapar




Sering buang air kecil



berat badan



Kesemutan atau mati rasa


Severity of diabetes
Impaired glucose tolerance
Frank diabetes
Insulin resistance
Hepatic glucose producti
Endogenous insulin
Postprandial blood glucos
Fasting blood glucose
Microvascular complications
Macrovascular complications
Years to decades
Time
Typical diagnosis of diabetes

BAGAIMANA GEJALA GAGAL JANTUNG?

Gejala yang Tampak

Sukar bernafas (nafas memendek)




Mudah letih dan lesu, akibat kurangnya asupan oksigen dan nutrisi di jaringan & organ tubuh

Gejala lainnya


- Batuk-batuk di malam hari
- Hilang nafsu makan
- Perut membengkak dan berasa begah
- Tidur lebih nyaman jika menggunakan 2 bantal atau lebih

Edema (pembengkakan kaki & pergelangan kaki akibat penumpukan cairan di jaringan tubuh)



TANDA DAN GEJALA PASIEN GAGAL JANTUNG

"Beratnya klinis gagal jantung dikelompokkan berdasarkan ***keterbatasan melakukan aktivitas fisik****"*



GEJALA GAGAL JANTUNG



Mudah lelah dan sesak nafas



Tidur dengan lebih dari 1 bantal



Tidak selera makan



Bengkak

Kedua kaki, perut



Mudah Pusing



Terbangun tengah malam


merasa sesak seperti tenggelam



Batuk Kering

CARA MENGETAHUI DIAGNOSIS GAGAL JANTUNG

Adanya **tanda dan gejala** gagal jantung pada seseorang yang dilengkapi dengan **data penunjang**



APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA MEMILIKI TANDA DAN GEJALA GAGAL JANTUNG???





Hubungi dokter segera atau pergi ke Unit Gawat Darurat (UGD)

Jika Anda mengalami tanda sebagai berikut :

- Sulit bernapas
- Nafas yang pendek (tersengal-sengal) walaupun dalam kondisi duduk
- Nyeri dada
- Bingung atau tidak dapat berpikir secara jernih

APA YANG HARUS DILAKUKAN JIKA MEMILIKI TANDA DAN GEJALA GAGAL JANTUNG???





Waspada - Hubungi dokter atau rumah sakit segera

Bila Anda berada pada zona ini dengan tanda-tanda berikut:

- Berat badan naik 2 kg atau lebih dalam 1 minggu.
- Nafas Anda menjadi pendek
- Pembengkakan pada bagian punggung kaki, pergelangan kaki, betis atau perut menjadi lebih bengkak dari sebelumnya.
- Merasa lebih lelah dan tidak ada tenaga
- Pusing atau pening
- Merasa tidak nyaman/cemas




TUJUAN PENGOBATAN

1. **Meningkatkan fungsi** jantung
2. **Mengurangi gejala**
3. **Mencegah memburuknya** gejala sehingga memerlukan rawat inap di rumah sakit
4. Meningkatkan **kualitas hidup**
5. **Meningkatkan usia harapan hidup**



DETEKSI DINI DAN PENGOBATAN YANG TEPAT

GAGAL JANTUNG adalah KONDISI PROGRESIF YANG MEMATIKAN



Gheorghiade et al. Am J Cardiol 2005;96:11G–17G; Gheorghiade & Pang. J Am Coll Cardiol 2009;53:557–73

PENGOBATAN GAGAL JANTUNG



Membantu mengeluarkan kelebihan cairan lewat urine

- **Penghambat beta**
- **Penghambat enzim pengubah angiotensin**
- **Penghambat reseptor angiotensin**
- **Penghambat reseptor angiotensin dan enzim**
- **neprilisin (ARNI)**
- **Agen pelebar pembuluh darah**



APA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PASIEN GAGAL JANTUNG ?

01



Minum Obat

Secara Teratur

02



Tidak Mengubah

Ataupun mengurangi dosis obat tanpa saran dari dokter

03



Kurangi Konsumsi Garam

04



Batasi Konsumsi Cairan

05



Timbang Berat Badan

Setiap Pagi

06



Olahraga teratur dan Istirahat cukup



Cara Mengurangi Konsumsi Garam



Gunakan garam secukupnya saat memasak makanan, tidak lebih dari 1 sendok teh dalam 1 hari

Kurangi konsumsi bahan makanan olahan dengan kadar garam yang tinggi, seperti keju, daging olahan seperti ham, sosis, kornet, atau berbagai macam saus





Baca label bahan makanan sebelum mengonsumsi

Konsumsi buah dan sayur-sayuran segar lebih banyak




Cara Membatasi Konsumsi Cairan

1. Tanya dokter anda berapa banyak yang boleh anda minum dalam 24 jam

2. Hitung berapa ml cairan setiap kali anda minum. Untuk memudahkan, gunakan **tempat minum yang sama** yang **telah diketahui takarannya.**

3. Cairan pada makanan, seperti sup, jus, buah, atau es krim juga termasuk dalam hitungan ini







Menimbang Berat Badan

Timbang berat badan
sebelum makan pagi



Setiap Pagi





Setiap Hari

Timbang berat badan anda
setiap hari dengan timbangan
yang sama

Catat

Catat tiap hari





Jangan lupa!





Pakai pakaian dengan berat kurang lebih sama

Berkemih terlebih dahulu sebelum menimbang




Gunakan alat timbang yang sama

Sadari perubahan berat badan anda jika terdapat **kenaikan 1 kg** dalam **1 hari** atau **3 kg dalam 1 minggu**, konsultasikan dengan dokter anda




KALAU BUKAN KITA
SIAPA LAGI


Kalau Bukan Sekarang
Kapan lagi ?


IF NOT US
IF NOT NOW
WHO?
WHEN?
John F. Kennedy

HARI PEDULI GAGAL JANTUNG INDONESIA


3 Mei 2019

Kenali Gagal Jantung!!

Visit us : www.inahfcarmet.org


Cara Berolahraga

- **Tanyakan pada dokter** anda seberapa berat anda boleh berolahraga
- Rencanakan olahraga pada saat anda **merasa paling bertenaga** (setelah bangun pagi atau setelah tidur siang)
- Lakukan olahraga dengan **jangka waktu lebih pendek dan lebih sering** (berjalan 10 menit dipagi hari, 10 menit meregangkan tubuh disiang hari, dan berjalan 10 menit di sore



Cara Berolahraga

- Apabila anda melakukan olahraga berjalan, maka berjalanlah pada **permukaan yang datar, di tempat yang anda kenal dengan baik**.
- Ajak teman atau sanak saudara apabila anda baru mulai berolahraga
- Apabila anda **merasa lelah** sewaktu berolahraga, **kurangi lama** atau **frekuensi** anda berolahraga




Cara Berolahraga

- Jangan berolahraga dengan **terlalu berat** dan usahakan anda masih mampu berbicara ketika berolahraga
- Pilihlah olahraga yang anda senangi
- **Hentikan olahraga dengan segera apabila anda merasa sesak nafas**, lemas, pusing, berdebar, atau kesakitan



KEPATUHAN BEROBAT

MINUM OBAT MU...



TIPS & TRICK



GUNAKAN
KOTAK OBAT



PENGINGAT
DENGAN CATATAN ATAU ALARM DI HANDPHONE



TANYAKAN DENGAN JELAS
CARA MINUM OBAT HARUS PERUT KOSONG ATAU TIDAK




SELALU MEMBAWA DAFTAR OBAT
SETIAP KUNJUNGAN KE DOKTER

PERUBAHAN POLA HIDUP










GULA DARAH → NORMAL
CHOLESTEROL → NORMAL

“BOLEH MAKAN APA SIH, DOK??”



Gagal Jantung – Masalah Nutrisi



Natrium

Pembatasan asupan: 1200 – 2400 mg/hari

Menahan cairan tubuh → beban jantung

Pembatasan <500 mg tidak dianjurkan

- Rasa –
- Kebutuhan tubuh tidak terpenuhi

Sumber Natrium

- **Garam (NaCl)**
- **MSG**
- ***Rock salt, sea salt, herb salt, chicken salt, garlic salt***
- **Baking soda, baking powder**
- **Sodium sorbat, sodium nitrat**

Makanan Rendah Natrium


Fresh, frozen or canned fruit


Fresh fish and seafood


Fresh meats


Yogourt


Milk


Fresh & frozen vegetables


Canned beans and vegetables with no added salt or well rinsed


Lemon, oils & vinegars


Dried beans


Whole oats


Unsalted crackers


Eggs


Unsalted nuts and nut butters


Rice and pasta


Spices and herbs


Onion and garlic


Homemade soup


Low sodium or well rinsed canned fish


Bread


Frozen desserts

Makanan Tinggi Natrium


Salt/sea salt


Fast foods


Hot dogs/smoked meats


Pizza


Cheese


Canned pasta sauce


Sauces & seasonings


Snack foods


Salted crackers


Vegetable juice


Bouillon cubes or powders


Pickles/Olives


Restaurant food


Cold cuts (Ham)


Bacon


Sausages


Canned soups


Frozen meals


Salted nuts


Soy sauce

Water Weight

- **Timbang BB harian**
  - Sebelum makan
  - Setelah buang air kecil
  - Jumlah pakaian yg sama
  - Waktu yang sama
  - Timbangan digital



Kenaikan BB harian → bukan dari kalori → cairan

Tips Mengurangi Rasa Haus

- Konsumsi sepotong kecil buah dingin/beku (anggur beku /jeruk dingin)
- Sikat gigi lebih sering
- Kumur-kumur dengan pencuci mulut bebas alkohol, dingin
- Makan permen/permen karet (bebas gula)
- Tambahkan bbrp tetes lemon dalam minuman
- Gunakan *lip balm* untuk mencegah bibir kering

Pencetus Kekambuhan

- Berhenti minum obat
- Minum terlalu banyak
- Kelelahan berlebihan
- Serangan jantung baru
- Perburukan kondisi kelainan jantung
- Demam/Infeksi
- Gangguan irama jantung
- Tekanan darah tidak terkontrol
- Gangguan fungsi ginjal
- Obat-obatan lain yang menyebabkan retensi cairan
- Kelebihan asupan garam dan lemak

Pemantauan Sendiri

- Catat nama obat-obatan dan jangan lupa minum obat
- Kontrol teratur
- Batasi minum sesuai anjuran
- Aktivitas disesuaikan kondisi
- Awasi berat badan bila peningkatan drastis ---- kontrol
- Batasi asupan garam
- Konsultasikan ke dokter bila harus minum obat yang lain
- Minum obat demam dan obati penyebab bila demam