

Machine Learning

Tipos de problema

1. Clasificación

- Predice una clase
- Las métricas: que hacen sentido para este tipo de problemas, accuracy.
- Accuracy: Los que fueron buenos / todos
- Precision: Indica falsos positivos ($f/(t+f)$)
- Recall: Indica falsos negativos ($t/(t+f)$)
- F1-Score: Cuando Precision y Recall tienen la misma importancia

2. Regresión

- Predice un valor.
- Las métricas: Error MSR2, etc.

Tipos de datos

- Estructurado
- Semiestructurado
- No estructurado: Texto cae acá. Tenemos que pasarlo de un esquema no estructurado a un estructurado, en numeritos.

Aprendizaje

1. Supervisado: Tiene etiquetas
2. No supervisado: No tiene etiquetas, no tiene métricas de desempeño. No sabes qué es la verdad, así que no podemos decir qué está bien y mal
 - TSNE
 - Análisis de componentes principales
 - Clusterización
 - K-Means
 - OBSCAN
 - Affinity Propagation
3. Por refuerzo

Análisis de los datos

Tipos de datos

- Estructurado
- Semiestructurado
- No estructurado: Texto cae acá. Tenemos que pasarlo de un esquema no estructurado a un estructurado, en numeritos.

Variables

Numeros, cantidades o medidas con los que describimos.

- Discreta: Numeros enteros. (ej. cantidades)
- Continuas: Rango (ej. precio)
- Categóricas: Etiquetas o categorías. El tipo de variable categórica implica distintas forma de codificarlos para el modelo.

- Nominales: El orden no importa
- Ordinales: El orden importa (ej. nivel académico)

Características

- Datos faltantes (ej. null): Los modelos de machine learning no pueden trabajar si faltan datos
- Cardinalidad: Representa la cantidad de valores distintos por categoría (ej. Genero puede ser Hombre y Mujer, o sea que tiene una cardinalidad 2).
 - Recordemos que las muestras en los sets de prueba y entrenamiento deben tener la misma cardinalidad y en un *ratio* equivalente (?).
 - Si la cardinalidad es baja, casi constante, no vale la pena para entrenamiento?
- Distribución

Distribución

Describe la probabilidad de tener uno de los posibles valores que una variable puede tener (ej. prob de que sea hombre y mujer donde hay 4 hombres y 3 mujeres)

El tipo de distribución nos permite adaptar un método de imputación para rellenar los variables faltantes.

Discreta:

- Binomial
- Poisson

Continua:

- Normal: Media, moda y mediana son iguales (simétrica). La inferencia usando una distribución normal sale bien
- Uniforma
- Exponencial
- Entre otras

Medidas de tendencia central

Media: Promedio aritmético de un conjunto de datos Mediana: Valor central de un conjunto de datos ordenados.

- Para los valores atípicos, extremos, que afectan la media. (ej. casi todos ganan \$5 y una persona \$1000)

Moda: Valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos

Medidas de dispersión

Rango: $\text{val_max} - \text{val_min}$ Varianza: Dispersión de los valores respecto a la media.

- Poblacional (+30 datos)
- Muestral

Desviación estándar: Raíz cuadrada de la varianza, para tener el valor sobre la unidad original.

Rango inter cuartil: Para obtener los valores atípicos, siendo los que no están entre 1.5 de Q1 y Q3.

Regresión Lineal simple

Un modelo que intente pasar lo más cerca de todos los puntos como sea posible.

Origen: Un estudio de estaturas de padre-hijo, la descendencia tiende a ser lo que la mayoría de la población. Los descendientes “regresan” a un parámetro que representa toda la población

$y = mx + b$ nos dice que si queremos predecir la variable independiente necesitamos una pendiente y un *interceptor* (u ordenada a el origen).

Es decir que $\hat{y} = w_1x + w_0$ quiere decir que el valor de la variable dependiente predicho es igual a un primer peso w_1 multiplicado por el valor independiente y sumado con otro peso w_0

Evaluando la regresión lineal

A la distancia entre los puntos y la línea tenemos un **residuo** u **error**.

Error cuadrático medio (MSE)

1. Podemos obtener la distancia de todos los puntos y el valor predicho.
2. Tomar su valor absoluto (elevantarlo al cuadrado).
3. Obtener el promedio

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i$$

Root mean square error

Si al MSE le sacamos la raíz cuadrada obtenemos

$$\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \hat{y}_i}$$

Mean absolute error

Usa el valor absoluto en lugar de MSE/RMSD

Ordinary Least Squares @ OLS

Es una forma de evaluar el modelo, queremos encontrar una línea que pase por todos los puntos, que la distancia entre todos los puntos sea la más mínima.

En esta forma de evaluar tenemos:

- 1 función original que suma todas las diferencias (no obtiene el promedio)
- Derivamos con respecto a β , ahora tenemos una función que podemos evaluar en 0 para obtener los mínimos y máximos.
- Podemos resolverlo a mano con álgebra lineal