

Alexander Neuwirth



Q Z<sup>0</sup> Resonanz

Z<sup>0</sup>-Resonanz
Assessor broades

wissenlabee

- 1. Begrüßung
- 2. Thema

wissen.leben

Z<sup>0</sup> Resonanz
Gliederung
Gliederung

1. Historie
2. Theorie
3. Messung/Experiment
4. Zusammenfasssung

Experimentalle Unitersuch Zusammenfassung

Gliederung




2018-1

• Zunächst Historie

-Historischer Überblick

○ Z<sup>0</sup> Resonanz

Historischer Überblick



#### Historischer Überblick

1968 — Theorie: Elektroschwache Wechselwirkung





1979 Nobelpreis an Steven Weinberg, Sheldon Glashow und Abdus Salam [1]

Alexander Neuwirth 3

Z<sup>0</sup> Resonanz —Historischer Überblick

Historischer Überblick

1948 — Berofe: Eiktroschwische Wechseleifkung

└─Historischer Überblick

- 1. Vereinheitlichung von elektr.magn. + schwache WW. Kräfteaustausch durch Photon, $W^{\pm}$ ,  $Z^0$
- 2. 1979 Nobelpreis für GWS




1968

1973

**Z**<sup>0</sup> Resonanz

# Historischer Überblick



3-12-1

Z<sup>0</sup> Resonanz

Historischer Überblick

Historischer Überblick

Historischer Überblick
1948 Theode: Elektroschwach
1979 Indirekter Nachweis dun

motorisener oberbue

1. Gargamelle-Blasenkammer am CERN



#### Historischer Überblick



1984 Nobelpreis an Carlo Rubbia und Simon van der Meer [2] , Z<sup>0</sup> Resonanz └─Historischer Überblick


└─Historischer Überblick



- 1. Am SppS
- 2. Nobelpreis für Carlo Rubbia and Simon van der Meer für experimentelle Beitrag Proton-Antiproton-Kollisionen
- 3. Mehr später
- 4. Weil führte mit zum Nachweis der Z und W Bosonen



#### Historischer Überblick



Z<sup>0</sup> Resonanz

Historischer Überblick


Historischer Überblick



- 1. Large Electron Positron Ring (CERN) Präzessionsmessungen
- 2. weiter Bestätigung der Theorie/Standardmodell und W-Z-Bosonen
- 3. bis 2000



#### Historischer Überblick



Z<sup>o</sup> Resonanz

Historischer Überblick

Historischer Überblick



- 1. Higgs Theorie in 60er-Jahren
- 2. 2013 Francois Englert und Peter Higgs Nobelpreis
- 3. Alle Nachweise am CERN!
- 4. Randnotitz

Alexander Neuwirth

3



Z<sup>0</sup> Resonanz

Theorie

#### Historischer Überblic

#### Theorie


Einordnung im Standardmodell der Elementarteilchen Elektroschwache Vereinheitlichung

Experimentelle Untersuchun

Zusammenfassui



## Einordnung im Standardmodell der Elementarteilchen



-Theorie Einordnung im Standardmodell der Elementarteilchen Einordnung im Standardmodell der Tl = --- = -- + = -+ = : | - |- - --

eigenes Antiteilchen

1. Antiteilchen invers

Z<sup>0</sup> Resonanz

- 2. Masse steigt mit Generation
- 3. Lebensdauer sehr sehr kurz
  - 4. Masse (Reichweite)
- 5. ungleaden/neutral 6. Boson also Spin 1, außer Higgs
- 7. Kräfte durch Austauschteilchen
- 8. Photon elektro magn. beispielweise Elektron-Elektron-Streuung.
- Rutherford Streuung
- 9. W,Z bsplw. Beta-Zerfall, Elektron-Positron-Streuung (Energieabhänig) 10. Gluon Kernzusammenhalt, Farbladung, 8 Sorten (n-p-Anziehung),
- Quarkanziehung 11. Nur durch Z-Boson lässt sich Neutrino-Neutrino-WW erklären, da sie
- nicht elektrisch sind. 12. Warum? Weil Divergenzen in höherer Ordnung/Energien auftreten  $(E > M_W)$



#### **Elektroschwache Vereinheitlichung** Schwacher Isospin

	Fermionmultipletts			T	$T_3$	$z_{ m f}$
Leptonen	$\begin{pmatrix} \nu_{\rm e} \\ {\rm e} \end{pmatrix}_{\rm L}$	$\begin{pmatrix} \nu_{\mu} \\ \mu \end{pmatrix}_{\mathrm{L}}$	$\left(\begin{array}{c} \nu_{\tau} \\ \tau \end{array}\right)_{\mathrm{L}}$	1/2	$^{+1/2}_{-1/2}$	$0 \\ -1$
Le	$e_{R}$	$\mu_{ m R}$	$ au_{ m R}$	0	0	-1
Quarks	$\begin{pmatrix} u \\ d' \end{pmatrix}_{L}$	$\begin{pmatrix} c \\ s' \end{pmatrix}_{L}$	$\begin{pmatrix} t \\ b' \end{pmatrix}_{L}$	1/2	$^{+1/2}_{-1/2}$	$+2/3 \\ -1/3$
	$u_{R}$	$c_{\mathrm{R}}$	$t_{\mathrm{R}}$	0	0	+2/3
	$d_{R}$	$s_{\mathrm{R}}$	$b_{R}$	0	0	-1/3

Schwacher Isospin[4]

Alexander Neuwirth 6

Z<sup>0</sup> Resonanz

Theorie

Elektroschwache Vereinheitlichung


Elektroschwache Vereinheitlichung



- 1. Einführung von schwachem Isospin, analogon zu starkem Isospin
- 2. Rechtshändige  $e, \mu, \tau$  Singulett Zustand.
- 3. Chiralität (l/r), Helizität, aber lorentzinvariant, Spinor Symmetrie
- 4. Rechtshändige Neutrinos  $T_3 = z = 0$ , keine WW, Auftreten in Natur unbekannt
- 5. T<sub>3</sub> Werte Bereich analog zu anderen Spins
- 6. invers für Antiteilchen: rechshändige Fermionen (linkshändige Antifermionen) Singulettt ( $T = 0 = T_3$ )
- 7. Umwandung durch Absorption von  $W^{\pm}$ -Boson innerhalb Multiplett (darin Ladungsdifferenz = 1)



#### **Elektroschwache Vereinheitlichung** Schwacher Isospin




Z<sup>0</sup> Resonanz


—Theorie
—Elektroschwache Vereinheitlichung
—Elektroschwache Vereinheitlichung



- 1. Bekannt aus schwacher WW
- 2. einzelne Zerfälle erläutern
- 3.  $d\rightarrow u + W^-$




#### **Elektroschwache Vereinheitlichung** Schwacher Isospin



Z<sup>0</sup> Resonanz
Theorie
Elektroschwache Vereinheitlichung
Elektroschwache Vereinheitlichung




1. T<sub>3</sub> Erhaltungsgröße



# Elektroschwache Vereinheitlichung

Schwacher Isospin




Z<sup>0</sup> Resonanz

Theorie
Elektroschwache Vereinheitlichung
Elektroschwache Vereinheitlichung




- 1.  $T_3$  in Graphik
- 2. W<sup>-</sup> muss -1 sein
- 3.  $W^+$  aus  $B^+$  Zerfall
- 4. Mehr zum Beta-Zerfall nächste Woche (+Paritätsverletzung)



# **Elektroschwache Vereinheitlichung**


Schwacher Isospin




Z<sup>0</sup> Resonanz
—Theorie
—Elektroschwache Vereinheitlichung
—Elektroschwache Vereinheitlichung



- 1. analog  $\beta^+$ -Zerfall:  $u \rightarrow d + W^+$
- 2. Hier Kaon-Zerfall



#### **Elektroschwache Vereinheitlichung** Schwacher Isospin







- 1. Analog zu 1/2x1/2 Gekoppelten Spins
- 2. Tripplett und Singulett Zustände
- 3.  $B^0$  postuliert



## **Elektroschwache Vereinheitlichung**


▶ Photon und  $Z^0$  als orthogonale Linearkombination von  $B^0$  und  $W^0$ :

$$|\gamma\rangle = +\cos\theta_{\mathrm{W}}|B^{0}\rangle + \sin\theta_{\mathrm{W}}|W^{0}\rangle$$
  
 $|Z^{0}\rangle = -\sin\theta_{\mathrm{W}}|B^{0}\rangle + \cos\theta_{\mathrm{W}}|W^{0}\rangle$ 

Z<sup>0</sup> Resonanz
—Theorie
—Elektroschwache Vereinheitlichung
—Elektroschwache Vereinheitlichung

ektroschwache Vereinheitlichung Photon umd  $Z^0$  als orthogonale Linearkombination von  $B^0$  und  $W^0$ :  $|Y\rangle = +\cos\theta_W |B^0\rangle + \sin\theta_W |W^0\rangle$  $|Z^0\rangle = -\sin\theta_W |B^0\rangle + \cos\theta_W |W^0\rangle$ 

- 1. Drehung um Weinberg-Winkel/elektroschwachen Mischungswinkel, Naturkonstante
- 2. spontane Symmetriebrechung, diagonaliesierung der Massematrix führt zu diesen.
- 3. orthogonal + linear Kombination




## **Elektroschwache Vereinheitlichung**

▶ Photon und  $Z^0$  als orthogonale Linearkombination von  $B^0$  und  $W^0$ :

$$|\gamma\rangle = +\cos\theta_{\mathrm{W}} |B^{0}\rangle + \sin\theta_{\mathrm{W}} |W^{0}\rangle$$
  
 $|Z^{0}\rangle = -\sin\theta_{\mathrm{W}} |B^{0}\rangle + \cos\theta_{\mathrm{W}} |W^{0}\rangle$ 

➤ Weinbergwinkel:

$$\cos \theta_{
m W} = rac{M_{
m W}}{M_{
m 7}} pprox 0.88$$



lektroschwache Vereinheitlichung

 $|\gamma\rangle = +\cos\theta_W |B^0\rangle + \sin\theta_W |W^0\rangle$  $|Z^0\rangle = -\sin\theta_W |B^0\rangle + \cos\theta_W |W^0\rangle$ 

► Weinherzwinke

:  $\cos \theta_W = \frac{M_W}{M} \approx 0.88$ 

- 1. experimentelle Bestimmung, später mehr
- 2. Einziger Freier Parameter der Theorie.
- 3. Masse für Z<sup>0</sup> leichter zu Bestimmen, da W-Boson in Neutrino zerfällt.

=> Bestimmung über fehlenden Transversalimpuls



# **Elektroschwache Vereinheitlichung**

▶ Photon und  $Z^0$  als orthogonale Linearkombination von  $B^0$  und  $W^0$ :

$$|\gamma\rangle = +\cos\theta_{\mathrm{W}}|B^{0}\rangle + \sin\theta_{\mathrm{W}}|W^{0}\rangle$$
  
 $|Z^{0}\rangle = -\sin\theta_{\mathrm{W}}|B^{0}\rangle + \cos\theta_{\mathrm{W}}|W^{0}\rangle$ 

➤ Weinbergwinkel:

$$\cos heta_{
m W} = rac{M_{
m W}}{M_{
m Z}} pprox 0.88$$

► Gekoppelte Ladungen:

$$e = g \cdot sin\theta_{W}$$



$$\begin{split} &\textbf{Elektroschwache Vereinheitlichung} \\ & \textbf{Prioton und } z^{a} \text{ als orthogonale Linearkombination von } z^{b} \text{ und } W^{b}; \\ & |y\rangle = &\cos\theta_{0}|y|^{2} + \sin\theta_{0}|W^{b}\rangle \\ & |z^{b}\rangle = &\sin\theta_{0}|y|^{2} + \cos\theta_{0}|W^{b}\rangle \\ \\ & \textbf{Weinbergeinkeit:} \\ &\cos\theta_{0} = \frac{M_{\phi}}{M_{\phi}} \approx 0.88 \\ & \textbf{Deloppelte Ladangen:} \\ & e = g \cdot \sin\theta_{0} \end{split}$$

- 1. schwache Ladung g (Analogon zu e) aus schwache WW. aus QFT
- 2. beschreibbar durch elektrische und schwache Ladung
- 3. Umformung zu e/g und M/M



Historischer Überblic

#### Theorie

#### Experimentelle Untersuchung

Indirekter Nachweis

Erzeugung des  $Z^0$ -Bosons

Nachweis

Präzisionsmessungen

Eigenschaften

Anzahl Neutrinogenerationen

#### 7usammenfassun

2018-12-10

Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung

Iterorischer Überblick


Experimentelle Untersuchung
Indirekter Nachweis
Ezreugung des 2º-Bosons
Nachweis
Präzisionsmessungen
Eigenschaften
Anzahl Neutrinogenerationen

essung



#### **Indirekter Nachweis**

des  $Z^0$ -Bosons durch neutrale Ströme



- Neutrinostrahl durch  $\pi^+ \rightarrow \mu^+ + \overline{\nu}_{\mu}$
- Blasenkammer:  $\bar{v}_{\mu} + e^{-} \xrightarrow{Z^{0}} \bar{v}_{\mu} + e^{-}$
- Elektron sendet
  Bremsstrahlung aus
- $ightharpoonup e^-e^+$ -Paarbildung ightharpoonup elektromagnetischer Schauer

[6][7]


Z<sup>o</sup> Resonanz —Experimentelle Untersuchung —Indirekter Nachweis —Indirekter Nachweis



- 1. 1973 Gargamelle Blasnekammer am CERN
- 2. Striche und Kreise sind Lamben und Spiegel Reflexionen
- 3. Myonlose Neutrinoreaktion
- 4. Neutrale Ströme von unten nach oben Antineutrinostrahl in Blasenkammer.
- 5. Neutrionstrahl durch bsplw.  $\pi^+ o \mu^+ + \overline{
  u}_\mu$  und Ladungsfilter
- 6. Photon nur bei elektr. Prozessen. (=> neutraler Strom, Z)
- 7. Vorhergesagter Winkel und 1/3 Energie des *e*<sup>-</sup> impliziert Wechselwirkung durch neutrale Ströme.
- 8. 700000 Bilder überprüft. Spiral/Bremsstrahlung.

#### **Erzeugung des** $Z^0$ **-Bosons**

Feynmandiagramme zur Elektron-Positron-Annihilation



Alexander Neuwirth 11

Z<sup>0</sup> Resonanz

Experimentelle Untersuchung

Erzeugung des Z<sup>0</sup>-Bosons

Erzeugung des Z<sup>0</sup>-Bosons




- W/Z-Boson durch Antilepton+Lepton/AntiQuark+Quark Reaktion
- kollidierende Teilchenstrahlen
- feynman diagram
- Zeit nach rechts
- über yoder Z zu Fermion und Antifermion paar.
- bei passender Energie approx  $M_Z$  dominiert  $Z^0$ , aus QFT+Feynmanregeln
- s-Kanal



## **Erzeugung des** $Z^0$ **-Bosons**

am Super Proton Synchrotron (SPS/Sp\overline{\pi}S)

- ▶  $u + \overline{u} \rightarrow Z^0$ : pp-Kollision benötigt  $E_p \gtrsim 600 \ GeV$ ▶  $u + \overline{u} \rightarrow Z^0$ :  $p\overline{p}$ -Kollision benötigt  $E_p \gtrsim 300 \ GeV$



Proton-Proton-Kollision [9]

12 Alexander Neuwirth


Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung Erzeugung des Z<sup>0</sup>-Bosons -Erzeugung des Z<sup>0</sup>-Bosons



- 1. 2 Möglichkeiten Z-Boson zu erzeugen mit Protonen (+Anti)
- 2. Energie muss in Quarks enthalten sein  $\rightarrow$  viel mehr Energie auf Valenzquarks => e-e+ Kollision einfacher (analog mit d-quark)
- 3. Seequarks sind viruelle QaurkAntiquark-Paare hier gekoppelt.
- 4. Keine Trennung up-down, sondern blau ist quark und grün ist Antiquark
- 5. Besser Proton-Antiproton, da weniger Enrgie notwendig.
- 6. Vorteilhaft in Beschleuniger inverse Rotation

#### **Nachweis**

#### Entdeckung des Z<sup>0</sup> Bosons



"Lego-Diagramm"  $q + \overline{q} o Z^0 o e^+ + e^-$  [4]


- ▶ 1983 UA2 Detektor am SppS
- ➤ Masse des Z<sup>0</sup>-Bosons entspricht der Summe der Energie von e<sup>-</sup> und e<sup>+</sup>
- Entgegengesetzte Impulse von  $e^-$  und  $e^+$

Z<sup>0</sup> Resonanz

Experimentelle Untersuchung

Nachweis


Nachweis



- Beispiel Event einer der ersten Messung 1983 am SppS
- Plane unten sind Kaloriemeterzellen zu Raumwinkel
- Energie Summe = Masse  $Z^0$
- Winkel 180° => entgegen gesetzte Richtungen

#### Präzisionsmessungen

Large Electron Positron Collider (LEP, 1989-2000)



Beschleuniger am CERN 1996 [10]

Alexander Neuwirth 14

Z<sup>0</sup> Resonanz
—Experimentelle Untersuchung
—Präzisionsmessungen
—Präzisionsmessungen



- 1. Farbe entsprechends Teilchen
- 2. LEP wurde zu LHC
- 3. L3 wurde zu ALICE
- 4. SppS von 1981 bis 1991 anstelle von SPS
- 5. prinzipielle Erzeugung, Lineare Beschleuniger und Vorstufen bekannt aus Vorlesung

#### Präzisionsmessungen

am Large Electron-Positron Collider (LEP)

- LEP 1 (1989-1996)
  - $ightharpoonup e^- + e^+ 
    ightarrow Z^0$ : Schwerpunktsenergie  $\sqrt{s} = 2E_e \approx M_7 c^2 \approx 91 \, GeV$
- LEP 2 (1996-2000)
  - $ightharpoonup e^- + e^+ 
    ightarrow W^+ + W^-$ : benötigt  $2E_e \approx 2M_W c^2 \approx 160~GeV$

Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung Präzisionsmessungen Präzisionsmessungen


ge Electron-Positron Collider (LEP)

▶  $e^- + e^+ \rightarrow Z^0$ : Schwerpunktsenergie  $\sqrt{s} = 2E_s \approx M_2c^2 \approx 91 \text{ GeV}$ LEP 2 (1996-2000) ▶  $e^- + e^+ \rightarrow W^+ + W^-$ : benötigt  $2E_s \approx 2M_ac^2 \approx 160 \text{ GeV}$ 

- 1. 2 Untersuchungsreihen am LEP
- 2. Tritt nicht auf bei Energien  $\approx 100 \, GeV$
- 3. LEP1, 50 GeV, LEP2, 86 GeV  $\rightarrow$  104,6 GeV
- 4. Im folgenden Fokus aus LEP 1

#### Präzisionsmessungen

#### Energiekalibration



#### Resonante Spin Depolarisation:

- 1. transversale Polarisation der Strahlen
- 2. Energie *E* ist proportinal zu Spinpräzessionen pro Speicherringdurchlauf *v*
- 3. Radiales oszillierendes Magnetfeld rotiert Spin minimal, falls dessen Frequenz in Phase zur Spinpräzession ist.


Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung Präzisionsmessungen Präzisionsmessungen



- 1. Polarisation durch Synchrotronstrahlung bzw. Solokov-Ternov Mechanismus, relativistische Elektronen/Positronen polarisieren durch spin-flip synchrotron radiation (92.4%)
- 2. Andere Effekte (Erdmagnetfeld) sorgen auch für Spinpräzession
- 3. *v* Spinpräzessionen pro Speicherringdurchlauf proportional zu E-Beam
- 4. *v* wird über Spin Depolarisation gemessen

#### Präzisionsmessungen

Energiekalibration



Relative Polarisation[11]


Z<sup>o</sup> Resonanz
Experimentelle Untersuchung
Präzisionsmessungen
Präzisionsmessungen



- 1. relative Polarisation gegen Energie
- 2. Misst offensichtlich nur gemittelt über mehere Elektronen
- 3. Leichte Asymmetrie aufgrund von Gezeiten in 12 Minuten!

## Präzisionsmessungen

Einfluss auf Beschleuniger durch Gezeiten



LEP Ausdehnung[12]


Z<sup>0</sup> Resonanz
—Experimentelle Untersuchung
—Präzisionsmessungen
—Präzisionsmessungen




- 1. weiter relevanter Effekt
- 2. Energie schwankt im Tagesverlauf
- 3. Güne Linie ist grob Erdrotation

#### Präzisionsmessungen

Einfluss auf Beschleuniger durch Gezeiten



Relative Strahlenergieänderung[13]






- 1. relative Energie des Strahls über 24h
- 2. Energiemodell zur Vorhersage der Energie zu jedem Zeitpunkt als Lösung



#### Präzisionsmessungen

L3 Detektoraufbau am LEP



L3 Detektor [13]

Z<sup>0</sup> Resonanz
Experimentelle Untersuchung
Präzisionsmessungen
Präzisionsmessungen




- 1. Mensch für Größenverhältnis.
- 2. Magnet im ALICE wieder verwendet.



# Präzisionsmessungen

L3 Detektoraufbau am LEP



L3 Detektor [13]

Von Innen nach Außen:

- 1. Spurdetektor
- 2. Elektromagnetisches Kalorimeter
- 3. Hadronisches Kalorimeter
- 4. Myonenkammer

Alexander Neuwirth 20


Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung Präzisionsmessungen Präzisionsmessungen



- 1. Alles in Magnetfeld
- 2. Spurdetektor: misst elektrische Teilchen
- 3. Krümmung gibt Impuls und Ladung
- 4. EM Kalorimeter: Energie von Elektron und Photon, EM Teilchen wird absorbiert
- 5. Had Kalorimeter: Energie von Hadronen, starke WW Teilchen werden absorbiert
- 6. Myonenkammern: Für Myonen, groß, weil geringe WW
- 7. Vortrag speziell zur Teilchendetektion

# Präzisionsmessungen

#### Z<sup>0</sup>-Zerfallskanäle



► mögliche Zerfälle:

$$Z^{0} \rightarrow e^{-} + e^{+}$$

$$\mu^{-} + \mu^{+}$$

$$\tau^{-} + \tau^{+}$$

$$v_{e,\mu,\tau} + \overline{v}_{e,\mu,\tau}$$

$$q + \overline{q}$$

Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung Präzisionsmessungen Präzisionsmessungen




- 1. Messung dieser Zerfallskanäle
- 2. keine top-quarks, weil zu schwer



## Präzisionsmessungen

L3 Detektor (1993 am LEP)



- Energiemessung im elm. Kalorimeter
- ► Entgegengesetzte Ausbreitung

$$e^- + e^+ \to Z^0 \to e^- + e^+$$
 [13]

Z<sup>0</sup> Resonanz
Experimentelle Untersuchung
Präzisionsmessungen
Präzisionsmessungen




- 1. L3 Detektor LEP
- 2. beispielhafte Ereignisse
- 3. entlang der Strahlachse
- 4. analog zu Lego
- 5. herausgezoomt, weil Enrgie weniger verteilt
- 6. Winkel 180° => entgegen gesetzte Richtungen
- 7. Balken sind die Energien die Kaloriemeter messen



## Präzisionsmessungen

L3 Detektor (1993 am LEP)



- ➤ Einzelnes Quark führt zu Quark-Antiquark-Paar Erzeugung, um isolierte Farbladung zu verhindern (Confinement)
- Reaktion äußert sich in hadronische lets
- Energiemessung im Hadronischen Kalorimeter

$$e^- + e^+ \rightarrow Z^0 \rightarrow \text{hadronische Jets [13]}$$


Z<sup>0</sup> Resonanz
LExperimentelle Untersuchung
Präzisionsmessungen
Präzisionsmessungen



- 1. Hadronische Jets, Farbladung nicht aleine vorkommend, immmer neue Quark-Antiquark-Paare (Confinment)
- 2. Zerfallsquarks kaum unterscheidbar

#### **Präzisionsmessungen** L3 Detektor (1993 am LEP)

- Messung der Spur der Myonen durch mehrere Myonenkammern
- ▶ kaum Absorption



$$e^- + e^+ \to Z^0 \to \mu^+ + \mu^-$$
 [13]

Z<sup>0</sup> Resonanz
Experimentelle Untersuchung
Präzisionsmessungen
Präzisionsmessungen

3 Detektor (1993 am LEP)

 Messung der Spur der Myonen durch mehrere Myonenkammern
 kaum Absorption

1. Muon erst an äußeren Platten detektiert



## Präzisionsmessungen

#### Luminosität


$$\sigma = \frac{N_{\rm sel} - N_{\rm bg}}{\varepsilon_{\rm sel} \mathcal{L}}$$

σ: Wirkungsquerschnitt V<sub>sel</sub>: Anzahl der Ereignisse

<sub>bg</sub>: Hintergrundereignisse

 $\varepsilon_{\rm sel}$ : Effizienz

 $\mathcal{L}: \quad$  Integrierte Luminosität



Bhabha Streuung [13]

Alexander Neuwirth 25

Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung Präzisionsmessungen Präzisionsmessungen




- 1. sigma ist gesucht
- 2. Luminosität hängt von Beschleuniger ab
- 3. N sind Anzahl Teilchen bei Reaktion
- 4. epsilon  $N_b g$  können durch Simulationen bestimmt werden (in epsilon ist auch Akzeptanzrate)
- 5. Geringer Winkel theta max, da Bhabha stark winkel abhängig ist.
- 6. Wirkungsquerschnitt für Bhabha-Streuung ee → ee reine QED ziemlich genau bekannt

## Präzisionsmessungen

 $Z^0$ -Resonanz bei  $\approx$  91 GeV

Alexander Neuwirth



Wirkungsquerschnitte verschiedener Beschleuniger [14] 26 Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung -Präzisionsmessungen -Präzisionsmessungen



- 1. Achsen + Farbliche Zuordnung
- 2. Z<sup>0</sup> Resonanz und weitere Messungen
- 3. Große Breite => geringe Lebensdauer
- 4. Masse top Quark wurde gut durch  $2M_{W}$  vermutet
- 5. Breite immer  $\Gamma_7$  egal welcher Zerfall, Höhe variiert

# **Eigenschaften**

Experimentelle Bestimmung

- ► Messung:
  - Ruhemasse  $M_7 = 91,188(2) \, GeV/c^2$
  - $\triangleright$  Zerfallsbreite  $\Gamma_7 = 2,495(2)$  GeV

Z<sup>0</sup> Resonanz
Experimentelle Untersuchung
Eigenschaften
Eigenschaften

Eigenschaften
Experimentelle Bestimmung

► Messung:

► Pathemasse M<sub>2</sub> = 91,188(2) GeV /c<sup>2</sup>

► Zerfallsbreite F<sub>2</sub> = 2,495(2) GeV

- 1. Über Wirkungsquerschnitt? src [PD12]
- 2. Breite + Maximalstelle



## **Eigenschaften**

Experimentelle Bestimmung

- Messung:
  - Ruhemasse  $M_7 = 91,188(2) \, GeV/c^2$
  - $\triangleright$  Zerfallsbreite  $\Gamma_z = 2,495(2)$  GeV
- > Zerfall:

$$Z^0 \rightarrow e^- + e^+$$
 3,363(4) %  $\mu^- + \mu^+$  3,366(7) %  $\tau^- + \tau^+$  3,370(8) %  $v_{e,\mu,\tau} + \overline{v}_{e,\mu,\tau}$  20,0(6) % Hadronen 69,91(6) %

Z<sup>0</sup> Resonanz

Experimentelle Untersuchung

Eigenschaften

Eigenschaften



- 1. Hadronen (idR. Anti+Quark) nicht unterscheidbar
- 2. Anti+Neutrino schwer detektierbar => % über Γ<sub>tot</sub>
- 3. au als Mischung von hadronischen Jets und elm., da au schnell zerfällt

28

#### **Anzahl Neutrinogenerationen**

Wirkungsquerschnitt


$$\sigma_f \propto \frac{s \cdot \Gamma_f \Gamma_e}{(s - M_Z^2)^2 + s^2 \Gamma_Z^2 / M_Z^2}$$

 $\sigma_f$ : Wirkungsquerschnitt

 $\sqrt{s}$ : Schwerpunktsenergie

 $\Gamma_i$ : Partialbreite

 $\Gamma_7$ : Gesamtbreite



Z<sup>0</sup> Resonanz

Experimentelle Untersuchung

Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen Wirkungsquerschnitt

- $\sigma_f \propto \frac{s \cdot \Gamma_f \Gamma_e}{(s-M_2^2)^2 + s^2 \Gamma_2^2/M_2^2}$
- a<sub>f</sub>: Wirkungsquerschnitt
  √s: Schwerpunktsenergie
  Γ<sub>i</sub>: Partialbreite
  Γ<sub>r</sub>: Gesamtbreite

- 1. Formel für  $\sigma$  Breit-Wigner
- 2. Einheiten *h* und *c* multiplizieren
- 3. Abhängig von ...
- 4. y unterdrückt

29

# **Anzahl Neutrinogenerationen**

Berechnung der Zerfallsbreite

$$\Gamma_Z = \sum_f \Gamma_{Z \to f\bar{f}}$$

Z<sup>0</sup> Resonanz
Experimentelle Untersuchung
Anzahl Neutrinogenerationen
Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen Berechnung der Zerfallsbreite  $\Gamma_x = \sum_f \Gamma_{x\to ff}$ 

1. Breite ergibt sich aus Partial Breiten

## **Anzahl Neutrinogenerationen**

Berechnung der Zerfallsbreite

$$\begin{split} \Gamma_{Z} &= \sum_{f} \Gamma_{Z \to f\bar{f}} \\ &= \Gamma_{u,c,d,s,b} + \Gamma_{e,\mu,\tau} + \Gamma_{v_{e},v_{\mu},v_{\tau}} \end{split}$$

Z<sup>0</sup> Resonanz

Experimentelle Untersuchung

Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen Berechnung der Zerfallsbreite  $r_z = \sum_j r_{z_i - ij}$   $= r_{a_i e_i d_i d_i d_i} + r_{a_i a_j d_i} + r_{a_i a_j d_i} + r_{a_i a_j d_i}$ 

1. kein top-Quark, da t-Masse ( $\approx 175~GeV$ )größer als  $Z^0$ -Masse ist



#### **Anzahl Neutrinogenerationen**

Berechnung der Zerfallsbreite

$$\begin{split} \Gamma_Z &= \sum_f \Gamma_{Z \to f\bar{f}} & \Gamma_f = \frac{G_F M_Z^3}{24\sqrt{2}\pi} \cdot (1 + (1 - e|Q_f| \sin^2 \theta_W)^2) \\ &= \Gamma_{\text{u,c,d,s,b}} + \Gamma_{\text{e,\mu,\tau}} + \Gamma_{\text{v_e,v_\mu,v_\tau}} \\ &= N_C \cdot 2 \cdot \Gamma_u + N_C \cdot 3 \cdot \Gamma_d + 3 \cdot \Gamma_e + N_v \cdot \Gamma_v \end{split}$$

 $N_C$ : Anzahl der Farbladungen

 $N_{v}$ : Anzahl der Neutrinogenerationen

 $G_F$ : Fermi-Kopplungskonstante

 $Q_f$ : Ladung

Z<sup>0</sup> Resonanz
—Experimentelle Untersuchung
—Anzahl Neutrinogenerationen
—Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen Berechnung der Zerfallsbreite 
$$\begin{split} &\Gamma_{J} = \sum_{f} \Gamma_{J \rightarrow ff} \\ &= \Gamma_{a,c,d_{A},b} + \Gamma_{a,a,c} + \Gamma_{v_{a},v_{a},v_{c}} \\ &= N_{C} \cdot 2 \cdot \Gamma_{a} + N_{C} \cdot 3 \cdot \Gamma_{d} + 3 \cdot \Gamma_{d} + N_{v} \cdot \Gamma_{v} \end{split}$$

1. 
$$\Gamma_f = \frac{G_F M_Z^2}{24\sqrt{2}\pi} \cdot (1 + (1 - e|Q_f|\sin^2\theta_W)^2)$$

2.  $G_F$  Fermikonstante

3.  $Q_f$  Ladung des Fermions

4. Quantenmechanisch Herleitung der Formel nicht notwendig

5. primär von Ladung abhängig

6. Lep:  $e^{\pm}$ ,  $\mu^{\pm}$ ,  $\tau^{\pm}$ 

7. Had: u,c=2/3; d,s,b=-1/3

8. Neutrinos

9. N<sub>C</sub> Anzahl Farbledungsnmöglichkeiten

$$\begin{split} \Gamma_Z &= \sum_f \Gamma_{Z \to f\bar{f}} & \Gamma_f = \frac{G_F M_Z^3}{24\sqrt{2}\pi} \cdot (1 + (1 - e|Q_f| \sin^2 \theta_W)^2) \\ &= \Gamma_{\text{u,c,d,s,b}} + \Gamma_{\text{e,\mu,\tau}} + \Gamma_{\text{v,e,v,v,r}} \end{split}$$

$$= N_C \cdot 2 \cdot \Gamma_u + N_C \cdot 3 \cdot \Gamma_d + 3 \cdot \Gamma_e + N_v \cdot \Gamma_v$$

$$= 3 \cdot 2 \cdot 94,9 \, \textit{MeV} + 3 \cdot 3 \cdot 122,4 \, \textit{MeV} + 3 \cdot 83,3 \, \textit{MeV} + 3 \cdot 165,8 \, \textit{MeV}$$

 $N_c$ : Anzahl der Farbladungen

 $N_{\nu}$ : Anzahl der Neutrinogenerationen  $G_F$ : Fermi-Kopplungskonstante

 $Q_f$ : Ladung

1. Einsetzen, vgl Maximal für minimale Ladung

—Anzahl Neutrinogenerationen

Experimentelle Untersuchung

—Anzahl Neutrinogenerationen

29

$$\Gamma_{Z} = \sum_{f} \Gamma_{Z \rightarrow f\bar{f}} \qquad \qquad \Gamma_{f} = \frac{G_{F} M_{Z}^{3}}{24 \sqrt{2} \pi} \cdot (1 + (1 - e|Q_{f}|\sin^{2}\theta_{W})^{2})$$

$$= \Gamma_{u,c,d,s,b} + \Gamma_{e,\mu,\tau} + \Gamma_{v_e,v_\mu,v_\tau}$$
  
=  $N_C \cdot 2 \cdot \Gamma_u + N_C \cdot 3 \cdot \Gamma_d + 3 \cdot \Gamma_e + N_v \cdot \Gamma_v$ 

$$= 3 \cdot 2 \cdot 94.9 \, \text{MeV} + 3 \cdot 3 \cdot 122.4 \, \text{MeV} + 3 \cdot 83.3 \, \text{MeV} + 3 \cdot 165.8 \, \text{MeV}$$

$$= 2,42 \, GeV$$
  $N_C$ : Anzahl der Farbladungen

 $N_{\nu}$ : Anzahl der Neutrinogenerationen

 $G_F$ : Fermi-Kopplungskonstante

 $Q_f$ : Ladung

Z<sup>0</sup> Resonanz Experimentelle Untersuchung —Anzahl Neutrinogenerationen —Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogeneratione Berechnung der Zerfallsbreite  $= N_{\mathcal{C}} \cdot 2 \cdot \Gamma_u + N_{\mathcal{C}} \cdot 3 \cdot \Gamma_d + 3 \cdot \Gamma_e + N_v \cdot \Gamma_v$ 

1. Summe

#### **Anzahl Neutrinogenerationen**

Berechnung der Zerfallsbreite

$$\begin{split} \Gamma_{Z} &= \sum_{f} \Gamma_{Z \to f\bar{f}} & \Gamma_{f} = \frac{G_{F} M_{Z}^{3}}{24 \sqrt{2} \pi} \cdot (1 + (1 - e|Q_{f}|\sin^{2}\theta_{W})^{2}) \\ &= \Gamma_{\text{u,c,d,s,b}} + \Gamma_{\text{e,}\mu,\tau} + \Gamma_{\text{v_e,v_{\mu},v_{\tau}}} \\ &= N_{C} \cdot 2 \cdot \Gamma_{u} + N_{C} \cdot 3 \cdot \Gamma_{d} + 3 \cdot \Gamma_{e} + N_{v} \cdot \Gamma_{v} \\ &= 3 \cdot 2 \cdot 94,9 \, \text{MeV} + 3 \cdot 3 \cdot 122,4 \, \text{MeV} + 3 \cdot 83,3 \, \text{MeV} + 3 \cdot 165,8 \, \text{MeV} \\ &= 2,42 \, \text{GeV} & N_{C}: \quad \text{Anzahl der Farbladungen} \\ &\frac{\text{Strahlungs-}}{\text{korrektur}} \geq 2,497 \, \text{GeV} & N_{v}: \quad \text{Anzahl der Neutrinogenerationen} \\ &G_{F}: \quad \text{Fermi-Kopplungskonstante} \\ &Q_{f}: \quad \text{Ladung} \end{split}$$

Z<sup>0</sup> Resonanz
—Experimentelle Untersuchung
—Anzahl Neutrinogenerationen
—Anzahl Neutrinogenerationen

- 1. Korrekturen aus QFT, höherer Ordungen, Strahlungskorrektur
- 2. Passt mit Unsicherheiten zu Exp. (nicht auf Folie)
- 3.  $\Gamma_e/\Gamma_{tot}=3,37\%$  passt auch zu Exp.

#### **Anzahl Neutrinogenerationen**

Vergleich Theorie und Experiment

Z <sup>0</sup> Zerfall	theoretisch	experimentell
$e^{-} + e^{+}$	3,34 %	3,363(4) %
$V + \overline{V}$	19,92%	20,0(6) %
Hadronen	66,92 %	69,91(6) %
$\Gamma_Z$	2,497 GeV	2,495(2) GeV


Z<sup>0</sup> Resonanz
—Experimentelle Untersuchung
—Anzahl Neutrinogenerationen
—Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen Vergleich Theorie und Experiment

Zº Zerfall	theoretisch	experimentell
$e^- + e^+$	3,34%	3,363(4)%
$v + \overline{v}$	19,92%	20,0(6)%
Hadronen	66,92%	69,91(6)%
F <sub>2</sub>	2,497 GeV	2,495(2) GeV

- 1.  $e^-$  exemplarisch für Leptonen
- 2. passt alles gut

### **Anzahl Neutrinogenerationen**



- ► OPAL-Detektor am LEP
- Messung bestätigt vermutete 3 Neutrinogenerationen
- ► Beleg für 3 Generationen von Leptonen und Quarks


Wirkungsquerschnitt  $e^+e^- \rightarrow \text{Hadronen}$  [4]

Z<sup>0</sup> Resonanz

Experimentelle Untersuchung

Anzahl Neutrinogenerationen

Anzahl Neutrinogenerationen



- 1. Cern Experiment
- 2. Wirkungsquerschnitt gegen Schwerpunktenergie
- 3. Ähnlich der Breit Wigner Funktion aber nicht passend symmetrisch durch Korrekturen höherer Ordnung udn Bremstrahlung durch e
- 4. Verschiedene Anzahl-Neutrinogenerationen-Kurven
- 5. 3 Neutrinogenerationen  $\rightarrow$  3 Leptonen 3 Quarks Generationen



## Zusammenfassung

- Schwache und Elektromagnetische Wechselwirkung lassen sich vereinheitlichen
- Weinbergwinkel  $\cos \theta_{\rm W} \approx 0.88$
- ightharpoonup Zerfallsbreite des  $Z^0$ -Bosons  $\Gamma_Z \approx 2,50 \, GeV$
- Nachweis von 3 Neutrinogenerationen am LEP



- 1. Weinbergwinkel Massenverhältniss W,Z Boson
- 2. Zerfallsbreite aus QFT großer Erfolg in Übereinstimmung mit Experiment
- 3. Bestätigung, dass es 3 Neutrinogenerationen gibt
- 4. Weiterfüherend Große Vereinheitlichung Analog ab 10<sup>16</sup> GeV ⇒ keine Differenzierung Fermionen, Quarks und Leptonen. (Astrovorträge, Universumentwicklungröhre)
- 5. Noch Weiterfüherend Quantengravitation kombiniert mit GUT

## Quellen I

Sheldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg. URL:	
http://thescientificodyssey.libsyn.com/episode-225-putting-	
the-nuzzle-together (hesucht am 12 11 2018)	

- The Nobel Prize in Physics 1984. URL: https://www.nobelprize.org/prizes/physics/1984/summary/ (besucht am 03.12.2018).
- Standardmodell. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Standardmodell (besucht am 12.11.2018).
- Povh et al. Teilchen und Kerne. Springer Spektrum, 2014. Kap. 12.

Z<sup>0</sup> Resonanz L-Zusammenfassung -Quellen

#### olden Clash oo - Ab

Ouellen I

- Shaldon Glashow, Abdus Salam and Steven Weinberg, URL:
  http://thescientificodyssey.librn.com/episode-225-put
  the-pszzle-togester (Beschit am 12.11, 2018).
  The Nobel Prize in Physics 1984. URL:
  https://www.sobelprize.org/prizes/physics/1984/summary,
  DebSacht am 03.12, 2018).
- (besucht am 03.12.2018).

  Standardnodell.us:
  https://de.wikipedia.org/wiki/Standardnodell(besucht al 12.11.2018).
- Powh et al. Teilchen und Keme. Springer Spektrum, 2014. Kap. 12.

34

#### Quellen II



- F.J. Hasert u. a. "Search for elastic muon-neutrino electron scattering". In: Physics Letters B 46.1 (1973), S. 121–124. ISSN: 0370-2693. DOI: https://doi.org/10.1016/0370-2693(73)90494-2. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0370269373904942.
- Weak neutral current. URL:
  https://www.symmetrymagazine.org/article/august-2009/weak-neutral-current (besucht am 03.12.2018).
- Donald H. Perkins. Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press, 2000.

Z<sup>0</sup> Resonanz
L-21-8
C Zusammenfassung
L Quellen

#### Schwachewechselwirkung.uss

https://de.wikipedia.org/wiki Description 06 12 2018)

F.J. Hasert u.a. "Search for elastic muon-neutrino electron scattering" Physics Letters B 46.1 (1973), S. 121–124. ISSN: 0370-2693. DOI:

Physics Letters B 46.1 (1973), S. 121-124. https://doi.org/10.1016/0370-2693(73

Weak neutral current. URL: https://www.symmetrymagazine.org/article, neutral-current(besucht am 03.12.2018).

neutral-current (besucht am 03.12.2018).

Donald H. Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge

Donald H. Perkins, Introduction University Press, 2000.

35

#### Quellen III

International Masterclasses. URL: http://atlas.physicsmasterclasses.org/de/index.htm (besucht am 04.12.2018).

The LEP Accelerator. URL: http://www.hep.ucl.ac.uk/~jpc/all/ulthesis/node15.html (besucht am 03.12.2018).

L. Arnaudon u. a. "Accurate determination of the LEP beam energy by resonant depolarization". In: Zeitschrift fr Physik C Particles and Fields 66.1-2 (März 1995), S. 45–62. DOI: 10.1007/bf01496579. URL: https://doi.org/10.1007/bf01496579.

Z<sup>0</sup> Resonanz
—Zusammenfassung
—Quellen

#### Quellen III

International Masterclasses.uru: http://stlas.physicsmasterclasses.org/de/index.htm(be am 04.12.2018).

The LEP Accelerator. un: http://www.hep.ucl.mc.uk/-jpc/all/ulthemim/node (besuchtam 03.12, 2018).

L. Amaudon u. a. "Accurate determination of the LEP beam energy by resonant depolarization." In: Zeitschrift in Physik C. Particles and Field 66.1-2 (Mair 1995). S. 45–62. Doi: 10.1007/bf01496879. URL: https://doi.org/10.1007/bf01496879.



#### **Quellen IV**

- How is the beam energy calibrated through the resonant spin depolarization? URL: http://tlep.web.cern.ch/content/how-beam-energy-calibrated-through-resonant-spin-depolarization (besucht am 29.11.2018).
- Versuch ZO-Resonanz. URL: https://www.physik.hu-berlin.de/de/eephys/teaching/lab/zOresonance/index\_html (besucht am 25.11.2018).
- The ALEPH Collaboration u. a. "Precision Electroweak Measurements on the Z Resonance". In: (2005). DOI: 10.1016/j.physrep.2005.12.006. eprint: arXiv:hep-ex/0509008.



• Masterclasses Atlas ist qualitativ gut