

Inserto GLICO-LAX

10 x 14 cm

Tiro

GLICO-LAX®

Polietilenglicol 3350

Polvo para solución oral

INFORMACIÓN PARA EL PACIENTE

Estimado paciente: lea cuidadosamente este prospecto, ya que contiene datos importantes con respecto al uso correcto de este medicamento. Ante cualquier duda, consulte siempre con su médico.

COMPOSICIÓN:

Glico-Lax Sobres

Cada 100 g de polvo contienen:

Macrogol 3350 (Polietilenglicol 3350).....100 g

GRUPO TERAPÉUTICO

Laxante osmótico.

DESCRIPCIÓN

GLICO-LAX® contiene como principio activo Polietilenglicol. El tamaño de sus moléculas impide que se absorban a través de la mucosa intestinal, de modo que permanecen retenidas en el lumen digestivo, donde por su poder osmótico, induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual ésta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación.

INDICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

Estreñimiento crónico funcional, laxante: Vierta el contenido de 1 sobre o la cantidad acorde dosis ajustada según criterio médico, en un vaso que contenga agua, jugo, refresco, té o cualquier líquido de su preferencia. Agitar hasta disolver. Se disuelve mejor en líquidos a temperatura ambiente, incluso caliente, más no exceda los 50 °C. A temperaturas frías, inferiores a 18 °C, requiere mayor tiempo para disolver. Una vez reconstituido consumir inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES Y

ADVERTENCIAS:

No se debe administrar a pacientes con diagnóstico o con síntomas sospechosos de obstrucción intestinal (náusea, vómito, dolor abdominal o distensión) de cualquier etiología. Alergia al polietilenglicol.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Los pacientes que presenten síntomas que pueden sugerir un abdomen agudo obstructivo o inflamatorio (náuseas, vómitos, dolor y distensión abdominal, disminución o ausencia de ruidos hidroaéreos, fiebre y otros), deben ser evaluados cuidadosamente para descartar estas condiciones antes de recibir la terapia.

Uso durante el embarazo: No se ha establecido la seguridad del polietilenglicol durante el embarazo. Este medicamento debe administrarse durante el embarazo solo bajo estricta supervisión médica y únicamente en aquellos casos en los que los beneficios esperados superen claramente los riesgos potenciales.

Uso durante la lactancia: No se recomienda la administración de GLICO-LAX® a mujeres dando de lactar.

Uso en geriatría: Los estudios adecuados realizados hasta la fecha no han evidenciado reacciones adversas específicas en este grupo de edad.

Precauciones especiales: El uso frecuente, prolongado o excesivo de GLICO-LAX®, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes. La acción de los laxantes en pacientes con historia de constipación crónica puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

Inserto GLICO-LAX

10 x 14 cm

Retiro

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS

GLICO-LAX® no ha demostrado tener interacciones con otros medicamentos.

EFFECTOS ADVERSOS

Puede presentar náusea, dolor y distensión abdominal, meteorismo y flatulencia. Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones. Comuníquese con su médico ante cualquier molestia que no ceda o que empeore con el paso de los días.

DOSIS

Adultos a partir de 16 años: 17 g por día.

Niños a partir de 2 años: 0.25 a 1.5 g/kg/día, una vez al día. Ajustar la dosis de acuerdo a criterio médico.

SOBREDOSIS

Ante cualquier sospecha de sobredosis acuda al centro de salud más cercano. Una sobredosis con este medicamento puede presentarse con síntomas y signos tales como diarrea y deshidratación debida a la misma, en estos casos se debe administrar líquidos suficientes.

ALMACENAMIENTO

Guarde este medicamento en su envase original en un lugar fresco, protegido de la luz y la humedad, a una temperatura no mayor a 30 °C. No lo utilice después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

Vía de administración: Oral

PRESENTACIÓN

GLICO-LAX® caja x 7, 10 y 20 sobres x 17.0 g c/u

GLICO-LAX® caja x 7 y 10 sobres x 8.5 g c/u

Venta Libre

Elaborado por

Laboratorios Rocnarf, S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km 5 ½

Guayaquil - Ecuador

Fecha de última revisión:

Febrero del 2025

 **Rocnarf**

www.rocnarf.com

Rev. 03



FICHA TÉCNICA PARA IMPRESIÓN

Cliente: ROCNARF

Producto: Inserto Glicolax

Fecha: 20/02/2025

Material:

Impresión: 1 lado

Medidas

Plano abierto: 10 x 14 cm

Plano cerrado: 10 x 14 cm

Troquel:

☒ Corte Recto

☐ Nuevo

☐ Archivo

Línea Magenta indica troquel

Línea Cyan indica dobles

Área de reserva no se imprime

Área de reserva sin barniz

Área de pega

Diseño: Felipe Merchán

Rev. 03

Firma de Aprobación

Jefe de control de Calidad

Firma de Aprobación

Coord. Garantía de Calidad