


# 5.1. DVOSTRUKI INTEGRALI

Matem 1:  $\int_a^b f(x,y) dx dy$

DEF dvostrukog integrala na pravokutniku P



DEF: Dvostruki integral

Dvostruki integral funkcije  $f(x,y)$  po pravokutniku P definiramo

$$\iint_P f(x,y) dx dy = \lim_{m,n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \Delta x \Delta y$$

ukoliko taj limit postoji i ne ovisi o izboru točaka  $(x_{ij}^*, y_{ij}^*) \in P_{ij}$ .

Joda kažemo da je  $f(x,y)$  na P.

→ Dakle dvostruki integral po pravokutniku 7 nenegativne funkcije  $f(x,y)$  predstavlja volumen tijela iznad P, a omeđen s gornje strane plohom  $z = f(x,y)$ .

**II** Ako je  $f$  neprekidna na pravokutniku  $T$ , onda je integrabilna na  $P$

**III** Ako je  $f$  omeđena na pravokutniku  $P$  i neprekidna na  $P$  osim na konačno mnogo glatkih krivulja, onda je integrabilna na  $P$ .

### FUBINJEV TEOREM

Ako postoji dvostruki integral funkcije  $f$  na pravokutniku  $P = [a, b] \times [c, d]$  tada

$$\iint_P f(x, y) dx dy = \int_a^b \left( \int_c^d f(x, y) dy \right) dx = \int_c^d \left( \int_a^b f(x, y) dx \right) dy$$

\* Rješavanje dvostrukih integrala je uvijek BROJ


Zapisaćemo:

$$\iint_P f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d f(x, y) dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x, y) dx \quad \leftarrow \text{slučaj}$$

**Primer:**  $\iint_P (y^2 + xy) dP$  po pravokutniku  $P = [0, 2] \times [1, 3]$


$$\rightarrow \int_0^2 dx \int_1^3 (y^2 + xy) dy = \int_0^2 \left( \frac{y^3}{3} + \frac{y^2}{2} x \right) \Big|_1^3 dx$$

$$= \int_0^2 \left( 9 + \frac{9}{2}x - \frac{1}{3} - \frac{x}{2} \right) dx = \frac{76}{3}$$



drugi način  $\int_1^3 dy \int_0^2 (y^2 + xy) dx = \int_1^3 \left( y^2 x + \frac{1}{2} x^2 y \right) \Big|_0^2 dy = \frac{76}{3}$

# Dvostruki integral na omeđenom skupu D



$$\iint_D f(x, y) dx dy = ?$$

$$F(x, y) = \begin{cases} f(x, y), & (x, y) \in D \\ 0, & (x, y) \in P \setminus D \end{cases}$$

↳ di nema D, stavimo  
nismo 0 da nemamo  
rdenu

$$\text{DEF: } \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_P F(x, y) dx dy$$

## TM računanje po omeđenom području D


$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_P F(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_c^d F(x, y) dy = \int_a^b dx \int_{g_1(x)}^{g_2(x)} f(x, y) dy$$

def. Fubini za F rečimite funkcije

ANALOGNO ZA DRUGI POREZAK:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{h_1(y)}^{h_2(y)} f(x, y) dx$$

$$\text{ZAD: } \iint_D (2x+y) dx dy = D \dots y=2x, y=x^2$$




FIKSIRAMO VARIJABLU x

$$\begin{aligned} 1) \int_0^2 dx \int_{x^2}^{2x} (2x+y) dy &= \int_0^2 \left( 2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{x^2}^{2x} dx = \int_0^2 \left( 4x^2 + 2x^2 - 2x^3 - \frac{x^4}{2} \right) dx \\ &= \int_0^2 \left( 6x^2 - 2x^3 - \frac{1}{2}x^4 \right) dx = \left( 2x^3 - \frac{1}{2}x^4 - \frac{1}{10}x^5 \right) \Big|_0^2 = 16 - 8 - \frac{32}{5} = \frac{80}{5} - \frac{32}{5} = \frac{48}{5} \end{aligned}$$

→ 1. način: normalno gledamo graf: (kao što je gore nacrtano)

2) Drugi presek: inverzna funkcija gornjeg grafa



$$\begin{aligned} y &= x^2 \rightarrow x = \sqrt{y} \\ y &= 2x \rightarrow x = \frac{y}{2} \end{aligned} \quad \left. \vphantom{\begin{aligned} y &= x^2 \\ y &= 2x \end{aligned}} \right\} \text{FIKSIRAMO VARIJABLU } y$$

$$\begin{aligned} \int_0^4 dy \int_{y/2}^{\sqrt{y}} (2x+y) dx &= \int_0^4 \left( x^2 + yx \right) \Big|_{y/2}^{\sqrt{y}} dy \\ &= \int_0^4 \left( y + y\sqrt{y} - \frac{y^2}{4} - \frac{y^2}{2} \right) dy = \frac{24}{5} \text{ isto} \end{aligned}$$


Ponkad se može dogoditi da je jedan poređak integracije puno jednostavniji i pogodniji od drugog pa radimo, logično, po lakšem.

Primer:  $\int_0^1 x^2 dx \int_{x^3}^1 e^{y^2} dy$

Annotations:  $y=1$ ,  $y=x^3$

unutarnji integ. nije elementarno integrabilan!

↪ zamjenimo



$$y=1 \rightarrow x=0$$

$$y=x^3 \rightarrow x=\sqrt[3]{y}$$

$$\int_0^1 e^{y^2} \int_0^{\sqrt[3]{y}} x^2 dx = \int_0^1 e^{y^2} \left( \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^{\sqrt[3]{y}} \right) dy$$

$$= \int_0^1 e^{y^2} \cdot \frac{1}{3} y dy = \frac{1}{3} \int_0^1 y e^{y^2} dy = \left| \begin{array}{l} t=y^2 \\ dt=2y dy \end{array} \right|$$

$$= \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{1}{2} e^t dt = \frac{1}{6} \int_0^1 e^t dt = \frac{1}{6} \cdot (e^t) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} (e^{1^2}) \Big|_0^1 = \frac{1}{6} (e - 1)$$


\* puno lakše nego da smo išli kako je zadano

M121-2020-4)

$$y = \sqrt{2x}$$

$$\iint_D (x+y) dx dy$$

$$y = 4-x, \text{ } 0 \leq x$$




$$\rightarrow \int_0^2 dx \int_0^{\sqrt{2x}} (x+y) dy + \int_2^4 dx \int_0^{4-x} (x+y) dy$$

$$|L| \int dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{4-y} (x+y) dx \rightarrow \int_0^2 dy \int_{\frac{y^2}{2}}^{4-y} (x+y) dx = \int_0^2 \left( \frac{1}{2}x^2 + yx \right) \Big|_{\frac{y^2}{2}}^{4-y} dy = \frac{178}{5}$$

ako integriramo po x, granice su y jer smo izrazili x

M1-2021-5)



$$\iint_D y dx dy$$

$$\rightarrow \int_{-2}^2 dx \int_{x^2}^4 y dy + \int_{-1}^1 dx \int_1^4 y dy + \int_1^2 dx \int_{x^2}^4 y dy$$


! ne koristimo površine! → ne koristiti simetriju  
Lne znamo kakva je ta ploha iznad

$$\text{inverz: } y=x^2 \\ x=\pm\sqrt{y}$$

$$|L| \rightarrow \int_1^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} y dx = \int_1^4 xy \Big|_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} dy$$

$$= \int_1^4 2y\sqrt{y} dy = 2(y^{5/2} \cdot \frac{2}{5}) \Big|_1^4 = \frac{4}{5} \cdot (32-1) = \underline{\underline{31 \frac{4}{5}}}$$

volumen ispod  
 $z=y$




## TM (Teorem srednje vrijednosti za 2 dimenzije)

Neka je  $f$  neprekidna na zatvorenom području  $D$ . Tada postoji točka

$$(x_0, y_0) \in D \text{ takva da je } \iint_D f(x, y) dx dy = f(x_0, y_0) \cdot \mu(D)$$

gdje je  $\mu(D)$  površina područja  $D$

→ Geom. interpretacija: volumen ispod plohe jednak je volumenu cilindra o bazi  $D$  i visinom  $f(x_0, y_0)$



DOKAZ: Neka je  $m = \min_D f(x, y)$ ,  $M = \max_D f(x, y)$  (pretpostavimo da postoji)


$$m \underbrace{\iint_D dx dy}_{\mu(D)} \leq \underbrace{\iint_D f(x, y) dx dy}_{\text{volumen}} \leq M \iint_D dx dy = M \cdot \mu(D)$$

$$m \leq \frac{1}{\mu(D)} \iint_D f(x, y) dx dy \leq M$$

— Zbog neprekidnosti fije sigurno  $f(x, y)$  postoji  $(x_0, y_0) \in D$  t.d.j.

$$\rightarrow = f(x_0, y_0)$$

Zad.) Odrediti srednju vrijednost funkcije  $f(x, y) = 4 - 2x - y$  na njenoj projekciji u  $xOy$  ravnini i geometrijski interpretirati.



$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{\mu(D)} \iint_D (4 - 2x - y) dx dy$$

$$\mu(D) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$$

$$\int_0^2 dx \int_0^{4-2x} (4 - 2x - y) dy$$

$$= \int_0^2 [4(4 - 2x) - 2x(4 - 2x) - \frac{1}{2}(4 - 2x)^2] dx =$$

$$= \frac{1}{3} \pi r^2 = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot 4 = \frac{16}{3}$$

$$f(x_0, y_0) = \frac{1}{4} \cdot \frac{16}{3} = \frac{4}{3}$$