CHAPITRE 5

Combinatoire et dénombrement

S22, S25, S30, S35

À retenir · Objectifs. Choisir un modèle de comptage ; distinguer ordre et répétition ; utiliser coefficients binomiaux et relation de Pascal.

Notes de cours

Additionner ou multiplier

Pour des ensembles finis deux à deux disjoints A_i, $|\bigcup A_i| = \sum |A_i|$. Si les cas se recouvrent, il faut corriger le double comptage : $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$. Le nombre d'éléments du produit cartésien $A \times B$ est $|A||B|$. Pour une suite de choix, multiplier les nombres de possibilités à chaque étape, à condition que ces nombres soient valables pour chaque choix antérieur considéré.

Exemple. Un code de deux lettres choisies parmi 26, suivies de trois chiffres, avec répétition autorisée, peut prendre $26^2 \times 10^3$ valeurs. Un nombre à trois chiffres ne commence pas par 0 : il y en a 9×10^2.

Listes et parties

Dans un ensemble de n éléments, il y a n^k listes ordonnées de longueur k avec répétition ; $n(n-1)\cdots(n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$ listes de k éléments distincts, si $0 \le k \le n$; $n!$ permutations de tous les éléments. On pose $0! = 1$.

À retenir · Combinaisons. Une combinaison de k éléments parmi n est une partie à k éléments ; l'ordre n'intervient pas.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \ (n,k \in \mathbb{N},\ 0 \le k \le n), \quad \binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \quad \binom{n}{1} = n, \quad \binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}.$$

Pourquoi diviser par $k!$? Chaque partie de taille k donne exactement $k!$ listes distinctes selon l'ordre de ses éléments. Le nombre de listes sans répétition est donc $k!\binom{n}{k}$.

Identités et démonstrations

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}, \qquad \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n.$$

La relation de Pascal ci-dessus s'utilise pour $0 \le k < n$; les formules au bord se lisent directement avec les valeurs 1.

Symétrie. Prendre le complémentaire établit une correspondance entre les parties de taille k et celles de taille $n-k$.

Pascal, preuve combinatoire. Dans un ensemble de $n+1$ éléments, fixer un élément a. Une partie de taille $k+1$ contient a (choisir k autres éléments parmi n) ou ne le contient pas (choisir $k+1$ éléments parmi n). Les deux cas sont disjoints et couvrent toutes les possibilités.

Pascal, preuve algébrique. Pour $0 \leq k < n$, mettre au même dénominateur :

$$\frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!((k+1)+(n-k))}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!}.$$

Les cas au bord se traitent directement.

Nombre de parties. Pour chacun des n éléments, choisir « présent » ou « absent » donne 2^n parties. En les classant par taille, on en compte $\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k}$: les deux comptages sont égaux.

Approfondissement mentionné dans la progression. Le développement $(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$ se comprend en choisissant, dans chacun des n facteurs, le terme a ou b. Cette formule n'est pas utilisée comme prérequis des DS de ce livret.

Activité de recherche

Ordre et répétition dans un dénombrement — 30 min.

Six élèves distincts se portent volontaires pour organiser un débat.

1. On choisit deux élèves pour former un binôme sans attribuer de rôle. Combien de binômes peut-on former ?
2. On désigne un président et un secrétaire, qui doivent être deux élèves différents. Combien d'attributions des deux rôles sont possibles ?
3. On prévoit trois interventions successives. Un même élève peut intervenir plusieurs fois. Combien de programmes de trois interventions sont possibles ?
4. On recommence avec quatre élèves seulement, désignés par A, B, C et D. Écrire tous les binômes et toutes les attributions des deux rôles. Expliquer ensuite pourquoi il existe 64 programmes de trois interventions, sans les énumérer.
5. Pour chacun des trois modes de choix, préciser si l'ordre intervient et si une même personne peut être choisie plusieurs fois.

Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Un code est une suite de quatre chiffres choisis parmi $0, 1, \ldots, 9$. Les répétitions et le chiffre 0 en première position sont autorisés. Combien de codes contiennent au moins un 0 ?

E2 · Entraînement. Dix athlètes participent à une course sans ex æquo. Combien de podiums différents, avec une première, une deuxième et une troisième place, peut-on obtenir ?

E3 · Entraînement. Parmi sept personnes distinctes, on forme un groupe de trois personnes contenant une personne désignée à l'avance. Combien de groupes peut-on former ?

E4 · Entraînement. Sur un quadrillage, on part de $(0;0)$ pour atteindre $(4;3)$ en effectuant exactement quatre déplacements d'une unité vers la droite et trois vers le haut. Combien de chemins différents peut-on suivre ?

E5 · Entraînement. Une classe compte huit filles et sept garçons. Combien de groupes de quatre élèves contenant exactement deux filles peut-on former ?

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 294, exercice 37. À la maison après S35 : traiter les deux questions. Préciser si l'ordre intervient et si une carte peut être choisie plusieurs fois avant d'utiliser un coefficient binomial.

Devoir à la maison

DM9 — Former une commission — 45 min, après S35.

Une équipe comprend cinq enseignants et sept élèves, tous distincts. On forme une commission de quatre personnes.

1. Combien de commissions différentes peut-on former ?
2. Combien de commissions contiennent exactement deux élèves ?
3. Combien de commissions contiennent au moins un enseignant et au moins un élève ?
4. Parmi les membres d'une commission de la question 2, on désigne un président enseignant et un secrétaire élève. Dénombrer les choix de la commission accompagnée de ces deux attributions.
5. En dénombrant les commissions selon leur nombre d'enseignants, démontrer que

$$\sum_{k=0}^{4} \binom{5}{k}\binom{7}{4-k} = \binom{12}{4}.$$