# Calcul intégral

Cours et exemples

# Objectifs

Calculer et encadrer une intégrale ; distinguer aire et intégrale ; utiliser une intégration par parties ; étudier une suite d'intégrales.

# Aire et primitive

Pour $f$ continue et positive sur $[a, b]$, $a \leq b$, l'intégrale $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ est l'aire sous la courbe, au-dessus de l'axe, entre $x = a$ et $x = b$, exprimée en unités d'aire.

# Aire et primitive

Si $f$ est continue sur un intervalle $I$ et $a \in I$, alors $F_a(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ est la primitive de $f$ qui s'annule en $a$. Pour toute primitive $F$,

$$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b) - F(a).$$

Toute fonction continue sur un intervalle admet des primitives. Une intégrale est un nombre ; une primitive est une fonction.

# Aire et primitive

Pour $h > 0$, les rectangles donnent $hf(x) \leq F_a(x+h) - F_a(x) \leq hf(x+h)$. Après division par $h$ et passage à la limite, le taux d'accroissement tend vers $f(x)$. Pour $h < 0$, la croissance donne $f(x+h) \leq f(t) \leq f(x)$ sur $[x+h, x]$. En intégrant,

$$(-h)f(x+h) \leq F_a(x) - F_a(x+h) \leq (-h)f(x).$$

En divisant par $-h > 0$, on obtient

$$f(x+h) \leq \frac{F_a(x+h) - F_a(x)}{h} \leq f(x).$$

Les deux bornes tendent vers $f(x)$. Par continuité, $F_a' = f$. Toute autre primitive est $F_a + C$, d'où la formule de calcul aux bornes.

# Propriétés

Pour des fonctions continues et des bornes appartenant à un même intervalle :

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_b^a f = -\int_a^b f, \quad \int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f, \quad \int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

Si $a \leq b$ et $f \leq g$, alors $\int_a^b f \leq \int_a^b g$. En particulier, si $m \leq f \leq M$, alors $m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$. Pour une fonction de signe quelconque, l'intégrale est définie par les primitives. L'aire géométrique entre la courbe et l'axe est $\int_a^b |f|$, obtenue en découpant aux changements de signe. Entre deux courbes, elle vaut $\int_a^b |f-g|$.

# Propriétés

$\int_{-1}^{1} x \, \mathrm{d}x = 0$, mais l'aire entre la droite et l'axe sur cet intervalle vaut 1.

# Valeur moyenne et intégration par parties

Pour $a < b$, la valeur moyenne est $\mu = \dfrac{1}{b-a} \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. Le rectangle de hauteur $\mu$ et de largeur $b - a$ possède la même aire algébrique.

# Valeur moyenne et intégration par parties

Si $u, v$ sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$,

$$\int_a^b u(x)v'(x)\ \mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)\ \mathrm{d}x.$$

# Valeur moyenne et intégration par parties

Intégrer $(uv)' = u'v + uv'$ puis isoler l'intégrale cherchée. Le crochet est indispensable.

# Valeur moyenne et intégration par parties

Avec $u = x$ et $v' = e^x$, $\int_0^1 xe^x \, \mathrm{d}x = [xe^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, \mathrm{d}x = e - (e-1) = 1$.

# Rectangles et suites d'intégrales

Pour $f$ continue et croissante sur $[a, b]$, avec $a < b$ et $n \geq 1$ et $h = \dfrac{b-a}{n}$, les sommes $h \sum_{k=0}^{n-1} f(a+kh)$ et $h \sum_{k=1}^{n} f(a+kh)$ encadrent l'intégrale. Leur différence est $h(f(b) - f(a))$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x)\,\mathrm{d}x$, commencer par le signe et les comparaisons de l'intégrande. Si $0 \leq f \leq M$, alors $0 \leq I_n \leq \dfrac{M}{n+1}$ ; les gendarmes donnent $I_n \to 0$. Une intégration par parties peut aussi fournir une relation entre $I_n$ et $I_{n+1}$.

# Rectangles et suites d'intégrales

Dans $I_n = \int_0^1 x^n f(x)\ \mathrm{d}x$, l'expression $x^0$ désigne la fonction constante 1, y compris à la borne 0. Ainsi $I_0 = \int_0^1 f(x)\ \mathrm{d}x$; aucun calcul indéterminé n'est nécessaire. L'aire entre $y = x$ et $y = x^2$ sur $[0, 1]$ vaut $\frac{1}{6}$.



# Activité de recherche

**Encadrer une intégrale par des rectangles - 35 min.**

On cherche à encadrer $I = \int_0^1 x^2 \, \mathrm{d}x$. Pour un entier $n \geq 1$, on partage $[0; 1]$ en $n$ intervalles de même longueur. On note $L_n$ la somme des aires des rectangles dont les hauteurs sont les valeurs de $x^2$ aux extrémités gauches, et $U_n$ celle obtenue aux extrémités droites.

# Activité de recherche (2)

1. Pour $n = 4$, représenter les deux familles de rectangles, puis calculer $L_4$ et $U_4$.
2. Justifier que $L_4 \leq I \leq U_4$.
3. Écrire une fonction Python d'argument $n$ qui renvoie $L_n$ et $U_n$. Déterminer algébriquement $U_n - L_n$.
4. Déterminer le plus petit entier $n$ pour lequel cet encadrement a une largeur au plus égale à 0,01.
5. Calculer la valeur exacte de $I$ à l'aide d'une primitive et vérifier qu'elle appartient à l'encadrement obtenu pour $n = 4$.