Chapitre 7

Variables aléatoires discrètes et loi binomiale


Compétences : définir une loi, calculer et interpréter une espérance, reconnaître et utiliser une loi binomiale

7.1 Cours de référence

Une variable aléatoire discrète X associe un nombre réel à chaque issue. Sa loi donne les valeurs x_i et les probabilités $p_i = P(X = x_i)$, avec $p_i \geq 0$ et $\sum p_i = 1$.

À retenir

L'espérance est $E(X) = \sum_i x_i p_i$. Elle représente la valeur moyenne à long terme lorsque l'expérience est répétée dans les mêmes conditions ; elle n'est pas nécessairement une valeur effectivement prise par X.




À retenir

X suit une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ lorsque X compte le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes, de même probabilité de succès p. Alors

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad E(X) = np.$$

Le coefficient $\binom{n}{k}$ compte le nombre de chemins contenant exactement k succès parmi n épreuves. Pour $n \leq 10$, il peut être lu dans le triangle de Pascal.



Le diagramme représente approximativement $\mathcal{B}(10, 0{,}3)$; son centre est proche de $E(X) = 3$.

Séance 47 — Espérance d'une variable aléatoire

Variables aléatoires discrètes

06/04/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Définir une loi.
- Calculer une espérance.
- Interpréter une moyenne théorique.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. $2x + 10$
2. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. 3
3. Calculer $\binom{5}{2}$. 10
4. Calculer l'espérance de X constant égal à 8. 8
5. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. $1 - P(X = 0)$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : définir une loi et calculer une espérance.

Activité de recherche

Un jeu coûte 2 euros. Le gain brut vaut 0, 3 ou 10 euros avec probabilités 0,6, 0,3, 0,1. Construire la loi du gain net X, calculer $E(X)$ et décider si le jeu est favorable au joueur.

Correction détaillée – édition professeur

X vaut $-2, 1, 8$. $E(X) = -1{,}2 + 0{,}3 + 0{,}8 = -0{,}1$ euro : jeu défavorable en moyenne. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

La loi de X associe à chaque valeur x_i la probabilité p_i. L'espérance $E(X) = \sum x_i p_i$ est une moyenne théorique à long terme.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

X vaut $-2, 1, 8$. $E(X) = -1{,}2 + 0{,}3 + 0{,}8 = -0{,}1$ euro : jeu défavorable en moyenne.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 8 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Correction détaillée – édition professeur

$X \sim \mathcal{B}(8, 0{,}3)$. $P(X = 2) = \binom{8}{2} 0{,}3^2 0{,}7^6$, $P(X = 0) = 0{,}7^8$, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ et $E(X) = \dfrac{24}{10}$.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, cours p. 154–159 ; exercices p. 160, n° 1 à 5. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Pour le lancement d'un nouveau parfum, une enseigne de cosmétiques vend à ses clients, au prix de 3 €, un ticket à gratter. Les tickets sont imprimés en carnets de 25 : dans chaque carnet, 16 tickets sont perdants, 6 tickets donnent droit à un bon d'achat de 6 € et 3 tickets donnent droit à un bon d'achat de 13 €. Un client achète un ticket choisi au hasard dans un carnet neuf.
On note G la variable aléatoire égale au gain net du client, en euros, c'est-à-dire la valeur du bon obtenu diminuée du prix du ticket (un gain négatif est une perte).

1. Quelles sont les valeurs prises par G ?
2. Recopier et compléter le tableau suivant, qui donne la loi de probabilité de G.

Valeur g_i de G			
$P(G = g_i)$			

3. Calculer l'espérance $E(G)$. Que peut-on en dire du point de vue du client ? et de l'enseigne ?
4. L'enseigne souhaite gagner en moyenne 0,40 € par ticket vendu, sans modifier la composition des carnets. À quel prix doit-elle vendre le ticket ?

Correction détaillée – édition professeur

Cible : Loi d'un gain et espérance.

1. Un ticket perdant donne $G = 0 - 3 = -3$; un bon de 6 € donne $G = 6 - 3 = 3$; un bon de 13 € donne $G = 13 - 3 = 10$. Donc G prend les valeurs -3, 3 et 10.
2. Le ticket est choisi au hasard parmi 25 tickets : situation d'équiprobabilité.

g_i	-3	3	10
$P(G = g_i)$	$\dfrac{16}{25} = 0{,}64$	$\dfrac{6}{25} = 0{,}24$	$\dfrac{3}{25} = 0{,}12$

   Contrôle : $0{,}64 + 0{,}24 + 0{,}12 = 1$.
3. $E(G) = -3 \times 0{,}64 + 3 \times 0{,}24 + 10 \times 0{,}12 = -1{,}92 + 0{,}72 + 1{,}20 = 0$. L'espérance est nulle : sur un grand nombre de tickets, le client ne gagne ni ne perd en moyenne ; le jeu est équitable.

L'enseigne ne gagne rien en moyenne sur les tickets eux-mêmes : l'opération ne sert qu'à attirer la clientèle.

4. Notons B la valeur du bon. $E(B) = 0 \times 0{,}64 + 6 \times 0{,}24 + 13 \times 0{,}12 = 1{,}44 + 1{,}56 = 3$ €. Si le ticket coûte c euros, le gain net du client est $B - c$ et son espérance vaut $3 - c$ (chaque valeur de G est diminuée de c). On veut $3 - c = -0{,}40$, donc $c = 3{,}40$ €. Vérification : les valeurs deviennent $-3{,}40$, 2,60, 9,60 et $-3{,}40 \times 0{,}64 + 2{,}60 \times 0{,}24 + 9{,}60 \times 0{,}12 = -2{,}176 + 0{,}624 + 1{,}152 = -0{,}40$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 355 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 48 — Loi binomiale : reconnaître une situation

Variables aléatoires discrètes

08/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Reconnaître un schéma de Bernoulli.
- Identifier n et p.
- Définir X.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 180. 9
2. Calculer $\binom{5}{2}$. 10
3. Calculer l'espérance de X constant égal à 9. 9
4. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. $1 - P(X = 0)$
5. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. 3

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître un schéma de bernoulli et identifier n et p.

Activité de recherche

Un client accepte une offre avec probabilité 0,25. Un conseiller contacte indépendamment huit clients. Définir X, justifier la loi binomiale et identifier n et p.

Correction détaillée – édition professeur

X compte les acceptations ; répétition de 8 épreuves identiques et indépendantes, succès de probabilité 0,25 : $X \sim \mathcal{B}(8, 0{,}25)$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

$X \sim \mathcal{B}(n, p)$ si X compte les succès dans n épreuves indépendantes de même probabilité p.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

X compte les acceptations ; répétition de 8 épreuves identiques et indépendantes, succès de probabilité 0,25 : $X \sim \mathcal{B}(8, 0{,}25)$.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 9 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Correction détaillée – édition professeur


$X \sim \mathcal{B}(9, 0{,}3)$. $P(X = 2) = \binom{9}{2} 0{,}3^2 0{,}7^7$, $P(X = 0) = 0{,}7^9$, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ et $E(X) = \dfrac{27}{10}$.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, cours p. 154–159 ; exercices p. 160, n° 5, puis p. 162, n° 14 à 20. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Sur une grande plateforme de vente en ligne, 12 % des colis expédiés font l'objet d'un retour par le client. Le service qualité choisit au hasard deux colis expédiés. Le nombre de colis expédiés est suffisamment grand pour que l'on puisse assimiler ce choix à deux tirages au hasard avec remise. On note R l'événement « le colis fait l'objet d'un retour » et X la variable aléatoire égale au nombre de colis retournés parmi les deux colis choisis.



1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessus.
2. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
3. Calculer $P(X = 0)$, $P(X = 1)$ et $P(X = 2)$. Pour $P(X = 1)$, préciser combien de chemins de l'arbre réalisent l'événement $\{X = 1\}$.
4. En déduire, de deux façons différentes, la probabilité qu'au moins un des deux colis fasse l'objet d'un retour.

Correction détaillée – édition professeur

Cible : Reconnaître une loi binomiale, n = 2.

1. Premier niveau : $P(R) = 0{,}12$ et $P(\overline{R}) = 1 - 0{,}12 = 0{,}88$. Les tirages étant assimilés à des tirages avec remise, le second niveau reprend les mêmes probabilités : 0,12 vers R et 0,88 vers $\overline{R}$ sur chacune des deux branches.

2. On répète 2 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise), une épreuve de Bernoulli dont le succès « le colis est retourné » a pour probabilité 0,12. La variable X compte le nombre de succès : X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(2;0{,}12)$.
3. $P(X=0) = 0{,}88^2 = 0{,}7744$. Deux chemins réalisent $\{X=1\}$: $(R,\overline{R})$ et $(\overline{R},R)$, d'où $P(X=1) = 2\times 0{,}12\times 0{,}88 = 0{,}2112$. $P(X=2) = 0{,}12^2 = 0{,}0144$. Contrôle : $0{,}7744+0{,}2112+0{,}0144=1$.
4. « Au moins un retour » est l'événement $\{X\geqslant 1\}$. Par addition : $P(X\geqslant 1) = P(X=1)+P(X=2) = 0{,}2112+0{,}0144 = 0{,}2256$. Par l'événement contraire : $P(X\geqslant 1) = 1-P(X=0) = 1-0{,}7744 = 0{,}2256$. Il y a donc environ 22,6 % de chances qu'au moins un des deux colis soit retourné.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 360 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 49 — Triangle de Pascal et coefficients binomiaux

Variables aléatoires discrètes

27/04/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Construire le triangle de Pascal.
- Lire $\binom{n}{k}$.
- Interpréter un coefficient.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Calculer l'espérance de X constant égal à 3. 3
3. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. $1 - P(X = 0)$
4. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. 3
5. Calculer $\binom{5}{2}$. 10

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : construire le triangle de pascal et lire $\binom{n}{k}$.

Activité de recherche

Construire les lignes $n = 0$ à $n = 6$ du triangle de Pascal. Expliquer le calcul du nombre 15 de la ligne 6, puis lire $\binom{6}{2}$ et $\binom{6}{4}$.

			1			
		1		1		
	1		2		1	
1		3		3		1
	4		6		4	
1						1

Correction détaillée – édition professeur

Chaque nombre intérieur est la somme des deux nombres situés au-dessus. $\binom{6}{2} = \binom{6}{4} = 15$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Le triangle de Pascal vérifie $\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$. Les bords valent 1.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Chaque nombre intérieur est la somme des deux nombres situés au-dessus. $\binom{6}{2} = \binom{6}{4} = 15$.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 10 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Correction détaillée – édition professeur

$X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. $P(X = 2) = \binom{10}{2} 0{,}3^2 0{,}7^8$, $P(X = 0) = 0{,}7^{10}$, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ et $E(X) = \dfrac{30}{10}$.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, p. 164, n° 24 à 29, puis p. 166, n° 36. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Une boutique en ligne teste deux présentations de sa page d'accueil (test A/B) : à chaque nouveau visiteur, le site affiche au hasard la version A ou la version B, avec la même probabilité $\dfrac{1}{2}$, indépendamment des autres visiteurs. On observe les 7 prochains visiteurs et on note X la variable aléatoire égale au nombre de visiteurs à qui la version B est affichée.

1. Justifier que X suit une loi binomiale et préciser ses paramètres.
2. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n = 7$.
3. Lire $\binom{7}{3}$ dans le triangle et interpréter ce nombre dans le contexte. Calculer $P(X = 3)$ sous forme de fraction, puis arrondie à 10^{-3}. Interpréter le résultat.
4. Calculer la probabilité qu'au moins 5 des 7 visiteurs voient la version B (fraction, puis arrondi à 10^{-3}).

Correction détaillée – édition professeur

Cible : Triangle de Pascal et loi B(n ; 1/2).

1. Chaque visiteur constitue une épreuve de Bernoulli de succès « la version B est affichée », de probabilité $\dfrac{1}{2}$. Les 7 épreuves sont identiques et indépendantes, et X compte les succès : $X \sim \mathcal{B}\left(7; \dfrac{1}{2}\right)$.

2.

n	coefficients $\binom{n}{k}$ pour $k = 0, \ldots, n$							
0	1							
1	1	1						
2	1	2	1					
3	1	3	3	1				
4	1	4	6	4	1			
5	1	5	10	10	5	1		
6	1	6	15	20	15	6	1	
7	1	7	21	35	35	21	7	1

Chaque coefficient intérieur est la somme du coefficient situé juste au-dessus et du coefficient placé à gauche de ce dernier (par exemple $\binom{7}{3} = \binom{6}{2} + \binom{6}{3} = 15 + 20 = 35$).

3. $\binom{7}{3} = 35$: il y a 35 suites différentes de 7 affichages contenant exactement 3 fois la version B. Chaque suite a pour probabilité $\left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{128}$, donc $P(X = 3) = \frac{35}{128} \approx 0{,}273$. Dans environ 27 % des séries de 7 visiteurs, exactement 3 voient la version B.

4. $P(X \geqslant 5) = P(X = 5) + P(X = 6) + P(X = 7) = \frac{21 + 7 + 1}{128} = \frac{29}{128} \approx 0{,}227$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 365 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 50 — Probabilités binomiales

Variables aléatoires discrètes

29/04/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Calculer $P(X = k)$.
- Traduire au moins/au plus.
- Utiliser le complémentaire.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Réduire $3x + 4 - x + 2$. $2x + 6$
2. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. $1 - P(X = 0)$
3. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. 3
4. Calculer $\binom{5}{2}$. 10
5. Calculer l'espérance de X constant égal à 4. 4

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer $p(x = k)$ et traduire au moins/au plus.

Activité de recherche

Pour $X \sim \mathcal{B}(8, 0{,}25)$, calculer $P(X = 2)$, $P(X = 0)$ puis $P(X \geq 1)$. Traduire chaque événement en phrase.



Correction détaillée – édition professeur

$P(X = 2) = \binom{8}{2} 0{,}25^2 0{,}75^6 \approx 0{,}3115$; $P(X = 0) = 0{,}75^8 \approx 0{,}1001$; $P(X \geq 1) \approx 0{,}8999$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Si $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, alors $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$. Traduire soigneusement « au moins », « au plus » et « aucun ».

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

$P(X=2)=\binom{8}{2}0{,}25^2 0{,}75^6 \approx 0{,}3115$; $P(X=0)=0{,}75^8 \approx 0{,}1001$; $P(X\geq 1)\approx 0{,}8999$.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 6 essais indépendants, avec $p=0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X=2)$ et $P(X=0)$.
3. En déduire $P(X\geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Correction détaillée – édition professeur

$X\sim\mathcal{B}(6,0{,}3)$. $P(X=2)=\binom{6}{2}0{,}3^2 0{,}7^4$, $P(X=0)=0{,}7^6$, $P(X\geq 1)=1-P(X=0)$ et $E(X)=\dfrac{18}{10}$.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, p. 164, n° 24 à 29, puis p. 168, n° 41 à 45. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Dans un cabinet médical, on estime qu'un patient ayant pris rendez-vous en ligne se présente effectivement à sa consultation avec une probabilité de 0,9. Un matin, un médecin a 8 rendez-vous pris en ligne. On note X la variable aléatoire égale au nombre de patients qui se présentent parmi ces 8. On admet que X suit une loi binomiale.
Les probabilités seront arrondies à 10^{-3}.

1. Donner les paramètres n et p de la loi de X.
2. Calculer la probabilité des événements suivants : A : « les 8 patients se présentent » ; B : « au moins un patient ne se présente pas ».
3. Construire le triangle de Pascal jusqu'à la ligne $n=8$. En déduire $\binom{8}{6}$, puis la probabilité de l'événement C : « exactement 6 patients se présentent ».
4. Traduire par une phrase l'événement $\{X=7\}$, puis calculer $P(X=7)$.

Correction détaillée – édition professeur

Cible : Probabilités binomiales, triangle jusqu'à n = 8.

1. $n=8$ et $p=0{,}9$: $X\sim\mathcal{B}(8;0{,}9)$.
2. $P(A)=P(X=8)=0{,}9^8\approx 0{,}430$. B est l'événement contraire de A : $P(B)=1-0{,}9^8\approx 0{,}570$.
3. Ligne 8 du triangle (obtenue à partir de la ligne 7 : $1,7,21,35,35,21,7,1$) : $1,8,28,56,70,56,28,8,1$. Donc $\binom{8}{6}=28$. $P(C)=P(X=6)=28\times 0{,}9^6\times 0{,}1^2\approx 0{,}149$.

4. $\{X = 7\}$: « exactement 7 des 8 patients se présentent », c'est-à-dire exactement un patient est absent. $P(X = 7) = \binom{8}{7} \times 0{,}9^7 \times 0{,}1 = 8 \times 0{,}9^7 \times 0{,}1 \approx 0{,}383$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 370 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

Séance 51 — Bilan du chapitre et évaluation

Variables aléatoires discrètes

04/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Calculer et interpréter $E(X)$.
- Résoudre un problème binomial.
- Analyser ses erreurs.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 100. 20
2. Donner $E(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}3)$. 3
3. Calculer $\binom{5}{2}$. 10
4. Calculer l'espérance de X constant égal à 5. 5
5. Traduire $X \geq 1$ par un complémentaire. $1 - P(X = 0)$

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : calculer et interpréter $e(x)$ et résoudre un problème binomial.

Activité de recherche

Un centre reçoit 120 groupes de 10 clients, chaque client réclamant avec probabilité 0,08. Estimer le nombre moyen de réclamations par groupe, puis sur l'ensemble des groupes. Discuter ce que l'espérance permet ou non de prévoir.

Correction détaillée – édition professeur

Par groupe $E(X) = 10 \times 0{,}08 = 0{,}8$. Sur 120 groupes, environ 96 réclamations en moyenne ; ce n'est pas une certitude. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

Trace écrite

Pour $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $E(X) = np$. La valeur donne le nombre moyen de succès sur un grand nombre de séries de n épreuves.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Correction détaillée – édition professeur

Par groupe $E(X) = 10 \times 0{,}08 = 0{,}8$. Sur 120 groupes, environ 96 réclamations en moyenne ; ce n'est pas une certitude.

Entraînement – essentiel

1. Justifier que le nombre de succès parmi 7 essais indépendants, avec $p = 0{,}3$, suit une loi binomiale.
2. Calculer $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.
3. En déduire $P(X \geq 1)$ et calculer $E(X)$.

Correction détaillée – édition professeur

$X \sim \mathcal{B}(7, 0{,}3)$. $P(X = 2) = \binom{7}{2} 0{,}3^2 0{,}7^5$, $P(X = 0) = 0{,}7^7$, $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0)$ et $E(X) = \dfrac{21}{10}$.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, p. 160 à 169. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Un producteur de semences potagères affirme que 95 % de ses graines de tomate germent. Les graines sont vendues en sachets de 12. La production est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler le remplissage d'un sachet à un tirage au hasard et avec remise de 12 graines. On note X la variable aléatoire qui, à chaque sachet, associe le nombre de graines qui germent.

1. Quelle loi suit X ? Justifier et préciser ses paramètres.
2. Donner $\binom{12}{11}$ et $\binom{12}{12}$.
3. Calculer $P(X = 11)$ et $P(X = 12)$, arrondies à 10^{-3}. Interpréter chacun de ces résultats.
4. En déduire la probabilité, arrondie à 10^{-3}, qu'un sachet contienne au moins 11 graines qui germent.
5. Calculer $E(X)$ et interpréter ce nombre pour un jardinier qui achète régulièrement ces sachets.

Correction détaillée – édition professeur

Cible : Bilan : loi binomiale, au moins, espérance.

1. On répète 12 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise), l'épreuve de Bernoulli « une graine germe », de probabilité 0,95. X compte les succès : $X \sim \mathcal{B}(12; 0{,}95)$.
2. $\binom{12}{11} = 12$ (choisir la seule graine qui ne germe pas) et $\binom{12}{12} = 1$.
3. $P(X = 11) = 12 \times 0{,}95^{11} \times 0{,}05 \approx 0{,}341$: environ 34 % des sachets contiennent exactement une graine qui ne germe pas. $P(X = 12) = 0{,}95^{12} \approx 0{,}540$: environ 54 % des sachets ont toutes leurs graines qui germent.
4. $P(X \geqslant 11) = P(X = 11) + P(X = 12) = 12 \times 0{,}95^{11} \times 0{,}05 + 0{,}95^{12} \approx 0{,}882$ (calcul fait avec les valeurs non arrondies ; la somme des arrondis donnerait 0,881).
5. $E(X) = np = 12 \times 0{,}95 = 11{,}4$. Sur un grand nombre de sachets, il germe en moyenne 11,4 graines par sachet ; ce n'est pas une valeur que X peut prendre pour un sachet donné.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 375 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Correction détaillée – édition professeur

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Méthode

Conduite en 1 h : 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
Conduite en 2 h : ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
Différenciation : fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.