Séance 52 — Diagnostic des acquis

Révisions et consolidation

11/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Identifier les acquis.
- Classer les erreurs.
- Planifier la remédiation.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....
3. Résoudre $10^x = 1000$. .....
4. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
5. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : identifier les acquis et classer les erreurs.

Activité de recherche

Répondre sans cours à 14 questions, deux par chapitre. Reporter chaque erreur dans une grille : connaissance, choix de méthode, calcul, lecture, rédaction. Choisir ensuite deux priorités personnelles.

Trace écrite

Le diagnostic sert à choisir la remédiation : reconnaître l'erreur, retrouver la règle utile, refaire une question analogue, puis vérifier sans aide.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Réactivation des chapitres 1 à 7. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Une coopérative installe des kits solaires domestiques dans une région rurale. Le tableau ci-dessous donne le nombre de kits installés chaque année.

Année	2021	2022	2023
Nombre de kits installés	2 480	3 150	3 938

Partie A

1. Calculer le taux d'évolution du nombre de kits installés entre 2021 et 2022, puis entre 2022 et 2023 (en pourcentage, arrondi à 0,1 %).
2. Calculer la moyenne géométrique de 1,27 et 1,25 (arrondie à 10^{-4}).
3. En déduire le taux d'évolution annuel moyen entre 2021 et 2023.

Partie B

On suppose qu'à partir de 2023, le nombre de kits installés augmente de 26 % par an. On note u_n le nombre de kits installés au cours de l'année $2023 + n$, les valeurs étant arrondies à l'unité.

1. Donner u_0, puis calculer u_1 et u_2.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Exprimer u_n en fonction de n.
3. Selon ce modèle, combien de kits seraient installés en 2028 ?
4. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'année à partir de laquelle le nombre annuel de kits installés dépasserait 20 000.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 380 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 53 — Réactivation : fonctions exponentielles

Révisions et consolidation

13/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Réactiver les modèles exponentiels.
- Résoudre et interpréter.
- Contrôler les unités.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. .....
2. Résoudre $10^x = 1000$. .....
3. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
4. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
5. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les modèles exponentiels et résoudre et interpréter.

Activité de recherche

Une valeur de 18 000 augmente de 3,5 % par an. Écrire le modèle, calculer la valeur après huit ans et déterminer quand elle dépassera 25 000.



Trace écrite

Une fonction exponentielle modélise une évolution relative constante. Identifier d'abord la valeur initiale et le coefficient multiplicateur.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, p. 48, n° 1 à 8, puis p. 54, n° 47 à 50. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

La fréquentation d'un parc naturel a connu trois évolutions annuelles successives : une hausse de 5,4 %, puis une baisse de 2,6 %, puis une hausse de 7,1 %.

1. Calculer le coefficient multiplicateur global sur les trois années et le taux d'évolution global correspondant (arrondi à 0,01 %).
2. Calculer le taux d'évolution annuel moyen sur cette période (arrondi à 0,01 %).
3. La fréquentation initiale était de 85 000 visiteurs. Calculer la fréquentation finale, puis vérifier qu'une hausse de ce taux moyen appliquée trois fois conduit à peu près au même résultat.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 385 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 54 — Réactivation : logarithme décimal

Révisions et consolidation

18/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Réactiver les logarithmes.
- Résoudre une équation.
- Vérifier les conditions.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 160. .....
2. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
3. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
4. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....
5. Résoudre $10^x = 1000$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les logarithmes et résoudre une équation.

Activité de recherche

Résoudre $10^x = 340$, $1{,}06^n = 2$ et $1{,}06^n \geq 2$. Pour chaque réponse, distinguer valeur réelle, valeur approchée et rang entier minimal.

Trace écrite

Le logarithme transforme une équation exponentielle en équation sur l'exposant. Conditions : base positive différente de 1, second membre positif.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, p. 70, n° 1 à 10, puis p. 73 à 75, n° 30 à 42. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Définition. L'ordre de grandeur d'un réel $x > 0$ est la puissance de 10 la plus proche de x (on compare les distances de x aux deux puissances de 10 qui l'encadrent).

1. On considère $x = 27{,}6$ et $y = 812$.
   a. Donner l'ordre de grandeur de x et celui de y, en justifiant par un calcul de distances.
   b. À l'aide de la calculatrice, donner $\log(x)$ et $\log(y)$ arrondis à 10^{-3}. Proposer une conjecture : comment obtenir l'ordre de grandeur à partir de l'arrondi à l'unité du logarithme ?
2. On considère $z = 4{,}6$. Déterminer son ordre de grandeur et $\log(z)$. La conjecture de la question 1 est-elle vérifiée ?
3. On écrit x en notation scientifique : $x = a \times 10^n$ avec $1 \leqslant a < 10$ et n entier relatif. Selon la valeur de a, quel est l'ordre de grandeur de x ? (En cas d'égalité des distances, on retient la plus grande puissance.)
4. Exprimer $\log(x)$ en fonction de n et de $\log(a)$. En déduire une méthode pour obtenir n, a, puis l'ordre de grandeur de x à partir de $\log(x)$.
5. En cybersécurité, on évalue la robustesse d'une clé ou d'un mot de passe par le nombre de possibilités. La calculatrice ne peut pas afficher directement les nombres suivants. Déterminer l'ordre de grandeur :
   a. du nombre $2^{1\,024}$ de clés de 1 024 bits ;
   b. du nombre 94^{128} de mots de passe de 128 caractères choisis parmi 94 caractères.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 390 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 55 — Réactivation : fonction inverse

Révisions et consolidation

20/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Réactiver la fonction inverse.
- Mener une étude.
- Tracer et interpréter.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
3. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....
4. Résoudre $10^x = 1000$. .....
5. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver la fonction inverse et mener une étude.

Activité de recherche

Étudier $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et interpréter son minimum dans un contexte de coût moyen. Produire le tableau de variations et une esquisse.



Trace écrite

Pour une fonction contenant $\dfrac{1}{x}$, commencer par exclure $x = 0$, puis dériver, factoriser et étudier le signe avant les variations.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Pour prolonger : Calao, p. 94, n° 1 à 9, puis p. 96, n° 10 à 21. L'exercice d'application ci-dessous est original ; ces références renvoient aux exercices du manuel pour s'entraîner davantage et retrouver ses figures.

Exercice d'application

Un atelier fabrique des sacs en raphia. Le coût de production, en milliers d'ariary, de x sacs par semaine est donné par $C(x) = 2x^2 + 40x + 1\,250$, pour x compris entre 0 et 60. L'atelier cherche le nombre de sacs pour lequel le coût moyen de fabrication d'un sac est le plus faible.

1. Calculer $C(0)$ et interpréter ce résultat. Calculer le coût de production de 10 sacs, puis le coût moyen d'un sac pour cette production.
2. On note $f(x)$ le coût moyen d'un sac lorsque l'atelier fabrique x sacs, pour $x \in [1;60]$. Montrer que $f(x) = 2x + 40 + \dfrac{1\,250}{x}$.
3. Calculer $f'(x)$ et montrer que $f'(x) = \dfrac{2(x-25)(x+25)}{x^2}$.
4. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[1;60]$ et dresser le tableau de variations de f.
5. Combien de sacs l'atelier doit-il fabriquer pour que le coût moyen soit minimal ? Donner ce coût moyen minimal.
6. Les sacs sont vendus 150 000 Ar pièce. Pour cette production, quel est le bénéfice réalisé sur un sac ? sur la semaine ?

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 395 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.