Séries de Fourier

Guide de travail et corrigés

Table des matières

1 Périodicité, amplitude et phase **2**

1.1 Une fonction qui recommence . . . 2

1.2 Trois paramètres, trois effets . . . 2

1.3 Le cercle derrière le sinus . . . 2

1.4 Additionner des ondes . . . 2

2 Orthogonalité et mesure des coefficients **4**

2.1 Mesurer une ressemblance . . . 4

2.2 Pourquoi cette intégrale choisit la bonne fréquence . . . 4

2.3 Convention réelle . . . 4

2.4 Un calcul complet : le créneau . . . 5

3 Approximation, sauts et moyennes de Fejér **6**

3.1 Trois questions différentes . . . 6

3.2 Ce qui se passe au bord d'un saut . . . 6

3.3 Pourquoi une convergence uniforme est impossible au saut . . . 6

3.4 Moyenner les approximations . . . 6

3.5 Pourquoi Fejér ne dépasse pas le créneau . . . 7

4 Énergie, projection et erreur **8**

4.1 L'énergie d'un signal . . . 8

4.2 La meilleure approximation dans un espace fini . . . 8

4.3 Bessel puis Parseval . . . 8

4.4 Retour aux coefficients réels . . . 8

4.5 Choisir des composantes pour un dessin . . . 9

5 Échantillonnage et transformée discrète **10**

5.1 Remplacer une fonction par une liste . . . 10

5.2 Orthogonalité discrète et inversion . . . 10

5.3 Pourquoi les fréquences se replient . . . 10

5.4 Parseval discret et erreur . . . 10

5.5 Ce qui est exact, ce qui est approximé . . . 11

6 Du contour aux cercles : Madagascar et au-delà **12**

6.1 Étape 1 : fermer et paramétrer 12

6.2 Étape 2 : répartir les points 12

6.3 Étape 3 : centrer puis décomposer 12

6.4 Étape 4 : interpréter les coefficients 12

6.5 Étape 5 : reconstruire sans inventer une trajectoire 13

6.6 Relier beauté, expérience et formalisation 13

1 Périodicité, amplitude et phase

Prérequis : Trigonométrie, fonctions et nombres complexes.

Explorer avant de formaliser

Dans le laboratoire, déplace le point de l'onde. Prédis ce qui change lorsque la fréquence double, puis compare la hauteur des oscillations et leur nombre.

1.1 Une fonction qui recommence

Une fonction f est T-périodique si T est strictement positif et si $f(t+T) = f(t)$ pour tout t. Une période n'est pas nécessairement la plus petite. Nous étudions d'abord des fonctions de période 1 ; pour une période T, on remplace t par t/T. Le signal ne change pas de forme : seule l'échelle horizontale change.

$$f(t+T) = f(t), \qquad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}.$$

1.2 Trois paramètres, trois effets

Pour A positif, A mesure l'amplitude ; k est le nombre entier d'oscillations sur une période de référence ; la phase indique la position initiale. Si k est non nul, la période fondamentale de cette onde isolée vaut T/|k|. Un déphasage ne change pas l'amplitude. Pour k=0, le terme est constant : il ne tourne pas.

$$u(t) = A\cos\left(\frac{2\pi kt}{T} + \varphi\right).$$

1.3 Le cercle derrière le sinus

Un nombre complexe $z = x + iy$ représente le vecteur de coordonnées (x,y). La formule d'Euler relie le cercle et les fonctions trigonométriques. Le module A est la longueur du vecteur, l'argument est son angle. La partie réelle est sa projection horizontale ; la partie imaginaire est sa projection verticale.

$$Ae^{i(2\pi kt/T+\varphi)} = A\cos(2\pi kt/T + \varphi) + iA\sin(2\pi kt/T + \varphi).$$

Justification. En multipliant A(cos φ+i sin φ) par cos θ+i sin θ, les formules d'addition donnent A(cos(θ+φ)+i sin(θ+φ)). Multiplier par une exponentielle de module 1 effectue donc une rotation.

1.4 Additionner des ondes

Une somme finie de sinus et de cosinus de fréquences entières est un polynôme trigonométrique. Elle est T-périodique, même si une période plus petite peut exister. L'addition est point par point : on additionne les hauteurs, pas les fréquences. Dans le plan complexe, on place les vecteurs bout à bout. Le dernier point est leur somme. C'est le principe géométrique des épicycles.

$$p(t) = c_0 + \sum_{1\le|k|\le N} c_k e^{2\pi ikt/T}.$$

Exercices

1. Déterminer amplitude, période fondamentale et valeur en zéro de $u(t) = 2\cos(6\pi t + \pi/3)$.

   Correction. L'amplitude vaut 2 ; la fréquence sur [0,1] vaut 3 ; la période fondamentale est 1/3. La valeur en zéro est 2 cos($\pi/3$)=1.

2. Pourquoi $e^{2\pi it} + e^{-2\pi it}$ trace-t-il un segment et non un cercle ?

   Correction. Les parties imaginaires s'annulent : la somme vaut $2\cos(2\pi t)$, réelle, dans le segment [-2,2]. Les deux vecteurs tournent dans des sens opposés.

3. Une somme de fréquences 2 et 4 est-elle nécessairement de période fondamentale 1 ?

   Correction. Non. Chaque terme est de période 1/2 ; la somme l'est donc aussi. Selon les coefficients, la période fondamentale peut même être plus petite.

2 Orthogonalité et mesure des coefficients

Prérequis : Leçon 1 ; intégrale sur un segment ; produit scalaire.

Explorer avant de formaliser

Choisis le mélange dans le laboratoire. Mesure successivement les fréquences 1, 2 et 3. Compare les produits avec un sinus et repère les compensations d'aires signées.

2.1 Mesurer une ressemblance

On considère des fonctions complexes de carré intégrable sur [0,1]. Le produit scalaire est linéaire en sa première variable. La conjugaison est indispensable : elle permet que la norme au carré soit réelle et positive. La famille des exponentielles entières est orthonormée.

$$\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(t)\overline{g(t)}\,dt, \qquad e_k(t) = e^{2\pi ikt}.$$

Justification. Le produit e_k fois le conjugué de e_l vaut $e^{2\pi i(k-l)t}$. Si k=l, son intégrale vaut 1. Sinon, une primitive est $\dfrac{e^{2\pi i(k-l)t}}{2\pi i(k-l)}$, qui prend la même valeur aux deux bornes : l'intégrale vaut zéro.

2.2 Pourquoi cette intégrale choisit la bonne fréquence

Le coefficient c_k est le produit scalaire de f et e_k. Pour un polynôme trigonométrique, multiplie la somme par le conjugué de e_k et intègre. Tous les termes de fréquence différente disparaissent ; il reste le coefficient cherché. Pour une fonction générale intégrable, cette formule définit ses coefficients de Fourier sans affirmer encore que la série converge vers la fonction.

$$c_k = \int_0^1 f(t)e^{-2\pi ikt}\,dt, \qquad S_N f = \sum_{k=-N}^{N} c_k e^{2\pi ikt}.$$

2.3 Convention réelle

Pour une fonction réelle, les coefficients de fréquences opposées sont conjugués. On regroupe les termes k et -k en sinus et cosinus. Le terme constant vaut $a_0/2$, et non a_0. Cette convention explique les facteurs 2 dans les intégrales.

$$a_0 = 2\int_0^1 f$$
$$a_n = 2\int_0^1 f(t)\cos(2\pi nt)\,dt$$
$$b_n = 2\int_0^1 f(t)\sin(2\pi nt)\,dt.$$

Justification. Les identités d'Euler écrivent chaque cosinus comme la demi-somme des exponentielles opposées et chaque sinus comme leur différence divisée par 2i. En regroupant les deux coefficients conjugués, on obtient la convention réelle et le facteur un demi du terme constant.

2.4 Un calcul complet : le créneau

Le créneau vaut 1 sur]0,1/2[et -1 sur]1/2,1[. Ses valeurs aux sauts ne changent aucune intégrale. Sa moyenne et ses coefficients cosinus sont nuls. Pour b_n, on sépare les deux demi-périodes et on intègre le sinus.

$$b_n = \frac{2(1-(-1)^n)}{\pi n} = \begin{cases} \dfrac{4}{\pi n} & n \text{ impair}, \\ 0 & n \text{ pair}. \end{cases}$$

Justification. Une primitive de $\sin(2\pi nt)$ est $-\dfrac{\cos(2\pi nt)}{2\pi n}$. L'intégrale sur la première moitié vaut $\dfrac{1-(-1)^n}{2\pi n}$, celle sur la seconde son opposé. Le facteur 2 de la définition donne le résultat affiché.

Exercices

1. Calculer les coefficients non nuls de f(t)=0,6 cos(2πt) + 0,8 sin(4πt).

   Correction. a_1=0,6 et b_2=0,8 ; les autres a_n et b_n sont nuls. Donc c_1=c_{-1}=0,3, c_2=-0,4i, c_{-2}=0,4i.

2. Calculer les coefficients sinus de f(t)=2t-1 sur]0,1[, prolongée périodiquement.

   Correction. La moyenne et les coefficients cosinus sont nuls. Par intégration par parties, b_n=$-\dfrac{2}{\pi n}$. Le terme de bord est -1/(πn) avant multiplication par 2.

3. Pourquoi modifier une fonction en un seul point ne change-t-il pas ses coefficients ?

   Correction. Une modification en un point ne change aucune intégrale. Les coefficients ne peuvent donc pas détecter la valeur choisie à un saut isolé.

3 Approximation, sauts et moyennes de Fejér

Prérequis : Leçons 1 et 2 ; limites et continuité.

Explorer avant de formaliser

Observe le créneau pour N=3, 12 puis 60. Zoome près d'un saut. Compare la somme partielle à la moyenne de Fejér : la zone de dépassement devient plus étroite, mais sa hauteur relative ne disparaît pas pour les sommes partielles.

3.1 Trois questions différentes

La convergence ponctuelle examine chaque t fixé. La convergence uniforme demande que l'erreur maximale sur toute une période tende vers zéro. La convergence quadratique demande seulement que l'intégrale du carré de l'erreur tende vers zéro. Une erreur concentrée sur un intervalle très court peut être petite au sens quadratique tout en restant grande en certains points.

$$S_N(t) \to f(t), \qquad \sup_t |S_N(t) - f(t)| \to 0, \qquad \int_0^1 |S_N - f|^2 \to 0.$$

3.2 Ce qui se passe au bord d'un saut

Théorème de Dirichlet, admis ici : si une fonction périodique est de classe C^1 par morceaux sur une période, sa série de Fourier converge en chaque point vers la moyenne de ses limites à gauche et à droite. En un point de continuité, cette moyenne est f(t). Au saut du créneau, elle vaut zéro. Il n'est donc pas correct d'affirmer que la série restitue toute valeur arbitrairement assignée au saut.

$$S_N(t) \longrightarrow \frac{f(t^-) + f(t^+)}{2}.$$

3.3 Pourquoi une convergence uniforme est impossible au saut

Chaque somme partielle est continue. Une limite uniforme de fonctions continues est continue. Une fonction discontinue ne peut donc pas être la limite uniforme de ces sommes sur la période entière. Le phénomène de Gibbs désigne un dépassement près du saut, dont la hauteur relative tend vers une constante non nulle alors que sa zone se resserre. Aucun de ces constats ne contredit une convergence en moyenne quadratique. **Justification.** Pour la continuité d'une limite uniforme : choisis une somme à distance uniforme inférieure à $\varepsilon/3$ de la limite ; utilise ensuite sa continuité pour rendre sa variation inférieure à $\varepsilon/3$. L'inégalité triangulaire donne une variation de la limite inférieure à ε.

3.4 Moyenner les approximations

La moyenne de Fejér est la moyenne arithmétique de S_0 à S_N. Chaque fréquence est retenue dans $N + 1 - |k|$ sommes. Son poids est donc $1 - \dfrac{|k|}{N+1}$. Cela réduit le rôle des hautes fréquences. Théorème de Fejér, admis : pour une fonction continue et périodique, ces moyennes convergent

uniformément vers f.

$$\sigma_N = \frac{S_0 + \cdots + S_N}{N+1} = \sum_{|k|\leq N} \left(1 - \frac{|k|}{N+1}\right) c_k e^{2\pi i k t}.$$

3.5 Pourquoi Fejér ne dépasse pas le créneau

La moyenne peut s'écrire comme une moyenne pondérée de valeurs du signal, avec un noyau positif d'intégrale 1. Elle reste donc entre le minimum et le maximum du créneau. Au saut elle converge encore vers la moyenne des limites. Elle ne peut pas converger uniformément vers un créneau discontinu sur toute la période.

$$K_N(u) = \frac{1}{N+1} \left| \sum_{j=0}^{N} e^{2\pi i j u} \right|^2 \geq 0$$

$$\int_0^1 K_N = 1.$$

Justification. En développant le carré, le coefficient de fréquence k compte $N + 1 - |k|$ couples d'indices. On retrouve les poids de σ_N. L'intégrale de K_N ne garde que sa fréquence zéro, égale à 1. Ainsi σ_N(t)=$\int$ f(t-u)K_N(u)du est une moyenne positive.

Exercices

1. Le créneau est défini égal à 7 en t=0. Vers quoi $S_N(0)$ converge-t-elle ?

   Correction. Vers zéro, moyenne des limites 1 et -1. Une valeur isolée ne change aucun coefficient.

2. Écrire σ_2 pour $f(t) = \cos(2\pi t) + \sin(4\pi t)$.

   Correction. σ_2(t)=(2/3) cos(2πt)+(1/3) sin(4πt). Les poids des fréquences 1 et 2 sont 2/3 et 1/3.

3. Une courbe paraît exacte à l'écran. A-t-on démontré la convergence uniforme ?

   Correction. Non. L'écran examine un nombre fini de pixels et des rangs finis. Une preuve doit contrôler tous les points et tous les rangs suffisamment grands.

4 Énergie, projection et erreur

Prérequis : Leçons 1 à 3 ; produit scalaire et sommes.

Explorer avant de formaliser

Choisis le mélange. Compare N=1 et N=2 : le premier rang manque une harmonique, le second retrouve le signal. Puis compare avec le créneau, dont l'erreur ne devient pas nulle à rang fini.

4.1 L'énergie d'un signal

On appelle ici énergie sur une période la norme L^2 au carré. Cette quantité est une moyenne quadratique puisque notre période vaut 1. Pour une période T, la convention moyenne utilise un facteur 1/T. On ne doit pas confondre énergie, erreur quadratique et racine de cette erreur.

$$\|f\|_2^2 = \int_0^1 |f(t)|^2 \, dt$$

$$\mathrm{RMS}(f) = \sqrt{\int_0^1 |f|^2}.$$

4.2 La meilleure approximation dans un espace fini

Soit V_N l'espace engendré par les exponentielles de fréquences -N à N. L'erreur f-S_N est orthogonale à chaque élément de V_N. Si p appartient à V_N, les deux termes f-S_N et S_N-p sont orthogonaux. Le théorème de Pythagore donne une identité qui prouve que S_N minimise l'erreur quadratique dans cet espace.

$$\|f - p\|_2^2 = \|f - S_N\|_2^2 + \|S_N - p\|_2^2 \geq \|f - S_N\|_2^2.$$

Justification. Pour chaque |k|≤N, $\langle f - S_N, e_k \rangle = c_k - c_k = 0$ par orthogonalité. Développer le carré de la norme de (f-S_N)+(S_N-p) annule le terme croisé. L'égalité minimale impose p=S_N au sens L^2.

4.3 Bessel puis Parseval

À rang fini, Pythagore donne l'énergie du signal comme la somme de l'énergie captée et de l'énergie résiduelle : c'est l'inégalité de Bessel. Théorème de complétude, admis : les polynômes trigonométriques sont denses dans l'espace L^2 périodique. Par optimalité des projections, cela entraîne que l'erreur tend vers zéro et donne Parseval.

$$\|f - S_N\|_2^2 = \|f\|_2^2 - \sum_{|k| \leq N} |c_k|^2$$

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k \in \mathbb{Z}} |c_k|^2.$$

4.4 Retour aux coefficients réels

Pour un signal réel, les termes de fréquence opposée ont la même énergie. On obtient la forme réelle de Parseval. Dans le mélange, l'énergie totale vaut $0{,}6^2/2+0{,}8^2/2$. Au rang 1, toute l'erreur

est l'énergie de la seconde harmonique.

$$\|f\|_2^2 = \frac{a_0^2}{4} + \frac{1}{2}\sum_{n\geq 1}(a_n^2 + b_n^2)$$

$$\|f - S_1\|_2^2 = \frac{0{,}8^2}{2} = 0{,}32.$$

4.5 Choisir des composantes pour un dessin

Pour un nombre fixé de coefficients d'une DFT, conserver ceux de plus grand module minimise l'erreur quadratique sur les échantillons, car chaque coefficient omis contribue par son module au carré. Ce tri n'est pas la troncature par fréquence $|k| \leq N$ d'une série classique. Dans la galerie, le tri par amplitude rend rapidement le contour reconnaissable ; dans le laboratoire des signaux, N désigne bien un rang de fréquence.

Exercices

1. Calculer l'énergie du mélange et la racine de son erreur au rang 1.

   Correction. L'énergie vaut 0,5. L'erreur quadratique vaut 0,32 et sa racine vaut $0{,}4\sqrt{2}$, soit environ 0,5657.

2. Pour le créneau, donner l'erreur au rang 1.

   Correction. L'énergie du créneau est 1. Seul $b_1 = 4/\pi$ est capté : l'erreur vaut $1 - \dfrac{8}{\pi^2}$, soit environ 0,1894.

3. Une moyenne de Fejér minimise-t-elle nécessairement l'erreur dans V_N ?

   Correction. Non. La projection S_N est le minimiseur. Pondérer ses coefficients diminue certaines oscillations mais ajoute une erreur dans V_N. Les buts visuels et quadratiques diffèrent.

5 Échantillonnage et transformée discrète

Prérequis : Leçons 1 à 4 ; sommes géométriques ; complexes.

Explorer avant de formaliser

Dans le tracé, compare 8, 40 puis 128 vecteurs. Le calcul utilise 128 points et 128 coefficients. Essaie un contour anguleux : même en conservant tout, que peut-on affirmer entre les points ?

5.1 Remplacer une fonction par une liste

La DFT s'applique à une liste de M nombres complexes z_j. Elle n'utilise pas d'intégrale. Les échantillons portent les paramètres t_j=j/M. Dans un contour, $z_j = x_j + iy_j$. Ici on répartit les points à pas de longueur constant le long du contour fermé ; t représente donc une fraction de longueur parcourue.

$$c_k^{(M)} = \frac{1}{M} \sum_{j=0}^{M-1} z_j e^{-2\pi i k j/M}, \quad 0 \le k < M.$$

5.2 Orthogonalité discrète et inversion

Pour un entier r, la somme des M racines $e^{2\pi i r j/M}$ vaut M si r est divisible par M, et zéro sinon. En remplaçant les coefficients dans la somme de reconstruction, cette identité ne garde que le point voulu. L'inversion est exacte en arithmétique exacte ; le logiciel introduit de petites erreurs d'arrondi.

$$z_j = \sum_{k=0}^{M-1} c_k^{(M)} e^{2\pi i k j/M}.$$

Justification. Si q=$e^{2\pi i r/M}$≠1, la somme géométrique vaut $\dfrac{1-q^M}{1-q}$=0. Si q=1, elle vaut M. En substituant c_k dans l'inversion, la somme intérieure en k vaut M lorsque l'indice du point est j et zéro autrement.

5.3 Pourquoi les fréquences se replient

Sur les points j/M, deux fréquences qui diffèrent d'un multiple de M sont indiscernables. On peut renommer les indices supérieurs à M/2 en fréquences négatives. Pour M pair, la fréquence de Nyquist M/2 et son opposée donnent les mêmes échantillons ; choisir l'une fixe une interpolation entre ces points.

$$e^{2\pi i (k+qM) j/M} = e^{2\pi i k j/M}, \qquad q \in \mathbb{Z}.$$

5.4 Parseval discret et erreur

Le même raisonnement d'orthogonalité donne Parseval discret. Si l'on conserve un sous-ensemble I de coefficients, l'erreur moyenne au carré sur les M points est exactement la somme des modules au carré des coefficients omis. La valeur RMS affichée dans le tracé est la racine de cette somme,

dans les unités du dessin normalisé.

$$\frac{1}{M}\sum_{j=0}^{M-1}|z_j|^2 = \sum_{k=0}^{M-1}|c_k^{(M)}|^2$$
$$\mathrm{RMS}^2 = \sum_{k\notin I}|c_k^{(M)}|^2.$$

5.5 Ce qui est exact, ce qui est approximé

Les M coefficients reconstruisent les M échantillons. Entre ces échantillons, la somme définit un polynôme trigonométrique ; rien n'oblige un contour arbitraire à le suivre exactement. Augmenter le nombre de coefficients conservés améliore une reconstruction à échantillonnage fixé. Augmenter M améliore une autre étape : la description du contour de départ. Un signal rapide mal échantillonné peut être confondu avec un signal lent.

Exercices

1. Calculer la DFT de la liste (1,i,-1,-i) avec M=4.

   Correction. La liste vaut $e^{2\pi ij/4}$. L'orthogonalité donne c_1=1 et c_0=c_2=c_3=0.

2. Avec M=8, pourquoi les fréquences 1 et 9 sont-elles indiscernables ?

   Correction. Leur différence vaut 8. Au point j/8, le quotient des deux exponentielles vaut $e^{2\pi ij}$=1.

3. Il reste des coefficients de modules 0,3 et 0,4. Quelle est l'erreur RMS sur les points ?

   Correction. Le carré de l'erreur vaut $0{,}3^2+0{,}4^2=0{,}25$; la RMS vaut 0,5.

6 Du contour aux cercles : Madagascar et au-delà

Prérequis : Leçons 1 à 5 ; coordonnées du plan.

Explorer avant de formaliser

Observe Madagascar dans la galerie, puis ouvre le laboratoire. Choisis Dessiner, trace un contour et relâche pour le fermer. Ajoute des vecteurs, parcours la période et explique chaque transformation.

6.1 Étape 1 : fermer et paramétrer

Un contour fermé est une application périodique $t \mapsto z(t)$ du paramètre vers le plan. Un dessin à main levée donne une ligne brisée ; on joint sa dernière position à la première. Ce segment peut être visible si le geste était ouvert. Les intersections du contour ne posent aucun problème : la méthode décrit un parcours, pas nécessairement une frontière simple.

6.2 Étape 2 : répartir les points

Les événements de la souris ne surviennent pas à distance constante. On calcule donc les longueurs des segments, puis on interpole sur la ligne brisée aux distances jL/M, où L est sa longueur totale. Cette étape évite qu'une zone dessinée lentement soit surreprésentée. Un autre paramétrage du même contour peut produire d'autres coefficients : la forme géométrique ne détermine pas seule un spectre.

6.3 Étape 3 : centrer puis décomposer

La moyenne des points est le coefficient c_0 de la DFT. Soustraire cette moyenne place le dessin autour de l'origine. Le laboratoire normalise aussi sa taille pour comparer des contours dans un repère fixe ; ce n'est pas un changement d'échelle automatique pendant le déplacement d'un paramètre. Le contour de Madagascar est un dessin simplifié, pas une donnée géographique de précision.

$$\widetilde{z}_j = z_j - \frac{1}{M}\sum_{\ell=0}^{M-1} z_\ell, \qquad \widetilde{c}_0 = 0.$$

6.4 Étape 4 : interpréter les coefficients

Écris chaque coefficient sous forme polaire. Son module devient le rayon du cercle, son argument la phase initiale et son indice k la vitesse signée de rotation. Un indice négatif fait tourner dans l'autre sens. Le cercle suivant est centré à l'extrémité du vecteur précédent, et non à l'origine. La pointe de la chaîne est la somme.

$$c_k = |c_k| e^{i\varphi_k}, \qquad c_k e^{2\pi i k t} = |c_k| e^{i(2\pi k t + \varphi_k)}.$$

6.5 Étape 5 : reconstruire sans inventer une trajectoire

À chaque t, on additionne les vecteurs conservés. En avançant t de 0 à 1, la pointe décrit la courbe approximante. Quand on ajoute une composante, la pointe peut changer brusquement : le segment reliant les deux approximations ne fait partie d'aucune des deux courbes et ne doit pas être tracé. Le laboratoire recalcule donc la courbe du nouveau jeu de coefficients ; la galerie sépare les traces de deux nombres de cercles.

6.6 Relier beauté, expérience et formalisation

La galerie rend le mécanisme visible. Le laboratoire permet de changer un paramètre, mesurer l'erreur et tester une conjecture. Les leçons expliquent l'orthogonalité et les garanties de reconstruction. Chacun éclaire les deux autres : une belle figure pose une question, l'expérience précise cette question, puis une démonstration établit les conditions dans lesquelles l'observation est vraie.

Exercices

1. Que change une translation de tous les points par un même complexe a ?

   Correction. Elle ajoute a au seul coefficient c_0. Toutes les fréquences non nulles sont inchangées par orthogonalité discrète.

2. Que devient le spectre si tout le dessin est multiplié par $re^{i\theta}$?

   Correction. Par linéarité de la DFT, chaque coefficient est multiplié par $re^{i\theta}$. Les rayons sont multipliés par r et les phases augmentées de θ pour r positif.

3. Concevoir une vérification qui sépare les erreurs d'échantillonnage et de troncature.

   Correction. À M fixé, augmente le nombre de coefficients et mesure l'erreur sur les M points. Puis conserve tous les coefficients et augmente M en comparant la courbe à un contour de référence plus fin. Les deux expériences portent sur des étapes différentes.

Références pour approfondir

NIST DLMF, section 1.8 : coefficients, convergence et Parseval

MIT OpenCourseWare, 18.102, leçon 16 : Fejér et convergence dans L^2