Notes de cours

Vocabulaire et opérations

Définition · Matrice. Une *matrice* de taille $n \times p$ est un tableau de nombres réels à n lignes et p colonnes. Le coefficient de ligne i et de colonne j de A est noté a_{ij}. Une matrice $n \times 1$ est une matrice *colonne*, une matrice $1 \times p$ une matrice *ligne*, une matrice $n \times n$ une matrice *carrée* d'ordre n. La matrice *identité* I_n a des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs ; la matrice *nulle* n'a que des 0. Une matrice carrée est *diagonale* si ses coefficients hors de la diagonale sont nuls.

Définition · Somme, produit par un réel, produit. Pour A et B de même taille et k réel, $A + B$ et kA se calculent coefficient par coefficient.

Si A est de taille $n \times p$ et B de taille $p \times q$, le produit AB est la matrice $n \times q$ de coefficients

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{ik} b_{kj} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{ip}b_{pj}.$$

Exemple 1 · Un produit. $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\times 0 + 2\times 4 & 1\times 1 + 2\times(-2) \\ -1\times 0 + 3\times 4 & -1\times 1 + 3\times(-2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -3 \\ 12 & -7 \end{pmatrix}$.

Propriété · Règles de calcul. Lorsque les produits sont définis : $(AB)C = A(BC)$, $A(B+C) = AB + AC$, $(A+B)C = AC + BC$, $(kA)B = k(AB)$, et $AI_n = I_n A = A$ pour A carrée d'ordre n.

Point de vigilance.

1. En général $AB \neq BA$; par suite $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, et non $A^2 + 2AB + B^2$.
2. Un produit peut être nul sans qu'aucun facteur le soit : $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Puissances

Définition · Puissances d'une matrice carrée. Pour A carrée d'ordre n, on pose $A^0 = I_n$ et $A^{k+1} = A^k A$ pour tout entier naturel k.

Méthode · Conjecturer puis démontrer par récurrence. Pour $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, on calcule $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et l'on conjecture $A^k = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. C'est vrai pour $k = 0$; si c'est vrai au rang k, alors $A^{k+1} = \begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & k+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

À retenir · Matrice diagonale. Si D est diagonale de coefficients diagonaux $d_1, \ldots, d_n$, alors D^k est diagonale de coefficients $d_1^k, \ldots, d_n^k$.

Inverse et systèmes

Définition · Matrice inversible. Une matrice carrée A d'ordre n est *inversible* s'il existe une matrice B telle que $AB = BA = I_n$. Cette matrice est unique ; on la note A^{-1}.

Propriété · Inverse d'une matrice d'ordre 2. Soit $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. La matrice A est inversible si et seulement si $ad - bc \neq 0$, et alors

$$A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Le nombre $ad - bc$ est le *déterminant* de A, noté $\det A$.

Démonstration. Posons $M = \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$. Le calcul donne $AM = MA = (ad-bc)I_2$. Si $ad - bc \neq 0$, la matrice $\frac{1}{ad-bc}M$ est donc l'inverse de A.

Si $ad - bc = 0$, alors $AM = 0$. Supposons A inversible : en multipliant à gauche par A^{-1}, on obtient $M = 0$, donc $a = b = c = d = 0$ et A est nulle. Mais la matrice nulle n'est pas inversible ($0 \times B = 0 \neq I_2$) : contradiction. □

Propriété · Systèmes linéaires. Un système linéaire de n équations à n inconnues s'écrit $AX = B$, où A est la matrice des coefficients, X la colonne des inconnues et B la colonne des seconds membres. Si A est inversible, le système a une unique solution : $X = A^{-1}B$.

Démonstration. Si $AX = B$, alors $A^{-1}AX = A^{-1}B$, soit $X = A^{-1}B$. Réciproquement, $A\left(A^{-1}B\right) = B$. □

Méthode · Ordre 3 : calculatrice et vérification. Pour une matrice d'ordre 3, on obtient A^{-1} à la calculatrice ou avec un logiciel, puis on contrôle à la main un ou deux coefficients de AA^{-1}.

Transformations du plan et suites

Propriété · Matrice d'une rotation. La rotation de centre O et d'angle θ transforme le point de colonne X en le point de colonne $R_\theta X$, avec

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Démonstration. Le point $M(x;y)$ a pour affixe $z = x + iy$, et son image a pour affixe $e^{i\theta}z = (\cos\theta + i\sin\theta)(x+iy) = (x\cos\theta - y\sin\theta) + i(x\sin\theta + y\cos\theta)$ (chapitre 3) : ce sont les coefficients de $R_\theta X$. □

Méthode · Suite définie par une matrice. Si $X_{k+1} = AX_k$ pour tout k, alors $X_k = A^k X_0$ (récurrence immédiate). Une suite définie par $u_{k+2} = au_{k+1} + bu_k$ s'y ramène avec $X_k = \begin{pmatrix} u_{k+1} \\ u_k \end{pmatrix}$ et $A = \begin{pmatrix} a & b \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.