Chapitre 1

# Suites numériques

**Compétences :** chercher, modéliser, représenter, calculer, communiquer


## 1.1 Cours de référence

Une suite numérique associe à chaque entier naturel $n$ un nombre $u_n$. L'indice $n$ désigne un rang ; il ne doit pas être confondu avec la valeur $u_n$.

### 1.1.1 Suite arithmétique

**À retenir**

Une suite $(u_n)$ est **arithmétique** lorsqu'il existe un réel $r$ tel que, pour tout $n$, $u_{n+1} = u_n + r$. Le nombre $r$ est la raison. Si le premier terme est $u_0$, alors $u_n = u_0 + nr$. Si le premier terme est $u_1$, alors $u_n = u_1 + (n-1)r$.




Trois nombres $x, y, z$, écrits dans cet ordre, sont trois termes consécutifs d'une suite arithmétique si $y - x = z - y$, c'est-à-dire si $y = \dfrac{x+z}{2}$. Cette dernière quantité est la moyenne arithmétique de $x$ et $z$.

**Méthode**

Pour modéliser une situation additive : 1) définir $u_n$ et préciser l'unité ; 2) identifier le premier terme ; 3) traduire l'augmentation ou la diminution constante par la raison $r$ ; 4) écrire le terme général ; 5) répondre par une phrase contextualisée.

**Exemple rédigé**

Un commerce vend 480 unités le premier mois puis 25 unités de plus chaque mois. Avec $u_1 = 480$ et $r = 25$, on obtient $u_n = 480 + 25(n-1)$. Ainsi $u_{12} = 755$ : le commerce prévoit 755 unités vendues au douzième mois.

### 1.1.2 Somme de termes arithmétiques

Pour $n+1$ termes de $u_0$ à $u_n$,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1)\frac{u_0 + u_n}{2}.$$

La formule se mémorise sous la forme : *nombre de termes multiplié par la moyenne du premier et du dernier terme*.


**Erreur fréquente**

Dans $u_3 + u_4 + \cdots + u_{12}$, il y a $12 - 3 + 1 = 10$ termes, et non 9 ni 12.

### 1.1.3 Suite géométrique

**À retenir**

Une suite $(u_n)$ est **géométrique** lorsqu'il existe un réel $q$ tel que $u_{n+1} = q u_n$. Si le premier terme est $u_0$, alors $u_n = u_0 q^n$. Si le premier terme est $u_1$, alors $u_n = u_1 q^{n-1}$.




Une hausse de $t\,\%$ correspond à $q = 1 + \dfrac{t}{100}$ ; une baisse de $t\,\%$ à $q = 1 - \dfrac{t}{100}$. Trois termes positifs $x, y, z$ sont consécutifs dans une suite géométrique si $y^2 = xz$ ; $y = \sqrt{xz}$ est leur moyenne géométrique. Pour $q \neq 1$,

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q}.$$

### 1.1.4 Algorithmique : calculer une somme

```
def somme_carres(n):
    s = 0
    for k in range(1, n + 1):
        s = s + k**2
    return s
```

L'accumulateur `s` contient la somme partielle ; le compteur `k` parcourt les entiers de 1 à $n$.

# Séance 1 — Suite arithmétique : reconnaître et modéliser

Suites numériques

15/09/2026 • B : 2 h – C : 1 h

## Objectifs de la séance

- Reconnaître une évolution additive.
- Déterminer la raison.
- Définir une suite dans un contexte.

## Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. $1 + \dfrac{10}{100} = 1,10$
2. Calculer $u_4$ si $u_0 = 14$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_4 = 26$
3. Combien de termes de $u_3$ à $u_{15}$ ? $15 - 3 + 1 = 13$
4. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. $0{,}92$
5. Donner la raison de $12, 12 + 4, 12 + 2 \times 4, \ldots$. $r = 4$

## Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître une évolution additive et déterminer la raison.

## Activité de recherche

Une association compte 320 adhérents. Elle prévoit d'en gagner 18 chaque année. On note $u_n$ l'effectif après $n$ années. Calculer $u_0, u_1, u_2$. Quelle opération fait passer d'un terme au suivant ? Écrire une relation entre $u_{n+1}$ et $u_n$, puis prévoir $u_5$.




## Correction détaillée – édition professeur

$u_0 = 320$, $u_1 = 338$, $u_2 = 356$ ; on ajoute 18. Donc $u_{n+1} = u_n + 18$ et $u_5 = 410$. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

## Trace écrite

Une suite est arithmétique lorsque $u_{n+1} - u_n = r$ est constant. Dans une situation, une augmentation absolue constante conduit à une suite arithmétique.

## Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_0 = 320$, $u_1 = 338$, $u_2 = 356$ ; on ajoute 18. Donc $u_{n+1} = u_n + 18$ et $u_5 = 410$.

**Entraînement – essentiel**

1. La suite $(u_n)$ vérifie $u_0 = 110$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Écrire $u_n$ puis calculer $u_{12}$.
2. Une quantité vaut 420 et baisse de 3 % par période. Écrire $v_n$ et calculer $v_5$.
3. Pour chaque suite, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 110 + 3n$ et $u_{12} = 146$, Pour la seconde, $q = 0,97$ et $v_n = 420 \times q^n$ ; le troisième item se justifie par la constance de la différence ou du quotient,

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, cours p. 18–21 ; exercices p. 24, n° 1 à 3. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 24, exercice 5**

Pour chacune des suites, préciser si elle est arithmétique et, si oui, indiquer sa raison.

a. Pour tout entier $n$ : $u_n = 2(n-5) + 3n$.

b. Pour tout entier $n$ : $v_n = n^2 + n - 1$.

c. Pour tout entier $n$ : $w_n = -4 + 3n$.

**Correction détaillée – édition professeur**

a. $u_n = 5n - 10$, donc $u_{n+1} - u_n = 5$ : la suite est arithmétique de raison 5.

b. $v_{n+1} - v_n = 2n + 2$, qui dépend de $n$ : la suite n'est pas arithmétique.

c. $w_{n+1} - w_n = 3$ : la suite est arithmétique de raison 3.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 125 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

## Séance 2 — Suite arithmétique : terme général

Suites numériques

17/09/2026 • B : 1 h – C : 2 h

### Objectifs de la séance

- Passer de la récurrence au terme général.
- Calculer un terme éloigné.
- Interpréter le rang.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 5 - x + 2$. $2x + 7$
2. Combien de termes de $u_3$ à $u_{15}$ ? $15 - 3 + 1 = 13$
3. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. $0{,}92$
4. Donner la raison de $12, 12 + 5, 12 + 2 \times 5, \ldots$. $r = 5$
5. Calculer $u_4$ si $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_4 = 27$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : passer de la récurrence au terme général et calculer un terme éloigné.

### Activité de recherche

Un magasin possède 1 250 cartes de fidélité actives au rang 0 et en gagne 75 par mois. Sans calculer tous les termes, déterminer l'effectif au rang $n$, puis au rang 18. Expliquer le rôle de 18 dans le calcul.

### Correction détaillée – édition professeur

$u_n = 1\,250 + 75n$, donc $u_{18} = 2\,600$. Le nombre 18 compte les augmentations depuis le rang 0. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Si $(u_n)$ est arithmétique de raison $r$, alors $u_n = u_0 + nr$ ou $u_n = u_1 + (n-1)r$, selon le rang du premier terme.

### Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

### Correction détaillée – édition professeur

$u_n = 1\,250 + 75n$, donc $u_{18} = 2\,600$. Le nombre 18 compte les augmentations depuis le rang 0.

**Entraînement – essentiel**

1. La suite $(u_n)$ vérifie $u_0 = 120$ et $u_{n+1} = u_n + 4$. Écrire $u_n$ puis calculer $u_{12}$.
2. Une quantité vaut 440 et baisse de 4 % par période. Écrire $v_n$ et calculer $v_5$.
3. Pour chaque suite, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 120 + 4n$ et $u_{12} = 168$, Pour la seconde, $q = 0,96$ et $v_n = 440 \times q^n$ ; le troisième item se justifie par la constance de la différence ou du quotient,

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, cours p. 18–21 ; exercices p. 24, n° 5 à 8. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 24, exercice 6**

Soit $(l_n)$ la suite arithmétique de raison 2 et de premier terme : $l_0 = -1$.

a. Exprimer $l_n$ pour tout entier naturel $n$.

b. Calculer $l_{35}$ et $l_{64}$.

**Correction détaillée – édition professeur**

$l_n = l_0 + nr = -1 + 2n$. Ainsi $l_{35} = 69$ et $l_{64} = 127$.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 130 et le taux ou la raison par 4. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

## Séance 3 — Somme des termes d'une suite arithmétique

Suites numériques

22/09/2026 • B : 2 h – C : 1 h

### Objectifs de la séance

- Compter les termes d'une somme.
- Appliquer la formule.
- Contrôler l'ordre de grandeur.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 20 % de 120. 24
2. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. 0,92
3. Donner la raison de $12, 12+6, 12+2\times 6, \ldots$. $r = 6$
4. Calculer $u_4$ si $u_0 = 16$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_4 = 28$
5. Combien de termes de $u_3$ à $u_{15}$ ? $15 - 3 + 1 = 13$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : compter les termes d'une somme et appliquer la formule.

### Activité de recherche

Une entreprise verse une prime mensuelle : 45 euros le premier mois, puis 5 euros de plus chaque mois. Calculer le total versé pendant les douze premiers mois de trois façons : somme explicite, regroupement premier-dernier, formule.

### Correction détaillée – édition professeur

$u_{12} = 45 + 11 \times 5 = 100$. Le total vaut $12 \times \dfrac{45 + 100}{2} = 870$ euros. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Une somme de termes arithmétiques vaut nombre de termes $\times \dfrac{\text{premier} + \text{dernier}}{2}$. De $u_p$ à $u_q$, il y a $q - p + 1$ termes.

### Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

### Correction détaillée – édition professeur

$u_{12} = 45 + 11 \times 5 = 100$. Le total vaut $12 \times \dfrac{45 + 100}{2} = 870$ euros.

**Entraînement – essentiel**

1. La suite $(u_n)$ vérifie $u_0 = 130$ et $u_{n+1} = u_n + 5$. Écrire $u_n$ puis calculer $u_{12}$.
2. Une quantité vaut 460 et baisse de 5 % par période. Écrire $v_n$ et calculer $v_5$.
3. Pour chaque suite, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 130 + 5n$ et $u_{12} = 190$, Pour la seconde, $q = 0,95$ et $v_n = 460 \times q^n$ ; le troisième item se justifie par la constance de la différence ou du quotient,

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, cours p. 20–21 ; exercices p. 24, n° 11 à 13, puis p. 28, n° 43–44. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 24, exercice 9**

a. Calculer la somme des 500 premiers entiers non nuls $\sum_{i=1}^{500} i$.

b. Calculer la somme des entiers de 35 à 150 : $\sum_{k=35}^{150} k$.

**Correction détaillée – édition professeur**

a. $\sum_{i=1}^{500} i = \dfrac{500 \times 501}{2} = 125\,250.$

b. Il y a $150 - 35 + 1 = 116$ termes, donc la somme vaut $116 \times \dfrac{35 + 150}{2} = 10\,730.$

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 135 et le taux ou la raison par 5. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.

**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Séance 4 — Suite géométrique : reconnaître et modéliser

Suites numériques

24/09/2026 • B : 1 h – C : 2 h

## Objectifs de la séance

- Reconnaître une évolution multiplicative.
- Passer d'un taux à un coefficient.
- Comparer arithmétique et géométrique.

## Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. $1 + \dfrac{25}{100} = 1,25$
2. Donner la raison de $12, 12+7, 12+2\times 7, \ldots$. $r = 7$
3. Calculer $u_4$ si $u_0 = 17$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_4 = 29$
4. Combien de termes de $u_3$ à $u_{15}$ ? $15 - 3 + 1 = 13$
5. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. $0{,}92$

## Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : reconnaître une évolution multiplicative et passer d'un taux à un coefficient.

## Activité de recherche

Une boutique en ligne augmente son nombre de visiteurs de 6 % par mois à partir de 8 000 visiteurs. Calculer les trois premières valeurs. Comparer les différences puis les quotients. Identifier la nature de la suite.




## Correction détaillée – édition professeur

Le coefficient est 1,06 : 8 000, 8 480, 8 988,8. Les quotients valent 1,06 ; la suite est géométrique. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

## Trace écrite

Une suite est géométrique lorsque $\dfrac{u_{n+1}}{u_n} = q$ est constant (termes non nuls). Une évolution relative constante conduit à une suite géométrique.

## Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Correction détaillée – édition professeur**

Le coefficient est 1,06 : 8 000, 8 480, 8 988,8. Les quotients valent 1,06 ; la suite est géométrique.

**Entraînement – essentiel**

1. La suite $(u_n)$ vérifie $u_0 = 140$ et $u_{n+1} = u_n + 6$. Écrire $u_n$ puis calculer $u_{12}$.
2. Une quantité vaut 480 et baisse de 6 % par période. Écrire $v_n$ et calculer $v_5$.
3. Pour chaque suite, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 140 + 6n$ et $u_{12} = 212$, Pour la seconde, $q = 0,94$ et $v_n = 480 \times q^n$ ; le troisième item se justifie par la constance de la différence ou du quotient,

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, cours p. 23–25 ; exercices p. 25, n° 14 à 18. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 25, exercice 19**

Soit $(l_n)$ la suite géométrique de raison 2 et de premier terme : $l_0 = -1$.

a. Exprimer $l_n$ pour tout entier naturel $n$.

b. Calculer $l_{12}$ et $l_{20}$.

**Correction détaillée – édition professeur**

$l_n = l_0 q^n = -2^n$. Ainsi $l_{12} = -4\,096$ et $l_{20} = -1\,048\,576$.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 140 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.

**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

# Séance 5 — Suite géométrique : terme général et somme

Suites numériques

29/09/2026 • B : 2 h – C : 1 h

## Objectifs de la séance

- Écrire le terme général.
- Calculer une somme géométrique.
- Interpréter une évolution cumulée.

## Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Réduire $3x + 8 - x + 2$. $2x + 10$
2. Calculer $u_4$ si $u_0 = 18$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_4 = 30$
3. Combien de termes de $u_3$ à $u_{15}$ ? $15 - 3 + 1 = 13$
4. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. 0,92
5. Donner la raison de $12, 12 + 8, 12 + 2 \times 8, \ldots$. $r = 8$

## Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : écrire le terme général et calculer une somme géométrique.

## Activité de recherche

Un capital de 250 000 Ar est placé à 4 % par an, intérêts composés. Écrire le capital $C_n$ après $n$ années. Calculer $C_6$, puis la somme $C_0 + \cdots + C_6$ et expliquer ce que cette dernière somme représente mathématiquement et pourquoi elle n'est pas le capital final.

## Correction détaillée – édition professeur

$C_n = 250\,000 \times 1{,}04^n$ et $C_6 \approx 316\,330$ Ar. La somme est la somme de sept états successifs, pas une accumulation réelle du placement. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

## Trace écrite

Si $(u_n)$ est géométrique de raison $q$, $u_n = u_0 q^n$ ou $u_n = u_1 q^{n-1}$. Pour $q \neq 1$, $u_0 + \cdots + u_n = u_0 \dfrac{1 - q^{n+1}}{1 - q}$.

## Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

**Correction détaillée – édition professeur**

$C_n = 250\,000 \times 1{,}04^n$ et $C_6 \approx 316\,330$ Ar. La somme est la somme de sept états successifs, pas une accumulation réelle du placement.

**Entraînement – essentiel**

1. La suite $(u_n)$ vérifie $u_0 = 150$ et $u_{n+1} = u_n + 2$. Écrire $u_n$ puis calculer $u_{12}$.
2. Une quantité vaut 500 et baisse de 2 % par période. Écrire $v_n$ et calculer $v_5$.
3. Pour chaque suite, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 150 + 2n$ et $u_{12} = 174$, Pour la seconde, $q = 0,98$ et $v_n = 500 \times q^n$ ; le troisième item se justifie par la constance de la différence ou du quotient,

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, cours p. 25–28 ; exercices p. 25, n° 19 à 25, puis p. 28, n° 42–44. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 25, exercice 22**

On considère la suite $(u_n)$ géométrique de raison 3 et de premier terme : $u_0 = 5$.

a. Exprimer $u_n$ pour tout entier naturel $n$. En déduire $u_7$.

b. Calculer : $S = \sum_{i=0}^{7} u_i = u_0 + u_1 + \cdots + u_7$.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 5 \times 3^n$, donc $u_7 = 10\,935$. Puis $S = 5\,\dfrac{1-3^8}{1-3} = 16\,400$.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 145 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.

## Séance 6 — Bilan et évaluation formative

Suites numériques

01/10/2026 • B : 1 h – C : 2 h

### Objectifs de la séance

- Choisir le bon modèle.
- Mobiliser les formules.
- Analyser ses erreurs.

### Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 180. 9
2. Combien de termes de $u_3$ à $u_{15}$ ? $15 - 3 + 1 = 13$
3. Donner le coefficient d'une baisse de 8 %. 0,92
4. Donner la raison de $12, 12 + 9, 12 + 2 \times 9, \ldots$. $r = 9$
5. Calculer $u_4$ si $u_0 = 19$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. $u_4 = 31$

### Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : choisir le bon modèle et mobiliser les formules.

### Activité de recherche

Classer huit situations selon trois catégories : arithmétique, géométrique, ni l'une ni l'autre. Pour chaque situation, souligner le mot ou la donnée qui justifie le choix, puis choisir la formule adaptée.

### Correction détaillée – édition professeur

Une variation absolue constante indique le modèle arithmétique ; un pourcentage ou coefficient constant indique le modèle géométrique ; sinon aucun des deux n'est garanti. Faire verbaliser la donnée qui déclenche le choix de méthode.

### Trace écrite

Avant de calculer, identifier : type de suite, premier rang, raison, terme ou somme demandé. La conclusion précise l'unité et le rang.

### Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

### Correction détaillée – édition professeur

Une variation absolue constante indique le modèle arithmétique ; un pourcentage ou coefficient constant indique le modèle géométrique ; sinon aucun des deux n'est garanti.

**Entraînement – essentiel**

1. La suite $(u_n)$ vérifie $u_0 = 160$ et $u_{n+1} = u_n + 3$. Écrire $u_n$ puis calculer $u_{12}$.
2. Une quantité vaut 520 et baisse de 3 % par période. Écrire $v_n$ et calculer $v_5$.
3. Pour chaque suite, préciser si le modèle est arithmétique ou géométrique et justifier par une différence ou un quotient.

**Correction détaillée – édition professeur**

$u_n = 160 + 3n$ et $u_{12} = 196$, Pour la seconde, $q = 0,97$ et $v_n = 520 \times q^n$ ; le troisième item se justifie par la constance de la différence ou du quotient,

**Repères dans le manuel**

**Compléments :** Calao, p. 29, n° 49 à 52. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

**Manuel Calao – p. 29, exercice 49**

Pour chaque proposition, dire si elle est vraie ou fausse. Justifier la réponse.

1. Un capital de 5 000 € est placé sur un compte à intérêts simples au taux d'intérêt annuel de 4 %. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,04.
2. Le nombre de moineaux baisse de 20 % par an dans une région. Une association décide de réintroduire 200 moineaux chaque année. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 200.
3. La masse d'ordures ménagères baisse de 10 % par an. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,1.
4. La production d'une entreprise augmente de manière hebdomadaire de 200 objets produits. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 200.
5. Le nombre d'abonnés d'un youtubeur augmente tous les mois de 15 %. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 15.
6. Le loyer annuel d'un appartement subit une hausse de 320 € tous les ans. Cette situation peut être modélisée par une suite arithmétique de raison 320.
7. Au 1er janvier d'une année, Enzo place 1 000 € à intérêts composés sur un compte dont le taux annuel est égal à 2 % et au 1er janvier de chaque année suivante, il place 200 € sur ce compte. Cette situation peut être modélisée par une suite géométrique de raison 1,02.

**Correction détaillée – édition professeur**

Les réponses sont : faux, faux, faux, vrai, faux, vrai, faux. Aux intérêts simples, l'accroissement est constant ; dans les questions 2 et 7, une opération additive s'ajoute à l'évolution multiplicative ; une baisse de 10 % correspond à 0,9 ; une hausse de 15 % conduit à une suite géométrique de raison 1,15.

**Travail personnel**

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 150 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

**Correction détaillée – édition professeur**

La correction dépend de l'exercice repris. Vérifier surtout la cohérence du modèle, le nombre d'itérations, l'arrondi et la phrase de conclusion.

**Billet de sortie – 3 minutes**

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

**Méthode**

**Conduite en 1 h :** 7 min d'automatismes ; 10 min de mise en commun et trace ; 28 min d'exercices essentiels ; 5 min de correction ; 3 min de billet de sortie.
**Conduite en 2 h :** ajouter 20 min de recherche de l'activité, 20 min d'institutionnalisation, un second exercice autonome et 10 min de correction comparée.
**Différenciation :** fournir aux élèves fragiles une fiche à quatre cases (données, modèle, calcul, conclusion). Demander aux élèves rapides de produire un contre-exemple, une justification ou une seconde méthode.