## Exercices progressifs

**E1 · Entraînement.** Dans une base orthonormée de l'espace, on considère $\vec{u} = (2; -1; 3)$ et $\vec{v} = (1; 4; 0)$. Calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$.

**E2 · Entraînement.** Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (a; 2; 1)$ et $\vec{v} = (3; -1; 4)$, où $a$ est réel. Déterminer $a$ pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ soient orthogonaux.

**E3 · Entraînement.** Dans un repère orthonormé, un plan est dirigé par $\vec{u} = (1; -1; 0)$ et $\vec{v} = (1; 0; -1)$. Montrer que $\vec{n} = (1; 1; 1)$ lui est normal. On considère ensuite $A(0; 0; 0)$ et $B(2; 2; 2)$. Décrire géométriquement l'ensemble des points équidistants de $A$ et de $B$.

**E4 · Entraînement.** Dans une base orthonormée, on considère $\vec{u} = (1; 0; 1)$ et $\vec{v} = (0; 1; 1)$. Déterminer la mesure, comprise entre 0 et $\pi$, de l'angle entre ces deux vecteurs.

**E5 · Entraînement.** Un tétraèdre a pour base un triangle rectangle dont les deux côtés perpendiculaires mesurent 3 cm et 4 cm. La hauteur du tétraèdre relative à cette base est de 5 cm. Calculer son volume en $\text{cm}^3$.

## Travail dans le manuel ou une annale

**Barbazo, p. 362, exercices 23 et 27.** En S48 : exercice 23, pour calculer un produit scalaire en coordonnées. À la maison après S54 : exercice 27 ; vérifier l'orthogonalité aux deux vecteurs directeurs d'un plan, sans se contenter d'un seul produit nul.