SÉQUENCE 9


Proportions et évolutions

21–29 janvier 2027


9.1 Proportion et proportion de proportion

À retenir · Définitions. Dans un ensemble fini non vide E, la proportion d'une partie F est $p = \text{Card}(F) / \text{Card}(E)$; $0 \leq p \leq 1$. Son expression en pourcentage est $100p\,\%$. Si $G \subseteq F \subseteq E$, $F \neq \varnothing$, et si p_1 est la proportion de F dans E, p_2 celle de G dans F, la proportion de G dans E vaut $p_1 p_2$.

Exemple 1. Un lycée compte 1500 élèves dont 652 demi-pensionnaires. Calculer leur proportion. Dans une classe, 60 % des élèves font du sport ; parmi eux, 40 % sont des garçons. Quelle proportion de la classe représentent les garçons faisant du sport ?



Exemple 2. Dans un établissement fictif de 800 élèves, 35 % pratiquent un sport en club ; parmi eux, 45 % pratiquent un sport collectif. Calculer les deux effectifs et la proportion finale.



Point de vigilance. La proportion et le taux d'évolution ne répondent pas à la même question : une proportion compare une partie à un ensemble, un taux compare une variation à une valeur initiale.


9.2 Variation absolue et taux d'évolution

À retenir · Définition. Pour une valeur initiale $V_I > 0$ et une valeur finale $V_F > 0$, la variation absolue vaut $V_F - V_I$; le taux d'évolution est

$$t = \frac{V_F - V_I}{V_I}.$$


Le taux est sans unité. Il est positif pour une hausse, négatif pour une baisse. La référence est toujours la valeur initiale.

Exemple 3. Un fromage est vendu 2,13 euros au lieu de 3,55 euros. Calculer la variation absolue et le taux.



À retenir · Coefficient multiplicateur. $CM = V_F / V_I = 1 + t$, donc $V_F = V_I(1 + t)$. Pour retrouver V_I, diviser V_F par $1 + t$ (non nul).

Exemple 4. Un article fictif de 50000 Ar augmente de 12 %, puis on considère séparément une remise de 12 % sur le prix initial. Donner les prix finaux. Un prix après hausse de 20 % vaut 72000 Ar ; retrouver son prix initial.



Automatismes · 5–10 min. Développer $(x - 3)^2$; résoudre $1/x = 5$; donner la moyenne de 8 ; 10 ; 12.


9.3 Évolutions successives

À retenir · Propriété. Des évolutions successives de taux t_1, t_2 ont pour coefficient global


$$CM_G = (1+t_1)(1+t_2), \qquad t_G = (1+t_1)(1+t_2) - 1.$$

On multiplie les coefficients ; on n'additionne pas simplement les taux.


Exemple 5. Un fabricant a vendu 5600 vélos en 2022, soit 25 % de plus qu'en 2021. Ses ventes diminuent de 15 % en 2023. Déterminer les ventes de 2021 et 2023, puis le taux global entre ces deux années.



Exemple 6. Un prix augmente de 10 % puis baisse de 10 %. Revient-il au prix initial ?



Exemple 7. Un taux passe de 20 % à 25 %. Expliquer la différence entre l'augmentation en points de pourcentage et l'évolution relative.




9.4 Évolution réciproque

À retenir · Propriété. Pour revenir à la valeur initiale après une évolution de taux $t > -1$, utiliser le coefficient $1/(1+t)$. Le taux réciproque est

$$t_{\text{réciproque}} = \frac{1}{1+t} - 1 = \frac{-t}{1+t}.$$

Exemple 8. Quel taux compense une hausse de 25 % ? Quel taux compense une baisse de 20 % ?



Exemple 9. Un prix subit une remise de 30 %, puis une hausse de 10 %. Quel pourcentage d'augmentation supplémentaire permet de retrouver le prix initial ?

