**Séquence n° 1**

# ARITHMÉTIQUE

2–11 septembre 2026

## I Entiers, multiples et diviseurs

**Définitions**

$\mathbb{N} = \{0; 1; 2; \ldots\}$ est l'ensemble des entiers naturels. $\mathbb{Z}$ contient les entiers naturels et leurs opposés. Pour $a, b \in \mathbb{Z}$, dire que $a$ est un **multiple de** $b$ signifie qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = bk$. On dit aussi que $b$ divise $a$.

$18 = 6 \times 3$ : 18 est un multiple de 3 et de 6. Tout entier est multiple de 1 et de lui-même ; 0 est multiple de tout entier. Le seul multiple de 0 est 0.

### Exemple 1.1

Lister les diviseurs positifs de 18 et de 24. Écrire trois multiples de 7, dont un négatif. 35 est-il un multiple de 5 ? de 6 ? Justifier.

**Correction :**

**Somme de multiples**

La somme de deux multiples d'un entier $a$ est un multiple de $a$.

**Démonstration à rédiger.**

**Correction :**

**Automatismes – 5 à 10 minutes**

Calculer $\frac{2}{3} + \frac{1}{6}$ ; $3(x+2) - x$ ; l'image de 2 par $x \mapsto 2x - 3$.

## II Parité et nombres premiers

**Définitions**

Un entier $n$ est **pair** s'il s'écrit $2k$, avec $k \in \mathbb{Z}$, et **impair** s'il s'écrit $2k+1$. Un **nombre premier** est un entier naturel supérieur ou égal à 2 qui possède exactement deux diviseurs positifs : 1 et lui-même.

Les nombres premiers inférieurs à 100 sont : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.

**Propriété à démontrer**

Le carré d'un entier impair est impair.

**Démonstration à rédiger.**

**Correction :**

**Tester si un entier est premier**

Pour $n \geq 2$, il suffit de tester les diviseurs premiers inférieurs ou égaux à $\sqrt{n}$. En effet, si $n = ab$ avec $1 < a \leq b$, alors $a \leq \sqrt{n}$ ; $a$ possède un diviseur premier qui divise aussi $n$.

**Exemple 1.2**

Montrer que 157 est premier et que 161 ne l'est pas.

**Correction :**

## III PGCD et fractions irréductibles

**Définition et convention**

Pour deux entiers $a, b$ **non tous deux nuls**, $\text{PGCD}(a, b)$ est le plus grand de leurs diviseurs positifs communs. On a $\text{PGCD}(a, b) = \text{PGCD}(|a|, |b|)$ et $\text{PGCD}(a, 0) = |a|$ si $a \neq 0$. Par convention, on pose $\text{PGCD}(0, 0) = 0$ ; ce dernier cas ne relève pas de la définition par le plus grand diviseur.

Par exemple, $\text{PGCD}(18, 24) = 6$, et les changements de signe de 18 ou 24 ne modifient pas ce résultat.

**Décomposition en facteurs premiers – admise**

Tout entier naturel supérieur ou égal à 2 est un produit de nombres premiers. Cette décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

**Exemple 1.3**

Décomposer 140, 150, 630 et 120 en facteurs premiers.

**Correction :**

**Rendre une fraction irréductible**

Pour $b \neq 0$, diviser le numérateur $a$ et le dénominateur $b$ par $\text{PGCD}(a, b)$. La fraction obtenue a un numérateur et un dénominateur premiers entre eux.

**Exemple 1.4**

Rendre irréductibles $\dfrac{140}{630}$, $\dfrac{84}{126}$ et $\dfrac{-120}{150}$.

**Correction :**

## IV Vocabulaire ensembliste en contexte

**Définitions et notations**


$x \in A$ signifie que $x$ est un élément de $A$ ; $A \subseteq B$ signifie que tout élément de $A$ appartient à $B$. $\varnothing$ est l'ensemble vide.

- $A \cap B$ : éléments appartenant à $A$ **et** à $B$ ;
- $A \cup B$ : éléments appartenant à $A$ **ou** à $B$ (éventuellement aux deux) ;
- dans un ensemble de référence $E$, $\overline{A} = E \setminus A$ contient les éléments de $E$ qui ne sont pas dans $A$ ;
- pour un ensemble fini, $\text{Card}(A)$ est son nombre d'éléments.

**Exemple 1.5**

Dans $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$, on pose $A = \{2; 4; 6\}$ et $B = \{3; 6\}$. Donner $A \cap B$, $A \cup B$, $\overline{A}$ et $\text{Card}(A)$. Les assertions $2 \in A$, $\{2\} \subseteq A$ et $A \subseteq B$ sont-elles vraies ?

**Correction :**



**Couple et produit cartésien**

Un couple $(a, b)$ est ordonné : en général $(a, b) \neq (b, a)$. Le produit cartésien $A \times B$ est l'ensemble des couples $(a, b)$ avec $a \in A$ et $b \in B$. Pour des ensembles finis, $\text{Card}(A \times B) = \text{Card}(A)\,\text{Card}(B)$.

**Exemple 1.6**

Écrire tous les éléments de $\{1; 2\} \times \{3; 4; 5\}$.

**Correction :**



## V Algorithmique et réinvestissement

**Python : entier, booléen et condition**


`a % b` est le reste de la division euclidienne pour des entiers et $b \neq 0$. Un test renvoie un booléen : `True` ou `False`. L'égalité se teste par `==` ; l'affectation utilise `=`.

```
def est_multiple(a, b):
    if b == 0:
        return a == 0
    return a % b == 0
```

**Exemple 1.7**

Prévoir les résultats de `est_multiple(35, 5)` et `est_multiple(35, 6)`, puis de `est_multiple(0, 7)`, `est_multiple(7, 0)` et `est_multiple(0, 0)`. Expliquer le rôle de la condition.

**Correction :**



**Exemple 1.8 : Problème**

On dispose de 84 cahiers et 126 crayons. On veut former le plus grand nombre possible de lots identiques en utilisant tout le matériel. Combien de lots peut-on faire ? Que contient chacun d'eux ?

**Correction :**

