Séquence n° 6

FONCTIONS : REPRÉSENTATIONS ET FONCTIONS DE RÉFÉRENCE

23 novembre–4 décembre 2026

I Fonction, image et antécédent

Définition

Une fonction à valeurs réelles associe à chaque réel x de son ensemble de définition D_f un unique réel $f(x)$, appelé image de x. Un antécédent de y est un réel $x \in D_f$ tel que $f(x) = y$. On note $f : x \mapsto f(x)$. Un nombre peut avoir aucun, un ou plusieurs antécédents.

Exemple 6.1

Soit $g(x) = x^2 - 4x + 32$ sur $\mathbb{R}$. Calculer $g(-5)$. Soit $h(x) = 3x + 5$; déterminer l'antécédent de 6 par h.

Correction :

Exemple 6.2

Pour la fonction carré, calculer les images de -3 et 3, puis les antécédents de 9, 0 et -1.

Correction :

```
def g(x):
    return x*x - 4*x + 32
```

Exemple 6.3

Distinguer `g(-5)` de `x = -5`.

Correction :

II Ensemble de définition

Conditions d'existence


D_f contient les valeurs pour lesquelles le procédé définissant f a un sens. Un dénominateur doit être non nul ; un nombre placé sous une racine carrée doit être positif ou nul. Respecter aussi tout domaine imposé par l'énoncé ou le contexte.

Exemple 6.4

Déterminer les ensembles de définition :

$$f(x) = 3x^2 - 5x + 2, \quad g(x) = \frac{2x+1}{x-4}, \quad h(x) = \frac{x}{x^2-9}, \quad k(x) = \sqrt{2x-6}.$$

Correction :




Point de vigilance. La racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas dans $\mathbb{R}$; ce n'est pas « une racine carrée négative » que l'on exclut.

Exemple 6.5 : Modéliser

Un rectangle de périmètre 20 m a pour largeur x m. Exprimer son aire et préciser le domaine si les deux dimensions doivent être strictement positives.

Correction :



III Tableau de valeurs et courbe représentative


Définition

$\mathcal{C}_f$ est l'ensemble des points $(x; f(x))$, avec $x \in D_f$. Ainsi $M(a;b) \in \mathcal{C}_f \iff a \in D_f$ et $b = f(a)$.

Exemple 6.6

Sur $[-1;4]$, $f(x) = x^2 - 2x - 1$. Compléter le tableau, puis tracer la courbe sur tout l'intervalle.

x	-1	$-0{,}5$	0	1	$1{,}5$	2	3	4
$f(x)$	.....	.....	-1	-2	.....	-1	.....	.....



Correction :




IV Résolution graphique d'équations et d'inéquations

Méthode


Les solutions de $f(x) = k$ sont les abscisses des intersections de $\mathcal{C}_f$ avec $y = k$. Pour $f(x) \leq k$, lire les abscisses où la courbe est en dessous de cette droite, intersections comprises ; avec $<$, les intersections sont exclues.

Exemple 6.7

La courbe représente $f(x) = 1 + \frac{1}{4}(x+3)(x+1)(x-2)$ sur $[-4;3]$. Résoudre graphiquement $f(x) = 1$, $f(x) \leq 1$ et $f(x) > 1$.



Correction :




V Comparer deux fonctions ; lire un signe

Méthode

$f(x) = g(x)$ se lit aux intersections des courbes. Pour $f(x) < g(x)$, $\mathcal{C}_f$ est strictement en dessous de $\mathcal{C}_g$ à la même abscisse. Le signe de $f(x)$ se lit par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple 6.8

Sur $[-3;3]$, $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 2$. Résoudre $f = g$, $f < g$, $f \geq g$ et déterminer le signe de g.



Correction :

VI Fonctions affines et valeur absolue


Définitions


Une fonction affine est $f(x) = mx + p$ sur $\mathbb{R}$. Elle est linéaire si $p = 0$, constante si $m = 0$. Pour $m \neq 0$, elle s'annule en $-p/m$; son signe est celui de m à droite de ce nombre. La fonction $x \mapsto |x|$ est définie sur $\mathbb{R}$, positive ou nulle, et s'annule uniquement en 0.

Exemple 6.9

Classer (plusieurs réponses possibles) en affine, linéaire, constante : $5x + 2$; $5x$; $7 + 2x - 7$; 6 ; $6(4x - 2)$; $6x + 5 - 6x$.

Correction :





Équations et inéquations

Si $k < 0$, $|x| = k$ et $|x| \leq k$ n'ont aucune solution, et $|x| \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$|x| = k \iff x \in \{-k; k\}, \quad |x| \leq k \iff x \in [-k; k],$$

$$|x| \geq k \iff x \in]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[.$$

Exemple 6.10

Résoudre $|x| = 5$, $|x| = -3$, $|x| \leq 3$, $|x| \geq 4$.


Correction :




VII Fonctions carré et inverse

Définitions et signe

$x \mapsto x^2$ est définie sur $\mathbb{R}$; sa courbe est une parabole. $x^2 \geq 0$, avec égalité seulement en 0. $x \mapsto 1/x$ est définie sur $\mathbb{R}^*$; sa courbe est une hyperbole. $1/x$ a le signe de x et ne s'annule jamais.





Équations et inéquations avec x^2

Si $k < 0$, $x^2 = k$ et $x^2 \leq k$ n'ont pas de solution ; $x^2 \geq k$ est vraie sur $\mathbb{R}$. Si $k = 0$, les deux premières donnent $x = 0$, la troisième est vraie sur $\mathbb{R}$. Pour $k > 0$:

$$x^2 = k \iff x \in \{-\sqrt{k}; \sqrt{k}\}, \quad x^2 \leq k \iff x \in [-\sqrt{k}; \sqrt{k}],$$

$$x^2 \geq k \iff x \in]-\infty; -\sqrt{k}] \cup [\sqrt{k}; +\infty[.$$

Exemple 6.11

Résoudre $x^2 = 4$, $x^2 = -1$, $x^2 \geq 4$, $x^2 \geq -1$, $1/x = 4$, $1/x = 0$.

Correction :

VIII Inéquations avec la fonction inverse

Méthode

Respecter $x \neq 0$ et lire les deux branches de l'hyperbole. Ne pas multiplier une inéquation par x sans connaître son signe.

	$k<0$	$k=0$	$k>0$
$1/x \leq k$	$[1/k;0[$	$]-\infty;0[$	$]-\infty;0[\cup[1/k;+\infty[$
$1/x \geq k$	$]-\infty;1/k]\cup]0;+\infty[$	$]0;+\infty[$	$]0;1/k]$

Exemple 6.12

Résoudre $1/x \geq 2$, $1/x \leq -1$, $1/x < 1/2$ et $1/x > -2$.

Correction :

Exemple 6.13


Un élève écrit : « $1/x \leq 2 \iff 1 \leq 2x$, donc $x \geq 1/2$ ». Que manque-t-il ?


Correction :

IX Mobiliser racine carrée et cube

Définitions

$x \mapsto \sqrt{x}$ est définie sur $[0;+\infty[$ et à valeurs positives ou nulles. Pour $k \geq 0$, $\sqrt{x} = k \iff x = k^2$; pour $k < 0$, aucune solution. $x \mapsto x^3$ est définie sur $\mathbb{R}$. Chaque réel k possède un unique antécédent, noté $\sqrt[3]{k}$.





Exemple 6.14

Résoudre $\sqrt{x} = 3$; $\sqrt{x} = -2$; $\sqrt{x} \leq 2$; $\sqrt{x} > 3$; $x^3 = -8$; $x^3 \leq 27$.

Correction :

Exemple 6.15

Comparer x^2 et x pour $x = 1/2$, puis $x = 2$. Le carré d'un positif est-il toujours plus grand que lui ?

Correction :