CHAPITRE 13

Probabilités conditionnelles et loi binomiale

S36 (rappels), S37, S38, S39, S41

Avant de commencer – Probabilités conditionnelles

Sans calculatrice, en 6 minutes. Répondre brièvement. Mobiliser les arbres et les événements. Puis choisir la reprise ciblée indiquée sous les questions.

1. Traduire « A sachant B ».
2. Écrire $P(A \cup B)$ lorsque A et B sont incompatibles.
3. Calculer $P(A \cap B)$ si $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}3$.
4. Donner l'événement contraire de « au moins 3 succès ».
5. Que signifie l'indépendance de A et B ?
6. Donner l'espérance d'un dé équilibré.

Réponses

$P_B(A)$; $P(A) + P(B)$; 0,12 ; au plus 2 succès ; $P(A \cap B) = P(A)P(B)$; 3,5.

Reprises ciblées après le diagnostic

Refaire uniquement les questions manquées. Pour chaque question : **1.** Nommer la population de référence après « sachant ». **2.** Faire une réunion de deux cas disjoints. **3.** Multiplier la probabilité de la branche par le conditionnement ; R46. **4.** Lister les entiers inférieurs à 3 ; R48. **5.** Revenir à la factorisation de la probabilité de l'intersection. **6.** Sommer les six valeurs pondérées par un sixième. Les questions R servent de supports de reprise avec le professeur, même si leur rituel collectif est prévu plus tard.

Objectifs

Construire un arbre ; choisir une loi binomiale ; calculer une probabilité cumulée et un seuil ; interpréter espérance et variance.

Notes de cours

Rappels : conditionnement et indépendance

Si $P(A) > 0$, $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Une branche d'arbre porte une probabilité conditionnelle ; la probabilité d'un chemin est le produit de ses branches. Pour une partition $A_1, \ldots, A_r$, $P(B) = \sum_i P(A_i \cap B)$; si tous les $P(A_i) > 0$, elle s'écrit $\sum_i P(A_i)P_{A_i}(B)$. Deux événements sont indépendants lorsque $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Pour $P(A) > 0$, cela équivaut à $P_A(B) = P(B)$. Ne pas confondre $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

Exemple. $P(A) = 0{,}4$, $P_A(B) = 0{,}7$, $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}2$. Alors $P(B) = 0{,}4 \times 0{,}7 + 0{,}6 \times 0{,}2 = 0{,}4$ et $P_B(A) = \frac{0{,}28}{0{,}4} = 0{,}7$.

Bernoulli et binomiale

Une épreuve de Bernoulli a deux issues, succès de probabilité p et échec de probabilité $1-p$. La variable indicatrice B vaut 1 en cas de succès et 0 sinon : $E(B) = p$, $V(B) = p(1-p)$. Un schéma de Bernoulli est une répétition de n épreuves identiques et indépendantes. Le nombre X de succès suit la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$.

Loi et paramètres

Pour $k \in \{0, \dots, n\}$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

$$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p), \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}.$$

Démonstration de la loi. Chaque chemin comportant k succès a probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$ par indépendance. Il existe $\binom{n}{k}$ choix des positions des succès. Ces chemins sont incompatibles ; additionner leurs probabilités.

Événements cumulés

$$P(X \leq k) = \sum_{j=0}^{k} P(X = j), \qquad P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1).$$

$$P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a-1).$$

Pour au moins un succès, $P(X \geq 1) = 1 - (1-p)^n$. Le complément de « au moins k » est « strictement moins de k ».

Exemple. Pour $X \sim \mathcal{B}(10, 0{,}2)$, $E(X) = 2$ et $V(X) = 1{,}6$. $P(X = 2) = 45(0{,}2)^2(0{,}8)^8 \simeq 0{,}3020$ et $P(X \geq 1) = 1 - 0{,}8^{10} \simeq 0{,}8926$. L'espérance n'est ni un résultat certain ni nécessairement le plus probable.

Seuil et intervalle

Pour chercher le plus petit n tel que $1 - (1-p)^n \geq q$, une boucle sur n suffit. Après le logarithme, on peut résoudre $(1-p)^n \leq 1-q$ puis arrondir dans le bon sens. Pour trouver le plus petit entier k tel que $P(X > k) \leq \alpha$, augmenter k jusqu'à obtenir $P(X \leq k) \geq 1 - \alpha$, puis vérifier le rang précédent. On peut également chercher un intervalle $[a, b]$ contenant au moins une probabilité prescrite, sans supposer qu'il soit unique.

Épreuves indépendantes, au-delà de deux issues

Pour des expériences indépendantes, la probabilité d'une liste de résultats est le produit des probabilités de ses composantes. L'univers est le produit cartésien des univers de chaque expérience. Par exemple, pour deux lancers indépendants d'un dé équilibré, l'univers contient les 36 couples (i, j), $1 \leq i, j \leq 6$, chacun de probabilité $\frac{1}{36}$. La probabilité que la somme soit 5 vaut $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$, car les couples favorables sont $(1,4), (2,3), (3,2), (4,1)$. Dans un schéma de Bernoulli, on code le succès par 1 et l'échec par 0 : l'univers est $\{0,1\}^n$. L'indépendance concerne toute la succession ; une simple égalité entre deux probabilités observées ne suffit pas à la prouver.

Construire le modèle avant le calcul

13.1 Du tableau à l'arbre

Première utilisation : S36.

Exemple résolu – Changer le dénominateur

Sur 1 000 objets, 600 viennent de l'atelier A et 400 de B. A produit 12 objets défectueux et B en produit 20. En notant D le défaut, $P(A \cap D) = 12/1000$, $P_A(D) = 12/600 = 0{,}02$ et $P_D(A) = 12/32 = 0{,}375$. Le même effectif 12 intervient, mais l'univers de référence change.




Figure 13.1. Lire le chemin A puis D : $0{,}6 \times 0{,}02 = 0{,}012$, soit 12 objets sur 1 000.

A1 – Application immédiate Compléter le tableau à deux lignes A/B et deux colonnes D/non D. Calculer $P(D)$ de deux façons. Le défaut et l'atelier sont-ils indépendants ?

13.2 Retrouver une branche et inverser un conditionnement

Première utilisation : S38.

Propriété – Partition et probabilités totales

Si A et $\overline{A}$ forment une partition, $P(D) = P(A)P_A(D) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(D)$, lorsque les conditionnements sont définis. Ce résultat vient de la réunion disjointe des deux chemins conduisant à D.

Exemple résolu – Une donnée manquante

On connaît $P(A) = 0{,}7$, $P_A(D) = 0{,}1$ et $P(D) = 0{,}13$. Posons $x = P_{\overline{A}}(D)$. L'équation $0{,}13 = 0{,}7 \times 0{,}1 + 0{,}3x$ donne $x = 0{,}2$. Le résultat appartient à $[0;1]$, ce qui est un contrôle nécessaire.

A2 – Guidage partiel Avec $P(A) = 0{,}4$, $P_A(D) = 0{,}2$ et $P(D) = 0{,}14$, retrouver $P_{\overline{A}}(D)$ puis $P_D(A)$.

A3 – Réfuter « Si 90 % des malades ont un test positif, alors 90 % des personnes positives sont malades. » Construire un tableau sur 1 000 personnes, avec 100 malades, 90 positifs parmi les malades et 90 positifs parmi les non-malades, puis calculer les deux proportions.

13.3 Quatre caractéristiques à vérifier

Première utilisation : S39 et S41.

Définition – Schéma de Bernoulli

On répète un nombre fixé n d'épreuves indépendantes, avec deux issues et la même probabilité de succès p. Le nombre X de succès suit la loi $\mathcal{B}(n;p)$: $P(X=k)=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$ pour $0\leq k\leq n$.

Exemple résolu – Compter les chemins

Pour quatre essais de probabilité $1/2$, obtenir exactement deux succès correspond à six chemins, chacun de probabilité $1/16$. Ainsi $P(X=2)=6/16$. L'indépendance permet de multiplier les probabilités d'un chemin ; le coefficient binomial compte les placements des succès.




Figure 13.2. Loi $\mathcal{B}(4;1/2)$: expliquer la symétrie et vérifier la somme des hauteurs.

A4 – Accepter ou refuser Dire dans quels cas le modèle binomial est justifié : dix lancers indépendants d'une pièce ; dix tirages sans remise dans une urne contenant cinq boules rouges et cinq bleues ; nombre de lancers avant le premier succès. Justifier chaque réponse.

13.4 Traduire les mots en événements entiers

Première utilisation : S41.

Exemple résolu – Une frontière décalée d'une unité

Pour X entier, « strictement plus de 4 » signifie $X\geq 5$ et son complément est $X\leq 4$. « Au moins 4 » signifie $X\geq 4$ et son complément est $X\leq 3$. Enfin, $P(2\leq X\leq 5)=P(X\leq 5)-P(X\leq 1)$.

A5 – Application immédiate Pour $X\sim\mathcal{B}(8;0{,}3)$, écrire à l'aide de probabilités cumulées les événements : au moins 3 succès ; strictement moins de 3 ; entre 2 et 5 inclus. Calculer exactement $P(X=0)$.

13.5 Déterminer une probabilité plutôt qu'un nombre d'essais

Première utilisation : S42.

Exemple résolu – Deux essais

Pour deux essais indépendants de probabilité p, la probabilité d'au moins un succès vaut $1-(1-p)^2$. La rendre égale à 3/4 revient à $(1-p)^2 = 1/4$. Comme $1-p \geq 0$, on garde $1-p = 1/2$, donc p=1/2. La racine de signe négatif serait incompatible avec p dans [0;1].

A6 – Choix de stratégie Trois essais sont indépendants, de probabilité de succès p. On veut que la probabilité d'au moins deux succès soit 0,9. Exprimer cette probabilité en fonction de p, démontrer l'unicité d'une solution dans $[0;1]$ et l'encadrer entre deux centièmes consécutifs.

Un premier pas : Compter séparément deux et trois succès. Pour l'unicité, étudier une fonction sur $[0;1]$.

Une minute à l'oral. Expliquer pourquoi un arbre de probabilités n'implique pas l'indépendance : les probabilités sur le deuxième niveau peuvent dépendre du premier résultat.

Reprise différée – S50 puis S77. Résoudre un seuil $1-(1-p)^n \geq c$ par logarithme, puis comparer probabilités exactes et bornes de concentration.

Activité de recherche

Contrôle de composants — 40 min.

On choisit au hasard un composant dans une production issue de deux ateliers. On note A l'événement « le composant provient du premier atelier », $B = \overline{A}$ et D l'événement « le composant est défectueux ». On donne $P(A) = 0{,}6$, $P_A(D) = 0{,}02$ et $P_B(D) = 0{,}05$. Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-4}.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré, puis calculer $P(D)$.
2. Le composant choisi est défectueux. Calculer la probabilité qu'il provienne du premier atelier.
3. On choisit maintenant vingt composants indépendamment, chacun suivant le modèle précédent. On note X le nombre de composants défectueux parmi les vingt. Justifier la loi suivie par X et préciser ses paramètres.
4. Calculer $P(X = 0)$, $P(X \geq 2)$ et $E(X)$.
5. Si les vingt composants étaient prélevés dans un même lot, quelle hypothèse du modèle faudrait-il réexaminer ? Expliquer pourquoi.

Exercices progressifs

E1 · Application directe. On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0{,}3$, $P_A(B) = 0{,}8$ et $P_{\overline{A}}(B) = 0{,}1$. Calculer $P(B)$, puis $P_B(A)$.

E2 · Application et justification. La variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètres 8 et $\frac{1}{4}$. Donner les valeurs exactes de $P(X = 3)$, $E(X)$ et $V(X)$.

E3 · Méthode à organiser. Soit X une variable aléatoire à valeurs entières. Pour tout entier k, on pose $F(k) = P(X \leq k)$. Exprimer $P(X \geq 4)$ et $P(2 \leq X \leq 5)$ à l'aide de F.

E4 · Choix de stratégie. On tire successivement cinq cartes, sans remise, dans un jeu de 52 cartes contenant quatre as. On note X le nombre d'as obtenus. La variable X suit-elle une loi binomiale ? Justifier.

E5 · Synthèse ou démonstration. On répète indépendamment une épreuve dont la probabilité de succès est $\frac{1}{2}$. Déterminer le plus petit nombre d'épreuves pour lequel la probabilité d'obtenir au moins un succès est supérieure ou égale à 0,99.

Travail dans le manuel ou une annale

Baccalauréat, Métropole, 17 juin 2025 : exercice 1, question 5 (p. 3). En classe après S41. Lire le contexte des questions 1 à 4 ; pour ce travail, admettre le résultat $p = 0{,}0714$ de la question 4. Le sujet est accessible ici : annale officielle. Utiliser les données et les consignes de cette annale.

Devoir à la maison

DM13 — Réservations et surréservation — 60 min.

Une salle dispose de dix-huit places. L'organisateur accepte vingt réservations, payées à l'avance. Chaque personne ayant réservé se présente avec une probabilité de 0,8, indépendamment des autres. On note X le nombre de personnes qui se présentent. Si plus de dix-huit personnes viennent, les personnes excédentaires sont refusées.

1. Justifier la loi de X, puis calculer son espérance et sa variance.
2. Calculer la probabilité que l'organisateur doive refuser au moins une personne. Arrondir à 10^{-6}.
3. Chaque réservation rapporte 10 unités monétaires, y compris si la personne ne vient pas. Chaque personne refusée reçoit un versement total de 30 unités monétaires, remboursement et indemnité compris. On note $R = \max(X - 18; 0)$ le nombre de personnes refusées. Exprimer le gain G en fonction de R, puis calculer $E(G)$.
4. Calculer le gain si l'organisateur n'accepte que dix-huit réservations, avec les mêmes règles de paiement. Comparer les deux stratégies du point de vue du gain moyen.
5. Citer une hypothèse du modèle qui peut être discutable en pratique, puis un critère autre que le gain monétaire à prendre en compte dans cette décision.

QCM A – conditionnement et indépendance

Après S37.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $P_A(B)$ désigne :

A. $P(A \cap B)$ B. $P(B \mid A)$

C. $P(A \mid B)$ D. $P(\overline{B})$

2. Si $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}5$, alors $P(A \cap B)$ vaut :

A. 0,9 B. 0,2

C. 0,5 D. 0,1

3. Des événements indépendants vérifient :

A. $P(A \cap B) = 0$ B. $P(A \cap B) = P(A) + P(B)$

C. $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ D. $A = B$

4. « Au plus 3 succès » se traduit par :

A. $X < 3$ B. $X \leq 3$

C. $X \geq 3$ D. $X > 3$

5. Dans un arbre pondéré, la probabilité d'un chemin est :

A. la somme de ses branches B. le produit de ses branches

C. toujours $\frac{1}{2}$ D. une différence

QCM B – loi binomiale et seuil

Après S41 ; variables de comptage entières.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. $X \sim \mathcal{B}(10; 0{,}3)$ compte :

A. les succès de dix épreuves identiques et indépendantes B. dix probabilités

C. les échecs seulement D. une moyenne continue

7. Pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, $E(X)$ vaut :

A. p^n B. np

C. $n + p$ D. $n(1 - p)$

8. « Strictement plus de 4 » équivaut à :

A. $X \geq 4$ B. $X \leq 4$

C. $X \geq 5$ D. $X > 5$

9. Les hypothèses du schéma de Bernoulli ne sont pas toutes satisfaites si :

A. il y a un nombre fixé d'épreuves B. le succès a une même probabilité

C. les épreuves sont dépendantes D. l'issue est succès/échec

10. Pour vérifier un seuil entier minimal dans un problème monotone, on contrôle aussi :

A. le rang précédent B. une couleur de l'arbre

C. $P(X = 0)$ seulement D. le nom de X

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. $P_A(B) = P_B(A)$ dans toute situation.
2. Si $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, alors $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k - 1)$.
3. Une fréquence observée est exactement égale à la probabilité théorique.

Bilan de reprise

Je sais construire un arbre, choisir ou refuser le modèle binomial et traduire un seuil entier. **À surveiller :** inverser conditionnement et intersection ; oublier le décalage d'une borne entière.

Corrigés des QCM

1. **B.** $P_A(B)$ est la probabilité de B sachant A, pour $P(A) > 0$. L'intersection et le conditionnement inverse sont différents.
2. **B.** $P(A \cap B) = P(A)P_A(B) = 0{,}4 \times 0{,}5 = 0{,}2$. On multiplie les probabilités successives, on ne les additionne pas.
3. **C.** Par définition de l'indépendance, $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Une intersection vide correspond à l'incompatibilité, pas à l'indépendance en général.
4. **B.** « Au plus 3 » inclut 3 : $X \leq 3$. « Moins de 3 » l'exclurait.
5. **B.** La probabilité du chemin est le produit de probabilités conditionnelles successives. On additionne ensuite des chemins disjoints pour obtenir une réunion.
6. **A.** Le nombre d'épreuves est 10, la probabilité de succès 0,3, avec indépendance. La variable compte les succès, et non les probabilités.
7. **B.** Une somme de n indicatrices de succès d'espérance p a espérance np. Le nombre moyen d'échecs serait $n(1-p)$.
8. **C.** X est entier : $X > 4$ équivaut à $X \geq 5$. $X > 5$ exclut à tort la valeur 5.
9. **C.** L'indépendance fait partie des hypothèses du schéma de Bernoulli. Sa perte ne permet plus d'appliquer automatiquement le modèle, même si une coïncidence de lois peut exister dans des cas particuliers.
10. **A.** Contrôler le rang candidat et le précédent permet d'établir la minimalité lorsque la probabilité est monotone en la taille. Un seul calcul au rang candidat prouve uniquement qu'il convient.

Vrai/faux. Faux : avec $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/4$ et $B \subset A$, on a $P_A(B) = 1/2$ et $P_B(A) = 1$. Vrai pour X entière et k entier : les deux événements sont complémentaires. Faux : un seul lancer d'une pièce équilibrée a une fréquence 0 ou 1, et non $1/2$.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. Ligne A : 12 et 588 ; ligne B : 20 et 380. $P(D) = 32/1000 = 0{,}032 = 0{,}6 \times 0{,}02 + 0{,}4 \times 0{,}05$. $P_A(D) = 0{,}02 \neq 0{,}032$: pas d'indépendance.

Application 2. $0{,}14 = 0{,}4 \times 0{,}2 + 0{,}6x$ donne $x = 0{,}1$. $P_D(A) = 0{,}08/0{,}14 = 4/7$.

Application 3. Malades : 90 positifs et 10 négatifs ; non-malades : 90 positifs et 810 négatifs. $P_M(+) = 0{,}9$, mais $P_+(M) = 90/180 = 0{,}5$.

Application 4. Le premier convient si on compte une issue fixée. Sans remise, les probabilités évoluent et les tirages ne sont pas indépendants. Le nombre d'essais jusqu'au premier succès n'est pas fixé : ce n'est pas un nombre de succès dans un schéma de longueur fixée.

Application 5. $1 - P(X \leq 2)$; $P(X \leq 2)$; $P(X \leq 5) - P(X \leq 1)$. $P(X = 0) = (7/10)^8 = 0{,}05764801$.

Application 6. $q(p) = 3p^2(1-p) + p^3 = 3p^2 - 2p^3$. $q' = 6p(1-p) > 0$ sur $]0;1[$, donc q est strictement croissante sur $[0;1]$. Continuité et $q(0) = 0 < 0{,}9 < q(1) = 1$ donnent existence et unicité. $q(0{,}80) = 0{,}896 < 0{,}9 < 0{,}905418 = q(0{,}81)$.

Institutionnalisation

Faire conserver le tableau à côté de l'arbre ; demander à chaque étape « parmi qui ? ». Pour les seuils, faire représenter les entiers sur un axe avant de calculer. Dans le problème paramétrique, distinguer la variable X, l'entier $n = 3$ et le paramètre p.


Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

Réactiver les conditionnelles en S36 avant tout schéma de Bernoulli. L'indépendance est une hypothèse du modèle, elle ne découle pas de la seule répétition. Pour un tirage sans remise, ne pas invoquer automatiquement une loi binomiale. Les formules d'espérance et de variance sont utilisées en S39 ; leur preuve par somme d'indicatrices est reprise au chapitre 14. Un seuil demandé en décembre doit pouvoir être obtenu par une boucle, le logarithme n'étant pas encore enseigné.

Corrigé de l'activité

1. L'arbre porte les branches A et B, de probabilités 0,6 et 0,4. Depuis A, les branches $D, \overline{D}$ portent 0,02, 0,98 ; depuis B, elles portent 0,05, 0,95.



   Par probabilités totales, $P(D) = P(A)P_A(D) + P(B)P_B(D) = 0{,}012 + 0{,}020 = 0{,}032$.

2. $P(D) > 0$ et $P(A \cap D) = 0{,}6 \times 0{,}02 = 0{,}012$. Donc $P_D(A) = \frac{P(A\cap D)}{P(D)} = \frac{0{,}012}{0{,}032} = \frac{3}{8} = 0{,}375$.

3. Chaque prélèvement est une épreuve à deux issues, « défectueux » ou « non défectueux », avec la même probabilité 0,032 de défaut. Les vingt prélèvements étant indépendants, $X \sim \mathcal{B}(20, 0{,}032)$.

4. $P(X = 0) = 0{,}968^{20} \simeq 0{,}5218$. Par complément,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - 0{,}968^{20} - 20(0{,}032)0{,}968^{19} \simeq 0{,}1332.$$

   Enfin $E(X) = 20 \times 0{,}032 = 0{,}64$. Cette espérance n'implique pas qu'un prélèvement présente un nombre fractionnaire de défauts.

5. Une cause commune liée au lot pourrait rendre les défauts dépendants. La loi binomiale et ses calculs reposent sur l'indépendance donnée dans le modèle ; il faudrait réexaminer cette hypothèse pour un autre protocole.

E1. Par probabilités totales, $P(B) = 0{,}3 \times 0{,}8 + 0{,}7 \times 0{,}1 = 0{,}31$. Puisque $P(B) > 0$, $P_B(A) = \frac{P(A\cap B)}{P(B)} = \frac{0{,}24}{0{,}31} = \frac{24}{31}$.

E2. Par la formule binomiale, $P(X = 3) = \binom{8}{3}\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^5 = 56\left(\frac{1}{4}\right)^3\left(\frac{3}{4}\right)^5$. Les paramètres donnent $E(X) = \frac{8}{4} = 2$ et $V(X) = 8\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{3}{4}\right) = \frac{3}{2}$.

E3. Le complément de $X \geq 4$ est $X \leq 3$, donc $P(X \geq 4) = 1 - F(3)$. Pour l'intervalle, on enlève à $X \leq 5$ les valeurs $X \leq 1$, donc $P(2 \leq X \leq 5) = F(5) - F(1)$.

E4. Non, dans un jeu usuel contenant quatre as. Sans remise, obtenir un as au premier tirage change la probabilité d'en obtenir un au second : les essais ne sont pas indépendants. En outre, le nombre d'as ne peut jamais valoir 5, alors qu'une binomiale de paramètres 5 et $0 < p < 1$ donne une probabilité positive à cette valeur.

E5. La probabilité d'au moins un succès vaut $1 - (\frac{1}{2})^n$. La condition est équivalente à $2^n \geq 100$. Comme $2^6 = 64 < 100 \leq 128 = 2^7$, le premier entier est 7. La probabilité vaut alors $\frac{127}{128} \simeq 0{,}99219$.

Corrigé du DM13

1. X compte les succès de vingt épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre 0,8. Donc $X \sim \mathcal{B}(20, 0{,}8)$, $E(X) = 20 \times 0{,}8 = 16$ et $V(X) = 20 \times 0{,}8 \times 0{,}2 = 3{,}2$.

2. La salle manque de places si $X > 18$, c'est-à-dire $X = 19$ ou $X = 20$. Ces événements étant incompatibles,
$$P(X > 18) = 20(0{,}8)^{19}(0{,}2) + (0{,}8)^{20} \simeq 0{,}069175.$$
Le risque est d'environ 6,92 %.

3. Le nombre de refus R vaut 0 pour $X \leq 18$, 1 pour $X = 19$ et 2 pour $X = 20$. Par définition de l'espérance,
$$E(R) = P(X = 19) + 2P(X = 20) \simeq 0{,}0807045.$$
Les recettes sont $20 \times 10 = 200$ et les versements $30R$, donc $G = 200 - 30R$. Ainsi $E(G) = 200 - 30E(R) \simeq 197{,}5789$ unités monétaires. Les 30 incluent déjà tous les versements liés à un refus ; il ne faut pas retirer encore 10.

4. Avec dix-huit réservations, aucun refus n'est possible et les recettes sont $18 \times 10 = 180$, quel que soit le nombre de présents. L'espérance du gain avec vingt réservations dépasse ce montant d'environ 17,58 unités monétaires.

5. Les venues de personnes d'un même groupe peuvent être dépendantes. En outre, la satisfaction du public et les conséquences d'un refus ne sont pas résumées par l'espérance du gain. Le résultat chiffre un modèle ; il ne suffit pas à lui seul à imposer une décision.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Les 100 choix sont indépendants, avec une même probabilité $p = 0{,}0714$. Donc $X \sim \mathcal{B}(100; 0{,}0714)$.

$$P(X \leq 7) = \sum_{k=0}^{7} \binom{100}{k} (0{,}0714)^k (0{,}9286)^{100-k} \simeq 0{,}577.$$

Enfin, $E(X) = 7{,}14$ et $V(X) = 100 \times 0{,}0714 \times 0{,}9286 = 6{,}630204 \simeq 6{,}63$.