5 Étude complète et représentation graphique

Analyse

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Assembler domaines, limites, dérivée, points remarquables et positions relatives pour tracer une courbe justifiée.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Les quatre chapitres précédents ; signe d'un polynôme ; équations de droites.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Factoriser $x^2 - 2x - 3$. Calculer $f(0)$ pour $f(x) = x + 1 + 2/(x-1)$.

5.1 Organiser l'étude

COMMENT ON S'Y PREND ▪ une étude en six étapes

Domaine et éventuelle réduction par symétrie/périodicité ; limites et branches infinies ; dérivée et variations ; points d'intersection avec les axes ; tangentes ou points particuliers ; tracé cohérent avec l'ensemble des résultats. Pour comparer deux courbes, étudier le signe de leur différence sur leur domaine commun.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1 ▪ une fraction rationnelle

Soit $f(x) = \dfrac{x^2+1}{x-1} = x + 1 + \dfrac{2}{x-1}$. Le domaine est $\mathbb{R} \setminus \{1\}$. Les limites en 1^- et 1^+ sont $-\infty$ et $+\infty$. Aux deux infinis, l'asymptote est $y = x + 1$.

$$f'(x) = 1 - \frac{2}{(x-1)^2} = \frac{(x-1)^2 - 2}{(x-1)^2}.$$


Elle s'annule en $a = 1 - \sqrt{2}$ et $b = 1 + \sqrt{2}$. Elle est positive en dehors de $[a; b]$ et négative à l'intérieur, en séparant les deux intervalles du domaine. Les valeurs sont $f(a) = 2 - 2\sqrt{2}$ et $f(b) = 2 + 2\sqrt{2}$.

x	$-\infty$		a		1
f'		$+$	0	$-$	non défini
f	$-\infty$	$\nearrow$	$2-2\sqrt{2}$	$\searrow$	$-\infty$
x	1		b		$+\infty$
f'	non défini	$-$	0	$+$	
f	$+\infty$	$\searrow$	$2+2\sqrt{2}$	$\nearrow$	$+\infty$

$f(0) = -1$. Le numérateur $x^2 + 1$ ne s'annule jamais, donc la courbe ne coupe

pas l'axe des abscisses. Pour tout $h \neq 0$, $f(1+h)+f(1-h)=4$, et le domaine est symétrique par rapport à 1 : $(1;2)$ est centre de symétrie.

JE VISUALISE ▪ deux branches, quatre variations



Le maximum de la branche gauche et le minimum de la branche droite ne sont pas les mêmes points. L'asymptote verticale sépare le domaine.

5.2 Point d'inflexion et tangente

DÉFINITION 1 ▪ point d'inflexion

Un point d'inflexion est un point où la courbe change de convexité. Pour les fonctions deux fois dérivables étudiées ici, un changement de signe de f'' de part et d'autre fournit un critère suffisant (admis). La convexité désigne l'allure courbée vers le haut, la concavité vers le bas.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2

Pour $g(x)=x^3$, $g''(x)=6x$ change de signe en 0. L'origine est un point d'inflexion, et la tangente $y=0$ est traversée par la courbe. Pour x^4, $g''(0)=0$ mais g'' reste positive : pas d'inflexion en 0.

AVERTISSEMENT

Annuler f'' ne suffit pas. Une courbe apparemment proche d'une droite ne prouve pas une asymptote. Une esquisse est un résumé de résultats déjà justifiés.

5.3 Comparer deux fonctions

Si $f-g>0$ sur un intervalle, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\mathcal{C}_g$; si $f-g<0$, elle est en dessous ; les zéros de la différence donnent les intersections. Les unités des axes peuvent être différentes ; préciser le repère pour les arguments métriques.

Lire une étude comme un ensemble de contraintes

COMMENT ON S'Y PREND ▪ construire la courbe dans le bon ordre

Tracer d'abord les axes et les asymptotes. Placer ensuite les points connus, en particulier extrema et intersections. Dessiner séparément chaque intervalle du domaine, en respectant les sens de variation et la position par rapport aux

droites. Revenir au tableau pour contrôler chaque branche : la calculatrice peut aider à visualiser, mais ne remplace aucune justification.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 3 ▪ compter des intersections sans formule des racines

Pour $p(x) = x^3 - 3x$, la dérivée est $3(x-1)(x+1)$. Les intervalles de monotonie stricte sont $]-\infty;-1]$, $[-1;1]$ et $[1;+\infty[$, avec valeurs remarquables 2 et -2. Une horizontale $y = k$ avec $-2 < k < 2$ rencontre chaque branche exactement une fois : la continuité donne l'existence et la monotonie l'unicité sur chaque branche. Ainsi on peut compter trois solutions sans les écrire en formule explicite.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ confronter une équation au domaine

Pour $h(x) = (2x+1)/(x-1)$, résoudre $h(x) = c$ exige $x \neq 1$. Multiplier alors par $x-1$ donne $(2-c)x = -1-c$. Si $c = 2$, on obtient $0 = -3$, impossible. Sinon, $x = (1+c)/(c-2)$; ce nombre n'est jamais 1, car cela imposerait $1 = -2$. Le niveau de l'asymptote horizontale n'est pas atteint dans cet exemple, mais cette propriété ne vaut pas pour toute asymptote.

AVERTISSEMENT ▪ les points remarquables n'ont pas le même rôle

Un extremum local concerne les valeurs voisines ; un extremum global concerne tout le domaine. Un point d'inflexion marque un changement de convexité et peut avoir une tangente non horizontale. Une valeur interdite ne devient pas un point de la courbe même si sa limite est finie.

5.4 Exercices et problèmes

2 Une parabole Étudier complètement $f(x) = x^2 - 4x + 3$: domaine, limites, variations, axe et intersections avec les axes. Tracer.

3 Courbe et droite Comparer $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = x - 1$.

4 Un quotient simple Étudier $h(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$: limites, variations, asymptotes, intersections et centre de symétrie.

5 Cubicité Étudier $p(x) = x^3 - 3x$, sa symétrie, ses extrema et son point d'inflexion. Donner sa tangente en 0.

6 Lecture argumentée Un élève affirme : « $f'(a) = 0$, donc $f(a)$ est un maximum ». Donner deux contre-exemples différents.

7 Oscillation Étudier $u(x) = 2\cos x$ sur $[0;\pi]$, puis expliquer comment obtenir sa courbe sur $\mathbb{R}$.

8 Le nombre de solutions dépend d'un niveau On reprend $p(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$. À partir de son tableau de variation, déterminer le nombre de solutions distinctes de $p(x) = k$ selon le réel k. Traiter séparément $k = -2$ et $k = 2$; pour ces deux niveaux, factoriser l'équation et donner les solutions exactes.

9 Auditer une description de courbe Pour $f(x) = (x^2+1)/(x-1)$, un compte rendu annonce : « la courbe coupe l'axe des abscisses ; ses deux branches se rejoignent en $x = 1$; elle possède un maximum global en $1 - \sqrt{2}$ ». Réfuter chacune des trois affirmations à l'aide de l'expression ou des résultats du cours et écrire une description corrigée.

JE ME TESTE

Pour vérifier mon tracé, je confronte chaque branche aux limites, chaque extremum au tableau et chaque intersection à son équation.