13 Calcul vectoriel et produit scalaire

Géométrie

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Décomposer un vecteur dans une base et utiliser les expressions du produit scalaire pour démontrer des relations métriques.

Dans ce chapitre, les calculs de longueurs, d'angles et d'aires à partir de coordonnées se font dans un repère orthonormé.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Chasles, coordonnées, Pythagore, angles et trigonométrie ; repère orthonormé pour les calculs métriques.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Pour $A(1;2), B(4;6)$, calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et AB.

13.1 Combinaisons linéaires et bases

DÉFINITION 1 ▪

Une combinaison linéaire de $\vec{u}, \vec{v}$ est $a\vec{u} + b\vec{v}$ avec $a, b \in \mathbb{R}$. Deux vecteurs non colinéaires forment une base du plan : chaque vecteur s'écrit d'une manière unique $a\vec{u} + b\vec{v}$.

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Dans un repère, $\vec{u} = (x;y)$ et $\vec{v} = (x';y')$ sont non colinéaires si et seulement si $xy' - yx' \neq 0$.

DÉMONSTRATION

Le système $a\vec{u} + b\vec{v} = \vec{w}$ a deux équations. L'élimination fournit une solution unique si le déterminant $xy' - yx'$ est non nul. S'il est nul, les colonnes sont proportionnelles (ou l'un des vecteurs est nul), donc colinéaires. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

$\vec{u} = (1;1)$, $\vec{v} = (1;-1)$ forment une base. Pour $\vec{w} = (3;1)$, $a+b = 3$ et $a-b = 1$, donc $\vec{w} = 2\vec{u} + \vec{v}$. Cette base n'est pas un repère orthonormé : ses deux vecteurs ont norme $\sqrt{2}$.

13.2 Quatre expressions d'un même produit

DÉFINITION 2 ▪

Pour deux vecteurs non nuls, $\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$, où θ est l'angle entre eux. Si l'un est nul, le produit scalaire est nul.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

Dans un repère orthonormé, $\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy'$. Pour $O \neq A$, avec H projeté orthogonal de B sur la droite (OA) et $\vec{u} = \overrightarrow{OA}, \vec{v} = \overrightarrow{OB}$, le produit vaut OA multiplié par la longueur algébrique OH orientée vers A. Enfin,

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right).$$

Le produit est symétrique et bilinéaire ; $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$; deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit est nul (y compris le vecteur nul).

DÉMONSTRATION

Décomposer dans deux directions orthonormées donne $xx'+yy'$. Développer $(x+x')^2+(y+y')^2$ donne l'identité par les normes. La projection donne $OH = OB\cos\theta$ avec son signe, donc la même expression géométrique. La bilinéarité résulte de la formule des coordonnées. ■

13.3 Relations métriques dans un triangle

PROPRIÉTÉ 3 ▪ Al-Kashi et médiane

Dans un triangle ABC,

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\,AC\cos\widehat{BAC}.$$

Si I est milieu de $[BC]$, alors $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + BC^2/2$.

DÉMONSTRATION

Al-Kashi résulte du carré de $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}$. Pour la médiane, $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AI} - \overrightarrow{IB}$; en additionnant les carrés, les produits croisés s'annulent. ■

PROPRIÉTÉ 4 ▪ aire et sinus

Pour un triangle non aplati, $\mathcal{A} = \dfrac{1}{2}AB\,AC\sin\widehat{BAC}$ et

$$\frac{BC}{\sin\widehat{BAC}} = \frac{CA}{\sin\widehat{ABC}} = \frac{AB}{\sin\widehat{ACB}}.$$

DÉMONSTRATION

La hauteur relative à AB vaut $AC\sin\widehat{BAC}$. Écrire l'aire avec chacun des trois angles puis diviser par les produits des côtés (tous non nuls) donne la relation des sinus. ■

Choisir la bonne expression du produit scalaire

COMMENT ON S'Y PREND ▪ relier angle, projection et coordonnées

Avec des coordonnées dans un repère orthonormé, calculer d'abord les vecteurs puis leur produit. Pour un angle, diviser par les deux normes non nulles. Pour projeter C sur la droite (AB), $A \neq B$, poser $H = A + t\overrightarrow{AB}$; la condition $\overrightarrow{HC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0$ impose

$$t = \frac{\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB}}{AB^2}.$$

Si $t \notin [0;1]$, le pied appartient à la droite mais pas au segment ; la hauteur d'un triangle peut être extérieure.

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 2 ▪ une projection calculée et vérifiée

Pour $A(1;1)$, $B(5;3)$, $C(2;4)$, $\overrightarrow{AB} = (4;2)$, $\overrightarrow{AC} = (1;3)$. Le produit vaut 10 et $AB^2 = 20$, donc $t = 1/2$, $H(3;2)$. On vérifie $\overrightarrow{HC} = (-1;2)$ et son produit avec $(4;2)$ vaut 0. La distance $CH = \sqrt{5}$ est la hauteur relative à $AB = 2\sqrt{5}$, d'où l'aire 5 unités d'aire. Le même produit donne $\cos \widehat{BAC} = 10/(\sqrt{20}\sqrt{10}) = 1/\sqrt{2}$: l'angle vaut $\pi/4$.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ contrôler la formule dans une base quelconque

Les coordonnées d'un vecteur sont les coefficients de sa décomposition dans la base choisie. Si la base n'est pas orthonormée, les produits des vecteurs de base interviennent. On peut revenir aux coordonnées dans un repère orthonormé pour éviter une formule mal appliquée. Une base sert à représenter les vecteurs ; elle ne garantit pas des unités de longueur égales.

13.4 Exercices et problèmes

2 Une base oblique Écrire $(5;1)$ dans la base $\vec{u} = (2;1)$, $\vec{v} = (1;-1)$.

3 Produit scalaire Calculer le produit de $(2;-1)$ et $(3;4)$, leurs normes et le cosinus de leur angle.

4 Triangle rectangle Pour $A(0;0), B(4;0), C(1;\sqrt{3})$, déterminer l'angle en A puis calculer BC.

5 Médiane Dans un triangle, $AB = 5$, $AC = 7$, $BC = 8$. Calculer la longueur de la médiane issue de A.

6 Une formule mal utilisée Dans la base $\vec{u} = (1;1)$, $\vec{v} = (1;-1)$, peut-on calculer le produit scalaire de deux vecteurs en multipliant directement leurs coordonnées dans cette base ?

7 Mesurer une aire Deux côtés d'une parcelle triangulaire mesurent 30 m et 40 m, avec angle compris 60°. Calculer sa surface et son troisième côté.

8 Une hauteur hors du segment Dans un repère orthonormé, $A(0;0)$, $B(4;0)$, $C(-2;3)$. Déterminer le projeté orthogonal H de C sur la droite (AB) et dire s'il appartient au segment $[AB]$. Calculer l'aire du triangle et le cosinus de l'angle en A ; cet angle est-il aigu, droit ou obtus ?

9 Des coordonnées dans une base oblique Dans un repère orthonormé de référence, $\vec{u} = (1;0)$ et $\vec{v} = (1;1)$. On définit $\vec{w} = \vec{u} + \vec{v}$ et $\vec{z} = \vec{u} - \vec{v}$. Un élève utilise leurs coordonnées $(1;1)$ et $(1;-1)$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v})$ pour conclure qu'ils sont

orthogonaux. Contrôler que cette paire est une base, puis calculer le vrai produit scalaire et expliquer l'erreur.

> **JE ME TESTE**
>
> Je distingue une base quelconque d'un repère orthonormé ; je choisis coordonnées, normes, angle ou projection selon les données.