19 Ensembles, applications et dénombrement

Données et probabilités

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE À LA FIN

Choisir entre produit, permutation, arrangement et combinaison ; reconnaître injection, surjection et bijection.

JE RÉVISE AVANT DE COMMENCER

Ensembles finis, union, intersection, complémentaire ; multiplication et factorielle.

TROIS MINUTES D'AUTOMATISMES

1 Lister les couples de $\{a, b\} \times \{1, 2\}$. Calculer $4 \times 3 \times 2 \times 1$.

19.1 Cardinal et opérations

DÉFINITION 1 ▪

Le cardinal $|E|$ d'un ensemble fini est son nombre d'éléments. L'intersection contient les éléments communs ; l'union ceux de l'un ou de l'autre ; le complémentaire $\overline{A}$ est pris dans un ensemble de référence E annoncé.

PROPRIÉTÉ 1 ▪

Pour A, B finis, $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ et $|\overline{A}| = |E| - |A|$. Le principe du produit multiplie les nombres de choix successifs lorsque le nombre de possibilités à chaque étape est fixé pour tous les choix précédents.

DÉMONSTRATION

La somme des deux cardinaux compte deux fois l'intersection. Pour le produit, grouper les résultats par premier choix : chaque groupe a le même nombre de possibilités suivantes ; répéter le raisonnement. ■

19.2 Applications entre ensembles finis

DÉFINITION 2 ▪

Une application $f : E \to F$ associe à chaque élément de E un unique élément de F. Elle est injective si deux éléments distincts ont des images distinctes ; surjective si chaque élément de F possède au moins un antécédent ; bijective si elle est injective et surjective.

PROPRIÉTÉ 2 ▪

Si $|E| = p, |F| = n$, avec $n \geq 1$, il existe n^p applications. Une injection exige $p \leq n$; leur nombre est $n(n-1)\cdots(n-p+1)$ pour $p \geq 1$, et 1 pour $p = 0$. Pour $p = n$, les bijections sont $n!$. Une surjection exige $p \geq n$ si F est non vide.

DÉMONSTRATION

Une application choisit indépendamment une image parmi n pour chacun des p éléments. Une injection retire à chaque étape les images déjà utilisées. Une injection entre deux ensembles de même cardinal utilise toutes les images, donc elle est aussi surjective. La condition pour la surjection résulte du nombre d'images disponibles. ■

REMARQUE

La formule n^p compte toutes les applications, pas seulement les surjections. Le programme demande de reconnaître la surjection, sans formule générale de comptage ; les petits exemples peuvent être énumérés.

19.3 Ordre et répétition

DÉFINITION 3 ▪

$n! = 1 \times 2 \times \cdots \times n$, avec $0! = 1$. Une permutation ordonne tous les éléments distincts : $n!$ choix. Un arrangement de p éléments distincts parmi n est une liste ordonnée sans répétition : $A_n^p = n!/(n-p)!$. Une combinaison est un sous-ensemble de p éléments : $\binom{n}{p} = n!/[p!(n-p)!]$, pour $0 \leq p \leq n$.

DÉMONSTRATION

Chaque sous-ensemble de p éléments donne exactement $p!$ ordres ; les arrangements comptent chacun $p!$ fois, donc on divise par $p!$. ■

JE COMPRENDS SUR UN EXEMPLE 1

Parmi 8 élèves, un podium de trois places se compte par $8 \times 7 \times 6 = 336$; un groupe de trois élèves se compte par $\binom{8}{3} = 56$. Un code de trois chiffres avec répétition autorisée a $10^3 = 1000$ possibilités, si le zéro initial est accepté.

COMMENT ON S'Y PREND ▪ poser trois questions

L'ordre distingue-t-il deux résultats ? La répétition est-elle autorisée ? Choisit-on tous les éléments ou seulement certains ? Donner un exemple de résultat permet de choisir le bon univers de comptage.

19.4 Exercices et problèmes

2 Union Dans un groupe de 40 élèves, 25 pratiquent le football, 18 le basket et 10 les deux. Combien pratiquent au moins un de ces sports ? Aucun ?

3 Codes Compter les codes de quatre chiffres avec répétition autorisée, puis sans répétition, si le premier chiffre peut être zéro. Recommencer si zéro est interdit au premier rang.

4 Responsabilités Parmi 12 personnes, choisir un président et un secrétaire distincts, puis un comité de trois personnes sans fonctions distinctes.

5 Applications Pour $E = \{1, 2, 3\}$ et $F = \{a, b\}$, compter les applications et les injections ; compter les surjections par retrait des applications constantes.

6 Frontières Expliquer $\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1$ et $\binom{n}{p} = \binom{n}{n-p}$.

7 Choix mixtes Un groupe contient 5 filles et 4 garçons. Compter les comités de trois élèves comprenant exactement deux filles, puis au moins une fille.

8 Listes ou groupes Un élève calcule un comité de trois parmi huit par $8 \times 7 \times 6$. Expliquer précisément le surcomptage et réparer.

> **JE ME TESTE**
>
> Je définis un résultat avant de compter et je contrôle les frontières $p = 0$ et $p = n$.