Notes de cours

Angles et longueurs

Propriété · Interprétation de $\frac{c-a}{b-a}$. Soit A, B, C trois points d'affixes a, b, c, avec $A \neq B$ et $A \neq C$. Alors

$$\left|\frac{c-a}{b-a}\right| = \frac{AC}{AB} \qquad \text{et} \qquad \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}.$$

Démonstration. Le module d'un quotient est le quotient des modules : $|c-a| = AC$ et $|b-a| = AB$. Pour l'argument, $\arg(b-a) \equiv \left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AB}\right)$ et $\arg(c-a) \equiv \left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AC}\right)$, donc par la relation de Chasles $\arg \frac{c-a}{b-a} \equiv \left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AC}\right) - \left(\overrightarrow{u}, \overrightarrow{AB}\right) \equiv \left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \pmod{2\pi}$. □

Propriété · Alignement, orthogonalité. Avec les mêmes notations, posons $q = \frac{c-a}{b-a}$.

1. A, B, C sont alignés si et seulement si q est réel.
2. Les droites (AB) et (AC) sont perpendiculaires si et seulement si q est imaginaire pur.
3. Le triangle ABC est rectangle isocèle en A si et seulement si $q = i$ ou $q = -i$; il est équilatéral si et seulement si $q = \mathrm{e}^{i\pi/3}$ ou $q = \mathrm{e}^{-i\pi/3}$.

Démonstration. q est réel si et seulement si son argument est 0 ou π modulo 2π, c'est-à-dire si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. q est imaginaire pur (non nul) si et seulement si son argument est $\pm\frac{\pi}{2}$. Pour 3, un triangle rectangle isocèle en A correspond à $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{2}$; un triangle équilatéral à $AC = AB$ et $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}\right) \equiv \pm\frac{\pi}{3}$. □

Exemple 1 · Construire un carré. Soit A et B d'affixes a et b. Le carré direct $ABCD$ a pour sommets $c = b + i(b-a)$ et $d = a + i(b-a)$: on passe de $\overrightarrow{AB}$ à $\overrightarrow{BC}$ par un quart de tour direct. Avec $a = 0$ et $b = 1$: $c = 1 + i$ et $d = i$.

Racines n-ièmes de l'unité

Définition · Racine n-ième de l'unité. Soit $n \geq 1$ un entier. On appelle *racine n-ième de l'unité* tout complexe z tel que $z^n = 1$. Leur ensemble est noté $\mathbb{U}_n$.

Propriété · Détermination de $\mathbb{U}_n$. Pour tout entier $n \geq 1$, $\mathbb{U}_n$ a exactement n éléments :

$$\mathbb{U}_n = \left\{ \mathrm{e}^{2ik\pi/n} \ : \ k \in [\![0; n-1]\!] \right\}.$$


Démonstration. Soit $z \in \mathbb{U}_n$. Alors $|z|^n = |z^n| = 1$ avec $|z| \geq 0$, donc $|z| = 1$ et $z = \mathrm{e}^{i\theta}$ pour un réel θ. L'égalité $\mathrm{e}^{in\theta} = 1$ équivaut à $n\theta \equiv 0 \pmod{2\pi}$, c'est-à-dire $\theta = \frac{2k\pi}{n}$ avec k entier. Réciproquement, $\left(\mathrm{e}^{2ik\pi/n}\right)^n = \mathrm{e}^{2ik\pi} = 1$.

Deux entiers k et k' donnent le même nombre si et seulement si $\frac{2(k-k')\pi}{n}$ est un multiple de 2π, soit $k \equiv k' \pmod{n}$. Tout entier k a même reste qu'un entier de $[\![0; n-1]\!]$, et ces n entiers ont des restes distincts : $\mathbb{U}_n$ a exactement n éléments. □

À retenir · Interprétation géométrique. Pour $n \geq 3$, les images des éléments de $\mathbb{U}_n$ sont les sommets d'un polygone régulier à n côtés inscrit dans le cercle unité, dont un sommet est le point d'affixe 1. Avec $\omega = e^{2i\pi/n}$, on a $\mathbb{U}_n = \{1; \omega; \omega^2; \ldots; \omega^{n-1}\}$. Cas à connaître : $\mathbb{U}_2 = \{1; -1\}$, $\mathbb{U}_3 = \{1; j; j^2\}$ avec $j = e^{2i\pi/3}$, $\mathbb{U}_4 = \{1; i; -1; -i\}$.

Propriété · Somme des racines n-ièmes. Pour tout entier $n \geq 2$, la somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle.

Démonstration. Avec $\omega = e^{2i\pi/n} \neq 1$ (car $n \geq 2$) : $1 + \omega + \cdots + \omega^{n-1} = \frac{1-\omega^n}{1-\omega} = 0$. □



Les racines sixièmes de l'unité forment un hexagone régulier.