Chapitre 8

Révisions et consolidation

8.1 Stratégie de révision

À retenir

Une révision efficace alterne récupération en mémoire, correction explicite des erreurs et réemploi dans un problème. Relire passivement le cours ne suffit pas : il faut tenter une question sans modèle, comparer sa réponse, puis refaire la question après un délai.

Pour chaque chapitre, utiliser le code suivant : **V** (maîtrisé), **O** (fragile), **R** (à reprendre). Après le diagnostic, travailler en priorité une compétence orange ou rouge, puis vérifier immédiatement avec une question analogue.

Compétence	V	O	R	Action de remédiation
Choisir un modèle	☐	☐	☐	Refaire un exercice de tri arithmétique/géométrique/exponentiel.
Lire et calculer	☐	☐	☐	Reprendre les automatismes ciblés.
Rédiger et interpréter	☐	☐	☐	Ajouter données, formule, calcul, unité et phrase de réponse.

Séance 52 — Diagnostic des acquis

Révisions et consolidation

11/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Identifier les acquis.
- Classer les erreurs.
- Planifier la remédiation.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 25 %. .....
2. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....
3. Résoudre $10^x = 1000$. .....
4. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
5. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : identifier les acquis et classer les erreurs.

Activité de recherche

Répondre sans cours à 14 questions, deux par chapitre. Reporter chaque erreur dans une grille : connaissance, choix de méthode, calcul, lecture, rédaction. Choisir ensuite deux priorités personnelles.

Trace écrite

Le diagnostic sert à choisir la remédiation : reconnaître l'erreur, retrouver la règle utile, refaire une question analogue, puis vérifier sans aide.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Compléments : Réactivation des chapitres 1 à 7. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 29, exercice 52

En France, depuis 2016, les ventes de véhicules hybrides ont fortement augmenté. Le tableau ci-dessous donne le nombre de véhicules hybrides vendus en France par année.

Année	2016	2017	2018
Nombre de véhicules hybrides vendus	7 420	11 010	15 350

Partie A

1. Déterminer le pourcentage d'évolution entre 2016 et 2017, puis entre 2017 et 2018.
2. Déterminer la moyenne géométrique de 1,48 et 1,39.
3. Quel est le taux annuel moyen d'évolution entre 2016 et 2018 ?

Partie B

On suppose qu'à partir de 2018, les ventes de voitures hybrides augmentent de 43 % par an et que cette évolution va se poursuivre. On modélise par la suite (u_n) l'évolution des ventes où la partie entière de u_n représente le nombre de voitures hybrides vendues au cours de l'année $(2018 + n)$.

1. Que vaut u_0 ? Calculer u_1 et u_2.
2. Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Exprimer u_n en fonction de n.
3. Selon ce modèle, combien de véhicules hybrides seront vendus en 2023 ?

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 380 et le taux ou la raison par 6. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 53 — Réactivation : fonctions exponentielles

Révisions et consolidation

13/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Réactiver les modèles exponentiels.
- Résoudre et interpréter.
- Contrôler les unités.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Réduire $3x + 7 - x + 2$. .....
2. Résoudre $10^x = 1000$. .....
3. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....
4. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
5. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les modèles exponentiels et résoudre et interpréter.

Activité de recherche

Une valeur de 18 000 augmente de 3,5 % par an. Écrire le modèle, calculer la valeur après huit ans et déterminer quand elle dépassera 25 000.



Trace écrite

Une fonction exponentielle modélise une évolution relative constante. Identifier d'abord la valeur initiale et le coefficient multiplicateur.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 48, n° 1 à 8, puis p. 54, n° 47 à 50. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 54, exercice 58

Le nombre d'adhérents à un club de basket a augmenté lors des trois dernières années de 2,5 %, puis de 4,1 %, et enfin de 3,8 %. Calculer le taux d'évolution annuel moyen.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 385 et le taux ou la raison par 7. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.

Séance 54 — Réactivation : logarithme décimal

Révisions et consolidation

18/05/2027 • B : 2 h – C : 1 h

Objectifs de la séance

- Réactiver les logarithmes.
- Résoudre une équation.
- Vérifier les conditions.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice

1. Calculer 5 % de 160.
2. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$.
3. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches.
4. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0.
5. Résoudre $10^x = 1000$.

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver les logarithmes et résoudre une équation.

Activité de recherche

Résoudre $10^x = 340$, $1{,}06^n = 2$ et $1{,}06^n \geq 2$. Pour chaque réponse, distinguer valeur réelle, valeur approchée et rang entier minimal.

Trace écrite

Le logarithme transforme une équation exponentielle en équation sur l'exposant. Conditions : base positive différente de 1, second membre positif.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 70, n° 1 à 10, puis p. 73 à 75, n° 30 à 42. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 76, exercice 43

Soit x un réel strictement positif. Le but de l'exercice est de déterminer un ordre de grandeur de x.

1. $x = 23{,}54$ et $y = 569{,}47$.
   a. L'ordre de grandeur d'un nombre est la puissance de 10 la plus proche de ce nombre. Donner l'ordre de grandeur de x et y.
   b. À l'aide de la calculatrice, déterminer $\log(x)$. Conjecturer un lien entre $\log(x)$ et l'ordre de grandeur de x. Vérifier votre conjecture avec y.
2. $x = 5{,}4517$. À l'aide de la calculatrice, déterminer l'ordre de grandeur de x et $\log(x)$. La conjecture émise à la question 1 est-elle vraie ?
3. Supposons que x soit écrit en notation scientifique : $x = a \times 10^n$ où $a \in [1; 10[$ et n est un entier relatif. Donner l'ordre de grandeur de x en fonction de la valeur de a.
4. En déduire une méthode mettant en lien l'ordre de grandeur d'un réel strictement positif et son logarithme décimal.
5. En déduire l'ordre de grandeur des deux nombres suivants : $2{,}26^{102}$ et $365{,}256^{2019}$.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 3 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 390 et le taux ou la raison par 2. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1 et 2.

Séance 55 — Réactivation : fonction inverse

Révisions et consolidation

20/05/2027 • B : 1 h – C : 2 h

Objectifs de la séance

- Réactiver la fonction inverse.
- Mener une étude.
- Tracer et interpréter.

Automatismes – 6 à 8 minutes, sans calculatrice


1. Écrire le coefficient multiplicateur d'une hausse de 10 %. .....
2. Énoncer la formule des probabilités totales avec deux branches. .....
3. Donner la formule du terme général arithmétique depuis u_0. .....
4. Résoudre $10^x = 1000$. .....
5. Dériver $x + \dfrac{4}{x}$. .....

Rappel et prérequis

Relire la dernière trace écrite et savoir effectuer les calculs élémentaires mobilisés aujourd'hui. Avant l'activité, faire reformuler les mots-clés : réactiver la fonction inverse et mener une étude.

Activité de recherche

Étudier $f(x) = x + \dfrac{16}{x}$ sur $]0, +\infty[$ et interpréter son minimum dans un contexte de coût moyen. Produire le tableau de variations et une esquisse.



Trace écrite

Pour une fonction contenant $\dfrac{1}{x}$, commencer par exclure $x = 0$, puis dériver, factoriser et étudier le signe avant les variations.

Exemple rédigé

Reprendre les données de l'activité et rédiger la solution dans l'ordre : définition des objets, propriété utilisée, calcul exact ou approché, puis phrase de réponse. La réponse modèle figure dans l'édition enseignant.

Entraînement – essentiel

1. Choisir entre suite arithmétique, suite géométrique et fonction exponentielle dans trois situations.
2. Résoudre une équation exponentielle avec un logarithme.
3. Calculer une probabilité à partir d'un arbre puis interpréter.

Repères dans le manuel

Compléments : Calao, p. 94, n° 1 à 9, puis p. 96, n° 10 à 21. L'exercice reproduit dans cette séance est identifié ci-dessous par sa page et son numéro ; la référence permet aussi de retrouver les figures et les ressources numériques du manuel.

Manuel Calao – p. 102, exercice 47

À Murano, un artisan verrier a calculé que le coût de production (en euros) de x vases est donné par : $C(x) = x^2 + 30x + 400$. Il cherche à fabriquer un nombre de vases maximal avec un coût unitaire moyen le plus faible possible.

Partie A

1. Calculer $C(0)$ et en déduire les frais fixes de l'artisan. Quel est le coût de production de 20 vases ? Pour 20 vases, calculer le coût moyen de production d'un vase.
2. On note $f(x)$ le coût unitaire moyen pour x vases fabriqués. Pour une production d'au moins un vase ($x \geqslant 1$), exprimer $f(x)$ en fonction de x.
3. On admet que le coût moyen unitaire peut s'exprimer par $f(x) = x + 30 + \dfrac{400}{x}$. Calculer $f'(x)$. Montrer que $f'(x) = \dfrac{(x-20)(x+20)}{x^2}$. Étudier le signe de $f'(x)$ et en déduire les variations de f. Combien de vases doit produire l'artisan pour que le coût moyen unitaire soit minimal ? Donner ce coût.

Travail personnel

Reprendre l'exercice d'entraînement 2 avec les données suivantes : remplacer la donnée initiale par 395 et le taux ou la raison par 3. Rédiger en quatre lignes : données, formule, calcul, conclusion.

Billet de sortie – 3 minutes

Sur une demi-feuille : écrire la règle principale de la séance, traiter un exemple très court et indiquer son degré de confiance de 1 à 4. Question(s) essentielle(s) du jour : 1, 2 et 3.