UNIVERSITE PARIS-VAL DE MARNE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE HENRI MONDOR 51 avenue du Mal de Lattre de Tassigny F. 94010 CRETEIL

SERVICE D'HEPATOLOGIE ET DE GASTRO-ENTEROLOGIE

HDJ: 01 49 81 23 66 Cadre infirmier: 01 49.81.43.59 Fax: 01 49.81.43.60

LETTRE D'INFORMATION SUR LE DEROULEMENT D'UNE PONCTION BIOPSIE HEPATIQUE

Madame, Monsieur,

Vous allez avoir prochainement une ponction-biopsie hépatique (PBH), prescrite par votre médecin.

Cet examen nécessite une hospitalisation de jour.

Il est inutile d'être à jeun.

Vous devez donc vous présenter à 7h30, au bureau des admissions au rez-de-chaussée haut pour votre inscription.

Comment se préparer.

Il ne faut pas que vous preniez de l'aspirine dans les 15 jours qui précèdent la biopsie, et au cours des 8 jours qui suivent l'examen (la liste des médicaments comprenant de l'aspirine vous a été remise).

Il est impératif que vous soyez en possession des résultats de la prise de sang (TQ, TCK, NFS, plaquettes) prescrite par le médecin et de l'échographie du foie.

• Comment se déroule la biopsie.

La ponction hépatique se fait au 13° étage après repérage échographique. Une anesthésie locale de la peau est pratiquée grâce à une aiguille sous-cutanée au niveau de votre côté droit. Une seconde anesthésie faite avec une aiguille un peu plus longue (intra-musculaire) est faite afin d'anesthésier le trajet de l'aiguille de ponction et le foie. Le matériel est à usage unique.

Vous serez insensibilisé en respirant, par l'intermédiaire d'un matériel à usage unique, un mélange de gaz et d'oxygène (Kalinox).

Après l'anesthésie, la ponction-biopsie hépatique se réalise à l'aide d'une aiguille, par aspiration. Ce geste dure environ 1 seconde et est indolore compte tenu de l'anesthésie.

Après la biopsie

Vous devez rester allongé(e) pendant 6 heures afin d'éviter une complication à type d'hématome. Un repas vous sera servi au lit.

Après l'examen, une douleur modérée, sans conséquence, à l'épaule droite, survient dans la moitié des cas. Un médicament contre la douleur vous sera donné.

Dans la semaine qui suit la biopsie, il est recommandé de ne pas prendre de médicaments modifiant la coagulation, par exemple l'Aspirine.

Durant cette semaine, vous pourrez procéder à vos occupations habituelles. Cependant il est déconseillé de faire un effort physique intense.

• Complications pouvant survenir :

Tout acte médical, investigation, exploration, même conduit dans des conditions de compétence et de sécurité conforme aux données actuelles de la science et de la réglementation en vigueur, recèle un risque de complication.

Les complications de la biopsie hépatique sont rares. Il s'agit essentiellement d'une hémorragie dont la fréquence est inférieure à 1 cas sur 1000. D'autres complications sont possibles mais restent exceptionnelles. Celles-ci peuvent être favorisées par vos antécédents médico-chirurgicaux (d'où la réalisation d'une échographie et d'un bilan de coagulation), où par la prise de certains traitements.

Ces rares complications surviennent le plus souvent dans les 6 heures qui suivent l'examen mais peuvent, exceptionnellement se révéler quelques jours après. Il est alors important de contacter le service 01 49 81 23 66 en semaine où le cadre infirmier 01 49 81 43 59 où les urgences, après 19 heures 01 49 81 44 23.

10-10-14