

## Домашка третья

1.


2. Для начала заметим, что  $(X_{n+1} = a | X_n = b)$  не зависит от  $n$  (так как эта вероятность равна  $P(\xi_{n+1} \equiv a - b)$ ), поэтому  $X_n$  будут образовывать постоянную марковскую цепь, запишем её матрицу перехода

$$P_X = \begin{pmatrix} \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} & \frac{3}{7} \\ \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} & \frac{2}{7} \\ \frac{2}{7} & \frac{3}{7} & \frac{1}{7} & \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

3. Рассмотрим координатную плоскость, где на оси  $X$  будет откладываться координату первого передатчика, а на оси  $Y$  — второго. Тогда заметим, что должны выполняться некоторые условия

1.  $\frac{1}{4} + \frac{1}{3} \geq |x - y| \geq \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{6}$ , так как зоны передатчиков не должны перекрываться больше, чем на  $\frac{1}{6}$ , иначе нам заведомо не хватит площади покрытия, и не могут стоять слишком далеко, иначе между ними будет пустое пространство (бирюзовая штриховка);
2.  $\frac{1}{4} - \frac{1}{6} \leq x \leq 1 + \frac{1}{6} - \frac{1}{4}$ , так как первый передатчик не может стоять у края, иначе снова не хватит зоны покрытия (красная штриховка);
3.  $\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \leq x \leq 1 + \frac{1}{6} - \frac{1}{3}$ , аналогично со вторым пунктом. (зелёная штриховка).

Таким образом мы получим следующую картинку:



В силу независимости выбора  $x$  и  $y$  а также равновероятности всех выборов нам достаточно просто посчитать площадь двух трапеций, которые оказались заштрихованны трижды. Упустим скучные и тривиальные

вычисления и скажем, что площадь одной трапеции равняется  $\frac{1}{24}$ , в силу симметрии тому же равняется и площадь второй трапеции, а значит вероятность того, что передатчиками будет покрыт весь отрезок составляем  $\frac{2}{24}/1 = \frac{2}{24}$ .