

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ENCÉFALO

Fase pré-contraste:

FAST-SPIN-ECHO - Cortes axiais e coronais ponderados em T2.

FAST-INVERSION-RECOVERY - Cortes axiais ponderados em T2, com supressão líquórica (FLAIR).

GRADIENT-ECHO - Cortes axiais ponderados em T2*.

SPIN-ECHO - Cortes axiais ponderados em T1.

Sequência ECHO-PLANAR de difusão B1000 T

Fase contrastada:

SPGR - aquisição volumétrica com ponderação em T1 e reconstruções multiplanares.

Aspectos observados:

Anormalidade de sinal envolvendo o tálamo e a porção adjacente do núcleo caudado à direita caracterizando hemorragia com metabólitos predominantemente subagudos, apresentando extravasamento para interior dos ventrículos laterais, III e IV ventrículos, formando níveis de fluido / debris nos cornos occipitais, com dilatação importante das primeiras cavidades, apresentando inclusive sinais de infiltrado intersticial.

Anormalidade de sinal no parênquima frontal à esquerda atribuída ao trajeto de punção ventricular.

Restante do parênquima encefálico configuração e distribuição e características de sinal habituais para a substâncias branca e cinzenta.

Sulcos da superfície cortical anatômicos.


Ausência de coleção extra-axial.

Ausência de captação anômala do agente paramagnético.

Conclusão:

Nome: **Sr(a). CECILIA MARIA ALBERGARIA SILVA**
Solicitante: Dr(a). MARLICE HALLAK MARTINS DA COSTA
Data: 16/08/2020
Atend.: 013 - 0084520

Hemorragia subaguda tálamo-caudada à direita com extravasamento ventricular e acentuada hidrocefalia obstrutiva, apresentando sinais de infiltrado intersticial.



DR. JOSE CARLOS TADEU MARTINS
CRM: 20831