

# Problemas de integración. Integración Impropia.

1. Estudiar la convergencia de la integral impropia  $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$  y calcular su valor en función de  $n$  en el caso en que sea convergente.

## Solución

Se trata de una integral impropia de primera especie.

Veamos primero que es convergente. Para ello, vamos a usar el criterio de comparación por cociente de la función a integrar  $x^n e^{-x}$  con la función  $e^{-\frac{x}{2}}$ :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n e^{-x}}{e^{-\frac{x}{2}}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^{\frac{x}{2}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{nx^{n-1}}{\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}} = 2n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{n-1}}{e^{\frac{x}{2}}} = 2^2 \cdot n \cdot (n-1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{n-2}}{e^{\frac{x}{2}}} \\ &= \dots = 2^{n-1} \cdot n! \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^{\frac{x}{2}}} = 2^n \cdot n! \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\frac{x}{2}}} = 0.\end{aligned}$$

Como la integral impropia  $\int_0^\infty e^{-\frac{x}{2}} dx$  es convergente ya que:

$$\int_0^\infty e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_0^t e^{-\frac{x}{2}} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} [-2e^{-\frac{x}{2}}]_0^t = 2 \lim_{t \rightarrow \infty} (-e^{-\frac{t}{2}} + 1) = 2 \cdot (0 + 1) = 2,$$

la integral impropia  $\int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ , usando el criterio de comparación por cociente, también lo sería.

Hallemos su valor en función de  $n$ . Si llamamos  $I_n = \int_0^\infty x^n e^{-x} dx$ , usando la técnica de integración por partes con:

$$\begin{aligned}u &= x^n, & du &= nx^{n-1} dx, \\ dv &= e^{-x}, & v &= -e^{-x},\end{aligned}$$

obtenemos:

$$I_n = \int_0^\infty x^n e^{-x} dx = [-x^n \cdot e^{-x}]_0^\infty + n \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx = n \cdot I_{n-1}.$$

En el último cálculo hemos usado que si  $n \geq 0$ ,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \cdot e^{-x} = 0,$$

ya que

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow \infty} x^n \cdot e^{-x} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{nx^{n-1}}{e^x} = n \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{n-1}}{e^x} = n \cdot (n-1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{n-2}}{e^x} \\ &= \dots = n! \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} = n! \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{e^x} = 0.\end{aligned}$$

Como  $I_n = n \cdot I_{n-1}$ , obtenemos:

$$I_n = n \cdot I_{n-1} = n \cdot (n-1) \cdot I_{n-2} = n! \cdot I_0 = n! \cdot \int_0^\infty e^{-x} dx = n! \cdot [-e^{-x}]_0^\infty = n! \cdot (0 + 1) = n!$$

2. Estudiar el carácter de las siguientes integrales impropias en función del parámetro  $\alpha$ :

- a)  $\int_a^b \frac{dx}{(x-a)^\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}, -\infty < a < b < +\infty.$
- b)  $\int_0^1 x^\alpha \ln x \, dx.$
- c)  $\int_1^2 \frac{dx}{x(\ln x)^\alpha}.$

### Solución

a) Se trataría de una integral impropia de segunda especie. Si hacemos el cambio  $t = x - a$ , la integral impropia sería en función de la variable  $t$ :

$$\int_0^{b-a} \frac{dt}{t^\alpha},$$

ya que  $dt = dx$ , y si  $x = a$ ,  $t = 0$  y si  $x = b$ ,  $t = b - a$ .

Estudiemos la convergencia de la integral impropia anterior. Consideremos dos casos:

- $\alpha \neq 1$ :

$$\int_0^{b-a} \frac{dt}{t^\alpha} = \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^{b-a} t^{-\alpha} dt = \lim_{c \rightarrow 0^+} \left[ \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_c^{b-a} = \frac{1}{1-\alpha} \left( (b-a)^{1-\alpha} - \lim_{c \rightarrow 0^+} c^{1-\alpha} \right).$$

A partir de aquí, tenemos dos nuevos casos:

- si  $1 - \alpha < 0$  o  $\alpha > 1$ ,  $\lim_{c \rightarrow 0^+} c^{1-\alpha} = \infty$  y la integral sería divergente.
- si  $1 - \alpha > 0$  o  $\alpha < 1$ ,  $\lim_{c \rightarrow 0^+} c^{1-\alpha} = 0$  y la integral sería convergente de valor

$$\int_0^{b-a} \frac{dt}{t^\alpha} = \frac{(b-a)^{1-\alpha}}{1-\alpha}.$$

- $\alpha = 1$ :

$$\int_0^{b-a} \frac{dt}{t} = \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^{b-a} t^{-1} dt = \lim_{c \rightarrow 0^+} [\ln t]_c^{b-a} = \ln(b-a) - \lim_{c \rightarrow 0^+} \ln c = \infty.$$

La integral sería divergente.

b) Consideremos dos casos:

- $\alpha \neq -1$ . Apliquemos la técnica de integración por partes con:

$$\begin{aligned} u &= \ln x, & du &= \frac{1}{x} dx, \\ dv &= x^\alpha, & v &= \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}, \end{aligned}$$

$$\int_0^1 x^\alpha \ln x \, dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^1 x^\alpha \ln x \, dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} \left[ \ln x \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_c^1 - \frac{1}{\alpha+1} \int_c^1 x^\alpha \, dx.$$

En los apuntes vimos que la integral impropia  $\int_0^1 x^\alpha \, dx$  es convergente si  $-1 < \alpha$  y, en este caso:

$$\int_0^1 x^\alpha \, dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} \int_c^1 x^\alpha \, dx = \lim_{c \rightarrow 0^+} \left[ \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_c^1 = \frac{1}{\alpha+1} \lim_{c \rightarrow 0^+} (1 - c^{\alpha+1}) = \frac{1}{\alpha+1}.$$

Para  $\alpha > -1$ , la integral inicial valdrá:

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^\alpha \ln x \, dx &= \lim_{c \rightarrow 0^+} \left[ \ln x \cdot \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_c^1 - \frac{1}{(\alpha+1)^2} = \frac{1}{\alpha+1} \left( \lim_{c \rightarrow 0^+} \ln x \cdot x^{\alpha+1} - \frac{1}{\alpha+1} \right) \\ &= \frac{1}{\alpha+1} \left( \lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-(\alpha+1)}} - \frac{1}{\alpha+1} \right) = \frac{1}{\alpha+1} \left( \lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-(\alpha+1)x^{-(\alpha+2)}} - \frac{1}{\alpha+1} \right) \\ &= \lim_{c \rightarrow 0^+} \frac{1}{-x^{-(\alpha+1)}} - \frac{1}{(\alpha+1)^2} = -\frac{1}{(\alpha+1)^2}.\end{aligned}$$

Por tanto, la integral inicial será convergente en este caso y su valor será  $-\frac{1}{(\alpha+1)^2}$ .

- $\alpha = -1$ . En este caso la integral impropia es:

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x} \, dx.$$

Para resolver la integral impropia anterior, aplicaremos el criterio de comparación por cociente usando las funciones  $\frac{\ln x}{x}$  y  $\frac{1}{x}$ . Si hacemos el límite del cociente, obtenemos:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\ln x}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty.$$

Sabemos por los apuntes que la integral impropia  $\int_0^1 \frac{1}{x} \, dx$  es divergente y usando el límite anterior, podemos afirmar que nuestra integral impropia  $\int_0^1 \frac{\ln x}{x} \, dx$  también lo es.

3. Provar que las integrales siguientes son convergentes:

$$I = \int_0^1 \frac{\ln x}{1+x^2} dx, \quad J = \int_1^\infty \frac{\ln x}{1+x^2} dx,$$

y que  $I + J = 0$ .

4. Estudiar el carácter de las siguientes integrales impropias:

a)  $\int_1^{\infty} \frac{dx}{2e^x + 1}.$

b)  $\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^4}}.$

c)  $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{\sqrt{1-\cos x}} dx.$

5. Estudiar el carácter de las siguientes integrales impropias en función del parámetro  $\alpha$ :

a)  $\int_{\alpha}^{\infty} \frac{x^{\alpha}}{x^4 - 1} dx.$

b)  $\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x^{\alpha}} dx.$

c)  $\int_1^{\infty} \sin(x^{\alpha}) dx, \alpha > 1.$

6. Explicar por qué el valor de las integrales siguientes no es correcto, estudiar su convergencia y, en el caso en que sean convergentes, hallar su valor:

$$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = -2, \quad \int_0^4 \frac{dx}{(x-1)^2} = \frac{4}{3}.$$