

Курузов Илья Задание 1

**Задача 1.**

1. Множество элементарных исходов:  $\Omega$  - все перестановки набора букв.

$$|\Omega| = 10!$$

2. Мощность интересующего нас множества событий (с учетом трех букв "А" и двух "Т") равна

$$|A| = 3! * 2!$$

$$3. \mathbb{P}(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{12}{10!}$$

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \frac{12}{10!}}$$

**Задача 2.**

1. Множество всех элементарных исходов:  $\Omega$  - множество  $n$ -мерных векторов ( $n=23$ ), в котором  $i$ -ая компонента - день рождения -  $i$ -ого ученика.

$$|\Omega| = 365^{23}$$

2. Событие  $A$  - найдется две равные компоненты в случайном векторе. Событие  $\Omega \setminus B$  - все дни рождения различны.

$$|A| = |\Omega| - |\Omega \setminus B| = |\Omega| - C_{365}^{23} * 23!$$

3.

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = 1 - \frac{365!}{342!365^{23}}}$$

**Задача 3.**

I. Шары различимы.

1. Множество всех элементарных исходов - множество  $n$ -мерных векторов, у которых на месте каждой компоненты стоит номер ящика в котором находится данный шар.

$$|\Omega| = m^n$$

2. Интересующее нас подмножество - в компонентах вектора нет первого ящика.

$$|A| = (m - 1)^n$$

$$\mathbb{P}(A) = \left( \frac{m - 1}{m} \right)^n$$

II. Шары неразличимы.

1. Множество всех элементарных исходов - все вектора, сумма компонент каждого из которых равна  $n$ . В итоге получаем, что мощность множества равна количеству способов разбить число  $n$  на  $m$  упорядоченных целых неотрицательных слагаемых:

$$|\Omega| = \binom{n + m - 1}{m - 1}$$

2. Интересующее нас подмножество - первая компонента равна нулю. Отсюда получаем

$$|A| = \binom{n + m - 2}{m - 2}$$

$$\mathbb{P}(A) = \frac{m - 1}{n + m - 1}$$

#### Задача 4.

1. Множество всех элементарных исходов  $\Omega = \{(A, B) | A, B \subset 2^N\}$ .

$$|\Omega| = 2^{2N}$$

2. Множество благоприятных исходов - такие пары, пересечение элементов которых равно пустому множеству. Построим эти пары следующим способом: выберем  $k$  элементов для  $A$  и для  $B$  будем выбирать из оставшихся. И так для всех  $k$ . Из этой идеи получаем мощность данного множества:

$$|A| = \sum_{j=0}^N C_n^j \left( \sum_{i=0}^{N-j} C_{N-j}^i \right) = \sum_{j=0}^N C_n^j 2^{N-j} = 3^N$$

$$\boxed{\mathbb{P}(A) = \left(\frac{3}{4}\right)^N}$$

### Задача 5.

1. Данное семейство не является  $\sigma$ -алгеброй. Докажу, что это семейство не замкнуто относительно счетного объединения.

Рассмотрим следующую числовую последовательность:

$$b_n = \begin{cases} 2b_{n-1} & \text{if } n \bmod 2 = 0 \\ \frac{3}{2}b_{n-1} & \text{if } n \bmod 2 \neq 0 \end{cases}$$

$$b_1 = 2$$

Далее рассмотрим подпоследовательность множеств:

$$A_n = \begin{cases} \{1 \dots \frac{3}{4}b_n\} & \text{if } n \bmod 2 = 0 \\ \{1 \dots \frac{1}{2}b_n\} & \text{if } n \bmod 2 \neq 0 \end{cases}$$

Каждый из элементов последовательности принадлежит семейству (множество конечно, а, следовательно, предел для него равен нулю).

Покажем, что  $A_{n-1} \cup A_n = A_{n+1}$ . В случае, если  $n \bmod 2 \neq 0$  это очевидно, докажем другой случай.

$$A_{n-1} \cup A_n = \{1 \dots \frac{3}{4}b_{n-1}\} \cup \{1 \dots \frac{1}{2}b_n\} = \{1 \dots \frac{3}{4}b_{n-1}\} \cup \{1 \dots \frac{3}{4}b_{n-1}\} = A_n$$

Что и требовалось доказать.

Рассмотрим числовую последовательность.

$$a_n = \frac{|\cup_{n=1}^{\infty} A_n \cap \{1 \dots b_n\}|}{b_n}$$

Видно, что для существования предела из условия для  $\cup_{n=1}^{\infty} A_n$  должен существовать предел для выше описанной последовательности.

Однако, как видим

$$a_n = \begin{cases} \frac{3}{4} & \text{if } n \bmod 2 = 0 \\ \frac{1}{2} & \text{if } n \bmod 2 \neq 0 \end{cases}$$

Откуда следует, что не существует предела последовательности  $a_n$ , а, следовательно, и предела из условия для  $\cup_{n=1}^{\infty} A_n$ .

А, значит, данное семейство не является  $\sigma$ -алгеброй, поскольку это семейство не замкнуто относительно счетного объединения.