

0.1 Второй подход, многомерная дихотомия

Рассмотрим задачу минимизации функции на гиперкубе:

$$\min_{\mathbf{x} \in Q} f(x, y),$$

где f - это выпуклая функция, $Q = [0, a]^n \subset \mathbb{R}^n, a > 0$ - гиперкуб. Здесь и далее будем считать, что стороны квадрата соориентированы параллельно осям текущей системы координат. Очевидно, что это не предположение не существенно, поскольку для любого гиперкуба существует тривиальное аффинное преобразование, приводящее его к такому виду.

Тогда рассмотрим метод многомерные дихотомии. Его основные этапы следующие:

1. Для всех осей Ox_k рассмотреть гиперкуб $Q_k = \left\{ \mathbf{x} \in Q \mid x_k = \frac{\max_{\mathbf{y} \in Q} y_k + \min_{\mathbf{y} \in Q} y_k}{2} \right\}$.
2. Решить задачу минимизации f на Q_k с точностью Δ (по функции или по аргументу) при помощи этого метода для Q_k .
3. Взять δ -субградиент в этой точке и оставить ту часть, в которую смотрит антиградиент.
4. Повторять шаги 1-3 до достижения необходимой точности.

Заметим, что когда $\dim Q = 1$, то полученное на первом шаге Q_k содержит только одну точку.

Сейчас обсудим корректность алгоритма. Здесь и далее мы будем использовать следующую нотацию. Пусть на текущем уровне рекурсии рассматривается множество Q и его некоторое сечение Q_k . Пусть $\nabla_\delta f(\mathbf{x})$ - δ -субградиент функции в точке \mathbf{x} . Тогда определим $\nabla_{\delta, \|Q_k} f(\mathbf{x})$, $\nabla_{\delta, \perp Q_k} f(\mathbf{x})$ - проекции δ субградиента на Q_k и его ортогональное дополнение в пространстве $\mathbb{R}^{\dim Q}$ соответственно.

Здесь и далее нам понадобятся стандартные понятия субдифференциала и субградиента, которые можно найти, например, в [?].

Нам понадобится следующая лемма.

Лемма 0.1. Пусть f есть непрерывно дифференцируемая выпуклая функция. Пусть на гиперкубе Q решается задача минимизации на Q_k . Если \mathbf{x}_* решение этой задачи:

$$\exists g \in \partial_Q f(\mathbf{x}_*) : g_{\parallel} = 0$$

Доказательство. Если \mathbf{x}_* есть внутренняя точка, то градиент по нефиксированным переменным равен нулю в силу того, что \mathbf{x}_* - минимум. Тогда с учетом

того, что $\nabla f(\mathbf{x}_*) \in \partial f(\mathbf{x}_*)$, получаем утверждение из теоремы.

Допустим, что \mathbf{x}_* граничная точка. Тогда множество условного субдифференциала на гиперкубе Q определяется следующим образом:

$$\partial_Q f(\mathbf{x}) = \partial f(\mathbf{x}) + N(\mathbf{x}|Q),$$

где $N(\mathbf{x}|Q) = \{\mathbf{a} | \langle \mathbf{a}, \mathbf{y} - \mathbf{x} \rangle \leq 0, \forall \mathbf{y} \in Q\}$.

В случае дифференцируемой функции имеем:

$$\partial f(\mathbf{x}_*) = \{\nabla f(\mathbf{x}_*)\},$$

Из того, что \mathbf{x}_* есть внутренняя точка, следует, что существует непустой набор координат $\{x_j\}_j$, такой что $x_j = \max_{\mathbf{y} \in Q_k} y_j$ или $x_j = \min_{\mathbf{y} \in Q_k} y_j$. Введем обозначение:

$$J_+ = \{j \in \mathbb{N} | x_j = \max_{\mathbf{y} \in Q_k} y_j\}$$

$$J_- = \{j \in \mathbb{N} | x_j = \min_{\mathbf{y} \in Q_k} y_j\}$$

В таком случае заметим, что любой вектор \mathbf{a} такой, что $a_j \geq 0, \forall j \in J_+$, $a_j \leq 0, \forall j \in J_-$ и $a_j = 0$ в противном случае, принадлежит нормальному конусу.

Также заметим, что $(\nabla f(\mathbf{x}_*))_j \leq 0, \forall j \in J_+$, $(\nabla f(\mathbf{x}_*))_j \geq 0, \forall j \in J_-$ и $(\nabla f(\mathbf{x}_*))_j = 0$. Действительно, если $(\nabla f(\mathbf{x}_*))_j > 0$ для некоторого $j \in J_+$, то существует вектор $\mathbf{x} = \mathbf{x}_* + \alpha \mathbf{e}_k \in Q$ для некоторого $\alpha < 0$ и вектора $\mathbf{e}_k^j = \delta_{kj}$, причем значение в этой функции будет $f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_*) + \alpha(\nabla f(\mathbf{x}_*))_j + o(\alpha) < f(\mathbf{x}_*)$ для достаточно малого α , что противоречит тому, что \mathbf{x}_* - решение.

Тогда выбрав \mathbf{a} , такой что $\mathbf{a}_\parallel = -(\nabla f(\mathbf{x}_*))_\parallel$, получаем субградиент из условия:

$$\mathbf{g} = \nabla f(\mathbf{x}_*) + \mathbf{a} : \mathbf{g}_\parallel = 0$$

□

Данный метод работает не для всех выпуклых функций, даже если решать задачу одномерной оптимизации точно. Пример негладкой выпуклой функции был рассмотрен в [2].

Обобщая результат из работы [2], получаем следующую оценку. Если задан гиперкуб Q и требуется минимизировать на нем функцию с точностью

ϵ , то для этого в методе достаточно решить вспомогательную задачу с точностью по аргументу

$$\Delta \leq \frac{\epsilon}{8L_f\sqrt{na}}, \quad (1)$$

где $n = \dim Q$, R - есть размер начального гиперкуба. Если f есть μ_f -сильно выпуклая функция, то используя выше написанное условие останова, получаем, что достаточно решить вспомогательную задачу с точностью $\tilde{\epsilon}$ по функции:

$$\tilde{\epsilon} \leq \frac{\mu_f \epsilon^2}{128L_f^2 na^2} \quad (2)$$

Теперь допустим, что у нас не доступен вектор $\nabla f(\mathbf{x})$, но доступно его приближение $\nu(\mathbf{x})$, такое что $\|\nabla f(\mathbf{x}) - \nu(\mathbf{x})\| \leq \tilde{\delta}$. Тогда наш метод сойдется к ϵ -решению при использовании $\nu(\mathbf{x})$ вместо точного градиента при выполнении следующего условия

$$L_f \Delta + 2\tilde{\delta} \leq \frac{\epsilon}{4L_f\sqrt{na}}. \quad (3)$$

Данный результат доказывается аналогично замечанию 1 из работы [2]. В частности:

$$\Delta \leq \frac{\epsilon}{16L_f\sqrt{na}}, \quad (4)$$

$$\tilde{\delta} \leq \frac{\epsilon}{32\sqrt{na}}, \quad (5)$$

Тогда для точности по функции решения вспомогательной задачи достаточно

$$\tilde{\epsilon} \leq \frac{\mu_f \epsilon^2}{512L_f^2 na^2}. \quad (6)$$

Данная оценка требует точности решения по функции на k -ом уровне рекурсии вспомогательной задачи порядка ϵ^{2k} . Таким образом, учитывая максимальную глубину рекурсии, равную $n-1$, получаем, что нам потребуется в худшем случае на каждом шаге алгоритма решать задачу с точностью ϵ^{2n-2} по функции.

Интуитивно понятно, что для функции с липшицевым градиентом "большая" величина ортогональной компоненты при близости к решению

не сможет сильно уменьшиться, а следовательно, изменить направление, а с другой стороны, если эта компонента малая, и решалась вспомогательная задача на многомерном параллелепипеде Q_k , то мы можем взять эту точку как решение всей задачи на Q_k . Представим стратегию, реализующую эти идеи.

Здесь и далее нам понадобится следующая простая лемма:

Лемма 0.2.

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, |a - b| \leq |b| \Rightarrow ab \geq 0$$

Доказательство. Если $b > 0$ и $a \leq b$, тогда условие из леммы эквивалентно следующему:

$$b - a \leq b \Rightarrow a \geq 0.$$

Если $b > 0$ и $a \geq b$, тогда $a \geq 0$.

Случай отрицательного b доказывается аналогично. \square

Теорема 0.1. *Функция f выпуклая с липшецевым градиентом с константой L_{xx} . Точка \mathbf{x}_* решение вспомогательной задачи оптимизации, \mathbf{x} - ее приближение, $\Delta = \|\mathbf{x}_* - \mathbf{x}\|$ есть расстояние между ними.*

Тогда если приближение удовлетворяет следующему условию:

$$\Delta \leq \frac{|f'_\perp(\mathbf{x})|}{L_{xx}},$$

то множество, выбранное на основе градиента в этой точке, содержит решение исходной задачи на квадрате.

Доказательство. Заметим, что множества выбирается правильно, если знак производной в решении вспомогательной задачи по фиксированной переменной совпадает со знаком производной в ее приближении.

Из леммы 0.2 следует, что для того чтобы совпали знаки, достаточно потребовать

$$|f'_\perp(\mathbf{x}_*) - f'_\perp(\mathbf{x})| \leq |f'_\perp(\mathbf{x})|$$

Используя липшецевость градиента получаем утверждение теоремы. \square

Описанная в теореме оценка крайне не эффективна, если модуль ортогональной компоненты стремительно убывает при приближении к точке-решению, поэтому сформулируем альтернативное условие остановки:

Теорема 0.2. Пусть f есть M_f -липшецева выпуклая с L_f -липшецевым градиентов. Пусть решается вспомогательная задача на множестве \tilde{Q} для задачи на множестве Q . Точка \mathbf{x}_* есть решение задачи оптимизации на \tilde{Q} , \mathbf{x} - ее приближение, $\Delta \geq \|\mathbf{x}_* - \mathbf{x}\|$ - верхняя оценка расстояния между ними.

Тогда для достижения точности решения ϵ на множестве Q в точке $\mathbf{x} \in \tilde{Q} \subset Q$ по функции следующего условия достаточно:

$$\Delta \leq \frac{\epsilon - R|f'_\perp(\mathbf{x})|}{L_f + M_f R},$$

где $R = a\sqrt{n}$ - это размер диагонали в исходном гиперкубе.

Доказательство. Из леммы 0.1 мы имеем:

$$g \in \partial f(\mathbf{x}_*) : g_\parallel = 0.$$

Тогда по определению субградиента:

$$f(\mathbf{x}^*) - f(\mathbf{x}_*) \geq (g, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_*)$$

Используем неравенство Коши-Буняковского-Шварца:

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_*) - f(\mathbf{x}^*) &\leq -(g, \mathbf{x}^* - \mathbf{x}_*) \leq \\ &\leq \|g\| \|\mathbf{x}^* - \mathbf{x}_*\| \leq \|g\| a\sqrt{n} \end{aligned}$$

С другой стороны, из липшецевости функции мы имеем:

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_*) \leq M_f \Delta$$

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) \leq M_f \Delta + \|g\| a\sqrt{n} = M_f \Delta + |f'_\perp(\mathbf{x}_*)| R$$

Из липшецевости градиента:

$$f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}^*) \leq M_f \Delta + (|f'_\perp(\mathbf{x})| + L_f \Delta) R$$

Тогда для достижения точности ϵ по функции в точке \mathbf{x} для исходной задачи достаточно следующего условия:

$$M_f \Delta + \|g\| a\sqrt{n} = M_f \Delta + (|f'_\perp(\mathbf{x})| + L_f \Delta) R \leq \epsilon$$

$$\Delta \leq \frac{\epsilon - R|f'_\perp(\mathbf{x})|}{M_f + L_f R}$$

□

В этой теореме подразумевается, что ϵ - есть точность задачи по функции, с которой нужно решить задачу оптимизации на Q , при условии, что мы находимся на Q_k . Т.е. это ϵ для подзадач, возникающих в подзадачах, отличается от ϵ для исходной задачи на начальном гиперкубе.

Определим нашу адаптивную стратегию. Мы решаем вспомогательную задачу оптимизации, пока не выполнено условие на точность по аргументу:

$$\Delta \leq \max \left\{ \frac{|f'_\perp(\mathbf{x})|}{L}, \frac{\epsilon - R|f'_\perp(\mathbf{x})|}{M + LR} \right\}. \quad (7)$$

Эту стратегию мы назвали **CurGrad**(Current Gradient). Заметим, что если нам доступен не сам градиент $\nabla f(\mathbf{x})$, а некоторое его приближение $\nu(\mathbf{x})$ при условии

$$\|\nabla f(\mathbf{x}) - \nu(\mathbf{x})\| \leq \tilde{\delta},$$

то условие 7 будет выполнено, если

$$\max \left(\frac{1}{L}, \frac{R}{M + LR} \right) \tilde{\delta} + \Delta \leq \max \left\{ \frac{|\nu_\perp(\mathbf{x})|}{L}, \frac{\epsilon - R|\nu_\perp(\mathbf{x})|}{M + LR} \right\},$$

или после упрощения

$$\frac{1}{L} \tilde{\delta} + \Delta \leq \max \left\{ \frac{|\nu_\perp(\mathbf{x})|}{L}, \frac{\epsilon - R|\nu_\perp(\mathbf{x})|}{M + LR} \right\}. \quad (8)$$

Таким образом, для каждой задачи оптимизации на многомерном прямоугольном параллелепипеде Q каждую вспомогательную задачу мы решаем до тех пор, пока не выполнена оценка 8. Причем, если мы остановили решение вспомогательной задачи в точке, в которой выполнено это неравенство для правой части максимума, то мы останавливаем решение на множестве Q .

Для того, чтобы знаки $f'_\perp(\mathbf{x})$ и $\nu_\perp(\mathbf{x})$ совпадали, достаточно потребовать, чтобы $\tilde{\delta} \leq |\nu_\perp(\mathbf{x})|$. Если мы не остановили наш метод после выполнения условия 8, то

$$\frac{|\nu_\perp(\mathbf{x})|}{L} \geq \frac{\epsilon - R|\nu_\perp(\mathbf{x})|}{M + LR}$$

$$|\nu_{\perp}(\mathbf{x})| \geq \frac{L}{M + 2LR}\epsilon.$$

Таким образом, если у нас есть итеративный метод, который генерирует $\nu_k(\mathbf{x}) : \|\nu_k(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})\| \rightarrow_{k \rightarrow \infty} 0$, то условие $C\delta \leq |\nu(\mathbf{x})|$ будет выполнено за конечное число итераций. Если же это не выполнено, то мы можем посчитать $\nu(\mathbf{x})$ согласно оценке ??.

Откуда взять условие $\|\nu_k(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})\| \leq \tilde{\delta}$? Пусть $\nu(\mathbf{x})$ есть δ -субградиент для функции f в точке \mathbf{x} . Пользуясь тем, что $f(\mathbf{x}) = S(\mathbf{x}, \mathbf{y}(\mathbf{x}))$ и тем, что для такой задачи $\nabla_x S(\mathbf{x}, \mathbf{y}_{\delta})$, где \mathbf{y}_{δ} есть решение задачи $\max_{\mathbf{y}} S(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ с точностью δ по функции, есть δ -субградиент. При этом в силу липшецевости S .

$$\|\nabla_{\delta} f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})\| \leq L_{yy} \|\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}_{\delta}\|$$

Таким образом, для того, чтобы правильно определить оставшееся множество, достаточно выполнения неравенства 8 и неравенства

$$L_{yy} \|\mathbf{y}(\mathbf{x}) - \mathbf{y}_{\delta}\| \leq |(\nabla_{\delta} f(\mathbf{x}))_{\perp}|. \quad (9)$$

Выше обозначенный способ требует сходимости внутренней задачи по аргументу. Однако если $S(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ - μ_y -сильно выпукла по \mathbf{y} , то эти условия можно заменить на условия сходимости по функции. С другой стороны, если $\rho(\mathbf{x}, \partial Q) \geq \sqrt{\frac{\delta}{2L_f}}$, то мы имеем из ?? следующее неравенство:

$$\|\nabla_{\delta} f(\mathbf{x}) - \nabla f(\mathbf{x})\| \leq \sqrt{\frac{L_f \delta}{2}}. \quad (10)$$

Приведем оценку сходимости для нашего метода.

Теорема 0.3. *Если функция f выпуклая и -липшецева, тогда для достижения ϵ по функции следующего количества итераций достаточно:*

$$N = \left\lceil \log_2 \frac{\sqrt{n}Ma}{\epsilon} \right\rceil \quad (11)$$

где a размер исходного квадрата Q .

References

- [1] Gasnikov A. Universal gradient descent // MIPT — 2018, 240 p.
- [2] Pasechnykh D.A., Stonyakin F.S. One method for minimization of a convex Lipschitz continuous function of two variables on a fixed square // arXiv.org e-Print archive. 2018. — URL: <https://arxiv.org/pdf/1812.10300.pdf>
- [3] Nesterov U.E. Methods of convex optimization // M.MCNMO — 2010, 262 p.
- [4] Anaconda[site]. At available: <https://www.anaconda.com>
- [5] Danskin, J.M.: The theory of Max-Min, with applications. J. SIAM Appl. Math.14(4) (1966)
- [6] Fedor S. Stonyakin, Mohammad S. Alkousa, Alexander A. Titov, and Victoria V. Piskunova1 On Some Methods for Strongly Convex Optimization Problems with One Functional Constraint // ...
- [7] Olivier Devolder Exactness, Inexactness and Stochasticity in First-Order Methods for Large-Scale Convex Optimization // UCL — 2013,
- [8] Need Reference To Book with Inexact Ellipsoids
- [9] B.T. Polyak. The Introduction to Optimization // Moscow, Science - 1983
- [10] Repository with code: <https://github.com/ASEDOS999/Optimization-Halving-The-Square>