

**Nota 2 bis**      *Nota eliminata dal 24/2/2001 (S.O. n.4 alla G.U. n.7 del 10/01/2001)*

*Classe B: limitatamente alle indicazioni: "calcolosi colesterinica."*

*La calcolosi colesterinica potenzialmente trattabile con acidi biliari è caratterizzata da calcoli singoli o multipli (diametro  $\leq 1$  cm) radiotrasparenti, pazienti non obesi con sintomatologia modesta (coliche non molto frequenti o severe). Altra indicazione è la presenza in colecisti di frammenti di calcoli post-litotripsia.*

*Principio attivo: acido ursodesossicolico*

*Specialità: Audec 20cps 300mg; Audec 225 20cps 225mg; Audec 450 20cps 450mg; Bilepar 20 cps 150mg; Bilepar 20 cps 300mg; Coledos 20cps 300mg; Coledos 30cps 300mg; Desocol 20 cps 300mg; Desoxil 20 cpr 150mg; Desoxil 20 cpr 300mg; Desoxil RC 20 cpr 450mg; Deursil 20 cps 150mg; Deursil 20 cps 300mg; Deursil RR 20 cps 450mg; Deursil RR Mite 20 cps 225mg; Fraurs 150 20 cps 150mg; Fraurs 300 20 cps 300mg; Galmax 300 20 cpr 480mg; Galmax 20cpr 240; Lentorsil 20 cps 450mg; Litoff 20 cpr 300mg; Litoff 20cpr 450mg; Litoff 20 cpr Ril.Con.450mg; Litursol 20 cpr 150mg; Litursol 20 cpr 300mg; Litursol Retard 20 cps 450mg; Urdes 20 cpr 150mg; Urdes 20 cpr 300mg; Urdes CD 20 cpr 225mg; Urdes CD 20 cpr 450mg; Ursacol 20 cpr 150mg; Ursacol 20 cpr 300mg; Ursacol 10cpr 300mg; Ursacol 30cpr 300mg; Ursacol 40cpr 150mg; Ursilon 20 cps 250mg; Ursilon 20cps 300mg; Ursilon Retard 20 cps 225mg; Ursilon Retard 20 cps 450mg; Ursobil 20 cps 250mg; Ursobil 20cps 150mg; Ursobil HT 20cps 225mg; Ursobil HT 20 cps 450mg; Ursobil gtt 20ml; Ursobil scir. 200ml; Ursodamor 20 cpr 150mg; Ursodamor 20 cpr 300mg; Ursodiol 20 cps 300mg; Ursodiol Retard 20 cps 225mg; Ursodiol Retard 20 cps 450mg; Ursofalk 20 cps 150mg; Ursofalk 20 cps 300mg; Ursofalk 450 SR 20 cps 450mg; Ursoflor 20 cps 150mg; Ursoflor 20 cps 300mg; Ursoflor R 20 cpr 450; Ursogarant 20cpr 240mg; Ursogarant 20cpr 480mg; Ursolac 300 20 cps 300mg; Ursolac Retard 20 cps 225mg; Ursolac Retard 20 cps 450mg; Ursolisin 20 cps 150mg; Ursolisin 20 cps 300mg; Urson 20 cpr 240mg; Urson 20 cpr 480mg; Ursoproge 20 cps 300mg.*

*Principio attivo: sale di magnesio triidrato dell'acido chenodesossicolico e ursodesossicolico.*

*Specialità: Bilenor 30cps 250mg; Litobile 30cps 250mg.*

*Principio attivo: acido tauroursodesossicolico.*

*Specialità: Tudcabil 20cps 150mg; Tudcabil 20cps 250mg.; Tauro 20 cps 250 mg, Tauro Mite 20 cps 150 mg.*

*Nella colelitiasi, la terapia con sali biliari ottiene la dissoluzione dei calcoli solo in una parte dei pazienti, variabile in relazione a fattori diversi (dimensioni dei calcoli, funzionalità della colecisti, etc.), è seguita frequentemente dalla formazione di nuovi calcoli (50-60% a 5 anni) (4), non trova indicazione nei pazienti con coliche ravvicinate o severe; infine, l'alternativa chirurgica, laparoscopica o con minilaparotomia, è risolutiva e a basso rischio. Per tutte queste ragioni, questa indicazione dei sali biliari è classificata in fascia B. Si è ritenuto opportuno limitare l'uso dei sali biliari ai pazienti con caratteristiche definite "ottimali" per la dissoluzione dei calcoli, che raggiunge in questi casi percentuali fra il 48% (5) e il 60% (4). Tali caratteristiche, presenti in circa il 15% dei pazienti (4), sono quelle riportate nella nota*

*Bibliografia:*

1. Strasberg SM & al. Cholecystolithiasis: lithotherapy for the 90s. Hepatology 1992; 16:820-39.

2. May GR & al. *Efficacy of bile acid for gallstone dissolution a meta-analysis of randomized trials. Aliment Pharmacol Ther* 1993; 7:139-48.