

Nota 69 *Nota eliminata dal 24/2/2001 (S.O. n.4 alla G.U. n.7 del 12/01/2001)*

Classe A: limitatamente al trattamento per 2-4 settimane dell'ulcera peptica Helicobacter pylori positiva in associazione con altri farmaci eradicanti.

Principio attivo: ranitidina+bismuto citrato.

Specialità: Elicodil 28cpr 400mg; Pylorid 28cpr 400mg.

La ranitidina-bismuto citrato associa l'effetto antisecretorio dell'H2-antagonista con quello antibatterico nei confronti dell'Helicobacter pylori (HP) del bismuto, tuttavia non sufficiente da solo per l'eradicazione. La sua efficacia nell'ulcera peptica HP-positiva è ben documentata. La tolleranza è generalmente eccellente. Colora le feci in nero, e questo può suscitare allarme se falsamente interpretato come melena. E' controindicato nei soggetti con ridotta clearance renale (minore 25 ml/min), valore non eccezionale negli anziani, nei quali va perciò somministrato con cautela. Nell'impiegare il farmaco bisogna tener presente che esso:

- non è efficace da solo per il doppio obiettivo di guarigione dell'ulcera e di eradicazione dell'HP, finalità che richiede l'associazione con uno o due antibiotici;*
- non è indicato nelle dispepsie, nel reflusso gastroesofageo e nelle rare ulcere HP-negative, condizioni nelle quali non c'è ragione di somministrazione di bismuto;*
- non deve essere usato per trattamenti prolungati oltre le 8 settimane. Una recente nota della Medecines Control Agency Comunitaria raccomanda di non superare due cicli di 8 settimane in un anno.*