



ریاضی عمومی ۲

تهیه و تدوین:

دکتر داریوش کیانی، دکتر سارا سعیدی مدنی، دکتر امیر ساکی

نیم سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

انتگرال روی خم (یا انتگرال خط)

Kiani-Saeedi Madani-Saki

تعریف انتگرال روی خم

فرض کنید که $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ یک تابع کران‌دار، و $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ یک نمایش پارامتری قطعه‌به‌قطعه هموار از خم C است. فرض کنید که $\text{Im}(\gamma) = C \subseteq D$. افراز P از $[a, b]$ را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$P = \{a = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = b\}$$

به ازای هر $1 \leq i \leq n$ ، طول قطعه‌ای از تصویر γ که بین $\gamma(t_{i-1})$ و $\gamma(t_i)$ قرار می‌گیرد را با Δs_i نمایش می‌دهیم، و فرض می‌کنیم که $t_i^* \in [t_{i-1}, t_i]$. حال، مجموع زیر را در نظر می‌گیریم:


$$R(P, f) = \sum_{i=1}^n f(\gamma(t_i^*)) \Delta s_i$$

فرض کنید که:

$$\|P\| = \max\{\Delta s_i : 1 \leq i \leq n\}$$

اگر $\lim_{\|P\| \rightarrow 0} R(P, f)$ موجود باشد، آنگاه مقدار این حد را با $\int_C f ds$ نمایش می‌دهیم، و به آن **انتگرال تابع f روی خم C** گوئیم.

شهود انتگرال روی خم



مطابق با شکل، اگر خم C به موازات صفحه‌ی xy باشد، آنگاه $\int_C f ds$ برابر است با مساحت دیواره‌ی ایجادشده روی خم C .

توجه:

انتگرال یک تابع دو متغیره روی یک خم در صفحه، به طور مشابه تعریف می شود.

توجه:

انتگرال روی خم $\int_C f ds$ را در صورتی که خم C بسته باشد، با نماد $\oint_C f ds$ نیز نمایش می دهیم.

کاربردی از انتگرال روی خم

فرض کنید که تصویر منحنی $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ یک سیم C و $\rho : \text{Im}(\gamma) \rightarrow \mathbb{R}$ تابع چگالی این سیم باشد؛ یعنی به ازای هر $(x, y, z) \in \text{Im}(\gamma)$ ، عدد $\rho(x, y, z)$ برابر است با چگالی سیم در نقطه‌ی (x, y, z) از سیم. در این صورت، داریم:

$$\text{جرم سیم} = m = \int_C \rho \, ds$$

به منظور توضیحات بیشتر، توجه کنید که:

چنانچه توزیع جرم در سیم یک نواخت باشد، آنگاه نسبت جرم به طول سیم برابر با چگالی سیم تعریف می‌شود. در حالت کلی، اگر توزیع جرم در سیم لزوماً یک نواخت نباشد، المان‌های کوچکی از سیم در نظر گرفته می‌شود که در آن‌ها توزیع جرم تقریباً یکسان است. بنابراین، در نزدیکی یک نقطه‌ی $\gamma(t^*) = (x, y, z)$ از سیم داریم:

$$dm = \rho(\gamma(t^*))ds \implies m = \int_C dm = \int_C \rho \, ds$$

قرارداد:

* از این پس، وقتی می‌گوییم خم C قطعه به قطعه هموار است، یعنی یک نمایش پارامتری قطعه به قطعه هموار دارد. همچنین، در ادامه همه‌ی نمایش‌های پارامتری که برای یک خم قطعه به قطعه هموار در نظر گرفته می‌شوند، قطعه به قطعه هموار هستند (بدون اینکه لزوماً این لفظ آورده شود).

قضیه

فرض کنید که $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ یک تابع کران دار، و $\gamma : [a, b] \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ یک نمایش پارامتری از خم C است، طوری که $C \subseteq D$. اگر $\int_C f ds$ موجود باشد، آنگاه داریم:

$$\int_C f ds = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| dt$$

* قضیه‌ی بالا در حالت \mathbb{R}^2 نیز برقرار است؛ یعنی حالتی که $f : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ یک تابع کران دار و γ یک خم در صفحه است.

قضیه

فرض کنید که C یک خم است، و $f, g : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ توابعی هستند که انتگرال هر یک از آنها روی خم C موجود است.

۱. $\int_C f \, ds$ به نمایش پارامتری در نظر گرفته شده برای C بستگی ندارد؛ یعنی اگر $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ و $\eta : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}^3$ دو نمایش پارامتری از C باشند، آنگاه داریم:

$$\int_C f \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) |\gamma'(t)| \, dt = \int_c^d f(\eta(t)) |\eta'(t)| \, dt$$

۲. داریم:

$$\int_C ds = \text{طول } C$$

۳. به ازای هر $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ ، انتگرال $c_1 f + c_2 g$ روی خم C وجود دارد، و داریم:

$$\int_C (c_1 f + c_2 g) \, ds = c_1 \int_C f \, ds + c_2 \int_C g \, ds$$

ادامه‌ی قضیه

۴. داریم:

$$\left| \int_C f \, ds \right| \leq \int_C |f| \, ds$$

۵. اگر به ازای هر $(x, y, z) \in C$ ، داشته باشیم $f(x, y, z) \leq g(x, y, z)$ ، آنگاه داریم:

$$\int_C f \, ds \leq \int_C g \, ds$$

۶. اگر $M = \max\{f(x, y, z) : (x, y, z) \in C\}$ ، آنگاه داریم:

$$\int_C f \, ds \leq M \times (\text{طول } C)$$

ادامه‌ی قضیه

۷. فرض کنید که C یک خم با نمایش پارامتری $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ است. هم‌چنین، فرض کنید که افراز P از $[a, b]$ به صورت زیر وجود دارد:

$$P = \{a = t_0, t_1, \dots, t_{n-1}, t_n = b\}$$


که به‌ازای هر $1 \leq i \leq n$ ، منحنی $\gamma_i : [t_{i-1}, t_i] \rightarrow \mathbb{R}^3$ چنان موجود است که:

$$C_i := \text{Im}(\gamma_i) = \text{Im}(\gamma|_{[t_{i-1}, t_i]})$$

حال، فرض کنید که $f : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ یک تابع است با $C \subseteq D$. در این صورت، انتگرال f روی C موجود است، اگر و تنها اگر به‌ازای هر $1 \leq i \leq n$ ، انتگرال f روی C_i موجود باشد، و در این صورت، داریم:

$$\int_C f \, ds = \sum_{i=1}^n \int_{C_i} f \, ds$$

ادامه‌ی قضیه




$$C = \bigcup_{i=1}^n C_i$$

مثال


فرض کنید که $a > 0$ و C نیم‌دایره‌ی بالایی $x^2 + y^2 = a^2$ است. دو نمایش پارامتری زیر را برای C در نظر بگیرید، و سپس با استفاده از هر دوی این نمایش‌ها، مساحت دیواره‌ی ساخته‌شده روی خم C به وسیله‌ی تابع $f(x, y) = y$ را محاسبه کنید.

$$\begin{cases} \gamma_1(t) = (a \cos(t), a \sin(t)), & 0 \leq t \leq \pi \\ \gamma_2(t) = (t, \sqrt{a^2 - t^2}), & -a \leq t \leq a \end{cases}$$

پاسخ:



ادامه‌ی مثال



دیواره‌ی بناشده روی خم C به وسیله‌ی تابع $f(x, y) = y$

ادامه‌ی مثال

داریم:

$$\gamma_1'(t) = (-a \sin(t), a \cos(t)) \implies |\gamma_1'(t)| = a$$

$$\gamma_2'(t) = \left(1, -\frac{t}{\sqrt{a^2 - t^2}}\right) \implies |\gamma_2'(t)| = \sqrt{1 + \frac{t^2}{a^2 - t^2}} = \frac{a}{\sqrt{a^2 - t^2}}$$

بنابراین، می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} \int_0^\pi f(\gamma_1(t)) |\gamma_1'(t)| dt &= \int_0^\pi a f(a \cos(t), a \sin(t)) dt \\ &= \int_0^\pi a^2 \sin(t) dt = a^2 (-\cos(t)) \Big|_{t=0}^{t=\pi} = 2a^2 \end{aligned}$$

هم‌چنین، داریم:

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(\gamma_2(t)) |\gamma_2'(t)| dt &= \int_{-a}^a f\left(t, \sqrt{a^2 - t^2}\right) \frac{a}{\sqrt{a^2 - t^2}} dt \\ &= \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - t^2} \frac{a}{\sqrt{a^2 - t^2}} dt = a \int_{-a}^a dt = 2a^2 \end{aligned}$$


میدانهای برداری

هر تابع به صورت $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ یک **میدان برداری** نامیده می‌شود. بنابراین، یک تابع برداری F روی \mathbb{R}^n ، به هر بردار (x_1, \dots, x_n) از دامنه‌اش، برداری به صورت زیر نسبت می‌دهد:

$$F(x_1, \dots, x_n) = (F_{(1)}(x_1, \dots, x_n), \dots, F_{(n)}(x_1, \dots, x_n))$$


ترسیم میدان‌های برداری

میدان‌های برداری روی \mathbb{R}^2 و \mathbb{R}^3 را می‌توان به ترتیب در صفحه و فضا نمایش داد. فرض کنید که $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ یک میدان برداری است. در این صورت، منظور از ترسیم میدان برداری F ، نمایش بردارهایی در صفحه است که از بعضی نقاط (x, y) از دامنه F ، به موازات بردار مکان $F(x, y)$ ترسیم می‌شوند. نمایش میدان‌های برداری روی \mathbb{R}^3 نیز مشابه است.




استفاده از دایره‌های هم‌مرکز به منظور نمایش میدان‌های برداری روی \mathbb{R}^2

فرض کنید که $F : D \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ یک میدان برداری است. در این صورت، به منظور ترسیم F ، می‌توانیم چند دایره‌ی هم‌مرکز با مرکز مبدأ را در صفحه مشخص کنیم، و مانند صفحه‌ی قبل، بردار F را به‌ازای تعدادی نقطه روی هر یک از این دایره‌ها مشخص کنیم. در چند مثالی که جلوتر می‌آیند، بردارهایی که با موازات بردار مکان F رسم می‌کنیم، دقیقاً هم‌اندازه با F هستند.



مثال

میدان برداری $F(x, y) = (-y, x)$ را رسم کنید.
پاسخ:



Kia

aki

توجه:

فرض کنید که $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ یک تابع اسکالر است. در این صورت، ∇f یک میدان برداری است. در واقع، داریم:


$$\nabla f : E \rightarrow E, \quad \nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)$$

که در آن E درون D است.

مثال

فرض کنید که $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{2}$. میدان برداری ∇f را ترسیم کنید.


پاسخ: داریم $\nabla f(x, y) = (x, y)$. بنابراین، شکل زیر را داریم:



مثال

فرض کنید که $f(x, y) = -\frac{x^2+y^2}{2}$. میدان برداری ∇f را ترسیم کنید.


پاسخ: داریم $\nabla f(x, y) = (-x, -y)$. بنابراین، شکل زیر را داریم (انتهای همه‌ی بردارها مبدأ است):



مثال


فرض کنید که $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{2}$. میدان برداری ∇f را ترسیم کنید.

پاسخ: داریم $\nabla f(x, y) = (x, -y)$. بنابراین، شکل زیر را داریم:




توجه: گاهی به منظور نمایش بهتر تغییرات بردارهای ترسیم‌شده‌ی یک میدان برداری، یک مقیاس در نظر می‌گیرند، و طول همه‌ی بردارهای ترسیم‌شده را در آن مقیاس ضرب می‌کنند، و سپس بردار را ترسیم می‌کنند. در ادامه، میدان‌های برداری مثال‌های قبل با مقیاس 0.25 ترسیم شده‌اند.


Kiani-Saeedi-Madani-Saki




میدان برداری $F(x, y) = (x, y)$ با مقیاس 0.25



میدان برداری $F(x, y) = (x, -y)$ با مقیاس 0.25




میدان برداری $F(x, y) = (-x, -y)$ با مقیاس 0.25




میدان برداری $F(x, y) = (-y, x)$ با مقیاس 0.25

توجه:


علاوه بر در نظر گرفتن یک مقیاس به منظور ترسیم یک میدان برداری، می‌توان تعداد دایره‌های هم‌مرکز و تعداد بردارهای نمایش داده‌شده روی هر دایره را افزایش داد تا تغییرات میدان برداری بهتر دیده شود. در چند صفحه‌ای که در ادامه می‌آیند، مثال‌هایی از میدان برداری که قبل‌تر ترسیم شدند، این بار با در نظر گرفتن تعداد دایره‌های هم‌مرکز بیش‌تری و تعداد بردارهای بیش‌تری روی هر دایره، ترسیم می‌شوند.




میدان برداری $F(x, y) = (x, y)$ با مقیاس 0.25



میدان برداری $F(x, y) = (x, -y)$ با مقیاس 0.25



میدان برداری $F(x, y) = (-x, -y)$ با مقیاس 0.25



میدان برداری $F(x, y) = (-y, x)$ با مقیاس 0.25

میدان‌های برداری پایستار

فرض کنید که $U \subseteq \mathbb{R}^n$ باز است. در این صورت، میدان برداری $F : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ را **پایستار** گوئیم، هرگاه تابع اسکالر $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ وجود داشته باشد که $\nabla \phi = F$. در این صورت، تابع ϕ را **تابع پتانسیل** F می‌گوئیم.

مثال

میدان‌های برداری

$$F(x, y) = (x, y), \quad G(x, y) = (-x, -y), \quad H(x, y) = (x, -y)$$

همان‌طور که در مثال‌های قبل دیدیم، همگی پایستار هستند.

قضیه (شرط لازم پایداری)

فرض کنید که $F : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ یک میدان برداری پایدار است، طوری که $F = (F_{(1)}, \dots, F_{(n)})$ ، و به ازای هر $1 \leq i \leq n$ ، مشتقات جزئی اول پیوسته دارد. در این صورت، داریم:

$$\forall 1 \leq i, j \leq n \quad \frac{\partial F_{(i)}}{\partial x_j} = \frac{\partial F_{(j)}}{\partial x_i}$$

* در حالت دوبعدی، فرض کنید که $F : U \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ یک میدان برداری پایدار است، طوری که $F = (P, Q)$ ، و توابع اسکالر P و Q مشتقات جزئی اول پیوسته دارند. در این صورت، داریم:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$



* در حالت سه بعدی، فرض کنید که $F : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ یک میدان برداری پایستار است، طوری که $F = (P, Q, R)$ ، و توابع اسکالر P ، Q و R مشتقات جزئی اول پیوسته دارند. در این صورت، داریم:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, \quad \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x}, \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y}$$



مثال

تابع $F(x, y) = (-y, x)$ پایستار نیست؛ زیرا داریم:


$$P(x, y) = -y, \quad Q(x, y) = x \implies \frac{\partial P}{\partial y} = -1 \neq 1 = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

توجه:

شرط لازم یادشده در قضیه‌ی اخیر درباره‌ی پایداری میدان‌های برداری، شرط کافی نیست؛ اما اگر دامنه‌ی میدان برداری مورد بحث هم‌بند باشد و **حفره** نداشته باشد، آنگاه شرط لازم یادشده شرط کافی نیز خواهد بود.




نمونه‌هایی از یک ناحیه‌ی هم‌بند فاقد حفره، و یک ناحیه‌ی هم‌بند دارای حفره



چنبره، به عنوان یک ناحیه‌ی دارای حفره در \mathbb{R}^3

انتگرال میدان‌های برداری در امتداد خم‌ها

فرض کنید که $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ یک میدان برداری و C یک خم است، و $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ یک نمایش پارامتری از C است، و داریم $\text{Im}(r) = C \subseteq \mathbb{R}^n$. همچنین، فرض کنید که به ازای هر $t \in [a, b]$ ، بردار یکه‌ی مماس بر C در نقطه‌ی $r(t)$ است. در این صورت، **انتگرال F در امتداد خم C** برابر با انتگرال روی خم C به ازای تابع تصویر F روی T تعریف می‌شود؛ یعنی انتگرال $\int_C F \cdot T ds$ را داریم.



فرض کنید که به یک ذره نیروی ثابتی وارد می‌شود، و بر اثر این نیروی ثابت، ذره مسافتی را روی خط راست می‌پیماید. در این صورت، داریم:

(بردار تغییر مکان ذره) \cdot (نیروی وارد شده) = کار انجام شده به وسیله نیروی وارد شده

حال، فرض کنید که نیروی وارد بر ذره در هر نقطه‌ای (x, y, z) از فضای \mathbb{R}^3 تابعی از (x, y, z) است، و همچنین مسیر حرکت ذره روی یک خم است. بنابراین، می‌توان فرض کرد که نیروی وارد بر ذره یک میدان برداری $F : D \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ است، و بر اثر این نیرو، ذره روی خمی مثل C حرکت می‌کند. فرض کنید که $r : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ یک نمایش پارامتری برای خم C با متغیر زمان است. در این صورت، وقتی که ذره تغییر مکان کوچک dr را می‌دهد، می‌توان فرض کرد که حرکت ذره روی خط راست است. بنابراین، اگر dw کار انجام شده به وسیله نیروی F در این تغییر مکان باشد، آنگاه داریم:

$$dw = F \cdot dr$$

توجه کنید که $dr = r' dt$. بنابراین، داریم:

$$\begin{aligned} dw &= F \cdot (r' dt) = F \cdot (|r'| T dt) \\ &= F \cdot \left(\frac{ds}{dt} T dt \right) = (F \cdot T) ds \\ &= |F| \underbrace{|T|}_{1} \cos(\theta) = |F| \cos(\theta) \end{aligned}$$

که در آن θ زاویه‌ی بین T و F است. بنابراین، داریم:

$$w = \int_C dw = \int_C F \cdot dr = \int_C F \cdot T ds = \int_C |F| \cos(\theta) ds$$

فرض کنید که $r(t) = (x(t), y(t), z(t))$. پس، داریم $dr = (dx, dy, dz)$. حال، اگر $F = (P, Q, R)$ ، آنگاه داریم:

$$\int_C F \cdot T ds = \int_C F \cdot dr = \int_C P dx + Q dy + R dz$$

مثال

فرض کنید که $F = (y^2, 2xy)$ و C خمی با نقطه‌ی ابتدایی $(0, 0)$ و نقطه‌ی انتهایی $(1, 1)$ است. انتگرال $\int_C F \cdot dr$ را در هر یک از حالت‌های زیر بیابید:

۱. خم C در امتداد $y = x$ است.
۲. خم C در امتداد $y = x^2$ است.
۳. خم C متشکل از پاره‌خط واصل $(0, 0)$ به $(0, 1)$ ، و پاره‌خط واصل $(0, 1)$ به $(1, 1)$ است.

به‌علاوه، اگر C' خمی از $(1, 1)$ به $(0, 0)$ و در امتداد $y = x$ باشد، آنگاه $\int_{C'} F \cdot dr$ را بیابید.

ادامه‌ی مثال


پاسخ ۱:

نمایش پارامتری زیر را برای C در نظر می‌گیریم:

$$r(t) = (x(t), y(t)) = (t, t), \\ 0 \leq t \leq 1$$

پس، داریم:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot dr &= \int_C P dx + \int_C Q dy = \int_C y^2 dx + \int_C 2xy dy \\ &= \int_0^1 y(t)^2 x'(t) dt + \int_0^1 2x(t)y(t)y'(t) dt \\ &= \int_0^1 (t^2 + 2t^2) dt = \int_0^1 (3t^2) dt = (t^3) \Big|_{t=0}^{t=1} = 1 \end{aligned}$$



ادامه‌ی مثال

پاسخ ۲:

نمایش پارامتری زیر را برای C در نظر می‌گیریم:


$$r(t) = (t, t^2), \quad 0 \leq t \leq 1$$

پس، داریم:

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot dr &= \int_C P dx + \int_C Q dy = \int_C y^2 dx + \int_C 2xy dy \\ &= \int_0^1 y(t)^2 x'(t) dt + \int_0^1 2x(t)y(t)y'(t) dt \\ &= \int_0^1 (t^4 + 2t^3(2t)) dt = \int_0^1 5t^4 dt = (t^5) \Big|_{t=0}^{t=1} = 1 \end{aligned}$$

ادامه‌ی مثال

پاسخ ۳:



داریم $C = C_1 \cup C_2$. نمایش‌های پارامتری زیر را برای C_2 و C_1 در نظر می‌گیریم:

$$C_1 : r_1(t) = (0, t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2 : r_2(t) = (t, 1), \quad 0 \leq t \leq 1$$

پس، داریم:

$$\int_C F \cdot dr = \int_{C_1} F \cdot dr + \int_{C_2} F \cdot dr$$

ادامه‌ی مثال

حال، داریم:

$$\begin{aligned}\int_{C_1} F \cdot dr &= \int_{C_1} P dx + \int_{C_1} Q dy \\ &= \int_{C_1} y^2 \underbrace{dx}_0 + \int_{C_1} 2 \underbrace{x}_0 y dy = 0 + 0 = 0\end{aligned}$$

هم‌چنین، داریم:

$$\begin{aligned}\int_{C_2} F \cdot dr &= \int_{C_2} P dx + \int_{C_2} Q dy \\ &= \int_{C_2} y^2 dx + \int_{C_2} 2xy \underbrace{dy}_0 = \int_0^1 y(t)^2 x'(t) dt = \int_0^1 dt = 1\end{aligned}$$

پس، در این حالت نیز داریم $\int_C F \cdot dr = 1$.


ادامه‌ی مثال

پاسخ «به علاوه ...»:

نمایش پارامتری زیر را برای C' در نظر می‌گیریم:

$$r(t) = (1 - t, 1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

پس، داریم:



$$\begin{aligned} \int_{C'} F \cdot dr &= \int_{C'} P dx + \int_{C'} Q dy = \int_{C'} y^2 dx + \int_{C'} 2xy dy \\ &= \int_0^1 y(t)^2 x'(t) dt + \int_0^1 2x(t)y(t)y'(t) dt \\ &= \int_0^1 (-(1-t)^2 - 2(1-t)^2) dt \\ &= \int_0^1 -3(1-t)^2 dt = \left. ((1-t)^3) \right|_{t=0}^{t=1} = -1 \end{aligned}$$

توجه:

در مثال قبل، خم C در قسمت (۱) و خم C' هر دو در امتداد $y = x$ اما در خلاف جهت هم بودند، و دیدیم که انتگرال‌های $\int_C F \cdot dr$ و $\int_{C'} F \cdot dr$ قرینه شدند. در حالت کلی، اگر C یک خم در \mathbb{R}^2 یا \mathbb{R}^3 باشد و $-C$ همان C باشد اما در خلاف جهت آن، آنگاه داریم:

$$\int_{-C} F \cdot dr = - \int_C F \cdot dr$$

توابع اسکالر هموار و میدان‌های برداری هموار

* تابع اسکالر $f : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ را هموار گوئیم، هرگاه مشتقات جزئی اول f موجود و پیوسته باشند.

* میدان برداری $F : D \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ را هموار گوئیم، هرگاه با فرض

$$F = (F_{(1)}, \dots, F_{(n)})$$

به‌ازای هر $1 \leq i \leq n$ ، تابع اسکالر $F_{(i)} : D \rightarrow \mathbb{R}$ هموار باشد.

قضیه

فرض کنید که U یک ناحیه‌ی همبند و باز در \mathbb{R}^2 یا \mathbb{R}^3 است، و F یک میدان برداری هموار بر U است. در این صورت، گزاره‌های زیر معادل هستند:

۱. F روی U پایستار است.

۲. به ازای هر خم بسته‌ی C در U ، داریم $\oint_C F \cdot dr = 0$.

۳. به ازای هر دو نقطه‌ی P_0 و P_1 در U ، انتگرال $\int_C F \cdot dr$ به ازای همه‌ی خم‌های C در U از P_0 به P_1 ، مقدار یکسانی دارد (یعنی این انتگرال فقط به نقاط ابتدایی و انتهایی C بستگی دارد).

تعمیم قضیه‌ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

با شرایط قضیه‌ی قبل، اگر F پایستار باشد، یعنی تابع اسکالر ϕ وجود داشته باشد که $\nabla\phi = F$ ، آنگاه داریم:

$$\int_C F \cdot dr = \int_C \nabla\phi \cdot dr = \phi(P_1) - \phi(P_0)$$

که در آن C یک خم از P_0 به P_1 است. به خصوص، اگر C بسته باشد (یعنی $P_0 = P_1$)، آنگاه داریم:

$$\oint_C F \cdot dr = 0$$

مثال

فرض کنید که

$$D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z \neq 0\}$$

و میدان برداری $F : D \rightarrow \mathbb{R}^3$ به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F(x, y, z) = \left(xy - \sin(z), \frac{x^2}{2} - \frac{e^y}{z}, \frac{e^y}{z^2} - x \cos(z) \right)$$

هم‌چنین، فرض کنید که C خمی با نمایش پارامتری زیر است:

$$r(t) = \left(e^{\sin(t) + \cos(t)}, 2^{\sin(t) \cos^2(t)}, 1 + t \right), \quad 0 \leq t \leq \pi$$

مقدار انتگرال $\int_C F \cdot dr$ را بیابید.

ادامه‌ی مثال

توجه کنید که C کاملاً بالای صفحه‌ی xy قرار دارد. بنابراین، می‌توانیم دامنه‌ی F را به ناحیه‌ی زیر محدود کنیم:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\}$$

نشان می‌دهیم که F پایستار است. واضح است که U یک ناحیه‌ی باز و هم‌بند است، و شامل هیچ حفره‌ای نیست. به‌علاوه، F تابعی هموار روی D است. همچنین، داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = x \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = -\cos(z) \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{e^y}{z^2} \end{cases}$$

بنابراین، F پایستار است. پس، تابع اسکالر $\phi : U \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد که $\nabla \phi = F$ داریم:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = (P, Q, R)$$

مثال

بنابراین، داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = xy - \sin(z) & (1) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{x^2}{2} - \frac{e^y}{z} & (2) \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{e^y}{z^2} - x \cos(z) & (3) \end{cases}$$

حال، از دو طرف رابطه‌ی (1) به صورت زیر بر حسب x انتگرال می‌گیریم:

$$\phi = \int (xy - \sin(z)) dx = \frac{x^2 y}{2} - x \sin(z) + g(y, z)$$

سپس، از دو طرف رابطه‌ی بالا به صورت زیر نسبت به y مشتق جزئی می‌گیریم:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{x^2}{2} + \frac{\partial g}{\partial y}$$

از مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا و رابطه‌ی (2)، داریم:

$$\frac{x^2}{2} + \frac{\partial g}{\partial y} = \frac{x^2}{2} - \frac{e^y}{z}$$

مثال

که نتیجه می‌دهد:

$$\frac{\partial g}{\partial y} = -\frac{e^y}{z}$$

از دو طرف رابطه‌ی بالا به صورت زیر نسبت به y انتگرال می‌گیریم:

$$g(y, z) = \int -\frac{e^y}{z} dy = -\frac{e^y}{z} + h(z)$$

بنابراین، داریم:

$$\phi = \frac{x^2 y}{2} - x \sin(z) - \frac{e^y}{z} + h(z)$$

سپس، از دو طرف رابطه‌ی بالا به صورت زیر نسبت به z مشتق جزئی می‌گیریم:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = -x \cos(z) + \frac{e^y}{z^2} + h'(z)$$

از مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا و رابطه‌ی (3)، داریم:

$$-x \cos(z) + \frac{e^y}{z^2} + h'(z) = \frac{e^y}{z^2} - x \cos(z)$$

مثال

بنابراین، داریم $h'(z) = 0$ ، پس عدد ثابت $c \in \mathbb{R}$ وجود دارد که $h(z) = c$. در نهایت، نشان دادیم که F پایستار است، و داریم:


$$F = \nabla \phi, \quad \phi(x, y, z) = \frac{x^2 y}{2} - x \sin(z) - \frac{e^y}{z} + c$$

در نهایت، بنابر تعمیم قضیه‌ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، داریم:


$$\int_C F \cdot dr = \phi(r(\pi)) - \phi(r(0)) = \phi(e^{-1}, 1, 1 + \pi) - \phi(e, 1, 1)$$

جهت‌گذاری مثبت مرز یک ناحیه در صفحه نسبت به آن ناحیه

فرض کنید که D ناحیه‌ای در صفحه و C مرز آن است. می‌گوییم C دارای جهت‌گذاری مثبت نسبت به D است، هرگاه وقتی روی C و در جهت C حرکت می‌کنیم، ناحیه D در سمت چپ ما قرار بگیرد.



خم C با جهت‌گذاری مثبت نسبت
به D



خم $C = C_1 \cup C_2$ با جهت‌گذاری
مثبت نسبت به D

قضیه‌ی گرین

فرض کنید که D ناحیه‌ای بسته و منتظم در \mathbb{R}^2 است با مرز C متشکل از یک یا چند خم قطعه‌به‌قطعه هموار که خودشان را قطع نمی‌کنند. اگر جهت‌گذاری C نسبت به D مثبت باشد، و $F = (P, Q)$ یک میدان برداری هموار روی D باشد، آنگاه داریم:


$$\oint_C F \cdot dr = \oint_C Pdx + Qdy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y}$$

مثال

فرض کنید که C دایره‌ی یکی با جهت مثلثاتی است. انتگرال زیر را حساب کنید:

$$\oint_C (7y + \sin(x^{100})) dx + \left(4x - \sqrt[100]{27 + y^2}\right) dy$$

پاسخ: فرض کنید که D دیسک یکه‌ی بسته است. در این صورت، C مرز D است، و جهت مثلثاتی برای C نسبت به D جهت‌گذاری مثبت است.



ادامه‌ی مثال

قرار می‌دهیم:

$$F = (P, Q) = (7y + \sin(x^{100}), 4x - \sqrt[100]{27 + y^2})$$

در این صورت، F یک میدان برداری هموار روی D است. پس، بنابر قضیه‌ی گرین داریم:

$$\oint_C (7y + \sin(x^{100})) dx + (4x - \sqrt[100]{27 + y^2}) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y}$$

داریم:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 4, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 7$$

بنابراین، داریم:

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y} = \iint_D (4 - 7) dA_{x,y} = -3 \times (\text{مساحت } D)$$


بنابراین، انتگرال داده‌شده برابر است با -3π .

مثال

فرض کنید که C مربعی با رئوس $(0, 0)$ ، $(2, 0)$ ، $(0, 2)$ و $(2, 2)$ ، و در جهت مثلثاتی است. انتگرال زیر را حساب کنید:

$$\oint_C \left(2xy + e^{\cos(x^2)} \right) dx + \left(4x^2 + e^{\sin(y^2)} \right) dy$$

پاسخ: فرض کنید که D ناحیه‌ی مربعی بسته با رئوس بالا است. در این صورت، C مرز D است، و جهت مثلثاتی برای C نسبت به D جهت‌گذاری مثبت است.



مطابق با شکل، C اجتماع چهار پاره‌خط است.

ادامه‌ی مثال

قرار می‌دهیم:

$$F = (P, Q) = (2xy + e^{\cos(x^2)}, 4x^2 + e^{\sin(y^2)})$$

در این صورت، F یک میدان برداری هموار روی D است. پس، بنابر قضیه‌ی گرین داریم:

$$\oint_C (2xy + e^{\cos(x^2)}) dx + (4x^2 + e^{\sin(y^2)}) dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y}$$

داریم:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 8x, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 2x$$

بنابراین، داریم:

$$\begin{aligned} \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y} &= \iint_D (8x - 2x) dA_{x,y} = \int_0^2 \int_0^2 6x dx dy \\ &= 2 (3x^2) \Big|_{x=0}^{x=2} = 24 \end{aligned}$$

کاربرد قضیه‌ی گرین در محاسبه‌ی مساحت

فرض کنید که D ناحیه‌ای بسته و منتظم در صفحه است، و C مرز D است، که به طور مثبت نسبت به D جهت‌گذاری شده است. در این صورت، اگر میدان برداری $F = (P, Q)$ را روی D چنان در نظر بگیریم که

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 1$$

آن‌گاه بنابر قضیه‌ی گرین داریم:

$$\text{مساحت } D = \iint_D dA_{x,y} = \oint_C P dx + Q dy$$

به طور مثال، میدان‌های برداری زیر در شرط بالا صدق می‌کنند:


$$F(x, y) = (0, x), \quad F(x, y) = (-y, 0), \quad F(x, y) = \left(-\frac{y}{2}, \frac{x}{2}\right)$$

مثال

مساحت محدود به بیضی $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ را بیابید.

پاسخ: فرض کنید که C بیضی داده شده، و D ناحیه‌ی محدود شده به C است. خم C را با جهت‌گذاری مثبت نسبت به D در نظر بگیرید. اگر $F(x, y) = (P, Q) = (0, x)$ ، آنگاه بنابر کاربرد قضیه‌ی گرین در محاسبه‌ی مساحت داریم:

$$\text{مساحت } D = \oint_C P dx + Q dy = \oint_C x dy$$



ادامه‌ی مثال

نمایش پارامتری زیر را برای C در نظر بگیرید:

$$r(t) = (x(t), y(t)) = (a \cos(t), b \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

در این صورت، داریم:


$$\begin{aligned} \text{مساحت } D &= \int_0^{2\pi} x(t)y'(t) dt = \int_0^{2\pi} (a \cos(t))(b \cos(t)) dt \\ &= ab \int_0^{2\pi} \frac{1 + \cos(2t)}{2} dt = ab \left(\frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right) \Big|_{t=0}^{t=2\pi} = \pi ab \end{aligned}$$

مثال

مساحت محدود به خم r به معادله‌ی زیر و محور x را بیابید.

$$r : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad r(t) = (t - \sin(t), 1 - \cos(t))$$

پاسخ: فرض کنید که \mathcal{C}_1 تصویر r ، و D ناحیه‌ی محدودشده به \mathcal{C}_1 و محور x است.




ادامه‌ی مثال

اگر $F(x, y) = (P, Q) = (-y, 0)$ ، آنگاه بنابر کاربرد قضیه‌ی گرین در محاسبه‌ی مساحت داریم:

$$\text{مساحت } D = \oint_C Pdx + Qdy = - \oint_C y dx$$

که در آن C خمی است که با اضافه کردن پاره‌خط واصل $(0, 0)$ به $(2\pi, 0)$ به دنبال $-C_1$ ، به دست می‌آید.



ادامه‌ی مثال

به منظور استفاده از قضیه‌ی گرین، باید خمی که روی آن انتگرال می‌گیریم، بسته باشد. از این‌رو خم C_2 را به دنبال $-C_1$ اضافه کردیم تا خم بسته‌ی C به‌دست آید. توجه کنید که خم C نسبت به D جهت‌گذاری مثبت دارد. نمایش پارامتری زیر را برای C_2 در نظر می‌گیریم:

$$r_2(t) = (t, 0), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

در این صورت، داریم:

$$D \text{ مساحت} = - \oint_{-C_1} y \, dx - \oint_{C_2} \underbrace{y}_0 \, dx = \oint_{C_1} y \, dx$$

در حالی‌که:

$$\begin{aligned} \oint_{C_1} y \, dx &= \int_0^{2\pi} y(t) x'(t) \, dt = \int_0^{2\pi} (1 - \cos(t))^2 \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos(t) + \cos^2(t)) \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos(t) + \frac{1 + \cos(2t)}{2} \right) \, dt \end{aligned}$$

ادامه‌ی مثال

بنابراین، داریم:


$$\oint_{C_1} y \, dx = \left(t - 2 \sin(t) + \frac{t}{2} + \frac{\sin(2t)}{4} \right) \Big|_{t=0}^{t=2\pi} = 3\pi$$

در نهایت، داریم:

$$D \text{ مساحت} = 3\pi$$

مثال

فرض کنید که C خم بسته‌ی زیر است.



$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$$

مقدار انتگرال زیر را بیابید:

$$I = \oint_C \left(\frac{1}{3}y^3 + e^{\cos(x^2)} \right) dx + (x^4 + y^2x + 3y)dy$$

ادامه‌ی مثال

پاسخ: فرض کنید که D ناحیه‌ی محصورشده به وسیله‌ی خم C است. واضح است که C نسبت به D دارای جهت‌گذاری مثبت است. اگر

$$F = (P, Q) = \left(\frac{1}{3}y^3 + e^{\cos(x^2)}, x^4 + y^2x + 3y \right)$$

آنگاه F تابعی هموار روی D است. پس، بنابر قضیه‌ی گرین داریم:

$$I = \oint_C F \cdot dr = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y}$$


اما داریم:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 4x^3 + y^2, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = y^2$$

پس، داریم:

$$I = \iint_D (4x^3 + y^2 - y^2) dA_{x,y} = \iint_D 4x^3 dA_{x,y}$$

ادامه‌ی مثال



مطابق با شکل، D مجموعه‌ی همه‌ی نقاط $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ است که:

$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq \sqrt[4]{1-x^4}$$


بنابراین، داریم:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^{\sqrt[4]{1-x^4}} 4x^3 dy dx = \int_0^1 4x^3 \sqrt[4]{1-x^4} dx \\ &= \left(-\frac{4}{5} \sqrt[4]{(1-x^4)^5} \right) \Big|_{x=0}^{x=1} = \frac{4}{5} \end{aligned}$$

در ادامه، یک سؤال تستی آورده می‌شود که از مثال قبل استخراج شده است.

Kiani-Saeedi Madani-Saki

مثال



فرض کنید که D ناحیه‌ی محصور به خم C مطابق شکل مقابل است. کدام گزینه توصیف ناحیه‌ی D است؟

$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3$$

۱. $0 \leq x \leq 1$ و $0 \leq y \leq 1$

۲. $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ و $0 \leq y \leq \sqrt[4]{1-x^4}$

۳. $0 \leq x \leq 1$ و $0 \leq y \leq \sqrt[4]{1-x^4}$

۴. $0 \leq x \leq \sqrt[4]{1-y^4}$ و $0 \leq y \leq \sqrt[4]{1-x^4}$



مثال‌های تکمیلی

Kiani-Saeedi Madani-Saki


مثال

فرض کنید که $a > 0$. مساحت جانبی ناحیه‌ی محصور به دو استوانه‌ی $x^2 + y^2 = a^2$ و $x^2 + z^2 = a^2$ را بیابید.

پاسخ:




ادامه‌ی مثال



فرض کنید که S سطح جانبی ناحیه‌ی محصور به دو استوانه‌ی داده‌شده است. مطابق با شکل، می‌توان S را به دو ناحیه‌ی S_1 و S_2 تقسیم کرد، طوری که S_1 و S_2 دیواره‌هایی نباشد بر خم‌های به‌ترتیب $x^2 + y^2 = a^2$ (در صفحه‌ی xy) و $x^2 + z^2 = a^2$ (در صفحه‌ی xz) هستند.

ادامه‌ی مثال



ابتدا مساحت S_1 را محاسبه می‌کنیم.
 مطابق با شکل، طولی که در نقطه‌ی
 (x, y, z) بر دایره‌ی $x^2 + y^2 = a^2$
 بناشده است، برابر است با:

$$f(x, y, z) = 2\sqrt{a^2 - x^2}$$

زیرا این طول فاصله‌ی بین دو نقطه‌ی
 برخورد دو استوانه‌ی داده‌شده است، و با
 توجه به اینکه این فاصله قائم است، برابر
 است با تفاضل مقادیر z در نقاط برخورد.
 بنابراین، داریم:

$$f(x, y, z) = \sqrt{a^2 - x^2} - \left(-\sqrt{a^2 - x^2}\right) = 2\sqrt{a^2 - x^2}$$

ادامه‌ی مثال

بنابراین، داریم:

$$S_1 = \text{مساحت} = \int_{x^2+y^2=a^2} f(x, y, z) \, ds$$

حال، نمایش پارامتری زیر را از دایره‌ی $x^2 + y^2 = a^2$ در نظر می‌گیریم:

$$\gamma(t) = (a \cos(t), a \sin(t), 0), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

در این صورت، داریم:

$$\gamma'(t) = (-a \sin(t), a \cos(t), 0) \implies |\gamma'(t)| = a$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned} S_1 = \text{مساحت} &= \int_0^{2\pi} f(a \cos(t), a \sin(t), 0) |\gamma'(t)| \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2a \sqrt{a^2 - a^2 \cos^2(t)} \, dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} |\sin(t)| \, dt \end{aligned}$$

ادامه‌ی مثال


توجه کنید که:

$$\begin{aligned}\int_0^{2\pi} |\sin(t)| dt &= \int_0^{\pi} \sin(t) dt + \int_{\pi}^{2\pi} -\sin(t) dt \\ &= (-\cos(t)) \Big|_{t=0}^{t=\pi} + (\cos(t)) \Big|_{t=\pi}^{t=2\pi} \\ &= 2 + 2 = 4\end{aligned}$$

در نتیجه، داریم:

$$S_1 = 8a^2$$

ادامه‌ی مثال



حال، مساحت S_2 را محاسبه می‌کنیم.

مطابق با شکل، طولی که در نقطه‌ی

(x, y, z) بر دایره‌ی $x^2 + z^2 = a^2$

بناشده است، برابر است با:

$$g(x, y, z) = 2\sqrt{a^2 - x^2}$$

زیرا این طول فاصله‌ی بین دو نقطه‌ی

برخورد دو استوانه‌ی داده‌شده است، و با

توجه به اینکه این فاصله صرفاً در راستای

محور y است، برابر است با تفاضل مقادیر

y در نقاط برخورد. بنابراین، داریم:

$$g(x, y, z) = \sqrt{a^2 - x^2} - \left(-\sqrt{a^2 - x^2}\right) = 2\sqrt{a^2 - x^2}$$

ادامه‌ی مثال

بنابراین، داریم:

$$S_2 \text{ مساحت} = \int_{x^2+z^2=a^2} g(x, y, z) \, ds$$

حال، نمایش پارامتری زیر را از دایره‌ی $x^2 + z^2 = a^2$ در نظر می‌گیریم:

$$\eta(t) = (a \cos(t), 0, a \sin(t)), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

در این صورت، داریم:

$$\eta'(t) = (-a \sin(t), 0, a \cos(t)) \implies |\eta'(t)| = a$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\begin{aligned} S_2 \text{ مساحت} &= \int_0^{2\pi} g(a \cos(t), 0, a \sin(t), 0) |\eta'(t)| \, dt \\ &= \int_0^{2\pi} 2a \sqrt{a^2 - a^2 \cos^2(t)} \, dt = 2a^2 \int_0^{2\pi} |\sin(t)| \, dt = 8a^2 \end{aligned}$$

ادامه‌ی مثال

در نهایت، داریم:

$$S = S_1 + S_2 = 8a^2 + 8a^2 = 16a^2$$

مثال

فرض کنید که C یک خم با یک نمایش پارامتری به صورت زیر است:

$$r(t) = (e^{t^2 + \sin(t)}, \pi(1-t)e^{\sin(t)}, (1-t)e^{\sin(t^2)}), \quad 0 \leq t \leq 1$$

همچنین، فرض کنید که میدان برداری F به صورت زیر روی \mathbb{R}^3 تعریف می‌شود:

$$F(x, y, z) = (yz, xz - z \sin(yz), xy - y \sin(yz))$$

مقدار $\int_C F \cdot T \, ds$ را بیابید.

پاسخ: نشان می‌دهیم که F پایستار است. واضح است که F تابعی هموار روی \mathbb{R}^3 است. همچنین، داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = z \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = y \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} = x - \sin(yz) - zy \sin(yz) \end{cases}$$

بنابراین، F پایستار است. پس، تابع اسکالر $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد که $\nabla \phi = F$.

ادامه‌ی مثال

داریم:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = (P, Q, R)$$

بنابراین، داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = yz & (1) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = xz - z \sin(yz) & (2) \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = xy - y \sin(yz) & (3) \end{cases}$$

حال، از دو طرف رابطه‌ی (1) به صورت زیر بر حسب x انتگرال می‌گیریم:

$$\phi = \int yz \, dx = xyz + g(y, z)$$

سپس، از دو طرف رابطه‌ی قبل به صورت زیر نسبت به y مشتق جزئی می‌گیریم:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = xz + \frac{\partial g}{\partial y}$$

ادامه‌ی مثال

از مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا و رابطه‌ی (2)، داریم:

$$xz + \frac{\partial g}{\partial y} = xz - z \sin(yz)$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\frac{\partial g}{\partial y} = -z \sin(yz)$$

با انتگرال‌گیری نسبت به y از تساوی بالا، داریم:

$$g(y, z) = \cos(yz) + h(z)$$

بنابراین، داریم:

$$\phi = xyz + \cos(yz) + h(z)$$

سپس، از دو طرف رابطه‌ی قبل به صورت زیر نسبت به z مشتق جزئی می‌گیریم:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = xy - y \sin(yz) + h'(z)$$

ادامه‌ی مثال

از مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا و رابطه‌ی (3)، داریم:

$$xy - y \sin(yz) + h'(z) = xy - y \sin(yz)$$

پس، داریم $h'(z) = 0$. لذا عدد ثابت $c \in \mathbb{R}$ وجود دارد که $h(z) = c$. از این رو، داریم:

$$\phi = xyz + \cos(yz) + c$$

حال، بنابر تعمیم قضیه‌ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال می‌توان نوشت:

$$\int_c F \cdot T ds = \int_c F \cdot dr = \phi(r(1)) - \phi(r(0))$$

توجه کنید که:

$$r(0) = (1, \pi, 1), \quad r(1) = (e^{1+\sin(1)}, 0, 0)$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\int_c F \cdot T ds = \phi(e^{1+\sin(1)}, 0, 0) - \phi(1, \pi, 1) = 1 - (\pi - 1) = 2 - \pi$$

در ادامه، دو سؤال تستی آورده می‌شوند که از مثال قبل استخراج شده‌اند.

Kiani-Saeedi Madani-Saki

مثال

فرض کنید که C یک خم با یک نمایش پارامتری به صورت زیر است:

$$r(t) = (e^{t^2 + \sin(t)}, \pi(1-t)e^{\sin(t)}, (1-t)e^{\sin(t^2)}), \quad 0 \leq t \leq 1$$

همچنین، فرض کنید که میدان برداری F به صورت زیر روی \mathbb{R}^3 تعریف می‌شود:

$$F(x, y, z) = (yz, xz - z \sin(yz), xy - y \sin(yz))$$

مقدار $\int_C F \cdot T \, ds$ کدام است؟

۱. 0

۲. $1 - \pi$

۳. $2 - \pi$

۴. $3 - \pi$

مثال

فرض کنید که میدان برداری F به صورت زیر روی \mathbb{R}^3 تعریف می‌شود:

$$F(x, y, z) = (yz, xz - z \sin(yz), xy - y \sin(yz))$$

در این صورت، کدام گزینه نادرست است؟

۱. $\int_{C_1} F \cdot dr = 0$ ، که در آن C_1 خم $x^2 + 3y^2 = 1$ است.

۲. $\int_{C_2} F \cdot dr = \pi$ ، که در آن C_2 خم $x^4 + y^4 = 1$ است.

۳. $\int_{C_3} F \cdot dr = 0$ ، که در آن C_3 خم $x^2 + y^2 = 4$ است.

۴. F پایستار است.

مثال


فرض کنید که C یک خم و r یک نمایش پارامتری C به صورت زیر است:

$$r : [0, \pi] \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad r(t) = (3 \cos(t), 4 \sin(t))$$

انتگرال زیر را حساب کنید:

$$I = \int_C \left(e^{2x} - y - \frac{1}{2} \sin(2y) \right) dx + (e^{2y} + 2x \sin^2(y)) dy$$

پاسخ: فرض کنید D ناحیه‌ی محدودشده به C و محور x است.



داریم $x = 3 \cos(t)$ و $y = 4 \sin(t)$

که نتیجه می‌دهد $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$.


بنابراین، D مجموعه‌ی همگی نقاط

$(x, y) \in \mathbb{R}^2$ است که:

$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} \leq 1, \quad y \geq 0$$

ادامه‌ی مثال

از قضیه‌ی گرین استفاده می‌کنیم. بنابراین، باید خمی که روی آن انتگرال می‌گیریم، بسته باشد. از این‌رو خم C' را به دنبال C اضافه می‌کنیم تا خم بسته‌ی C'' به‌دست آید. توجه کنید که خم C'' مرز D است، و نسبت به D جهت‌گذاری مثبت دارد.



$$C'' = C \cup C'$$

داریم:

$$F(x, y) = (P, Q) = (e^{2x} - y - \frac{1}{2} \sin(2y), e^{2y} + 2x \sin^2(y))$$

ادامه‌ی مثال

بنابر قضیه‌ی گرین داریم:

$$\oint_{C''} F \cdot dr = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y}$$

در حالی‌که:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2 \sin^2(y), \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -1 - \cos(2y)$$

و

$$\oint_{C''} F \cdot dr = \int_C F \cdot dr + \int_{C'} F \cdot dr = I + \int_{C'} F \cdot dr$$

از این رو، داریم:

$$\begin{aligned} I &= - \int_{C'} F \cdot dr + \iint_D (2 \sin^2(y) + 1 + \cos(2y)) dA_{x,y} \\ &= - \int_{C'} F \cdot dr + 2 \iint_D dA_{x,y} = - \int_{C'} F \cdot dr + 2 \frac{(3)(4)\pi}{2} \end{aligned}$$

ادامه‌ی مثال

بنابراین، کافی است که $\int_{C'} F \cdot dr$ را بیابیم. نمایش پارامتری زیر را برای C' در نظر می‌گیریم:

$$r_1(t) = (t, 0), \quad -3 \leq t \leq 3$$

لذا، داریم:

$$\begin{aligned} \int_{C'} F \cdot dr &= \int_{C'} P dx + Q \underbrace{dy}_0 = \int_{-3}^3 P(x(t), y(t)) x'(t) dt \\ &= \int_0^1 e^{2x(t)} x'(t) dt = \int_{-3}^3 e^{2t} dt = \left(\frac{e^{2t}}{2} \right) \Big|_{t=-3}^{t=3} \\ &= \frac{e^6 - e^{-6}}{2} \end{aligned}$$

در نهایت، داریم:

$$I = - \int_{C'} F \cdot dr + 12\pi = - \frac{e^6 - e^{-6}}{2} + 12\pi$$

یادآوری:

یک نمایش پارامتری برای یک پاره خط با نقطه‌ی ابتدایی A و نقطه‌ی انتهای B در \mathbb{R}^n ،
به صورت زیر است:

$$r(t) = A + (B - A)t, \quad 0 \leq t \leq 1$$

مثال

فرض کنید که میدان برداری F به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$F(x, y, z) = (yz \cos(xz) - e^z \sin(x), \sin(xz), xy \cos(xz) + e^z \cos(x))$$

۱. مطلوب است تابع اسکالر ϕ که $\nabla \phi = F$.

۲. فرض کنید که میدان برداری G به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$G(x, y, z) = (y + yz \cos(xz) - e^z \sin(x), \sin(xz), x + xy \cos(xz) + e^z \cos(x))$$

مقدار انتگرال $\int_C G \cdot dr$ را بیابید، که در آن C خمی است متشکل از دو پاره‌خط جهت‌دار، اولی از نقطه‌ی $A = (1, 1, 1)$ به نقطه‌ی $B = (1, -1, 1)$ ، و دومی از نقطه‌ی $B = (1, -1, 1)$ به نقطه‌ی $C = (1, 0, 0)$.

ادامه‌ی مثال

پاسخ ۱: نشان می‌دهیم که F پایستار است. واضح است که F تابعی هموار روی \mathbb{R}^3 است. هم‌چنین، داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = z \cos(xz) \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = -xyz \sin(xz) - e^z \sin(x) \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} = x \cos(xz) \end{cases}$$

بنابراین، F پایستار است. پس، تابع اسکالر $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ وجود دارد که $\nabla \phi = F$ داریم:

$$\left(\frac{\partial \phi}{\partial x}, \frac{\partial \phi}{\partial y}, \frac{\partial \phi}{\partial z} \right) = (P, Q, R)$$

بنابراین، داریم:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = yz \cos(xz) - e^z \sin(x) & (1) \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = \sin(xz) & (2) \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = xy \cos(xz) + e^z \cos(x) & (3) \end{cases}$$

ادامه‌ی مثال

حال، از دو طرف رابطه‌ی (1) به صورت زیر بر حسب x انتگرال می‌گیریم:

$$\phi = \int (yz \cos(xz) - e^z \sin(x)) dx = y \sin(xz) + e^z \cos(x) + g(y, z)$$

سپس، از دو طرف رابطه‌ی قبل به صورت زیر نسبت به y مشتق جزئی می‌گیریم:

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \sin(xz) + \frac{\partial g}{\partial y}$$

از مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا و رابطه‌ی (2)، داریم:

$$\sin(xz) + \frac{\partial g}{\partial y} = \sin(xz)$$

که نتیجه می‌دهد:

$$\frac{\partial g}{\partial y} = 0 \implies g(y, z) = h(z)$$

بنابراین، داریم:

$$\phi = y \sin(xz) + e^z \cos(x) + h(z)$$

ادامه‌ی مثال

سپس، از دو طرف رابطه‌ی قبل به صورت زیر نسبت به z مشتق جزئی می‌گیریم:

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = xy \cos(xz) + e^z \cos(x) + h'(z)$$

از مقایسه‌ی رابطه‌ی بالا و رابطه‌ی (3)، داریم:

$$xy \cos(xz) + e^z \cos(x) + h'(z) = xy \cos(xz) + e^z \cos(x)$$


بنابراین، داریم $h'(z) = 0$. پس عدد ثابت $c \in \mathbb{R}$ وجود دارد که $h(z) = c$. بنابراین، داریم:

$$\phi = y \sin(xz) + e^z \cos(x) + c$$

پاسخ ۲: توجه می‌کنیم که $G(x, y, z) = F(x, y, z) + (y, 0, x)$. پس، داریم:

$$\int_C G \cdot dr = \int_C F \cdot dr + \int_C (y, 0, x) \cdot dr$$

ادامه‌ی مثال



حال، بنابر تعمیم قضیه‌ی اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال می‌توان نوشت:

$$\int_C F \cdot dr = \phi(C) - \phi(A) = (1 - e) \cos(1) - \sin(1)$$

بنابراین، کافی است که $I = \int_C (y, 0, x) \cdot dr$ را بیابیم.

ادامه‌ی مثال

با توجه به اینکه $C = C_1 \cup C_2$ ، داریم:

$$I = \int_{C_1} (y, 0, x) \cdot dr + \int_{C_2} (y, 0, x) \cdot dr$$

نمایش‌های پارامتری زیر را از C_1 و C_2 در نظر می‌گیریم:

$$C_1 : \quad r_1(t) = A + (B - A)t = (1, -2t + 1, 1), \quad 0 \leq t \leq 1$$

$$C_2 : \quad r_2(t) = B + (C - B)t = (1, t - 1, 1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1$$

بنابراین، داریم:

$$\int_{C_1} (y, 0, x) \cdot dr = \int_{C_1} y \underbrace{dx}_0 + \int_{C_1} x \underbrace{dz}_0 = 0$$

$$\begin{aligned} \int_{C_2} (y, 0, x) \cdot dr &= \int_{C_2} y \underbrace{dx}_0 + \int_{C_2} x dz \\ &= \int_0^1 -1 dt = (-t) \Big|_{t=0}^{t=1} = -1 \end{aligned}$$

ادامه‌ی مثال

در نهایت، داریم $I = -1$ ، و از این رو:


$$\int_C G \cdot dr = (1 - e) \cos(1) - \sin(1) - 1$$

مثال

فرض کنید $D \subseteq \mathbb{R}^2$ یک ناحیه‌ی بسته و منتظم در صفحه است، و C مرز قطعه به قطعه هموار ناحیه‌ی D است، طوری که C از مبدأ نمی‌گذرد و دارای جهت‌گذاری مثبت نسبت به D است. اگر E درون D باشد، نشان دهید:

$$I = \oint_C \left(-\frac{y}{x^2 + y^2} \right) dx + \left(\frac{x}{x^2 + y^2} \right) dy = \begin{cases} 0 & , (0,0) \notin E \\ 2\pi & , (0,0) \in E \end{cases}$$

پاسخ:



فرض کنید $F : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2$ با

$$F(x, y) = \left(-\frac{y}{x^2 + y^2}, \frac{x}{x^2 + y^2} \right)$$

حالت اول: $(0,0) \notin E$

در این صورت، D زیرمجموعه‌ی دامنه‌ی

F است، و F یک میدان برداری هموار

است.

ادامه‌ی مثال

هم‌چنین، داریم:

$$P = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

در حالی‌که:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$$


پس، بنابر قضیه‌ی گرین داریم:

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA_{x,y} = 0$$

ادامه‌ی مثال

حالت دوم: $(0, 0) \in E$.

تابع F در مبدأ تعریف نشده است، پس روی D هموار نیست. از این رو، نمی‌توان مستقیماً از قضیه‌ی گرین استفاده کرد. توجه کنید که $(0, 0)$ یک نقطه‌ی درونی D است، و از این رو، $\epsilon > 0$ وجود دارد که دیسک بسته با شعاع ϵ و مرکز مبدأ نیز کاملاً در D قرار می‌گیرد.




مطابق با شکل، داریم $D = D_1 \cup D_2$ ، و $C \cup C'$ و $-C'$ به ترتیب مرزهای D_1 و D_2 با جهت‌گذاری‌های مثبت نسبت به D_1 و D_2 هستند. با توجه به اینکه $(0, 0) \notin D_1$ ، بنابر حالت اول داریم:

$$\int_{C \cup C'} F \cdot dr = 0$$

ادامه‌ی مثال

داریم:

$$I = \int_C F \cdot dr = \underbrace{\int_{C \cup C'} F \cdot dr}_0 + \int_{-C'} F \cdot dr = \int_{-C'} F \cdot dr = \int_{-C'} P dx + Q dy$$



نمایش پارامتری $r_1 : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}^2$ را
برای $-C'$ به صورت در نظر می‌گیریم:

$$r_1(t) = (\underbrace{\epsilon \cos(t)}_{x(t)}, \underbrace{\epsilon \sin(t)}_{y(t)})$$

بنابراین، داریم:

$$I = \int_0^{2\pi} (P(r_1(t))x'(t) + Q(r_1(t))y'(t)) dt$$

ادامه‌ی مثال

پس، می‌توان نوشت:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \left(-\frac{\epsilon \sin(t)}{\epsilon^2} (-\epsilon \sin(t)) + \frac{\epsilon \cos(t)}{\epsilon^2} (\epsilon \cos(t)) \right) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\sin^2(t) + \cos^2(t)) dt = \int_0^{2\pi} dt = 2\pi \end{aligned}$$