Чи стане 2026 рік найтеплішим в історії вимірювань?

Клімат · рівень довіри: високий · подія сталася, якщо в річному звіті Copernicus (ERA5) 2026 рік названо найтеплішим або рівним 2024-му: аномалія ≥ 0,72 °C до норми 1991–2020

СЬОГОДНІ · 10.11.2026 | БЮЛЕТЕНЬ ЗА ЛИСТОПАД · ≈ 05.12 | ПЕРЕВІРКА · 15.01.2027

13,92%

ВИСНОВОК

Новий температурний рекорд у 2026 році малоймовірний — 13,92%. За десять місяців рік на 0,64 °C тепліший за норму 1991–2020, на 0,07 °C нижче рекордного 2024-го. Щоб зрівнятися з ним, листопад і грудень мають бути в середньому на 1,09 °C теплішими за норму — на 0,16 °C більше, ніж найтепліший місяць за всю історію ERA5. Жовтень, найтепліший жовтень у ряді, дав 0,90 °C. Ель-Ніньйо вже рекордний і посилюється до грудня, але приземна температура реагує на нього із запізненням 2–4 місяці, тож основний ефект припаде на початок 2027 року. Якщо листопад покаже 1,05 °C і більше, шанс рекорду зросте до 57,39%.


СЦЕНАРІЇ · РІВНІ 1–2 · ШАНС РЕКОРДУ В КОЖНОМУ

		P	РЕКОРД
E1 · посилюється Ель-Ніньйо · 0,70	A · листопад ≥ 1,05 °C	**0,20**	60,00%
	B · листопад 0,95–1,04 °C	**0,50**	12,00%
	C · листопад < 0,95 °C	**0,30**	викл.
E2 · плато/спад Ель-Ніньйо · 0,30	A · листопад ≥ 1,05 °C	**0,07**	40,00%
	B · листопад 0,95–1,04 °C	**0,40**	4,00%
	C · листопад < 0,95 °C	**0,53**	викл.

ОЗНАКИ ПЕРЕГЛЯДУ

▲ листопад у бюлетені C3S ≥ 1,05 °C
▲ денні дані C3S Climate Pulse > 1,0 °C у 2-й половині листопада
▲ Niño 3.4 зростає й у листопаді
▼ листопад < 0,95 °C
▼ CPC або BoM: пік Ель-Ніньйо пройдено
▼ грудень холодніший за листопад

Сценарні течії



Позиція аналізу

Аналіз ведеться з позиції **N2 — «друге місце впритул» (63,18%)**: 2026 рік поступиться 2024-му на 0,01–0,03 °C. До неї ведуть обидва сценарії Ель-Ніньйо і кожна смуга листопада, бо для рекорду потрібні два місяці поспіль з небувалими аномаліями, а для відриву — охолодження на тлі рекордного Ель-Ніньйо. Позиція зміниться, якщо листопад перевищить 1,05 °C: тоді найімовірнішим стає **N1 — рекорд** (57,39% у цій смузі). **N3** (22,90%) — друге місце з відривом — стане базовим, якщо листопад залишиться нижче 0,95 °C, а пік Ель-Ніньйо мине раніше грудня. Третє місце виключено: для нього листопад і грудень мали б охолонути до 0,40 °C.

КОЕФІЦІЄНТНА ЧАСТКА

Рів.	Змінна	Коефіцієнти	Чому такі · дослідження
1	Траєкторія Ель-Ніньйо до грудня	0,70 · 0,30	Жовтень: Niño 3.4 +3,21 °C — рекордна аномалія, вища за піки 1982–83, 1997–98 і 2015–16 (C3S). Copernicus очікує пік у грудні; CPC — посилення до кінця року, шанс історичної сили в жовтні–грудні 83%. Звідси перевага E1.
2	Аномалія листопада	E1: 0,20 · 0,50 · 0,30 E2: 0,07 · 0,40 · 0,53	Вересень 0,82 °C → жовтень 0,90 °C: +0,08 за місяць. Збереження темпу дає ≈ 0,98 °C — смуга B. Смуга A вимагає вдвічі швидшого росту і перевищення місячного рекорду ERA5 (0,93 °C, вересень 2023). Глобальна температура відстає від Niño 3.4 на 2–4 місяці (Foster, Rahmstorf).
3	Грудень → вузол	A: 0,60 · 0,40 (E1) B: 0,12 · 0,80 · 0,08 (E1)	Арифметика річного середнього: рекорд потребує листопад + грудень ≥ 2,18 °C. Після смуги C грудень мав би сягнути ≈ 1,28 °C — рекорд виключено. Після смуги A друге місце з відривом виключено: грудень мав би впасти нижче 0,74 °C.

ДОСЛІДЖЕННЯ

Людський внесок у потепління — 0,27 °C за десятиліття; 2025 рік — 1,39 °C над доіндустріальним рівнем (Forster et al. 2026)	база · кожен рік стартує вище
Сплеск 2023 року спричинив ENSO: після тривалої Ла-Ніньї такі стрибки в моделях трапляються у 10,3% випадків проти 1,6% загалом (Raghuraman et al. 2024)	рівень 1 · вага Ель-Ніньйо
≈ 0,2 °C аномалії 2023 року, не поясненої трендом і Ель-Ніньйо, головно пояснює рекордно низьке альбедо — менше низьких хмар (Goessling et al. 2025)	рівень 2 · чому смуга A можлива
Приземна температура реагує на ENSO із запізненням 2–4 місяці (Foster, Rahmstorf 2011)	рівні 2–3 · грудневий пік діє вже на 2027

ДЖЕРЕЛА

Copernicus C3S. Surface air temperature for October 2026. Climate Bulletin, 06.11.2026	**A1**
NOAA Climate Prediction Center. ENSO Diagnostic Discussion, 08.10.2026	**A1**
Forster et al. Indicators of Global Climate Change 2025. Earth System Science Data 18, 3889–3933, 2026	**A2**
Raghuraman et al. The 2023 global warming spike was driven by the El Niño–Southern Oscillation. Atmos. Chem. Phys. 24, 11275–11283, 2024	**A2**
Goessling, Rackow, Jung. Recent global temperature surge intensified by record-low planetary albedo. Science 387, 2025	**A2**
Foster, Rahmstorf. Global temperature evolution 1979–2010. Environmental Research Letters 6, 044022, 2011	**A2**

УСІ ВАРІАНТИ

E1 → A (≥ 1,05 °C) → грудень ≥ поріг рекорду	8,40%	**N1**
E1 → A (≥ 1,05 °C) → грудень у проміжку	5,60%	**N2**
E1 → B (0,95–1,04 °C) → грудень ≥ поріг рекорду	4,20%	**N1**
E1 → B (0,95–1,04 °C) → грудень нижче за листопад	2,80%	**N3**
E1 → B (0,95–1,04 °C) → грудень у проміжку	28,00%	**N2**
E1 → C (< 0,95 °C) → грудень ≥ 0,92 °C	12,60%	**N2**
E1 → C (< 0,95 °C) → грудень < 0,92 °C	8,40%	**N3**
E2 → A (≥ 1,05 °C) → грудень ≥ поріг рекорду	0,84%	**N1**
E2 → A (≥ 1,05 °C) → грудень у проміжку	1,26%	**N2**
E2 → B (0,95–1,04 °C) → грудень ≥ поріг рекорду	0,48%	**N1**
E2 → B (0,95–1,04 °C) → грудень нижче за листопад	2,16%	**N3**
E2 → B (0,95–1,04 °C) → грудень у проміжку	9,36%	**N2**
E2 → C (< 0,95 °C) → грудень ≥ 0,92 °C	6,36%	**N2**
E2 → C (< 0,95 °C) → грудень < 0,92 °C	9,54%	**N3**

ЩО ЗМІНИТЬ ОЦІНКУ

Листопад ≥ 1,05 °C	**57,39%**
Листопад 0,95–1,04 °C	**9,96%**
Листопад < 0,95 °C	**0%**
Пік Ель-Ніньйо вже пройдено (E2)	**4,40%**

Обмеження: середнє за січень–жовтень опубліковане з точністю до 0,01 °C, тому поріг рекорду відомий у межах ± 0,025 °C. Остаточний ранг визначає річний звіт C3S; оцінка не враховує інших наборів даних (NASA, NOAA, Met Office).

Наступний перегляд: бюлетень C3S за листопад (≈ 5 грудня).