

andriy159

Зуб №6 і гайморит

Додано: 10.01.2013 12:32

Доброго дня. До свят в мене на протязі трьох днів в мене піднімалась плавно температура до 38.7, клонило на сон, гуділо в голові. Я почув біль в районі зуба №6 верхній (права сторона). Наступного дня мені гній пішов через праву сторону носа, точніше не через ніс, а через рот, коли я втягував повітря через праву ніздрю. Це прозора рідина, на смак ядовита, на запах гнійна. Звернувся в перший день після свят до лікаря стоматолога, зробили знімок. Лікар сказав, що на знімку є щось підозріле, але там де я вказав - це кістка і він скаже результат мені лише після консультації ще одного лікаря. Мене направили до лора, так як сказали що №6 ніякого відношення до носа не має. Зробили знімок. Так справді є гайморит. Але чим визваний. Мене й надалі болить зуб №6. Рік тому мені рвали №7, там була страшна гранульома, цей зуб ще взяли як зразок щоб студентам показувати, а рана чомусь довго не закривалась. В місці де був вирваний зуб якщо пройтись пальцем по яснам, відчувалась затверділа гулька, яка з часом перелізла на зуб №6. Власне мене це й стривожило, бо при натиску на цю ніби-то кістку я відчуваю ниття цього невідомого походження. Гайморитом ніколи не хворів. Що мені робити ? До кого звертатись. Мене лор як на буденній роботі закритими очами відправляє в лікарню "Добрий день, що турбує, знімок, направлення хай розбираються". В лікарні також стандартна процедура: "Що турбує, будемо робити прокол, призначимо лікування". Про зуб ніхто не згадує ((

medisvit\_doctor

Додано: 11.01.2013 16:55

Доброго дня. До свят в мене на протязі трьох днів в мене піднімалась плавно температура до 38.7, клонило на сон, гуділо в голові. Я почув біль в районі зуба №6 верхній (права сторона). Наступного дня мені гній пішов через праву сторону носа, точніше не через ніс, а через рот, коли я втягував повітря через праву ніздрю. Це прозора рідина, на смак ядовита, на запах гнійна. Звернувся в перший день після свят до лікаря стоматолога, зробили знімок. Лікар сказав, що на знімку є щось підозріле, але там де я вказав - це кістка і він скаже результат мені лише після консультації ще одного лікаря. Мене направили до лора, так як сказали що №6 ніякого відношення до носа не має. Зробили знімок. Так справді є гайморит. Але чим визваний. Мене й надалі болить зуб №6. Рік тому мені рвали №7, там була страшна гранульома, цей зуб ще взяли як зразок щоб студентам показувати, а рана чомусь довго не закривалась. В місці де був вирваний зуб якщо пройтись пальцем по яснам, відчувалась затверділа гулька, яка з часом перелізла на зуб №6. Власне мене це й стривожило, бо при натиску на цю ніби-то кістку я відчуваю ниття цього невідомого походження. Гайморитом ніколи не хворів. Що мені робити ? До кого звертатись. Мене лор як на буденній роботі закритими очами відправляє в лікарню "Добрий день, що турбує, знімок, направлення хай розбираються". В лікарні також стандартна процедура: "Що турбує, будемо робити прокол, призначимо лікування". Про зуб ніхто не згадує ((

Доброго дня!, шановний автор запитання! Ви правильно звертались до лікарів. У Вашому випадку (з Ваших слів) дійсно проблема починалась із зуба №7. Можливо, внаслідок хронічного запального процесу довкола коренів зуба №7 відреагувала і гайморова пазуха з тієї ж сторони також запальним хронічним процесом, котрий Ви не відчували. З часом Ви видалили зуб №7, а запальний процес залишився у гайморовій пазусі. Діагностувати його не завжди можливо, адже контури дна гайморової пазухи зазвичай накладаються, при рентгенлогічному обстеженні, на корені зубів №5,6,7,8. Вас цей процес не турбував, хронічне запалення прогресувало. Очевидно, що зуб №6 інфікувався через гайморові пазухи і тепер є джерелом гаймориту. Вашу проблему повинен вирішувати стаціонар (ЛОР і хірург-стоматолог). Зазвичай йде одночасне лікування

гаймориту та лікування кореневих каналів 6-го зуба, або видалення 6-го зуба. Це залежить від даних комп'ютерної томографії зони (гайморова пазуха та зуби з даної сторони), динаміки запального процесу та поширення запалення. Зверніться до стаціонару.

З повагою, [к.м.н., лікар-стоматолог, Кольба О.О.](#)

katyamar2011

**ДИТИНА ГЛИБОКО ВДИХАЄ РОТОМ**

Додано: 02.11.2012 22:14

Добрий день. Моєму сину 5 років. Нещодавно він час від часу почав вдихати глибоко ротом. Тиждень назад він захворів на ларингіт і в нього почався нежить. З того часу він став частіше так вдихати (приблизно кожні 5 хвилин). За тиждень нежить не проходить, застосовували і зволожуючі, і судинозвужуючі засоби. Дільничний педіатр прослухала, хрипів не було. Не може це бути симптомами захворювання аденоїдів чи бронхіальної астми? До якого лікаря нам звернутися? Дякую

medisvit\_doctor

Додано: 06.11.2012 10:39

Добрий день. Моєму сину 5 років. Нещодавно він час від часу почав вдихати глибоко ротом. Тиждень назад він захворів на ларингіт і в нього почався нежить. З того часу він став частіше так вдихати (приблизно кожні 5 хвилин). За тиждень нежить не проходить, застосовували і зволожуючі, і судинозвужуючі засоби. Дільничний педіатр прослухала, хрипів не було. Не може це бути симптомами захворювання аденоїдів чи бронхіальної астми? До якого лікаря нам звернутися? Дякую

Шановна мамо! Часті глибокі вдихи можуть бути наслідком гіпоксії, тобто нестачі кисню, в організмі. Ваша дитина може мати набряк в носоглотці, що заважає їй нормально дихати через ніс. Необхідно показати дитину лікарю-оториноларингологу. При бронхіальній астмі відмічається кашель, задишка з затрудненим видихом, свистяче дихання і хрипи в легенях. Будьте здорові!

З повагою, [лікар-педіатр, гастроентеролог, Поліщук Т.С.](#)

romanroman

**температура 37-37.4**

Додано: 22.10.2012 13:48

Доброго дня!

На протязі 5 днів у мене температура 37-37.4, постійно змінюється може впасти до нормальної 36.6 і знову підняти до 37-37.4... самопочуття хороше, нічого не болить, швидкої втоми не відчуваю  
допоможіть будь-ласка порадою! буду вдячним!

medisvit\_doctor

Додано: 23.10.2012 08:43

Доброго дня!

На протязі 5 днів у мене температура 37-37.4, постійно змінюється може впасти до нормальної 36.6 і знову підняти до 37-37.4... самопочуття хороше, нічого не болить, швидкої втоми не відчуваю  
допоможіть будь-ласка порадою! буду вдячним!

Доброго дня, шановний автор romanroman! Уточніть, будь-ласка, свій вік.

З повагою, medisvit\_doctor.

OrativValya

**Допоможіть БУДЬ\_ЛАСКА!!!!**

Додано: 03.10.2012 21:27

Доброго вечора. Вас турбує Лавренюк Лариса. У сина зранку була рвота, в обід піднялась температура до 38,6 , дала йому німесил, а в 13:30 вкололи но-шпу і церукал. о 17:30 температура 38,6 - дала панadol, а о 20:00 37,9, зараз температура піднімається.... О 18:30 бцула рвота, о 19:00 дала таблетку від рвоти, поки що не рве. за день випив стакан води і стакан соку. Що можна дати наніч, що робити, допоможіть будь-ласка!!!!

medisvit\_doctor

Додано: 05.10.2012 09:47

Доброго вечора. Вас турбує Лавренюк Лариса. У сина зранку була рвота, в обід піднялась температура до 38,6 , дала йому німесил, а в 13:30 вкололи но-шпу і церукал. о 17:30 температура 38,6 - дала панadol, а о 20:00 37,9, зараз температура піднімається.... О 18:30 бцула рвота, о 19:00 дала таблетку від рвоти, поки що не рве. за день випив стакан води і стакан соку. Що можна дати наніч, що робити, допоможіть будь-ласка!!!!

Шановна Лариса, доброго дня! Вашій дитині терміново потрібен огляд лікаря. Він зробить детальне обстеження і встановить причину захворювання, тоді лікування буде підібрано індивідуально.

З повагою,[лікар-педіатр, Гнилокурєнко Г.В.](#)

NakonechnaN

**аскаридоз в дитини**

Додано: 01.10.2012 12:49

Доброго дня! В моєї дитини ( 6 років) , за результатом аналізу калу, аскаридоз, ми пройшли триденне лікування : порошок вормілу 400г.- 3 дні, декаріс 50мг. одноразово, діазолін 0,05г/2р., біле вугілля 1т/день, холосас 1ч.л./2 на день. Але самих паразитів, щоб вони вийшли я не бачила. Це значить що лікування пройшло даремно, вони ще є в організмі дитини? І що тоді робити щоб вони вийшли? Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 11.10.2012 08:52

Доброго дня! В моєї дитини ( 6 років ) , за результатом аналізу калу, аскаридоз, ми пройшли триденне лікування : порошок вормілу 400г.- 3 дні, декаріс 50мг. одноразово, діазолін 0,05г/2р., біле вугілля 1т/день, холосас 1ч.л./2 на день. Але самих паразитів, щоб вони вийшли я не бачила. Це значить що лікування пройшло даремно, вони ще є в організмі дитини? І що тоді робити щоб вони вийшли? Дякую!

Шановна мама! Не обов'язково Ви будете бачити аскариду. Скоріше всього вона перетравиться. Для того, щоб попередити негативний вплив на організм, продуктів розпаду паразита, лікар призначив комплекс Вами названих препаратів. Обов'язково зверніть увагу на всі варіанти можливого зараження, з метою попередження повторної інвазії.

З повагою, [лікар-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.І.](#)

oljadem

Вітрянка

Додано: 26.07.2012 14:06

Доброго дня! Коли моя сестра була вагітна на 5 місяці, захворіла вітряною, незважаючи на лякання лікарів - дитина народилася здоровою. Зараз я також заразилась вітряною, а ми живемо всі разом. Чи є загроза захворювання в дитини ( їй 1 і 7 міс), чи, можливо в неї вже є імунітет?

Наперед вдячна!

medisvit\_doctor

Додано: 27.07.2012 15:18

Доброго дня! Коли моя сестра була вагітна на 5 місяці, захворіла вітряною, незважаючи на лякання лікарів - дитина народилася здоровою. Зараз я також заразилась вітряною, а ми живемо всі разом. Чи є загроза захворювання в дитини ( їй 1 і 7 міс), чи, можливо в неї вже є імунітет?

Наперед вдячна!

Доброго дня, шановний автор запитання! Після перенесеного захворювання формувався імунітет у вагітної, яким вона мала поділитись із дитиною до народження та впродовж грудного годування. Але стійкий імунітет до захворювання формується лише після безпосередньо перенесеної вітряної віспи. Тому, загроза захворіти для дитини існує. Рекомендую звернутись з цього приводу до лікаря. Після контакту із хворим за дитиною слід спостерігати протягом 21 доби (інкубаційний період) на предмет розвитку захворювання (висип). Бажаю швидкого одужання!

З повагою, [лікар-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.І.](#)

ira125

пробіотики. для підтримки здорового балансу мікрофлори в кишківнику

Додано: 21.03.2012 15:27

Доброго дня! Є безліч препаратів котрі приписують новонародженим з перших днів для покращення травлення. (такі як Біогая, Симбітер, Біфіформ які містять лактобацили та лактококи, біфітобактерії і тд.)

Підскажіть будьласка, чи підходить по своїм складникам ось цей препарат вироблений закордоном для малюків с перших днів життя:

<http://www.amway.com/en/ResourceCenterDocuments/Visitor/nutr-nut-nutr-v-en--NutriliteIntestiFlora7.pdf>

NUTRILITE® INTESTIFLORA 7™

Supplement Facts

Serving Size 1 Stick Pack (1.4 g)

Servings per container: 30

Amount Per Pack % Daily Value

Calories 4

Total Carbohydrates 1 g < 1%

Dietary Fiber 1 g 4%

Sodium 79 mg 3%

Fructooligosaccharides (FOS)

from Chicory Root extract 1.0 g \*

Proprietary Blend Lactic Acid Bacteria 1 billion CFU \*

Streptococcus thermophilus

Lactobacillus acidophilus

Lactobacillus plantarum

Lactobacillus rhamnosus

Bifidobacterium bifidum

Bifidobacterium breve

Lactococcus lactis

OTHER INGREDIENTS: MALTODEXTRIN, GRAPE JUICE POWDER, CARROT PULP POWDER, TREHALOSE, STARCH, NATURAL GRAPE FLAVOR, SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE, XANTHAN GUM, ISOLATED SOY PROTEIN. CONTAINS: MILK, SOY

Дякую за відповідь!

medisvit\_doctor

Додано: 23.03.2012 13:27

Доброго дня! Є безліч препаратів котрі приписують новонародженим з перших днів для покращення травлення. (такі як Біогая, Симбітер, Біфіформ які містять лактобацили та лактококи, біфітобактерії і тд.)

Підскажіть будьласка, чи підходить по своїм складникам ось цей препарат вироблений закордоном для малюків с перших днів життя:

<http://www.amway.com/en/ResourceCenterDocuments/Visitor/nutr-nut-nutr-v-en--NutriliteIntestiFlora7.pdf>

NUTRILITE® INTESTIFLORA 7™

## Supplement Facts

Serving Size 1 Stick Pack (1.4 g)

Servings per container: 30

Amount Per Pack      % Daily Value

Calories 4

Total Carbohydrates 1 g   < 1%

Dietary Fiber 1 g   4%

Sodium 79 mg   3%

Fructooligosaccharides (FOS)

from Chicory Root extract 1.0 g \*

Proprietary Blend Lactic Acid Bacteria 1 billion CFU \*

*Streptococcus thermophilus*

*Lactobacillus acidophilus*

*Lactobacillus plantarum*

*Lactobacillus rhamnosus*

*Bifidobacterium bifidum*

*Bifidobacterium breve*

*Lactococcus lactis*

OTHER INGREDIENTS: MALTODEXTRIN, GRAPE JUICE POWDER, CARROT PULP POWDER, TREHALOSE, STARCH, NATURAL GRAPE FLAVOR, SODIUM CARBOXYMETHYLCELLULOSE, XANTHAN GUM, ISOLATED SOY PROTEIN. CONTAINS: MILK, SOY

Дякую за відповідь!

Доброго дня, шановний автор запитання. Препарат не є лікарським засобом. Це БАД. Речовина, що рекомендована для вживання до їжі. Це Ваш вибір. Що стосується новонародженої дитини, раджу погоджувати із Вашим педіатром, необхідність застосування будь-яких препаратів та включення в раціон будь-яких речовин.

С уважением, [доктор-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.И.](#)

nata1983

що б це значило

Додано: 15.03.2012 11:16

Дитинка на 3 день була переведена у дитячу лікарню з жовтушкою. Під час лікування жовтухи зроблено нейросонографію, котра дала такі результати: Ехогенність тканин звичайна. Зміщень серединних структур не виявлено. 3 шлуночок не поширений, 4 шлуночок не поширений. Бокові шлуночки: с/плетення по 10 мм (D=S). Судинні сплетення правого та лівого шлуночків неоднорідні. Велика цистерна – норма. Міжпівкульна щілина – норма. Підвищення ехогенності перівентрикулярних ділянок. Передня мозкова артерія RI-0.60, Vсист.-67см/с, Vдіаст-27 см/с, с/д – 3,2. Також зроблено ЕКГ: Ритм синусів, ЧСС 166-176 за хв., тахікардія, кут альфа +110°. ЕВС відхилена вправо. Біелектрична систола нормальна. Перевантаження правого шлуночка. Порушення процесів реполяризації. Бовтушку ми вилікували, а от чи є привід хвилюватися з такими результатами? Наперед вдячні за відповідь.

medisvit\_doctor

Додано: 16.03.2012 09:25

Дитинка на 3 день була переведена у дитячу лікарню з жовтушкою. Під час лікування жовтухи зроблено нейросонографію, котра дала такі результати: Ехогенність тканин звичайна. Зміщень серединних структур не виявлено. 3 шлуночок не поширений, 4 шлуночок не поширений. Бокові шлуночки: с/плетення по 10 мм (D=S). Судинні сплетення правого та лівого шлуночків неоднорідні. Велика цистерна – норма. Міжпівкульна щілина – норма. Підвищення ехогенності перівентрикулярних ділянок. Передня мозкова артерія RI-0.60, Vсист.-67см/с, Vдіаст-27 см/с, с/д – 3,2. Також зроблено ЕКГ: Ритм синусів, ЧСС 166-176 за хв., тахікардія, кут альфа +110°. ЕВС відхилена вправо. Біелектрична систола нормальна. Перевантаження правого шлуночка. Порушення процесів реполяризації. Бовтушку ми вилікували, а от чи є привід хвилюватися з такими результатами? Наперед вдячні за відповідь.

Доброго дня, шановний автор запитання! На Ваше запитання відповідають два дитячих спеціаліста:

1. Для коректної відповіді на Ваше запитання не вистачає інформації. Скоріш за все з вашою дитиною все нормально, але в будь-якому випадку потрібне динамічне спостереження педіатра, якому ви довіряєте, та який при необхідності визначиться з подальшим обстеженням та лікуванням.

З повагою, [лікар-педіатр, Поліщук Т.С.](#)

2. За даними нейросонографії можливо лише зробити висновок, що дитинка перенесла нестачу кисню (в утробі матері або під час пологів), і це обов'язково потребує контролю фахівцями. Показники нейросонографії важливі, але вирішальне значення для прогнозу та подальшої тактики має значення огляд дитини(!) - оцінка неврологічного статусу, психічного та моторного розвитку та виявлення можливих відхилень. Заочно визначити приводи для хвилювання неможливо.

Звертайтеся, будемо раді допомогти.

З повагою, лікар-дитячий невролог, Грабовенська І.О.

Nadia-1989

**Поганий сон.**

Додано: 30.01.2012 14:17

Доброго дня. Моєму синові 1 рік і 9 місяців. Дуже погано спить в ночі. З інтервалами від 30 хв. до 2 годин. Прокидається і часто плаче. З такими просинаннями за ніч він випиває до літри молока. Мені це дуже не подобається, потім у день дуже поганий апетит. Наш педіарт каже що це з часом пройде. А інший лікар порадив купувати його в відварі кореня валеріани, після купання у малого по тілі пішли червоні плями, я так розумію це алергія на валеріану. Багато наговорила....єдине чого хочу допоможіть нам будьласка з нічним сном.

medisvit\_doctor

Додано: 30.01.2012 17:34

Доброго дня. Моєму синові 1 рік і 9 місяців. Дуже погано спить в ночі. З інтервалами від 30 хв. до 2 годин. Прокидається і часто плаче. З такими просинаннями за ніч він випиває до літри

молока. Мені це дуже не подобається, потім у день дуже поганий апетит. Наш педіарт каже що це з часом пройде. А інший лікар порадив купувати його в відварі кореня валеріани, після купання у малого по тілі пішли червоні плями, я так розумію це алергія на валеріану. Багато наговорила....єдине чого хочу допоможіть нам будьласка з нічним сном.

Доброго дня, шановна мама! Раджу Вам поспілкуватись із педіатром, можливо з іншим. Є багато причин, коли порушується сон вночі. Необхідно це вияснити. Адже молоко 1 літр за ніч, це багато. І дитина його п'є не тому, що хоче, а тому, що його щось турбує. Приходьте, розберемось, допоможемо.

З повагою, [лікар-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.І.](#)

jadronik

Нежить у дитини

Додано: 14.11.2011 15:52

Доброго дня! Дитині 2 місяці і у неї сопильки чим можна закапати носика і як довго можна капати?

medisvit\_doctor

Додано: 15.11.2011 17:28

Доброго дня! Дитині 2 місяці і у неї сопильки чим можна закапати носика і як довго можна капати?

Доброго дня, шановний автор запитання!

Для дитини 2-х місячного віку, при закладеності носа, дозволені краплі "віброцил".

Використовуються 2-3 рази на день до 5-ти днів. Якщо симптоми захворювання будуть зберігатися довше, продовжити лікування необхідно під наглядом лікаря. Бажаю Вам всього найкращого.

З повагою, лікар-отоларинголог, Кот В.Ф.

vitochka\_85

кіста у дитини

Додано: 03.08.2011 12:43

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як розібратися в нашій ситуації. Моєму синові 2 роки і 2 місяці у квітні місяці я помітила у дитини невеличку тверду шишечку розміром з горошину в самому низу шиї, сходили в р-ну поліклініку, хірург поставив діагноз (просто пощупавши шишку) - кіста надгрудної області, через місяць були на прийомі у хірурга в Охматдет, там теж пощупали і на наше прохання зробили узд, сказали що це дермоїдна кіста шиї, сказали що треба оперувати, але попередньо ще раз прийти у вересні на огляд.

Скажіть, будь ласка, які можна ще здати аналізи чи пройти додатково процедури, щоб точно знати що це кіста, і що її обов'язково потрібно оперувати? Чи може це бути зв'язано з онкозахворюванням, можливо потрібна консультація онколога? Наперед дуже вдячна за відповідь!



medisvit\_doctor

Додано: 12.08.2011 18:40

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, як розібратися в нашій ситуації. Моєму синові 2 роки і 2 місяці. У квітні місяці я помітила у дитини невеличку тверду шишечку розміром з горошину в самому низу шиї, сходили в р-ну поліклініку, хірург поставив діагноз (просто пощупавши шишку) - кіста надгрудної області, через місяць були на прийомі у хірурга в Охматдет, там теж пощупали і на наше прохання зробили узд, сказали що це дермоїдна кіста шиї, сказали що треба оперувати, але попередньо ще раз прийти у вересні на огляд.

Скажіть, будь ласка, які можна ще здати аналізи чи пройти додатково процедури, щоб точно знати що це кіста, і що її обов'язково потрібно оперувати? Чи може це бути зв'язано з онкозахворюванням, можливо потрібна консультація онколога? Наперед дуже вдячна за відповідь!

Доброго дня! Дермоїдна кіста - вроджена доброякісна пухлина, що не має тенденції до малігнізації та значного росту, але, як і будь-яка пухлина, теоретично може перерости в злоякісну. Крім того, УЗД не є абсолютно достовірним методом дослідження, підтвердити діагноз може тільки біопсія. При відсутності значного посилення росту "шишечки", зміни кольору, форми і т.п. поспішати з операцією не слід, але й (з огляду на теоретично можливу малігнізацію) відкладати на роки не варто. Отже, рекомендую: що-3-місяці проходити обстеження, оперативне лікування планово після 3-х років.

З повагою, лікар-хірург, ортопед, травматолог дитячий, Харсіка С.М. [/url]

iruna

гемоглобін

Додано: 30.12.2010 20:21

Доброго дня

Скажіть будь-ласка як можна підняти гемоглобін у дитини. Моїй дитині 4 роки в неї гемоглобін 100. Чи можна підняти гемоглобін тільки продуктами харчування (гречка, граната, печінка, яблука). Чи ще потрібно додатково приймати якісь препарати.

medisvit\_doctor

Додано: 04.01.2011 18:59

Доброго дня

Скажіть будь-ласка як можна підняти гемоглобін у дитини. Моїй дитині 4 роки в неї гемоглобін 100. Чи можна підняти гемоглобін тільки продуктами харчування (гречка, граната, печінка, яблука). Чи ще потрібно додатково приймати якісь препарати.

Ірина, доброго дня! Рівень гемоглобіну, один із критеріїв наявності, або ступеню анемії. В залежності від причини - плануються лікування. Курс лікування безпосередньо залежить від причини, що привела до даних змін, включає харчування та прийом препаратів заліза. У якому випадку не можливо обійтись без препаратів? Коли ми не маємо можливості дати дитині добову потребу разом із продуктами харчування. Наприклад із розрахунку добова потреба міститься у 3кг-яблук, або в 1кг-печінки, або в 2кг-смородини. В такому випадку проводиться розрахунок: потреба фізіологічна + додаткова, і розраховується доза препарату на кг маси тіла.

Також враховується можливість дитячого організму засвоїти препарат (розрідження стулу). І звичайно корегується харчування із метою вкючення продуктів, що містять залізо, та виключення продуктів, що порушують всмоктування заліза. Приклад: дитина добре харчується, але дуже любить чай. Чай містить речовини, що порушують всмоктування заліза. Як результат-розвиток анемії. Будьте здорові!

З повагою, [лікар-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.І.](#)

Igor

Аналіз крові

Додано: 06.11.2009 17:31

У моєї дружини ревматоїдний фактор після ГРВ становить 84 МО/мл,

ШОЕ - 26, паличкоядерні 11,

температура тіла коливається 37,2 - 37,4 грд.

Біль у лівій частині грудей.

Як запобугти такому стану, які необхідно зробити заходи по покращенню стону здоров'я моєї дружини.

smartik

Додано: 11.04.2011 18:56

доброго дня .мені 20років.Прокоментуйте будь-ласка мені аналіз крові.Що на вашу думку треба зробити чи обстежити.Еритроцити-4,1 гемоглобін-129,0 тромбоцити-283,0 лейкоцити-6,6 шое(за 1 год)2,0 паличкоядерні-7 сегментоядерні-23,0 еозинофіли-4,0 лімфоцити-62,0 моноцити-4,0 гематокрит-42,0

medisvit\_doctor

Додано: 12.04.2011 17:25

доброго дня .мені 20років.Прокоментуйте будь-ласка мені аналіз крові.Що на вашу думку треба зробити чи обстежити.Еритроцити-4,1 гемоглобін-129,0 тромбоцити-283,0 лейкоцити-6,6 шое(за 1 год)2,0 паличкоядерні-7 сегментоядерні-23,0 еозинофіли-4,0 лімфоцити-62,0 моноцити-4,0 гематокрит-42,0

Доброго дня, шановний автор запитання! В аналізі крові, який ви прислали, при нормальній загальній кількості лейкоцитів, відзначається зміна співвідношення лімфоцитів/гранулоцитів. У дорослої людини в нормі з числа лейкоцитів 50% або більше повинні складати сегменто-ядерні гранулоцити, а лімфоцити - не більше 35%. Крім того, бентежить збільшення числа паличкоядерних гранулоцитів (у нормі до 4%). Такі зміни, у поєднанні з незміненими іншими показниками (зокрема ШОЕ), не мають вказівного характеру, тобто не дозволяють тільки на підставі аналізу крові визначитися в діагнозі. Необхідно оцінювати своїми очима стан пацієнта, дивитися усе в комплексі. Спершу, думаю, краще прийти на прийом до терапевта, який допоможе скоординувати подальший план обстеження.

З повагою, лікар-терапевт Лялюхіна Ю.Є.

smartik

Додано: 12.04.2011 22:51

Це пройшло 4 місяці від пологів ,болить спина і голова інколи.Я ходила на узі по жіночцму написали хронічний двобічний андексит,початкові прояви аденоміозу,це може давати на такі аналізи вплив???

medisvit\_doctor

Додано: 13.04.2011 10:06

Це пройшло 4 місяці від пологів ,болить спина і голова інколи.Я ходила на узі по жіночцму написали хронічний двобічний андексит,початкові прояви аденоміозу,це може давати на такі аналізи вплив???

Так, двобічний аднексит може давати подібні зміни в аналізі крові, але ви повинні розуміти, що і аналізи, і УЗД є лише додатковими методами обстеження (тобто читати треба так: УЗ ознаки хронічного двобічного аднекситу). Без консультації лікаря неможливо отримати повної картини, тим більше надати дієві рекомендації.

З повагою, лікар-терапевт Лялюхіна Ю.Є.

20071130

Аналіз крові

Додано: 19.04.2012 09:46

Доброго дня !!!

Мені 29 років. День перед здачею розгорнутого аналізу крові здавала аналізи на гормони. Прокоментуйте будь-ласка мені аналіз крові.

Анализ крови развернутый

Скорость оседания эритроцитов

(метод Панченкова) - 6 мм/час

Лейкоциты (WBC) 4.16

Эритроциты (RBC) 4.09

Гемоглобин (HGB) 125 г/л

Гематокрит (HCT) 35.7 %

Средний объем эритроцита (MCV) 87.3

Среднее содержание гемоглобина в

эритроците (MCH) 30.6 пг

Средняя концентрация гемоглобина

в эритроците (MCHC) - 35 г/дл

Тромбоциты (PLT) 189

Ширина распределения

эритроцитов (RDW-SD) - 38.7 фл

Ширина распределения

эритроцитов (RDW-CV) - 12.4 %

Ширина распределения

тромбоцитов по объемам (PDW) - 17.9 %

Средний объем тромбоцитов (MPV) 12.6 фл

Тромбокрит (PCT) 0.24 %

Нейтрофилы (на 100 лейкоцитов) 47.9 %

Лимфоциты (на 100 лейкоцитов) 38.2 %

Моноциты (на 100 лейкоцитов) 12 %  
 Эозинофилы (на 100 лейкоцитов) 1.4 %  
 Базофилы (на 100 лейкоцитов) 0.5 %

medisvit\_doctor

Додано: 20.04.2012 16:01

Доброго дня !!!

Мені 29 років. День перед здачею розгорнутого аналізу крові здавала аналізи на гормони.  
 Прокоментуйте будь-ласка мені аналіз крові.

Анализ крови развернутый  
 Скорость оседания эритроцитов  
 (метод Панченкова) - 6 мм/час  
 Лейкоциты (WBC) 4.16  
 Эритроциты (RBC) 4.09  
 Гемоглобин (HGB) 125 г/л  
 Гематокрит (HCT) 35.7 %  
 Средний объем эритроцита (MCV) 87.3  
 Среднее содержание гемоглобина в  
 эритроците (MCH) 30.6 пг  
 Средняя концентрация гемоглобина  
 в эритроците (MCHC) - 35 г/дл  
 Тромбоциты (PLT) 189  
 Ширина распределения  
 эритроцитов (RDW-SD) - 38.7 фл  
 Ширина распределения  
 эритроцитов (RDW-CV) - 12.4 %  
 Ширина распределения  
 тромбоцитов по объемам (PDW) - 17.9 %  
 Средний объем тромбоцитов (MPV) 12.6 фл  
 Тромбоцит (PCT) 0.24 %  
 Нейтрофилы (на 100 лейкоцитов) 47.9 %  
 Лимфоциты (на 100 лейкоцитов) 38.2 %  
 Моноциты (на 100 лейкоцитов) 12 %  
 Эозинофилы (на 100 лейкоцитов) 1.4 %  
 Базофилы (на 100 лейкоцитов) 0.5 %

Доброго дня! В цілому Ваш аналіз крові нормальний, крім незначно збільшеної кількості лімфоцитів та моноцитів. Такі зміни не є специфічними для якогось одного діагнозу. Для диференційної діагностики треба бачити пацієнта, знати клінічну картину, провести додаткові обстеження, при необхідності.

З повагою, [лікар-кардіолог, терапевт Четверикова О.М.](#)

20071130

Додано: 30.04.2012 19:04

Доброго дня ! Мені 29 років. На даний момент обстежують в лікаря гінеколога по причині безпліддя. Здаю зараз дуже багато різних аналізів. Розшифруйте, будь-ласка, мій загальний розширений аналіз крові, всі інші аналізи на гормони і мочі в нормі.

Еритроцити (RBC) 4,23 (Ч: 4,5-5,0 x10<sup>12</sup>/л Ж: 3,5-4,5 x10<sup>12</sup>/л)  
 Середній об'єм еритроцитів (MCV) 94,1 (82,0-95,0 фл)  
 Гемоглобін (HGB) 127 (Ч: 130-170 г/л Ж: 120-150 г/л)  
 Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 30 (27-31 п/г)  
 Кольоровий показник 0,9 (0,85-1,15)  
 Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) 319 (320-360 г/л)  
 Гематокрит (HCT) 39,8 (Ч: 39-48 % Ж: 34-44 %)  
 Розподіл еритроцитів з коефіцієнтом варіації (RDW-CV) 14,3 (11,5-14,5 %)  
 Тромбоцити (PLT) 231 (180-320 x10<sup>9</sup>/л)  
 Розподіл еритроцитів зі стандартною похибкою (RDW-SD) 49,2 (35-56 фл)  
 Лейкоцити (WBC) 3,9 (4,0-9,0 x10<sup>9</sup>/л)  
 Розподіл тромбоцитів по об'ємах (PDW) 15,9 (15-17 %)  
 Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 4 (Ч: 1-10 мм/год Ж: 2-15 мм/год)  
 Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,8 (7,0-11 фл)  
 Нейтрофіли  
 Мієлоцити -  
 Метамієлоцити -  
 Паличкоядерні 6 (1,0-6,0 %)  
 Сегментоядерні 52 (47,0-72,0 %)  
 Еозинофіли 5 (0,5-5,0 %)  
 Базофіли 1 (0,0-1,0 %)  
 Лімфоцити 29 (19,0-37,0 %)  
 Моноцити 7 (3,0-11,0 %)  
 Плазматичні клітини -  
 Дегенеративні  
 зміни: Анізоцитоз + Пойкілоцитоз +

В грудні місяці 2011 р. лейкоцити були на рівні 6,3 гемоглобін 104, в середині квітня - 4,16. Скажіть ще що таке Анізоцитоз та Пойкілоцитоз. Аналізи мочі та гормонів в нормі. Лише пролактин на декількох поділох вище норми, і останні 5 днів вживаю ліки Нормпролак. Чи можуть під дією ліків знизитись лейкоцити ?

Почуваю себе добре, нічого не турбує.

Буду вдячна за відповідь. Дякую

20.04.2012р. я вже викладала на цьому сайті свої аналізи. Через 10 днів перездала їх ще раз.

medisvit\_doctor

Додано: 03.05.2012 15:01

Доброго дня ! Мені 29 років. На даний момент обстежують в лікаря гінеколога по причині безпліддя. Здаю зараз дуже багато різних аналізів. Розшифруйте, будь-ласка, мій загальний розширений аналіз крові, всі інші аналізи на гормони і мочі в нормі.

Еритроцити (RBC) 4,23 (Ч: 4,5-5,0 x10<sup>12</sup>/л Ж: 3,5-4,5 x10<sup>12</sup>/л)  
 Середній об'єм еритроцитів (MCV) 94,1 (82,0-95,0 фл)  
 Гемоглобін (HGB) 127 (Ч: 130-170 г/л Ж: 120-150 г/л)

Середній вміст гемоглобіну в еритроциті (MCH) 30 (27-31 п/г)  
 Кольоровий показник 0,9 (0,85-1,15)  
 Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті (MCHC) 319 (320-360 г/л)  
 Гематокрит (HCT) 39,8 (Ч: 39-48 % Ж: 34-44 %)  
 Розподіл еритроцитів з коефіцієнтом варіації (RDW-CV) 14,3 (11,5-14,5 %)  
 Тромбоцити (PLT) 231 (180-320 x109/л)  
 Розподіл еритроцитів зі стандартною похибкою (RDW-SD) 49,2 (35-56 фл)  
 Лейкоцити (WBC) 3,9 (4,0-9,0 x109/л)  
 Розподіл тромбоцитів по об'ємах (PDW) 15,9 (15-17 %)  
 Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 4 (Ч: 1-10 мм/год Ж: 2-15 мм/год)  
 Середній об'єм тромбоцитів (MPV) 8,8 (7,0-11 фл)  
 Нейтрофіли  
 Мієлоцити -  
 Метамієлоцити -  
 Паличкоядерні 6 (1,0-6,0 %)  
 Сегментоядерні 52 (47,0-72,0 %)  
 Еозинофіли 5 (0,5-5,0 %)  
 Базофіли 1 (0,0-1,0 %)  
 Лімфоцити 29 (19,0-37,0 %)  
 Моноцити 7 (3,0-11,0 %)  
 Плазматичні клітини -  
 Дегенеративні  
 зміни: Анізоцитоз + Пойкілоцитоз +

В грудні місяці 2011 р. лейкоцити були на рівні 6,3 гемоглобін 104, в середині квітня - 4,16. Скажіть ще що таке Анізоцитоз та Пойкілоцитоз. Аналізи мочі та гормонів в нормі. Лише пролактин на декількох поділох вище норми, і останні 5 днів вживаю ліки Нормпролак. Чи можуть під дією ліків знизитись лейкоцити ?

Почуваю себе добре, нічого не турбує.

Буду вдячна за відповідь. Дякую

20.04.2012р. я вже викладала на цьому сайті свої аналізи. Через 10 днів перездала їх ще раз.

Доброго дня! В цілому Ваш аналіз крові нормальний, крім незначно зменшення загальної кількості лейкоцитів. Такі зміни не є специфічними і навіть не обов'язково є ознакою хвороби. Для диференційної діагностики треба бачити пацієнта, знати клінічну картину, провести, при необхідності, додаткові обстеження. Прийом норпролаку не може бути причиною зниження кількості лейкоцитів. Анізоцитоз - наявність у мазку крові зменшених еритроцитів. Пойкілоцитоз - наявність у мазку крові еритроцитів зміненої форми.

З повагою, medisvit\_doctor

Natalie\_Hanko

Додано: 10.05.2012 01:15

Доброго вечора!

Мені 20 років.І потрібна Ваша допомога і консультація!

Що можуть означати ці аналізи, якщо кілька тижнів як у мене пропав нюх і тиждень як набрякають очі і обличчя??:

Лейкоцити - г/л -4,8

еритроцити - т/л -4,77

гемоглобін - г/л - 133,0

гематокрит - %- 38,5

сер.об'єм еритроцитів - фл -80,9

сер.вміст гемоглобіну в еритроциті - пг - 27,8

сер.концентрація гемоглоб.в еритроцитиф -g/dL -34,5

тромбоцити - г/л - 192,0

шое -г/л -4

морф.лейкоцитів:

базофілди-1

еозинофіли-3

паличкаоядерні-10

сегментоядерні-44

лімфоцити-29

моноцити-13

Щиро Вам дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 11.05.2012 09:35

Доброго вечора!

Мені 20 років.І потрібна Ваша допомога і консультація!

Що можуть означати ці аналізи, якщо кілька тижнів як у мене пропав нюх і тиждень як набрякають очі і обличчя??:

Лейкоцити - г/л -4,8

еритроцити - т/л -4,77

гемоглобін - г/л - 133,0

гематокрит - %- 38,5

сер.об'єм еритроцитів - фл -80,9

сер.вміст гемоглобіну в еритроциті - пг - 27,8

сер.концентрація гемоглоб.в еритроцитиф -g/dL -34,5

тромбоцити - г/л - 192,0

шое -г/л -4

морф.лейкоцитів:

базофілди-1

еозинофіли-3

паличкаоядерні-10

сегментоядерні-44

лімфоцити-29

моноцити-13

Щиро Вам дякую!

Доброго дня, шановний автор запитання! Є незначні зміни в аналізі крові, але без огляду лікаря-отоларинголога, лише за результатами аналізу встановити діагноз неможливо. Ваші скарги

більше нагадують алергічний набряк, але необхідно виключати і гострий синусит. Обов'язково зверніться до фахівця!

З повагою, [лікар-отоларинголог, Мошинська В.Ю.](#)

ruslanlrr

Плями на спині

Додано: 21.09.2012 22:36

Доброго дня, шановні лікарі!

Моя проблема, це поява світло-коричневих плям на спині, які пізніше викликають свербіж, після чого світлішають та лущаться, приблизна їх тривалість 4 - 5 тижнів, після чого вони самостійно зникають.

Єдина причина їх появи є вживання алкоголю, доза може бути самою мінімальною (наприклад: при ковтку пива).

Запитання:

- 1) Що це можуть бути за плями?
- 2) Чому вони з'являються після вживання алкоголю.
- 3) Чи пов'язана їх поява із хворобою печінки (печінка не турбувала та не турбує)?

Ваші поради.

Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 25.09.2012 08:51

Доброго дня, шановні лікарі!

Моя проблема, це поява світло-коричневих плям на спині, які пізніше викликають свербіж, після чого світлішають та лущаться, приблизна їх тривалість 4 - 5 тижнів, після чого вони самостійно зникають.

Єдина причина їх появи є вживання алкоголю, доза може бути самою мінімальною (наприклад: при ковтку пива).

Запитання:

- 1) Що це можуть бути за плями?
- 2) Чому вони з'являються після вживання алкоголю.
- 3) Чи пов'язана їх поява із хворобою печінки (печінка не турбувала та не турбує)?

Ваші поради.

Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання! Виходячи з опису симптомів захворювання, неможливо поставити остаточний діагноз без огляду. Такі плями можуть виникати при різних захворюваннях. Поява їх після вживання алкобголю може бути зігом обставин, як і свербіж. Тому, для остаточного діагнозу, необхідно, все ж таки, звернутися до лікаря-дерматолога на очний прийом. Поява плям, скоріше за все, не пов'язана із хворобою печінки.

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)



tet33

прищі на тілі які сверблять

Додано: 17.06.2012 15:07

Доброго дня, шановний лікарю. Прошу консультації щодо лікування прищів які почали з'являтися на тілі. Живу за кордоном і на разі не маю змоги звернутися до лікаря. Спочатку з'явилися одночасно два прищі на бедрі, все було дуже похоче ніби вкусив комар, вони почали свербіти, шкіра навколо припухла і почервоніла так само як при укусі нашого українського комарика. Свербіло до неможливості, а потім ті місця затверділи і зробилися великі червоні плями. Вони періодично свербіли то заспокоювалися, появилися вершки з яких я видавила водичку. А потім похоті прищі почали з'являтися на руках, правда вони не так напухали, але природа їхня однакова. Зараз їх більше десяти, інколи сверблять, але свербіж просто нестерпний, роздираю, робляться як маленькі кратери. Перший прищ загоївся, залишився шрам, більше не гоїться нічого, а нові появляються. Купила що могла без рецепту мазь ультралан, близька до гідрокортизонової, полегшення незначне. З надією чекаю відповіді.

medisvit\_doctor

Додано: 19.06.2012 12:07

Доброго дня, шановний лікарю. Прошу консультації щодо лікування прищів які почали з'являтися на тілі. Живу за кордоном і на разі не маю змоги звернутися до лікаря. Спочатку з'явилися одночасно два прищі на бедрі, все було дуже похоче ніби вкусив комар, вони почали свербіти, шкіра навколо припухла і почервоніла так само як при укусі нашого українського комарика. Свербіло до неможливості, а потім ті місця затверділи і зробилися великі червоні плями. Вони періодично свербіли то заспокоювалися, появилися вершки з яких я видавила водичку. А потім похоті прищі почали з'являтися на руках, правда вони не так напухали, але природа їхня однакова. Зараз їх більше десяти, інколи сверблять, але свербіж просто нестерпний, роздираю, робляться як маленькі кратери. Перший прищ загоївся, залишився шрам, більше не гоїться нічого, а нові появляються. Купила що могла без рецепту мазь ультралан, близька до гідрокортизонової, полегшення незначне. З надією чекаю відповіді.

Доброго дня.

Видавлювати та роздирати "прищі" не треба. Мазь краще купити сильнішу (адвантан чи елоком) і попити протиалергічні препарати (супрастин, еріус). Але це симптоматичне лікування, полегшення буде тимчасовим. Детальне лікування можна призначити лише після огляду.

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)

Andrew999

не знайшов потрібної гілки

Додано: 03.06.2012 12:28

тому вирішив задати питання тут)

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка достовірність тесту ІФА на ВІЛ через 2 місяці після можливо ризикованого контакту?

дякую, бо аналіз показав, що антитіл не виявлено, але всеодно переживаю. дуже переживаю... скоро в психушку попаду. дякую

medisvit\_doctor

Додано: 06.06.2012 12:25

тому вирішив задати питання тут)

Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка достовірність тесту ІФА на ВІЛ через 2 місяці після можливо ризикованого контакту?

дякую, бо аналіз показав, що антитіл не виявлено, але всеодно переживаю. дуже переживаю... скоро в психушку попаду. дякую

Доброго дня, достовірність тесту біля 80%, тому рекомендується здавати кров повторно через 3 місяці, та пів року від першої здачі крові на ІФА.

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.Є.](#)

stefza

**прищі по всьому тілу, які сверблять**

Додано: 23.06.2012 13:11

Доброго дня! У мене і всіх членів сім'ї з'явилися прищі на тілі. Спочатку з'являється достатньо велике почервоніння з маленьким водянистим пухирцем в центрі, яке свербить. Через декілька днів цей пухирець засихає і на його місці залишається малесенька цяточка. Згодом почервоніння проходить, але ця цяточка залишається і навіть продовжує трохи свербіти.

Що це може бути і як лікуватися?

medisvit\_doctor

Додано: 26.06.2012 10:29

Доброго дня! У мене і всіх членів сім'ї з'явилися прищі на тілі. Спочатку з'являється достатньо велике почервоніння з маленьким водянистим пухирцем в центрі, яке свербить. Через декілька днів цей пухирець засихає і на його місці залишається малесенька цяточка. Згодом почервоніння проходить, але ця цяточка залишається і навіть продовжує трохи свербіти.

Що це може бути і як лікуватися?

Доброго дня, шановний автор запитання! Схожі клінічні прояви можуть бути при багатьох захворюваннях, в тому числі і при інфекційних. Тому, для постановки точного діагноза і призначення адекватного лікування Вам необхідно звернутися до лікаря на очний прийом.

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)

olya23

**почервоніння шкіри обличчя**

Додано: 05.05.2012 10:13

Добрий день. Мене турбує така проблема. В моєї мами, в продовж багатьох років червоне обличчя, літом почервоніння стає ще більшим, мабуть від сонця, зимою також. Їй зарас 42 роки, вона ниського зросту і трохи повновата, ще внеї інколи буває задишка. Мене цікавить чому внеї червоне лице, чи це просто якесь захворювання шкіри, чи щось зв'язане з кров'яним тиском і що може допомогти, наприклад, якийсь крем чи спеціальні ліки???????? Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 08.05.2012 15:32

Добрий день. Мене турбує така проблема. В моєї мами, в продовж багатьох років червоне обличчя, літом почервоніння стає ще більшим, мабуть від сонця, зимою також. Їй зараз 42 роки, вона ниського зросту і трохи повновата, ще в неї інколи буває задишка. Мене цікавить чому в неї червоне лице, чи це просто якесь захворювання шкіри, чи щось зване з кров'яним тиском і що може допомогти, наприклад, якийсь крем чи спеціальні ліки??????? Дякую!

Доброго дня, шановний автор запитання! Червоне обличчя може бути при багатьох захворюваннях, в тому числі, і при дерматологічних (наприклад: рожеві вугрі). Для визначення причини у цьому конкретному випадку, необхідно спочатку відвідати терапевта для виключення терапевтичної патології, а потім дерматолога для призначення обстеження та лікування.

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)

kiral

**Чи можна лікувати демодекс при вагітності?**

Додано: 11.05.2012 12:55

Доброго дня! Вже багато років турбує почервоніння в зоні підборіддя, ніс та навколо носу... виявилось що це демодекс. В сестри та сама проблема, їй назначили препарати:

1 Stop demodex (Стоп демодекс) бальзам лечебно-профилактический

2 СТОП-ДЕМОДЕКС МЫЛО ЖИДКОЕ

3 ДЕТОКСИЛ (DETOXIL) дієтична добавка для очищення печінки.

Ці препарати їй допомогли.

Чи можу я використовувати ці самі препарати при вагітності 25 тижнів, зокрема мене цікавить чи можна при вагітності вживати Детоксил.

Буду дуже вдячна за відповідь!

medisvit\_doctor

Додано: 23.05.2012 09:34

Доброго дня! Вже багато років турбує почервоніння в зоні підборіддя, ніс та навколо носу... виявилось що це демодекс. В сестри та сама проблема, їй назначили препарати:

1 Stop demodex (Стоп демодекс) бальзам лечебно-профилактический

2 СТОП-ДЕМОДЕКС МЫЛО ЖИДКОЕ

3 ДЕТОКСИЛ (DETOXIL) дієтична добавка для очищення печінки.

Ці препарати їй допомогли.

Чи можу я використовувати ці самі препарати при вагітності 25 тижнів, зокрема мене цікавить чи можна при вагітності вживати Детоксил.

Буду дуже вдячна за відповідь!

Доброго дня, шановний автор запитання! Препарати з групи "стоп-демодекс" вагітним використовувати не можна (в них входить "метронідазол"). На рахунок "Детоксила" - треба порадитись з гінекологом.

А, взагалі, лікування "Демодекозу" призначається після огляду дерматолога, причому індивідуально (не всім підходять одні й ті ж самі препарати).

Тільки після огляду дерматолог зможе призначити лікування, яке хоча б призупинить розвиток хвороби (повноцінне лікування вагітним протипоказане).

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)

bela2709

зуд по спині

Додано: 19.04.2012 10:52

Дуже прошу Вашої допомоги. Моїй мамі (66 років) поставили діагноз кліщ, але ніяке лікування не допомагає вже пів року. Її дуже тривожить зуд по спині в нічний час. Ніяких лабораторних досліджень не робилось. З чого починати і що робити далі? Допоможіть будь ласка.

medisvit\_doctor

Додано: 20.04.2012 11:14

Дуже прошу Вашої допомоги. Моїй мамі (66 років) поставили діагноз кліщ, але ніяке лікування не допомагає вже пів року. Її дуже тривожить зуд по спині в нічний час. Ніяких лабораторних досліджень не робилось. З чого починати і що робити далі? Допоможіть будь ласка.

Доброго дня, шановний автор запитання. Раджу Вам здати аналіз крові на гельмінти, якщо аналіз позитивний - тоді потрібно звернутися до гастроентеролога або інфекціоніста, а якщо аналіз негативний - то до дерматолога або алерголога. Це або віковий зуд, або гельмінти (глисти) - друге скоріше за все. Кліщ - це не зовсім коректний діагноз, оскільки на спині їх не буває. Потрібно уточнити діагноз для назначення ефективного лікування.

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)

gregor

грибок в області паху і між пальцями ступнів

Додано: 03.04.2012 10:58

Добрий день! В мене в області паху і між пальцями ступнів є свербіж, почервоніння і лущення шкіри. З цією проблемою я звертався до лікаря. Мені поставили діагноз грибок і призначили дьогтьову мазь і 3% розчин йоду. Повністю курс лікування я пройти не міг через відразливий запах мазі, оскільки живу з чужими людьми. Після неповного курсу лікування симптоми зникли але через деякий час знову появились. Прошу вас, щоб ви мені порадили, які ще ліки можна приймати без такого відразливого запаху.

medisvit\_doctor

Додано: 05.04.2012 14:38

Добрий день! В мене в області паху і між пальцями ступнів є свербіж, почервоніння і лущення шкіри. З цією проблемою я звертався до лікаря. Мені поставили діагноз грибок і призначили дьогтьову мазь і 3% розчин йоду. Повністю курс лікування я пройти не міг через відразливий запах мазі, оскільки живу з чужими людьми. Після неповного курсу лікування симптоми зникли але через деякий час знову появились. Прошу вас, щоб ви мені порадили, які ще ліки можна приймати без такого відразливого запаху.

Добрий день, шановний автор питання! в даном випадку можна використовувати: розчин нітрофунгін один раз на день 7 днів, а противрибкові мазі: міфунгар або екзіфін два рази в день впродовж 10 днів, при новому загостренні зверніться до дерматолога на очну консультацію!

З повагою, [лікар-дерматолог Ющенко Н.В.](#)

gysia9

**паразити в крові**

Додано: 15.03.2012 11:43

Добрий день.Підскадіть,будь ласка,які потрібно здати аналіз крові чи калу,щоб дізнатися про наявність паразитів в організмі?Дякую

medisvit\_doctor

Додано: 15.03.2012 16:36

Добрий день.Підскадіть,будь ласка,які потрібно здати аналіз крові чи калу,щоб дізнатися про наявність паразитів в організмі?Дякую

Доброго дня, шановний автор запитання! Для того, щоб оприділити наявність паразитів в організмі необхідно здати аналіз крові на At Ig G до аскарид, токсокар, лямблій.

З повагою,[лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

gysia9

**видалення атероми**

Додано: 14.03.2012 14:27

Доброго дня.Підскажіть,будь-ласка,у вас можна провести видалення атероми на голові (менше 1см)радіохвильовим методом?Скільки це коштує?Яка потрібна підготовка?Дякую

medisvit\_doctor

Додано: 26.03.2012 10:55

Доброго дня.Підскажіть,будь-ласка,у вас можна провести видалення атероми на голові (менше 1см)радіохвильовим методом?Скільки це коштує?Яка потрібна підготовка?Дякую

Доброго дня, шановний автор питання. На підставі Вашого опису ситуації, можна припустити нагноєння атероми. В даному випадку, її слід розглядати як гнійник (загроза розповсюдження гнійного запалення на навколишні тканини-Флегона, в кровоносну систему - сепсис і через

кровоносні канали в черепній коробці в оболонки мозку - менінгіт), що вимагає оперативного лікування - розтину або висічення. При самостійному спорожнюванні атероми формується свищ (незагоєний канал з мізерними салоподібними виділеннями). Атерома (епідермальна кіста) - процес доброякісний і у вкрай рідкісних випадках перероджується в пухлину. Бажаю успіхів у лікуванні!

З повагою, [лікар-хірург, Сидоренко О.В.](#)

Inna81

**Перевірка родимок**

Додано: 23.05.2010 22:31

Доброго дня! Підкажіть, у "Медісвіті" можна перевірити родимки на злоякісність? Якщо так, то до кого потрібно записуватись - до онколога чи дерматолога, скільки коштує діагностика? Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 26.05.2010 10:21

Доброго дня! Підкажіть, у "Медісвіті" можна перевірити родимки на злоякісність? Якщо так, то до кого потрібно записуватись - до онколога чи дерматолога, скільки коштує діагностика? Дякую!

Добрый день! Вам необходимо записаться на консультацию онколога. Вам необходимо будет сделать биопсию и гистологическое исследование. Звоните в наш контакт-центр 393-00-00, где врачи-координаторы Вам детально расскажут про необходимые исследования и консультацию.

merikej2012

Додано: 25.03.2011 15:18

Добрый день! В січні місяці у мене воспалилася родимка за деякий час вона пройшла, але тепер поступово одна за одною поступово щось із ними відбувається то на одній появиться прищик то на іншій і зникне що мені робити? Можливо це не прищик, але малесеньке і щось похоче це опасно чи ні?

medisvit\_doctor

Додано: 28.03.2011 19:23

Добрый день! В січні місяці у мене воспалилася родимка за деякий час вона пройшла, але тепер поступово одна за одною поступово щось із ними відбувається то на одній появиться прищик то на іншій і зникне що мені робити? Можливо це не прищик, але малесеньке і щось похоче це опасно чи ні?

Доброго дня, шанований автор питання!

На жаль, з Вашого опису проблеми, дуже складно зрозуміти, що Ви маєте на увазі і чим Вам можна допомогти зараз. Раджу Вам знайти час, коли Вас турбуватимуть подібні явища і звернутися на консультацію до лікаря дерматолога. Ви можете записатися на прийом за номером 393 0000. Це позбавить Вас від хвилювань і допоможе застосувати правильну тактику лікування, у разі потреби.

З повагою, [к.м.н., лікар-дерматолог Ніколасва З.А.](#)

Lyudmila

**Шкіра**

Додано: 01.02.2010 14:09

В мого чоловіка на спині pojawiaються червоні плями із дрібними пухирцями рідини, при цьому вони сверблять і зверху утворюються кірки сухої шкіри. Лікували від екземи, грибка, дерматиту...результат був тільки на місяців 2-3. А осінню і зимою найбільше pojawiaється цих плям. Порадьте, що робити?

Lyudmila

Дякую за відповідь!

Додано: 04.02.2010 12:52

Olla

**Дермато-венерологія**

Додано: 15.02.2010 14:47

Доброго дня, на сайті побачила інформацію лише щодо косметологічних маніпуляцій, мене ж цікавить дерматовенерологія. довгий час маю проблему зі свербіжем і білим нальотом в складках статевих органів, та навколо анального отвору. зараз проблема погіршилась. пробувала лікуватись в іншого лікаря, але на той момент ніяких особливих ознак вона не виявила і ніяких аналізів не призначила, лікування антибактерицидною маззю було безрезультатним. Скажіть будь-ласка, чи зможу я отримати консультацію з цього приводу і якщо потрібно здавати аналізи, то яка треба підготовка, аби в за один ращ охопити і консультацію і одразу здати аналізи.

fog1985

**Маленькі прищики на ладонях обох рук...**

Додано: 21.03.2010 00:42

Доброго дня, лікарю!

На ладонях обох рук з'явилися невелички прищики, навідь не прищики а якісь ніби бугорці... Колір ніби водянистий ніби прозорий... Не сверблять. Їх більшає. Декілька штук навідь вже з'явилося зверху на пальцях, ближче до нігтів, такої ж форми (ніби бугорок) і кольору (водянистого чи прозорого). Що це може бути? Якщо вас це не буде обтяжувати, я вам можу надіслати фото ладонь.

Щиро дякую за розуміння.

Із повагою. Тарас.

П.С. клієнт вашого закладу. №1020-4038

klum\_tz@ukr.net

fog1985

**Питання на рахунок прищів на лиці.**

Додано: 14.04.2010 16:42

Доброго дня!

Був в вас недавно на прийомі. Можливо не особисто в вас. В дерматолога в вашій клініці. Мені було приписано слідуєчі медикаменти для видалення прищів із шкіри обличчя:

- 1) 2% розчин саліцилової кислоти
- 2) розчин левоміцетин
- 3) мило "стоп-демодекс" для вмивання
- 4) Зинерит.

Пам'ятаю що ви(чи можливо іншій лікар) казали, що щось із цих медикаментів не можна

наносити на шкіру щік. Та не пам'ятаю що саме.

Щоб уникнути небажаних наслідків, прошу ще раз назвати що куди і в якій послідовності наносити...

Завчасно вдячний за відповідь, із повагою,  
Тарас.

fog1985

**Питання по ціні випікання бородавок.**

Додано: 24.04.2010 16:06

Доброго дня!

В мене питання скільки коштує видалення бородавок в вашому центрі?

Розмір (діаметр) -> ціна.

В мене десь біля 5-и бородавок невеликого розміру. Приблизно в одному місці на ладоні ближче до великого пальця.

Діаметр найбільшої = 3 мм. Найменшої = 1 мм.

На вигляд - телесний колір (ніяких чорних цяток і т.д. Як ніби мозоль).

Із повагою, Тарас.

260390

**Плями по тілі**

Додано: 20.03.2012 12:22

Доброго дня!

У мене з'явилися червоні плями по тілі, спочатку в області грудей, через 3 дня і на спині. Плямки невеликі - діаметром як 10коп і менші, трішки підпухші, деколи проявляється свербіж. У зв'язку з роботою до лікаря звернутись не можу! У мене організм схильний до алергії, особливо на укуси комах, тому часто користуюсь маззю "Стерокорт", пробувала і цього разу, але не допомагає, можливо почервоніння стає менш насиченими, але не зникає. Порадьте що робити!

medisvit\_doctor

Додано: 20.03.2012 14:01

Доброго дня!

У мене з'явилися червоні плями по тілі, спочатку в області грудей, через 3 дня і на спині. Плямки невеликі - діаметром як 10коп і менші, трішки підпухші, деколи проявляється свербіж. У зв'язку з роботою до лікаря звернутись не можу! У мене організм схильний до алергії, особливо на укуси комах, тому часто користуюсь маззю "Стерокорт", пробувала і цього разу, але не допомагає, можливо почервоніння стає менш насиченими, але не зникає. Порадьте що робити!

Доброго дня, шановний автор запитання!

У даному випадку може бути рожевий лишай Жиберера, що має вірусно-бактеріальну причину захворювання.

В даному випадку рекомендую обмежити мед, цитрусові, шоколад на два тижні, та приймати "Цетрин" 0,01 по 1 табл. 1 раз на день на вечір впродовж 7 днів. Під час прийому ванни - бажано не митися мочалкою.

З повагою, [лікар-дерматолог Ющенко Н.В.](#)



Oleg1991

Додано: 11.06.2012 13:22

доброго дня.

на шкірі в невеликій кількості були плями коричнево-чорного кольору.але на це не звернулось якось уваги.а тепер плями почали поширюватись по тулубу,в більшій кількості.скажіть будьласка що це таке,і як боротизя з ними?що використовувати?

medisvit\_doctor

Додано: 15.06.2012 10:08

доброго дня.

на шкірі в невеликій кількості були плями коричнево-чорного кольору.але на це не звернулось якось уваги.а тепер плями почали поширюватись по тулубу,в більшій кількості.скажіть будьласка що це таке,і як боротизя з ними?що використовувати?

Доброго дня.

Виходячи з опису клінічних проявів, можна запідозрити декілька захворювань, в тому числі і "пігментні невуси". Для встановлення остаточного діагноза необхідно звернутися до лікаря-дерматолога; а тому "боротися" з цими плямами ні в якому разі не можна до огляду лікаря.

З повагою, [лікар-дерматолог, Вишенський А.П.](#)

KOShandor

розрив м'язу

Додано: 21.04.2012 22:28

розрив 28-20 мм передньої частини чотириголового м'язу

+ гематома

мої дії?

medisvit\_doctor

Додано: 23.04.2012 11:48

розрив 28-20 мм передньої частини чотириголового м'язу

+ гематома

мої дії?

Доброго дня, шановний автор запитання! Наразі в клініці відсутні травматологи, радимо не зволікати та звернутися до лікаря-травматолога на очний прийом.

З повагою, medisvit\_doctor.

killer

Нерухомий 5 п'ястний суглоб після металоостеосинтезу

Додано: 30.03.2012 20:07

Була зроблена операція(металоостеосинтез 5 п'ястної кістки руки),після одужання рух в п'ястному суглобі обмежений,рух здійснюється тільки вгору,у "кулак" зігнути неможу,при розминці чути хрускіт,місце перелому тверде і чуть збільшене,болі відсутні.....

medisvit\_doctor

Додано: 04.04.2012 10:08

Була зроблена операція(металоостеосинтез 5 п'ястної кістки руки),після одужання рух в п'ястному суглобі обмежений,рух здійснюється тільки вгору,у "кулак" зігнути неможу,при розминці чути хрускіт,місце перелому тверде і чуть збільшене,болі відсутні.....

Доброго дня, шановний автор запитання. Причин такого стану може бути багато - від післяімобілізаційної контрактури до міграції фіксатора. Раджу звернутись на консультацію разом із усіма рентгенограммами та медичними заключеннями.

З повагою, [лікар-ортопед, травматолог, Вадзюк Н.С.](#)

112233

травмування коліна

Додано: 31.03.2012 22:01

ліве коліно,ліва сторона, дуже сильно притиснули до дерев'яної поверхні, не пухле, рухаюсь , сходами піднімаюсь ,біль з лівої сторони біля круглої частини коліна , травматолог сказав , що кістка не ушкоджена , але працювати , виконувати тяжку роботу ногою не можу, знімок нічого не показав. Що це таке? Дякую.

revo

Біль під коліном.

Додано: 01.04.2012 17:00

Доброго дня!

Мені 37років. Чоловік. Десь місяців три тому в мене почалися болі під лівим коліном, болять не весь час, а тільки тоді коли присідаю навіть без навантаження, після присідання біль дуже різка і проходить десь приблизно через 3-5хв. Пошкодження коліна не було. Що це може бути?

Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 04.04.2012 10:26

Доброго дня!

Мені 37років. Чоловік. Десь місяців три тому в мене почалися болі під лівим коліном, болять не весь час, а тільки тоді коли присідаю навіть без навантаження, після присідання біль дуже різка і проходить десь приблизно через 3-5хв. Пошкодження коліна не було. Що це може бути?

Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання. З вашого опису дуже важко встановити, яка саме проблема вас турбує. Ви можете прийняти знеболююче, але якщо біль не пройде - доведеться звернутись на консультацію.

З повагою, [лікар-ортопед, травматолог, Вадзюк Н.С.](#)

medisvit\_doctor

Додано: 04.04.2012 10:27

ліве коліно,ліва сторона, дуже сильно притиснули до дерев'яної поверхні, не пухле, рухаюсь , сходами піднімаюсь ,біль з лівої сторони біля круглої частини коліна , травматолог сказав , що кістка не ушкоджена , але працювати , виконувати тяжку роботу ногою не можу, знімок нічого не показав. Що це таке? Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання! Імовірніше за все у вас забій колінного суглоба. Якщо після травми пройшло менше 7 днів - використовуйте знеболюючі препарати у вигляді гелю чи таблеток, а також мазь чи гель на основі гепарину (якщо є гематома). При ходьбі краще зафіксувати еластичною пов'язкою. Якщо часу пройшло більше - зверніться на консультацію до лікаря-травматолога.

З повагою, [лікар-ортопед, травматолог, Вадзюк Н.С.](#)

sanchek88

Меніск -що робити?

Додано: 01.11.2012 22:23

Доброго дня!2011року в серпні місяці на футбольному матчі після зіткнення отримав травму коліна(меніск розрив?)вже рік ходжу в наколіннику.Зараз коліно(ліве) щораз більше поболіє.Підкажіть,будь ласка,де можна прооперуватись в Західному регіоні і які передопераційні етапи треба пройти?Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 16.11.2012 12:38

Доброго дня!2011року в серпні місяці на футбольному матчі після зіткнення отримав травму коліна(меніск розрив?)вже рік ходжу в наколіннику.Зараз коліно(ліве) щораз більше поболіє.Підкажіть,будь ласка,де можна прооперуватись в Західному регіоні і які передопераційні етапи треба пройти?Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання. Для підтвердження пошкодження меніска потрібно зробити МРТ-обстеження. Оперативне лікування виконується в травматологічних відділеннях лікарень, де володіють технікою артроскопії. Теоретично таку операцію можливо зробити в будь-якому обласному центрі.

З повагою, [лікар-ортопед, травматолог, Вадзюк Н.С.](#)

IrunaKyruo

Звих правого надколінника

Додано: 10.01.2013 13:25

Доброго дня!

З тижні тому в мене вискочила чашка коліна, за допомогою інструктора коліно вправили, і відправили в травмпункт. Там мені зробили рентген, після якого наклали лангет на 2 тижні. Після чого провели контрольний знімок коліна, висновки наступні - Незначне звуження міжсуглобової щілини. Що це означає? Що мені погано вправили коліно чи це запальний процес?

Лікар сказав ще тиждень потрібно бути в гіпсі!

Такий випадок в мене не вперше, в мене вискакувала чашка але ставала сама на місце,багато хто вважає що в мене слабкі звязки і бажано робити операцію на коліно. мені 21 рік і до операції ставлюсь негативно... Що Ви можете мені порадити в моїй ситуації? Як повинна проходити

реабілітація?

І чи можна після такої травми займатись шейпінгом чи аквааеробікою?

Дуже вдячна!

medisvit\_doctor

Додано: 14.01.2013 11:32

Доброго дня!

3 тижні тому в мене вискочила чашка коліна, за допомогою інструктора коліно вправили, і відправили в травмпункт. Там мені зробили рентген, після якого наклали лангет на 2 тижні. Після чого провели контрольний знімок коліна, висновки наступні - Незначне звуження міжсуглобової щілини. Що це означає? Що мені погано вправили коліно чи це запальний процес?

Лікар сказав ще тиждень потрібно бути в гіпсі!

Такий випадок в мене не вперше, в мене вискакувала чашка але ставала сама на місце, багато хто вважає що в мене слабкі зв'язки і бажано робити операцію на коліно. мені 21 рік і до операції ставлюсь негативно... Що Ви можете мені порадити в моїй ситуації? Як повинна проходити реабілітація?

І чи можна після такої травми займатись шейпінгом чи аквааеробікою?

Дуже вдячна!

Доброго дня, шановний автор запитання. Незначне звуження суглобової щілини - це одна з рентгенологічних ознак розвитку остеоартрозу (патології суглобового хряща). Що саме по собі не є діагнозом, а вказує на МОЖЛИВІ початкові зміни хряща. Для постановки діагнозу потрібно дані клінічного огляду, сукупності рентгенологічних ознак артрозу.

Ваші описані симптоми схожі на звичний вивих надколінника. Так, це лікується оперативним шляхом. У вашій ситуації раджу зробити МРТ колінного суглобу, взяти всі рентгенограми та звернутись до травматолога з метою постановки точного діагнозу.

З повагою, [лікар-ортопед, травматолог, Кучеренко А.В.](#)

forvard040992

коліно

Додано: 06.03.2010 13:15

Добрий день!!!

У мене вже 3 місяць болить коліно. У зв'язку з тим що я дав на нього велику навантаження. Ввечері я носив 30 кілограмові мішки на третій поверх по сходах. Зранку проснувся і не міг розігнути ногу, десь через 2 неділі біль майже пройшов, ногу я вже розгинав, але я по своїй необачності впав і вдарився в коліно і після того біль вже не проходить. Коліно не спухше виглядає як здорове. Воно мене ноїть, коли пробіжусь то болить ще сильніше. Був в лікарні зробили знімок лікар на ньому нічого не побачив. Сказав що в мене артрит або артроз Мені 17 років я займаюсь волейболом за цей рік виріс на 12 см і я не розумію як в мене може бути артрит чи артроз . Прописав В/М уколи, які мені робили 5 днів по 5 уколів в день, також мазь і таблетки. Коліно всерйовно болить. Може хтось щось підкаже який точний діагноз і як вилічити коліно???. За любую інформацію буду дуже вдячний...

dock

коліно

Додано: 20.03.2010 22:37

доброго дня.

Мені 21р. у мене вже декілька місяців болять коліно, здебільшого праве. Лікар приписав мені мазь індометацин проте біль тільки стала сильнішою. Підкажіть будь ласка, що це може бути і що мені робити?

medisvit\_doctor

Додано: 24.03.2010 21:38

доброго дня.

Мені 21р. у мене вже декілька місяців болять коліно, здебільшого праве. Лікар приписав мені мазь індометацин проте біль тільки стала сильнішою. Підкажіть будь ласка, що це може бути і що мені робити?

Болі в ділянці коліна можуть бути викликані місцевими проблемами з кістками, м'якими тканинами(зв'язки, сухожилки, капсула), проблемами хребта і загальними запальними процесами(поліартрит, порушення обміну речовин). треба обстежитись: рентген, УЗИ, ЗА крові, все залежить від клінічної симптоматики, котру видно при обстеженні.

З повагою, лікар-травматолог Шмагой В.Л.

medisvit\_doctor

Додано: 26.07.2010 09:38

Добрий день!!!

У мене вже 3 місяць болять коліно. У зв'язку з тим що я дав на нього велику навантаження. Ввечері я носив 30 кілограмові мішки на третій поверх по сходах. Зранку проснувся і не міг розігнути ногу, десь через 2 неділі біль майже пройшов, ногу я вже розгинав, але я по своїй необачності впав і вдарився в коліно і після того біль вже не проходить. Коліно не спухше виглядає як здорове. Воно мене ноїть, коли пробіжусь то болять ще сильніше. Був в лікарні зробили знімок лікар на ньому нічого не побачив. Сказав що в мене артрит або артроз Мені 17 років я займаюсь волейболом за цей рік виріс на 12 см і я не розумію як в мене може бути артрит чи артроз . Прописав В/М уколи, які мені робили 5 днів по 5 уколів в день, також мазь і таблетки. Коліно всерйовно болять. Може хтось щось підкаже який точний діагноз і як вилічити коліно???. За будь-яку інформацію буду дуже вдячний...

Добрый день! для ответа на Ваш вопрос Вы предоставили слишком мало информации. хруст в суставах может возникать по разным причинам. причиной могут быть околосуставные либо внутрисуставные изменения. если это приносит дискомфорт и боль то нагружать суставы в любом случае не стоит. есть великолепные альтернативы: велосипед, плавание.

С уважением, Денисенко А.А.

SOIMNS

Додано: 04.03.2011 13:47

Доброго дня! Маю проблему з болями в правій частині правого коліна. Особливо це проявляється при грі у волейбол (при стрибках), також при ходьбі вгору по сходах. При зменшенні навантажень біль притуплюється, але не зникає повністю. Що ви мені зможете порадити?

medisvit\_doctor

Додано: 09.03.2011 10:27

Доброго дня! Маю проблему з болями в правій частині правого коліна. Особливо це проявляється при грі у волейбол (при стрибках), також при ходьбі вгору по сходцях. При зменшенні навантажень біль притуплюється, але не зникає повністю. Що ви мені зможете порадити?

Доброго дня, шановний автор запитання! Для того, щоб Вам щось порадити необхідно Вас оглянути. Зробити рентгенографію колінного суглоба, перевірити зв'язковий апарат. Якщо виникне необхідність, то зробити додаткові обстеження. На даний момент можу надати Вам прості рекомендації: обмежити навантаження, накласти еластичний бандаж на колінний суглоб упродовж активного часу доби. Якщо продовжуватиме турбувати сустав - приходьте на консультацію. Ми Вам обов'язково допоможемо.

З повагою, [лікар-травматолог, Денисенко О.О.](#)

farina

остеохондропатія

Додано: 03.11.2011 19:41

Здравствуйте. Моему сыну 11 лет. Он занимается 6 лет бальными танцами, два месяца назад у него начало болеть колено, врач ортопед сделал обследование и поставил диагноз (остеохондропатия коленной чашечки). Две недели в гипсе, мазать "Нимид-гель" два раза в день. Таблетки "Кидди". Прошел месяц, колено не болит. Можно ли заниматься танцами? Или о спорте стоит забыть? И подскажите пожалуйста может стоит пропить хотя бы кальций или другие препараты. У сына Атриовентрикулярная блокада 1 ст. Транзиторная атриовентрикулярная блокада 2 ст.

Kendi29

Додано: 06.11.2011 19:53

Доброго дня ! У мене часто бувають болі в колінах, навіть коли я сиджу. При бігові інколи болять, при стрибках! це розпочалось 1,5 назад зпочатку боліло одне коліно коли я його згинала, а тепер 2 і не тільки коли я його згинаю 😞 Мазі не дають ніякого ефекту 😞 Що це таке і чим воно зпчинено?

medisvit\_doctor

Додано: 08.11.2011 09:26

Доброго дня ! У мене часто бувають болі в колінах, навіть коли я сиджу. При бігові інколи болять, при стрибках! це розпочалось 1,5 назад зпочатку боліло одне коліно коли я його згинала, а тепер 2 і не тільки коли я його згинаю 😞 Мазі не дають ніякого ефекту 😞 Що це таке і чим воно зпчинено?

Доброго дня! Без огляду та додаткового обстеження важко сказати з чим можуть бути пов'язані ваші незручності та болі. Це може бути як перевантаження зв'язочного апарату, так і початок захворювання суглобів. Тому раджу записатись на прийом, щоб в'яснити в чому причина, та щоб знати як правильно лікуватись.

З повагою, [лікар-травматолог, Денисенко О.О.](#)

romanvasuluk

**Біль під коліном лівої ноги**

Додано: 23.03.2012 09:12

Доброго дня хочу хорошої консультації на рахунок лікування коліна. Приблизно місяць тому гаяв футбол і десь чи то став погано чи як навіть сам не знаю, як це сталося. Відчуваю біль під коліном лівої ноги - переважно коли присідаю або бігаю, був у поліклініці лікар - травматолог сказав, що потягнув м'яз коліна(?) виписав мазь долобене і сказав два тижні не давати навантажень і зафіксувати коліно бинтом або наколінником з того часу пройшло 3 тижні і біль ніби перестав, але після вчорашнього тренування відчуваю знов біль в тому самому місці, порадьте щось будь-ласка лікарю!!!!

medisvit\_doctor

Додано: 26.03.2012 10:19

Доброго дня хочу хорошої консультації на рахунок лікування коліна. Приблизно місяць тому гаяв футбол і десь чи то став погано чи як навіть сам не знаю, як це сталося. Відчуваю біль під коліном лівої ноги - переважно коли присідаю або бігаю, був у поліклініці лікар - травматолог сказав, що потягнув м'яз коліна(?) виписав мазь долобене і сказав два тижні не давати навантажень і зафіксувати коліно бинтом або наколінником з того часу пройшло 3 тижні і біль ніби перестав, але після вчорашнього тренування відчуваю знов біль в тому самому місці, порадьте щось будь-ласка лікарю!!!!

Доброго дня, шановний автор запитання! Колінний суглоб дуже складний за своєю будовою, в ньому є бокові, хрестоподібні зв'язки, два меніски, завороти, складки і т.д.

Якщо до цього часу біль не пройшов, варто оглянути коліно ще раз, оскільки будь-яка з вищеназваних структур може бути пошкоджена. Раджу звернутись на консультацію якомога швидше.

З повагою, [лікар-травматолог, Вадзюк Н.С.](#)

Masha

Vtyscr

Додано: 06.04.2012 14:18

Добрий день! Скажіть будь-ласка, якщо вже була операція на меніск і через певний час коліно болить (меніск не розірвався, а тонянувся, надірвався) чи обов'язково робити операцію чи можна проводити певні процедури в домашніх умовах для його лікування?

Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 25.04.2012 11:44

Добрий день! Скажіть будь-ласка, якщо вже була операція на меніск і через певний час коліно болить (меніск не розірвався, а тонянувся, надірвався) чи обов'язково робити операцію чи можна проводити певні процедури в домашніх умовах для його лікування?

Дякую!

Доброго дня, шановний автор. На ваше запитання неможливо відповісти без детального з'ясування всієї історії захворювання. Також необхідно очно оглянути коліно для виявлення причини болю.

З повагою, [лікар-ортопед, травматолог, Вадзюк Н.С.](#)

11any2006

Тест на толерантність до глюкози

Додано: 08.02.2013 14:44

Доброго дня. Звертаюся до вас з таким запитанням: на 28 тижні вагітності я здала тест на толерантність до глюкози(спочатку кров з пальця на тощак, потім дали випити 75 гр. глюкози з 250 гр. води і через 2 години знову кров з пальця) результати такі: натощак цукор 4,4 г/м, після 2 годин 8.1г/м.,дали направлення на повторне обстеження, а коли я запитала чи обов'язково здавати лікар ендокринолог відповіла, що як не здам напише мені діагноз діабет і відпустить. Чи має вона право так мені відповісти і чи насправді все настільки погано з моїм аналізом?Дуже чекаю на відповідь і дуже вдячна за відповідь.

medisvit\_doctor

Додано: 18.02.2013 14:38

Доброго дня. Звертаюся до вас з таким запитанням: на 28 тижні вагітності я здала тест на толерантність до глюкози(спочатку кров з пальця на тощак, потім дали випити 75 гр. глюкози з 250 гр. води і через 2 години знову кров з пальця) результати такі: натощак цукор 4,4 г/м, після 2 годин 8.1г/м.,дали направлення на повторне обстеження, а коли я запитала чи обов'язково здавати лікар ендокринолог відповіла, що як не здам напише мені діагноз діабет і відпустить. Чи має вона право так мені відповісти і чи насправді все настільки погано з моїм аналізом?Дуже чекаю на відповідь і дуже вдячна за відповідь.

Доброго дня, шановний автор запитання!

За наведеними вами даними, рівень глюкози дійсно є дещо підвищеним. Але ваш лікар вочевидь має на увазі, що сталася помилка, що хвороби немає, що скоріш за все наявні порушення в процесі підготовки до тесту та під час забору крові. На теперішній час існують стандарти проведення глюкозотолерантного тесту у вагітних. Особливістю цих стандартів є, наприклад, те, що глюкоза визначається у венозній крові, а не у крові з пальця (капілярній). Також дуже важливо, щоб до проведення проби було натще, останній прийом їжі за 10-12 годин до тесту. Я рекомендую вам повторити дослідження за всіма правилами і без хвилювань.

З повагою, [лікар-ендокринолог, Волобасва Л.Ю.](#)

solbka

АІТ

Додано: 17.12.2012 20:35

Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є залежність між аутоімунним тиреоїдитом та себореїним дерматитом? АІТ нещодавно виявлений, субатрофічна форма, еутиреоз (ТТГ 3,42; АТПО - 193,7; АТТГ - 170,3). Діагноз себореїний дерматит ставили за 3 місяці до виявлення АІТ. Призначене лікування дерматиту допомогло тимчасово. Вік 26. Дякую.



medisvit\_doctor

Додано: 17.01.2013 13:42

Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є залежність між аутоімунним тиреоїдитом та себорейним дерматитом? АІТ нещодавно виявлений, субатрофічна форма, еутиреоз (ТТГ 3,42; АТПО - 193,7; АТТГ - 170,3). Діагноз себорейний дерматит ставили за 3 місяці до виявлення АІТ. Призначене лікування дерматиту допомогло тимчасово. Вік 26. Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання! Дійсно, в літературі є вказівки на зв'язок себорейного дерматиту з порушеннями імунітету, однак мова йде про його зниження (наприклад, ВІЛ, СНІД). Частіше АІТ та себорейний дерматит є не пов'язаними між собою та зустрічаються незалежно.

З повагою, лікар-ендокринолог Гутаревич Г.О.

marjynka

**Перевірка щитовидної залози.**

Додано: 28.02.2011 10:04

Чи можна якимось чином перевірити стан своєї щитовидної залози? Чи можливе лікування на дому?

medisvit\_doctor

Додано: 01.03.2011 17:04

Чи можна якимось чином перевірити стан своєї щитовидної залози? Чи можливе лікування на дому?

Доброго дня, шановний автор запитання! Для визначення стану щитоподібної залози необхідно провести УЗД, що дозволить оцінити структуру щитоподібної залози, і визначити вміст у крові основних гормонів, що характеризують її функцію: вільного тироксину та тиреотропного гормону. Лікування захворювань щитоподібної залози "на дому" можливо, бо зазвичай воно тривале (місяці і навіть роки) і рідко вимагає стаціонарного режиму. Виключеннями є випадки, коли необхідне хірургічне втручання.

З повагою, [лікар-ендокринолог Ляпкало Л.М.](#)

kate\_sobbo

**дитина постійно висовує язичок**

Додано: 06.01.2011 13:43

моя 2 місячна дитина постійно висовує язичок, і навіть часто спить з висунутим язиком. на це звернула увагу невролог і відправила нас до ендокринолога, а ендокринолог говорить що це неврологія.....кому вірити і до кого звертатись?

kate\_sobbo

Додано: 06.01.2011 14:06

хотіла ще додати що дитина народилась недоношеною на 34 тижні вагітності, скринінг на ттг в нормі.(0,6) і язичок в неї в період гри постійно в русі, тобто вона його то висовує, то засовує.....але все таки наш невролог говорить що він її не подобається, і що нам необхідна консультація ендокринолога! тобто вона хоче щоб виключили гіпотеріоз, незважаючи на результати аналізів! скажіть будь-ласка, які ще повинні бути симптоми у 2 місячної дитини крім висунутого язика, і чи можна стверджувати про наявність хвороби лише за висунутим у дитини язичком?

medisvit\_doctor

Додано: 18.01.2011 16:52

хотіла ще додати що дитина народилась недоношеною на 34 тижні вагітності, скринінг на ттг в нормі.(0,6) і язичок в неї в період гри постійно в русі, тобто вона його то висовує, то засовує....але все таки наш невролог говорить що він її не подобається, і що нам необхідна консультація ендокринолога! тобто вона хоче щоб виключили гіпотеріоз, незважаючи на результати аналізів! скажіть будь-ласка, які ще повинні бути симптоми у 2 місячної дитини крім висунутого язика, і чи можна стверджувати про наявність хвороби лише за висунутим у дитини язичком?

Добрий день, шановний автор питання! Для гіпотиреоза в цьому віці характерно: зміна голосу (стає грубим), дитина погано набирає вагу, є зміни м'язового тонуса, погіршується стан шкіри. Проте, перебіг захворювання і симптоми індивідуальні, тому виключити або підтвердити наявність захворювання має ендокринолог. Нажаль, Ви не вказуєте які симптоми, крім язика, непокоять невролога. Тобто, з боку нервової системи лікар знаходить патологічні зміни чи ні? При таких скаргах бажано проконсультувати дитину у дитячого хірурга з приводу вуздечки язика, та отоларинголога, для перевірки функціонування носоротоглотки.

З повагою, лікар-терапевт Гнилокурєнко А.В.

katy

харчова алергія

Додано: 22.08.2011 23:40

В моєї дочки харчова алергія приблизно почалась рік назад(почалось з апльсин висипало все тіло червоними п'ятнами) і з того часу ми дуже часто сидимо на гіперактивні дієті, так як з'їсть чогось з харчовими добавками зразу висипка по цілому тілу. Правда літом алергії не було ні на суниці ні на інші фрукти і овочі(апельсини ми не вживаємо). Алергія виникає після харчових добавок у продуктах наприклад у печеннях різного виду. Підкажіть невже вона не буде їсти нічого з магазинних продуктів. Дочці 5 років

medisvit\_doctor

Додано: 29.08.2011 14:56

В моєї дочки харчова алергія приблизно почалась рік назад(почалось з апльсин висипало все тіло червоними п'ятнами) і з того часу ми дуже часто сидимо на гіперактивні дієті, так як з'їсть чогось з харчовими добавками зразу висипка по цілому тілу. Правда літом алергії не було ні на суниці ні на інші фрукти і овочі(апельсини ми не вживаємо). Алергія виникає після харчових добавок у продуктах наприклад у печеннях різного виду. Підкажіть невже вона не буде їсти нічого з магазинних продуктів. Дочці 5 років

Доброго дня, шановний авто запитання! Алергія на харчові добавки (барвники, стабілізатори, консерванти та ін.) зустрічається дуже часто, і може бути як істинною, так і неправдивою. У будь-якому випадку продуктів з харчовими добавками необхідно уникати. Подібна ситуація дуже часто виникає при порушеннях роботи травної системи. Тому раджу проконсультуватися з лікарем. Доброго Вам здоров'я!

З повагою, [лікар-педіатр-алерголог Шуміліна-Абрамовська Н.В.](#)

glowen

**Свербіж усього тіла**

Додано: 01.05.2011 01:59

Добрий день, лікарю. Звертаюся до Вас з проблемою наступного характеру. Мені 26 років. Помітних алергічних реакцій раніше не помічала. З пів-року тому у мене розпочали свербіти різні ділянки на тілі. Після чухання з'являються червоні плями, які зразу стають навіть трохи припухлими, але згодом вони зникають. Після звернення до лікаря він призначив аналізи на глисти. Аналізи показали нижчу за пороговий рівень вірогідність зараження глистами. Зараз я змінила місце проживання і живу закордоном. Ще 2 місяці (за правилами еміграції) я не можу звертатися до лікаря як громадянка за місцем проживання. А проблема загострюється з кожним днем. На сьогодні свербить уже все тіло і навіть статеві органи. Я у розпачі. Допоможіть будь ласка дієвою порадою. Дякую за розуміння.

medisvit\_doctor

Додано: 05.05.2011 11:19

Добрий день, лікарю. Звертаюся до Вас з проблемою наступного характеру. Мені 26 років. Помітних алергічних реакцій раніше не помічала. З пів-року тому у мене розпочали свербіти різні ділянки на тілі. Після чухання з'являються червоні плями, які зразу стають навіть трохи припухлими, але згодом вони зникають. Після звернення до лікаря він призначив аналізи на глисти. Аналізи показали нижчу за пороговий рівень вірогідність зараження глистами. Зараз я змінила місце проживання і живу закордоном. Ще 2 місяці (за правилами еміграції) я не можу звертатися до лікаря як громадянка за місцем проживання. А проблема загострюється з кожним днем. На сьогодні свербить уже все тіло і навіть статеві органи. Я у розпачі. Допоможіть будь ласка дієвою порадою. Дякую за розуміння.

Добрий день, шановний автор питання!

Схоже на те, що Ви страждаєте на таке алергічне захворювання як кропив'янка. Звісно, Вам треба буде ретельно обстежуватись, як тільки дозволить ситуація. Мова йде про обстеження органів травлення, гінекологічне обстеження і, бажано, щитоподібної залози, - виключити ті патології, що найчастіше підтримують рецидиви кропив'янки. Зараз Ви можете приймати проти-алергічні препарати (Єріус або Кларитин) по 1 таб. 1 раз на день вранці, при необхідності - додавати Ксизал по 1 таб. ввечері. Також треба притримуватись без-алергійної дієти: обмежити вживання морепродуктів, молока, меду, горіхів, кави, вина, курячих яєць, та ін.

З повагою, [лікар-алерголог-пульмонолог Голубовська-Компанченко Т.А.](#)

glowen

**ЩИРО ВДЯЧНА**

Додано: 05.05.2011 17:30

Шановна, лікарко! Щиро вдячна Вам за консультацію та просте людське розуміння моєї проблеми. Дай Вам Боже здоров'я

oksi1977

**Свербить усе тіло**

Додано: 06.02.2012 22:05

Доброго дня! У мене, чоловіка і доньки свербить усе тіло, виходять маленькі прищі, почешуться і зникають. Ходили до лікаря два рази з цією проблемою, вона сказала алергія, прописала лоратадин, після чого не певний період перестало свербіти, але потім знову почало. Порадьде щось дієвіше будь ласка. Чи може передаватися алергія. Гарно дякую за допомогу!

medisvit\_doctor

Додано: 07.02.2012 16:39

Доброго дня! У мене, чоловіка і доньки свербить усе тіло, виходять маленькі прищі, почешуться і зникають. Ходили до лікаря два рази з цією проблемою, вона сказала алергія, прописала лоратадин, після чого не певний період перестало свербіти, але потім знову почало. Порадьде щось дієвіше будь ласка. Чи може передаватися алергія. Гарно дякую за допомогу!

Добрий день! Алергія, звісно, не передається. Зауваживши на те, що висип є у всіх членів родини і супроводжується свербіжем, треба звернутися до дерматолога, щоб виключити те захворювання шкіри, що передається.

З повагою, [лікар-алерголог-пульмонолог Голубовська-Компанченко Т.А.](#)

oksi1977

Додано: 08.02.2012 21:21

До дерматолога ходила з донькою раніше вона сказала алергія

medisvit\_doctor

Додано: 09.02.2012 16:13

До дерматолога ходила з донькою раніше вона сказала алергія

Добрий день. Малоімовірно, щоб вся родина раптом одночасно захворіла на алергію. Необхідно обов'язково виключати хвороби, що передаються. Порекомендувала б також обстежитись на глисти: кров на антитіла до лямблій, аскарид, токсокар. Звертаю вашу увагу на те, що я вас не бачу. Якщо мова дійсно йде про алергію, то слід вияснити причинні алергени та відповідно лікуватись під наглядом алерголога.

З повагою, [лікар-алерголог-пульмонолог Голубовська-Компанченко Т.А.](#)

qaz1234xsw

Алергія

Додано: 06.04.2011 20:13

Добрий вечір ,мені 31 рік, у мене така ситуація : вже десь років 10 у мене алергія - тіло стає червоним,появляються білі вулдири(вони збільшуються і переходять в суцільні спухлі ділянки тіла – по всьому тілу),свербіж,відчуття сильного тепла навіть гарячості тіла.Симптоми алергії проходять в середньому 8-12 разів на рік по моїм спостереженням на хлібо - молочну продукцію але не завжди (рідко) думаю тоді коли до неї добавляють якісь добавки (напевно якусь хімізу) Я приймаю кетотіфен і симптоми потрохи починають проходити десь за 30-40 хв., а за 1.5- 2 год. фактично зникають і залишається слабкість і сонливість . Останні два рази мені при алергії ставало досить погано: потемніння в очах, втрата координації ,загальна слабкість,потовиділення,прискорене серцебиття,відчуття що втрачу свідомість,тошнота,також ті які а описав вище - тіло стає червоним,появляються білі вулдири(вони збільшуються і переходять в суцільні спухлі ділянки тіла – по всьому тілу),свербіж ,відчуття сильного тепла навіть гарячості тіла (трохи допомагало якщо присяду і не рухатимусь але все рівно почувався погано). Коли смптоми почали потрохи проходити(десь через 30 хв. після приймання кетотіфену появлялась головна біль,сухість у роті,трохи важкувате дихання,слабкість і сонливість. Скажіть що вони означають? Наскільки це небезпечно для організму? Наперед вдячний за відповідь.

medisvit\_doctor

Додано: 07.04.2011 18:19

Добрий вечір ,мені 31 рік, у мене така ситуація : вже десь років 10 у мене алергія - тіло стає червоним,появляються білі вулдири(вони збільшуються і переходять в суцільні спухлі ділянки тіла – по всьому тілу),свербіж,відчуття сильного тепла навіть гарячості тіла.Симптоми алергії проходять в середньому 8-12 разів на рік по моїм спостереженням на хлібо - молочну продукцію але не завжди (рідко) думаю тоді коли до неї добавляють якісь добавки (напевно якусь хімію) Я приймаю кетотифен і симптоми потрохи починають проходити десь за 30-40 хв., а за 1.5- 2 год. фактично зникають і залишається слабкість і сонливість . Останні два рази мені при алергії ставало досить погано: потемніння в очах, втрата координації ,загальна слабкість,потовиділення,прискорене серцебиття,відчуття що втрачу свідомість,тошнота,також ті які я описав вище - тіло стає червоним,появляються білі вулдири(вони збільшуються і переходять в суцільні спухлі ділянки тіла – по всьому тілу),свербіж ,відчуття сильного тепла навіть гарячості тіла (трохи допомагало якщо присяду і не рухатимусь але все рівно почувався погано). Коли симптоми почали потрохи проходити(десь через 30 хв. після приймання кетотифену появлялась головна біль,сухість у роті,трохи важкувате дихання,слабкість і сонливість. Скажіть що вони означають? Наскільки це небезпечно для організму? Наперед вдячний за відповідь.

Доброго дня шановний автор! По тих симптомах, які Ви описали, можна думати, що це рецидивуюча кропив'янка, на яку страждають досить багато людей (тобто це не якась загадкова хвороба). Загострення можуть бути спровоковані деякими продуктами харчування, але не вони є причиною. Вам буде потрібно обстежити шлунково-кишковий тракт (зробити УЗД органів черевної порожнини, здати кров на печінкові проби, також звернутися до гастроентеролога у разі виявлення патології). По-друге, потрібно обстежитися у спеціаліста-уролога для виключення хронічних запальних процесів. І, як останнє, - УЗІ щитовидної залози для виключення патології (вузлів, аутоімунних процесів), що також сприяє розвитку алергічних захворювань. Крім того, Ваш вибір кетотифену для блокування проявів кропив'янки не є правильним. Кетотифен розвиває максимальну дію на 7-10 день прийому, а побічна дія - сонливість, заторможеність - дуже виражені. Краще приймати препарат Еріус по 1 таб. в день, або Семпрекс по 1 капс. 3 рази на день, або 2 капс. одномоетно. Але головне - це обстеження у лікаря, тому раджу Вам записатися на прийом, дзвоніть до нашого контакт-центру - 393 0000.

З повагою, [лікар-алерголог-пульмонолог Голубовська-Компанченко Т.А.](#)

NataliGalica

Додано: 03.09.2011 00:52

доброї ночі! після купання в ванні в донечки висип на ніжках(ніби кропивою попекла). цей висип проявляється вдруге. що це може бути та як лікувати? дякую

medisvit\_doctor

Додано: 08.09.2011 15:25

доброї ночі! після купання в ванні в донечки висип на ніжках(ніби кропивою попекла). цей висип проявляється вдруге. що це може бути та як лікувати? дякую

Доброго дня, шановна мамо! У вашої дитини кропив'янка спровокована або гарячою водою, або

миючими засобами. Причина може бути закладена всередині організму. Слід звернутися до лікаря.

З повагою, [лікар-педіатр-алерголог Шуміліна-Абрамовська Н.В.](#)

irynka

Додано: 22.10.2012 14:02

Доброго дня! В мого чоловіка алергія, зробив алергопроби і йому пропонують лікування що триватиме 4 роки. Ми з чоловіком запланували вагітність, скажіть чи передасться воно в спадковість? ми спершу хочемо вагітніти а тоді починати лікування, скажіть чи правильно ми робимо?

medisvit\_doctor

Додано: 22.10.2012 14:55

Доброго дня! В мого чоловіка алергія, зробив алергопроби і йому пропонують лікування що триватиме 4 роки. Ми з чоловіком запланували вагітність, скажіть чи передасться воно в спадковість? ми спершу хочемо вагітніти а тоді починати лікування, скажіть чи правильно ми робимо?

Доброго дня! Було б добре, якби Ви точно назвали, які саме алергопроби були позитивні, яким точно методом алерговакцинації збирається лікуватися Ваш чоловік? Чому саме 4 роки? Що до спадковості, то успадковуються не тільки алергічні хвороби, але це не залежить від того, чи проводилася алерговакцинація. Дайте відповіді на мої запитання, я зможу дати більше детальної інформації.

З повагою, [лікар-алерголог-пульмонолог Голубовська-Компанченко Т.А.](#)

frey-lyalya

**підвищена температура**

Додано: 03.12.2012 17:00

Доброго дня! У мене таке питання, скажіть будь-ласка, два дні тому перехворіла ГРЗ (та був ларингіт) запізно звернулася до лікаря, назначили антибіотики на 3 дня, після чого полегшало. Температура під час хвороби була 37,5-38. Проте залишився кашель та нежить. А зараз знову закладає ніс та температура тримається від 37 - 37,4. Чи може за два дні знову взятися вірусне захворювання, адже за останній місяць я хворіла уже 2 рази. Що це може бути та порадьте будь-ласка можливо щось для покращення імунітету?

Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 04.12.2012 16:21

Доброго дня! У мене таке питання, скажіть будь-ласка, два дні тому перехворіла ГРЗ (та був ларингіт) запізно звернулася до лікаря, назначили антибіотики на 3 дня, після чого полегшало. Температура під час хвороби була 37,5-38. Проте залишився кашель та нежить. А зараз знову закладає ніс та температура тримається від 37 - 37,4. Чи може за два дні знову взятися вірусне захворювання, адже за останній місяць я хворіла уже 2 рази. Що це може бути та порадьте будь-ласка можливо щось для покращення імунітету?

Дякую!

Доброго дня, шановний автор запитання. Враховуючи Ваші скарги, вірусна інфекція підряд два рази практично ніколи не виникає, у випадку, коли після вірусної інфекції не проходить нежить, та є підвищена температура тіла, це може свідчити про запалення порожнини носу та пазух (гайморит). Тому Вам необхідно звернутися до ЛОР-лікаря, для призначення правильного лікування та запобігання ускладнень. Самолікування у даному випадку може бути неефективне та може призвести до хронізації процесу.

З повагою, [лікар-отоларинголог, Прима В.А.](#)

oksi22021977

епісіндром

Додано: 02.03.2013 10:06

Доброго дня! Моїй доньці 14 років 28.02.2013 вночі стався приступ, який продовжувався 3-4 хв (сціпила зуби, слина з рота і трохи харкотіла), відвезли на швидку там прокапали на наступний день відпустили додому. 01.03 звирнулися в обласну лікарню до невролога, який поставив діагноз - епісіндром, назначив лікування фінлепсин 200 ретард, кардонат. Зробили МРТ - одиночне дрібне вогнище гліозу лівої гемісфери (4мм в діаметрі) без наявних ознак органічного ураження головного мозку. Лікар був не багатословний підкажіть будь ласка це виліковно і що можна ще робити щоб приступ не повторювався.

medisvit\_doctor

Додано: 11.03.2013 12:37

Доброго дня! Моїй доньці 14 років 28.02.2013 вночі стався приступ, який продовжувався 3-4 хв (сціпила зуби, слина з рота і трохи харкотіла), відвезли на швидку там прокапали на наступний день відпустили додому. 01.03 звирнулися в обласну лікарню до невролога, який поставив діагноз - епісіндром, назначив лікування фінлепсин 200 ретард, кардонат. Зробили МРТ - одиночне дрібне вогнище гліозу лівої гемісфери (4мм в діаметрі) без наявних ознак органічного ураження головного мозку. Лікар був не багатословний підкажіть будь ласка це виліковно і що можна ще робити щоб приступ не повторювався.

Доброго дня, шановний автор запитання! Діагноз "Епісіндром" ставиться, якщо людина звернулася до лікаря вперше зі скаргами, які характерні для епілепсії. Пацієнта детально обстежують: повинен бути зібраний анамнез (історія) життя, анамнез захворювання, проведена Електроенцефалографія, МРТ головного мозку та інші обстеження. Лише після дообстеження лікар може поставити певний діагноз.



Згідно до рекомендацій ILAE (Всесвітня антиепілептична ліга), лікування після першого нападу не призначається, виключенням є складні генералізовані та парціальні напади, які, крім чітко вираженої клінічної картини мають чітко ідентифіковану морфофункціональну основу при параклінічному обстеженні.

За думкою багатьох спеціалістів, лікування епілепсії необхідно призначати після повторного нападу. Одиначний пароксизм може бути «випадковим», обумовленим лихоманкою, перегрівом, інтоксикацією, метаболічними розладами, і не мати відношення до епілепсії.

З повагою, [лікар-дитячий невролог, Холодницька О.І.](#)

inform111

зниження пам'яті

Додано: 16.11.2012 23:38

inform111

зниження пам'яті

Додано: 16.11.2012 23:42

добрий вечір, студенту під час підготовки до екзаменів порадили приймати Аміналон, яка ваша думка з приводу цього?

medisvit\_doctor

Додано: 23.11.2012 11:31

добрий вечір, студенту під час підготовки до екзаменів порадили приймати Аміналон, яка ваша думка з приводу цього?

Доброго дня, шановний автор запитання.

Аміналон не є препаратом, ефективним для покращення запам'ятовування, підвищення концентрації уваги і т.д через його низьку біодоступність.

Іншими словами, гама-аміномасляна кислота (а це і є препарат "аміналон") не потрапляє в головний мозок в кількості, необхідній для виникнення бажаних ефектів. Тому з неї було синтезовано багато сполук (пірацетам, ноофен, фентропіл, тощо), які позбавлені цього недоліку. Препарати цього ряду успішно використовують студенти, розпочинаючи прийом за 20-30 днів до сесії. Але в кожного з цих препаратів є перелік протипоказань та побічних дій, які треба уважно прочитати та врахувати. І бажано, щоб рішення приймалося сумісно з Вашим лікарем, враховуючи перш за все особливості Вашого організму, а не потребу в успішному складанні іспитів.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)



inform111

Додано: 28.11.2012 23:35

добрий вечір, студенту під час підготовки до екзаменів порадили приймати Аміналон, яка ваша думка з приводу цього?

Доброго дня, шановний автор запитання.

Аміналон не є препаратом, ефективним для покращення запам'ятовування, підвищення концентрації уваги і т.д через його низьку біодоступність.

Іншими словами, гама-аміномасляна кислота (а це і є препарат "аміналон") не потрапляє в головний мозок в кількості, необхідній для виникнення бажаних ефектів. Тому з неї було синтезовано багато сполук (пірацетам, ноофен, фентропіл, тощо), які позбавлені цього недоліку. Препарати цього ряду успішно використовують студенти, розпочинаючи прийом за 20-30 днів до сесії. Але в кожного з цих препаратів є перелік протипоказань та побічних дій, які треба уважно прочитати та врахувати. І бажано, щоб рішення приймалося сумісно з Вашим лікарем, враховуючи перш за все особливості Вашого організму, а не потребу в успішному складанні іспитів.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

Дякую за відповідь. З перелічених вами препаратів зацікавив пірацетам (через невисоку вартість) також дещо знайомий з його властивостями (навчаюсь у мед. вузі). Чи не могли б ви надати консультацію з приводу: часу прийому, доз, довготривалість, а також побічних ефектів на які слід звернути увагу (особливо: екстра пірамідальні розлади...)

medisvit\_doctor

Додано: 30.11.2012 10:59

Дякую за відповідь. З перелічених вами препаратів зацікавив пірацетам (через невисоку вартість) також дещо знайомий з його властивостями (навчаюсь у мед. вузі). Чи не могли б ви надати консультацію з приводу: часу прийому, доз, довготривалість, а також побічних ефектів на які слід звернути увагу (особливо: екстра пірамідальні розлади...)

Доброго дня. Пірацетам є дійсно препаратом першого вибору, хоча брендовий препарат не такий і дешевий. Для студента медичного університета буде корисним прочитати підручник з клінічної фармакології, - главу, присвячену ноотропам, щоб глибше зрозуміти природу побічної дії та різної частоти різних ускладнень терапії. Щоб оцінити Ваш індивідуальний ризик виникнення судомних нападів або екстрапірамідних порушень, як Вам вже напевно відомо, існує не тільки збір скарг, але й збір анамнезу та очний огляд. На щастя для їх проведення Ви маєте можливість звернутися до своєї кафедри неврології. Приймати ліки, спираючись на заочні консультації чи поради друзів не розумно і безвідповідально.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

irynka

епілепсія

Додано: 18.10.2012 17:11

Доброго Дня! Я лікую епілептичні напади вже 3 роки. Напади в мене були лише вночі, я прокидалась в туалет і різко шум в голові жар по тілу і втрата свідомості. Лікую ламікталом

50мг в день. За 3 роки напади повторились 2 разі, 1 на фоні зміни препарату, інший був безз втрати свідомості з невідомих причин. Хочу запитати, я планную вагітніти чи можна зменшити дозу, і чи не передасться це дитинці в спадковість? І взагалі які особливості перетікання вагітності в таких випадках.

medisvit\_doctor

Додано: 24.10.2012 16:19

Доброго Дня! Я лікую епілептичні напади вже 3 роки. Напади в мене були лише вночі, я прокидалась в туалет і різко шум в голові жар по тілу і втрата свідомості. Лікую ламікталом 50мг в день. За 3 роки напади повторились 2 разі, 1 на фоні зміни препарату, інший був безз втрати свідомості з невідомих причин. Хочу запитати, я планную вагітніти чи можна зменшити дозу, і чи не передасться це дитинці в спадковість? І взагалі які особливості перетікання вагітності в таких випадках.

Доброго дня, шановний автор! На ваеш запитання дають відповідь лікар-невролог та лікар-гінеколог:

Якщо у Вас діагностовано епілепсію, протиепілептичний препарат може бути відмінений після 2,5-4 років повної відсутності нападів, чого не спостерігається. Але невідомим є а ні Ваш точний діагноз, а ні характер змін на ЕЕГ, тому говорити про наслідки для дитини неможливо. Рішення про те, який препарат слід приймати, і в якій дозі, і як довго вирішується тільки лікарем і виключно при очній консультації. Більше того, бажано проконсультуватися в спеціалізованому епілептологічному центрі.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

Зменшувати дозу не можна ні в якому разі, тому що під час вагітності епілептичні напади, як правило, посилюються.

З повагою, [лікар-гінеколог, Микилюк А.В.](#)

Katya29

**Постійна знервованість.**

Додано: 19.04.2012 15:04

Останнім часом (останній рік) я помітила за собою надмірну знервованість, подекуди тривогу з нічого. Стала часто плакати, хоча раніше у мене такого не було. Мені нехочеться нікуди виходити, нічого робити, стала дуже швидко втомлюватись, постійно відчуваю якусь слабкість. Під очима мішки постійно. Вже пробувала і вітаміни якісь пити і чаї з м'ятою та мелісою, і починати день з бадьорої музики і зарядки - симптоми не проходять. Я постійно нервова і через дрібниці кричу на усіх..( коли не кричу, а стримуюсь, то таке враження що всередині у мене усе от-от взірветься). Якщо так буде далі, то моє весілля у вересні може так і не відбутися... П.С. Це все у мене почалося ще до заручин та весільних клопотів, тому у цьому причини не може бути..

Підкажіть будь ласка що це таке у мене може бути, і що мені робити.

medisvit\_doctor

Додано: 20.04.2012 13:07

Останнім часом (останній рік) я замітила за собою надмірну знервованість, подекуди тривогу з нічого. Стала часто плакати, хоча раніше у мене такого не було. Мені нехочеться нікуди виходити, нічого робити, стала дуже швидко втомлюватись, постійно відчуваю якусь слабкість. Під очима мішки постійно. Вже пробувала і вітаміни якісь пити і чаї з м'ятою та мелісою, і починати день з бадьорої музики і зарядки - симптоми не проходять. Я постійно нервова і через дрібниці кричу на усіх..( коли не кричу, а стримуюсь, то таке враження що всередині у мене усе от-от взірветься). Якщо так буде далі, то моє весілля у вересні може так і не відбутися...

П.С. Це все у мене почалося ще до заручин та весільних клопотів, тому у цьому причини не може бути..

Підкажіть будь ласка що це таке у мене може бути, і що мені робити.

Доброго дня, шановний автор запитання!

Ваш стан схожий за описом на тривожний або депресивний розлад. На сьогоднішній день існують ефективні та безпечні засоби для його подолання. Потрібно звернутися на консультацію до невролога. Бажано перед цим зробити загальний аналіз крові, рентгенографію легень, аналіз крові на гормони щитоподібної залози. Якщо весілля у вересні, не зволікайте з візитом до лікаря більше місяця.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

Olena13

Головна біль

Додано: 14.01.2012 12:03

Доброго дня !

У мене дуже сильно болить голова, тобто права частина голови від голови до шиї, і вухо болить навіть зуби, і гланди, але саме все в правій стороні.

Піскажіть будь ласка щось проти болі, якісь препарати що небудь. бо прийом до лікаря назначений аж через пару днів

Дякую !

medisvit\_doctor

Додано: 16.01.2012 16:12

Доброго дня !

У мене дуже сильно болить голова, тобто права частина голови від голови до шиї, і вухо болить навіть зуби, і гланди, але саме все в правій стороні.

Піскажіть будь ласка щось проти болі, якісь препарати що небудь. бо прийом до лікаря назначений аж через пару днів

Дякую !

Доброго дня, шановний автор запитання!

Якщо це невралгія трійчастого нерву - "Лірика" 75 мг 2 рази на день (маса тіла 75 кг), якщо мігрень - "Золміг" 2,5 мг 1 раз на день, якщо синусит - антибіотик.

Досить важко однозначно радити яке лікування приймати, за умови що я Вас не оглядала та висновків не ставила.

Тому негайно зверніться до будь-якого невропатолога, або терапевта, якщо в Вашому місті невропатологів немає.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

vlad123

**Головний біль, запаморочення**

Додано: 02.01.2012 22:28

Добрий День. Недавно в мене почалися запаморочення і незначні головні болі. Зробив доплероскопію шийного відділу: Висновок: "Гемодинамічні порушення кровоплину по вертебральній артерії зліва, за рахунок компресії в поперековому каналі С-4, С-5, С-6 при функціональних пробах Д-2.0 мм., з протилежної сторони - 5.2 мм., Ознак венозного застою невиявлено." Лікар сказав що це вроджене. Чи лікується таке захворювання і як ?

vlad123

Додано: 02.01.2012 22:30

Дякую

vlad123

Додано: 02.01.2012 22:32

І скажіть будь ласка, до якого лікаря можна звернутися !?

medisvit\_doctor

Додано: 03.01.2012 13:59

Добрий День. Недавно в мене почалися запаморочення і незначні головні болі. Зробив доплероскопію шийного відділу: Висновок: "Гемодинамічні порушення кровоплину по вертебральній артерії зліва, за рахунок компресії в поперековому каналі С-4, С-5, С-6 при функціональних пробах Д-2.0 мм., з протилежної сторони - 5.2 мм., Ознак венозного застою невиявлено." Лікар сказав що це вроджене. Чи лікується таке захворювання і як ?

Доброго дня, шановний автор запитання!

Так, звичайно, лікується. Симптомів можна позбутися. Тобто головний біль і запаморочення зникнуть на фоні лікування, незважаючи на те, що "вроджене" залишиться таким, як і було - адже воно Вам не заважало раніше, не буде заважати і після курсу лікування... Рекомендована консультація невролога (впевнена, так і записано у Вашому консультативному висновку).

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

arichkasmiluk

**Порушення сну!**

Додано: 08.12.2011 13:32

Доброго дня! Мені 20 років, я професійно займаюся спортом. В останні тижні почав погано спати. Порушення сну пов'язане з обставинами проживання (живу в гуртожитку). Проте мені як активній людині потрібен стовідсотковий сон. Скажіть будь ласка чи безпечно приймати мені такий препарат як мелатонін? Яка доза, та період лікування?

medisvit\_doctor

Додано: 09.12.2011 13:00

Доброго дня! Мені 20 років, я професійно займаюся спортом. В останні тижні почав погано спати. Порушення сну пов'язане з обставинами проживання (живу в гуртожитку). Проте мені як активній людині потрібен стовідсотковий сон. Скажіть будь ласка чи безпечно приймати мені такий препарат як мелатонін? Яка доза, та період лікування?

Доброго дня, шановний автор запитання!

У Вашому випадку мелатонін не є препаратом першого вибору. Бажано нормалізувати сон без допомоги медикаментів (дотримання режиму, свіже повітря та ін.), у разі неефективності - приймати рослинні лікарські засоби, що містять валеріану, пустирник, шишки хмелю, або гомеопатичні препарати (нотта). Систематичне порушення сну більше місяця потребує лікування під наглядом лікаря.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

frey-lyalya

**доброго дня**

Додано: 22.11.2011 13:45

доброго дня, у мене таке питання, чи може викликати запаморочення низький тиск 80/60, і чим може бути викликаний такий артеріальний тиск та що при цьому робити?  
дякую

medisvit\_doctor

Додано: 22.11.2011 16:03

доброго дня, у мене таке питання, чи може викликати запаморочення низький тиск 80/60, і чим може бути викликаний такий артеріальний тиск та що при цьому робити?  
дякую

Доброго дня, шановний автор запитання! Дійсно, запаморочення може бути пов'язано зі зниженим артеріальним тиском. Причин запаморочення, як і зниження тиску, існує дуже багато. Це може бути патологія вестибулярного апарату, проблеми, пов'язані шийним відділом хребта, зниження рівня глюкози крові, порушення серцевого ритму, та ін. Як бачите, дати Вам якусь універсальну рекомендацію неможливо. Тому раджу Вам звернутися на прийом до лікаря (терапевта або невролога), який зможе звузати коло подальшого обстеження і допоможе підібрати необхідну Вам терапію.

З повагою, [лікар-терапевт Лялюхіна Ю.С.](#)

Natala555

**Горовний біль**

Додано: 18.11.2011 09:10

Доброго дня.. В моєї мами (їй 45 років) частенько, дуже болить голова.Особливо після фізичних навантажень, ну і кожної неділі, це як закон..Лікарі сказали що надмірне звуження судин ший (спазм).Але нічого, чим би її не лікували, не допомагає..В неї робота сидяча за помп"ютером...Підкажіть будь ласка, чим можна моїй матусі допомогти..Знеболюючі таблетки не допомагають,голова має переболіти,от тоді перестає(((На даний час вона почала ходити на масажі.

Щиро дякую за відповідь!!!!

medisvit\_doctor

Додано: 21.11.2011 13:14

Доброго дня.. В моєї мами (їй 45 років) частенько, дуже болить голова.Особливо після фізичних навантажень, ну і кожної неділі, це як закон..Лікарі сказали що надмірне звуження судин ший (спазм).Але нічого, чим би її не лікували, не допомагає..В неї робота сидяча за помп"ютером...Підкажіть будь ласка, чим можна моїй матусі допомогти..Знеболюючі таблетки не допомагають,голова має переболіти,от тоді перестає(((На даний час вона почала ходити на масажі.

Щиро дякую за відповідь!!!!

Доброго дня! Звичайно, мамі можна допомогти! Можна підібрати лікування для зняття нападу головного болю, і , також, для попередження наступного. Для цього необхідно оглянути Вашу маму, розпитати більш докладно, і , можливо, провести дообстеження. На массаж нехай продовжує ходити.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

Koval

**Вертебро-базилярна недостатність**

Додано: 26.10.2011 11:54

Добрий день. Мені 21 рік. Встановили діагноз -вертебро-базилярна недостатність,остеохондроз шийно-грудного відділу жребта. Після курсу лікування стало краще, але через місяць я відмічаю прогресування погіршення стану. В басейні мені стає ще гірше, массаж особливо не допомагає, Відчутно погіршилась якість життя. Допоможіть мені будь-ласка. Якої тактики краще всього притримуватись. або куд звернутись?

medisvit\_doctor

Додано: 27.10.2011 15:31

Добрий день. Мені 21 рік. Встановили діагноз -вертебро-базилярна недостатність,остеохондроз шийно-грудного відділу жребта. Після курсу лікування стало краще, але через місяць я відмічаю прогресування погіршення стану. В басейні мені стає ще гірше, массаж особливо не допомагає, Відчутно погіршилась якість життя. Допоможіть мені будь-ласка. Якої тактики краще всього притримуватись. або куд звернутись?

Доброго дня. Вважаю, що потрібно звернутися до лікаря, який призначив курс лікування, який виявився неефективним. Повідомте, що плавання і массаж як методи профілактики Вам не підійшли (інколи таке можливо), і невролог змінить лікувальну тактику. Це є спостереженням в динаміці, яке дозволяє точніше встановити діагноз і відкорегувати лікування.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

a-romanuk

неспокій

Додано: 27.01.2011 16:27

Доброго дня! Я часто відчуваю неспокій, часто приходиться переживати через проблеми на роботі. Не могли б ви порадити якісь заспокійливі препарати нешкідливі і що не виликають звикання. Наперед дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 31.01.2011 15:57

Доброго дня! Я часто відчуваю неспокій, часто приходиться переживати через проблеми на роботі. Не могли б ви порадити якісь заспокійливі препарати нешкідливі і що не виликають звикання. Наперед дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання! Міру і глибину занепокоєння оцінити неможливо без консультування. Існують спеціальні опитувачі і шкали, які допомагають встановити діагноз і призначити у кожному окремому випадку саме те лікування (метод, лікарський препарат), яке буде найефективнішим для цього пацієнта.

Те, що ви висловили, по суті не є скаргами докторів. Люди часто відчувають занепокоєння і переживають через проблеми на роботі. Людям взагалі властиво переживати і відчувати. Безрецептурні лікарські засоби широко представлені в аптеках: рослинні - валеріана, пустирник, м'ята, меліса і тому подібне в різних комбінаціях; гомеопатичні - нервохеель, нотта, хомвіоневрин і тому подібне. Рекомендувати вам їх приймати без огляду - я не можу. Раджу Вам записатися на прийом до невролога для повнішого огляду та консультації, подзвонивши в наш контакт-центр за номером 393-00-00.

З повагою, [лікар-невролог Рубцова О.В.](#)

HeavyOksy

високий очний тиск

Додано: 10.09.2012 12:04

Доброго дня. У мами високий очний тиск - 38 мм рт. ст. Чим це грозить? Які краплі при цьому можна використати для тимчасового його пониження поки мама не пройде повне обслідування?

medisvit\_doctor

Додано: 11.09.2012 09:32

Доброго дня. У мами високий очний тиск - 38 мм рт. ст. Чим це грозить? Які краплі при цьому можна використати для тимчасового його пониження поки мама не пройде повне обслідування?

Доброго дня, шановний автор запитання! У Вашої мами найімовірніше глаукома. Швидше зробіть додаткое обстеження, це можливо зробити в нашій клініці. Поговоримо, з'ясуємо які краплі їй підходять. Почати закапування треба якомога раніше. Інакше високий тиск в оці пошкодить зоровий нерв і знизить зір назавжди. Записуватися треба на консультацію офтальмолога та периметрію через колл-центр 393-00-00.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

Yarock

червона пляма на оці

Додано: 07.09.2012 14:00

Доброго дня!

На лівому оці на кольоровій частині трішки нижче кристалика у 13 років я помітив невеликий червоний трикутник. Із зором все нормально, ніщо не хвилює, тільки цікаво що то за трикутник і чому він з'явився.

Чекаю на відповідь!

Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 10.09.2012 17:53

Доброго дня!

На лівому оці на кольоровій частині трішки нижче кристалика у 13 років я помітив невеликий червоний трикутник. Із зором все нормально, ніщо не хвилює, тільки цікаво що то за трикутник і чому він з'явився.

Чекаю на відповідь!

Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання. На жаль, не дуже коректним відповідати по Інтернету, не бачачи Ваші очі. Я зрозуміла, що пляма нижче зіниці. І якого кольору Ваші очі? І, уточніть, будь ласка, пляма червона чи все ж таки коричнева? Дякую.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)



Yarock

Додано: 13.09.2012 10:39

Доброго дня!

На лівому оці на кольоровій частині трішки нижче кристалика у 13 років я помітив невеликий червоний трикутник. Із зором все нормально, ніщо не хвилює, тільки цікаво що то за трикутник і чому він з'явився.

Чекаю на відповідь!

Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання. На жаль, не дуже коректним відповідати по Інтернету, не бачачи Ваші очі. Я зрозуміла, що пляма нижче зіниці. І якого кольору Ваші очі? І, уточніть, будь ласка, пляма червона чи все ж таки коричнева? Дякую.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

Доброго дня!

Мої очі зеленого кольору, і пляма червоного кольору.

medisvit\_doctor

Додано: 17.09.2012 12:28

Доброго дня!

Мої очі зеленого кольору, і пляма червоного кольору.

Доброго дня, колір Вашого трикутника мене турбує. Це може бути гемангіома. Запишіться, будь-ласка на консультацію, щоб визначитись з діагнозом та за необхідності призначити лікування.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

Yarock

Додано: 18.09.2012 11:19

Доброго дня!

Трикутник в мене червоного кольору.

Ще щось страшне чи так легке якесь захворювання?

medisvit\_doctor

Додано: 19.09.2012 09:40

Доброго дня!

Трикутник в мене червоного кольору.

Ще щось страшне чи так легке якесь захворювання?

Доброго дня, шановний автор запитання!

Гемангіома - це доброякісна пухлина судинного походження. Навіть якщо це вона, то необов'язково з цього приводу потрібні лікувальні заходи, але без огляду напевно сказати нічого неможливо.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

HeavyOksy

утворення на очному яблуці

Додано: 31.08.2012 18:11

Доброго дня. В моєї мами появились утворення на білмі ока, щось схоже на прищики на білій ділянці ока. Що це може бути? Із зором в неї все гаразд, з віком просто трохи впав при читанні.

medisvit\_doctor

Додано: 03.09.2012 17:37

Доброго дня. В моєї мами появились утворення на білмі ока, щось схоже на прищики на білій ділянці ока. Що це може бути? Із зором в неї все гаразд, з віком просто трохи впав при читанні.

Доброго дня, шановний автор запитання. Якщо ці утворення давно не болять, не червоніють, то це вікові накопичення під кон'юнктивою (поверхнева оболонка ока). Вони не лікуються. А якщо є всі вищевказані ознаки - треба дивитися. Це може бути запалення.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

Andre93ar

Перхоть на очах

Додано: 31.01.2012 18:50

Доброго дня. Моя проблема полягає в тому, що встаючи, зранку на очах з'являється, ніби перхоть. Чи не могли б ви порадити медичний препарат. Дякую за відповідь.

medisvit\_doctor

Додано: 01.02.2012 17:39

Доброго дня. Моя проблема полягає в тому, що встаючи, зранку на очах з'являється, ніби перхоть. Чи не могли б ви порадити медичний препарат. Дякую за відповідь.

Добрий день, якщо я правильно зрозуміла, то ця перхоть знаходиться на віях. А це - захворювання повік. Потребує ретельного очищення повік від "перхоті". Це промивання розчином чаю, фурациліна, а потім втирає тетрациклінову очну мазь по краю повіки, ближче до вій. 3 рази на день, 10 днів. Не допомогло - прийдіть до лікаря.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

Yura

Плями в очах

Додано: 08.08.2011 11:36

Доброї пори доби!!!

Мені 24 роки, приблизно в 16 років в мене появилися плями в очах. Зір в мене відмінний бачу чітко, але ті плями в очах постійно дратують.

Все було не погано від тих пір, бо якось звиклось до тих плям, але тепер вони мене знову почали дратувати бо мабуть їх стало більше в очах.

Виглядає воно таким чином:

Сірі рисочки, полосочки, різні криві, та точки темніші та світліші постійно перед очима наче дивитися через трохи забруднене скло. Вони є в обох очах але в одному вони в одні в іншому їх трохи менше.

Плями не статичні вони рухаються і повертаються коли рухати очами в різні сторони, і опускаються вниз коли зупинити рух очей на одному рівні, причому вони дещо запізнюються за рухом очей. таке враження що вони в рідині якісь в очах.

Їх чітко видно на світлих об'єктах, небі, снігу і тд.

Припущення одне колись у школі інколи лазерними указками світили в очі (може і від того) але зараз такого нічого немає. Хіба, що від сонячних зайчиків від авто, чи може від сонця в горах куди я часто ходжу без темних окулярів але в кепці.

Від чого вони могли появитися на вашу думку чи може то якась хвороба? як то лікувати?

medisvit\_doctor

Додано: 09.08.2011 11:28

Доброї пори доби!!!

Мені 24 роки, приблизно в 16 років в мене появилися плями в очах. Зір в мене відмінний бачу чітко, але ті плями в очах постійно дратують.

Все було не погано від тих пір, бо якось звиклось до тих плям, але тепер вони мене знову почали дратувати бо мабуть їх стало більше в очах.

Виглядає воно таким чином:

Сірі рисочки, полосочки, різні криві, та точки темніші та світліші постійно перед очима наче дивитися через трохи забруднене скло. Вони є в обох очах але в одному вони в одні в іншому їх трохи менше.

Плями не статичні вони рухаються і повертаються коли рухати очами в різні сторони, і опускаються вниз коли зупинити рух очей на одному рівні, причому вони дещо запізнюються за рухом очей. таке враження що вони в рідині якісь в очах.

Їх чітко видно на світлих об'єктах, небі, снігу і тд.

Припущення одне колись у школі інколи лазерними указками світили в очі (може і від того) але зараз такого нічого немає. Хіба, що від сонячних зайчиків від авто, чи може від сонця в горах куди я часто ходжу без темних окулярів але в кепці.

Від чого вони могли появитися на вашу думку чи може то якась хвороба? як то лікувати?

Доброго дня, шановний автор запитання!

Не хвилюйтесь, будь ласка, такі рухливі риси та цятки, що не впливають на гостроту зору, не пов'язані з захворюваннями сітківки (очного дна) та не є хворобою.

Звернутись до офтальмолога слід якщо кількість «плям» зростає, або якщо вони впливають на гостроту зору.

Звичайно, звернення з профілактичною метою вам також не зашкодить.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

oko0605

Дитяча катаракта

Додано: 20.04.2011 20:29

Скажіть будь-ласка чи можу я дитині при вродженій катаракті на одне око оформляти групу?

medisvit\_doctor

Додано: 26.04.2011 13:53

Скажіть будь-ласка чи можу я дитині при вродженій катаракті на одне око оформляти групу?

Доброго дня, шановний автор запитання!

Ви звичайно можете звернутись до МСЕК з цього приводу, оскільки це є ваше право, але скоріш за все дитину інвалідом не визнають, бо вроджена катаракта не є безперечно інвалідізуючим захворюванням і зазвичай успішно лікується. Більш повну відповідь на це питання, а також рекомендації і заключення для МСЕК можна отримати в консультативній поліклініці Центру мікрохірургії ока, вул. Стражеско, 6.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

Lilija

відсутність вії

Додано: 29.03.2011 14:36

добрий день! у мого сина (4 місяці) діагноз іхтіоз. у нього відсутні вії, підкажіть будь-ласка, яке лікування потрібно проводити і чи воно можливе! дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 30.03.2011 09:39

добрий день! у мого сина (4 місяці) діагноз іхтіоз. у нього відсутні вії, підкажіть будь-ласка, яке лікування потрібно проводити і чи воно можливе! дякую!

Доброго дня, шановний автор запитання! На Ваше запитання складно дати конкретну відповідь. Усе залежить від стадії і форми захворювання, і лікування має проводитись із залученням декількох фахівців.

У легкій стадії потрібно приймати вітаміни А та Е. У складніших - прийом гормонів, імунокоректори. Окремо очі не лікують. Потрібно призначити загальне лікування спрямоване і на лікування очей у тому числі. Іноді плюс симптоматичне.

Більш конкретні висновки Вам може надати дитячий спеціаліст.

З повагою, [лікар-офтальмолог, Дубровська О.О.](#)

vika2010mc

???

Додано: 17.10.2012 21:24

Я була в обласній лікарні там за підшлункову зовсім не іде мова там усі говорять тільки про операцію на жовчну протоку. Чи потрібна ця операція? Що вся проблема в ній, а свербіж тому що маю якийсь маленьки гепатит, і печінка провокує свербіж. Чи може так бути?

medisvit\_doctor

Додано: 18.10.2012 13:44

Я була в обласній лікарні там за підшлункову зовсім не іде мова там усі говорять тільки про операцію на жовчну протоку. Чи потрібна ця операція? Що вся проблема в ній, а свербіж тому що маю якийсь маленьки гепатит, і печінка провокує свербіж. Чи може так бути?

Добрий день, шановний автор запитання! Суть та сама. Вільному відтоку жовчі щось заважає, тому жовч застоюється у протоці та всмоктується у кров, тим самим викликає свербіж шкіри. Я знову ж таки наполегливо Вам рекомендую не витратити ваш дорогоцінний час і негайно звертатися по допомогу до відділення хірургічної гастроентерології!

З повагою, [Лікар-хірург, онколог, мамолог Медведєв О.Л.](#)

vika2010mc

???

Додано: 14.10.2012 12:56

Добрий день. В мене свербіж усього тіла а ніхто не може сказати причину чому. Розкажу з чого все розпочалося. В 2010 році мені видалили жовчний міхур (ЖКХ), операція була дуже довга і важка, тому що починали оперувати лапароскопом, але не змогли тому що жовч був дуже великих розмірів, а закінчили зичайним способом (розрізали і видалили так). Після виписки додому я була дуже ослаблена, не могла навіть рухатися, через два місяці після операції я звернулася до лікаря він назначив мені курс капельниць для підкріплення організму. С початку було чуть - чуть ліпше, а потім гірше появився кашель. Я сама пішла і зробила рентген легень, бо думала що я застудилася і боялася щоб не мала проблем з легеньми. Лікар рентгенолог сказав плеврит, але щоб я ще зробила УЗД. На УЗД мені сказали кіста (і ця кіста подразнювала легені і тому був кашель). Знову я до лікаря. Зробили мені пункцію, забрали всю рідину з кісти. Після цього мені стало краще. Так пройшов рік. Весною і осінню я трішки перенервувалася, але ніякого свербіжу не було. 2011 році в вересні я впала порізала передпліччя з пошкодженням нервів. Разу зашили, рана зажила, але 4 і 5 палень я не відчувала. Лікар невропатолог назначив мені уколи і таблетки для відновлення нервів. Я почала приймати таблетки, але не довго я їх приймала бо не було ніякого ефекту і я боялася що не маю жовчного міхура та перестала їх приймати. В грудні мене почало свербіти все тіло, свербіж нестерпний, я так натираю тіло до крові. Я думала то шкірне захворювання і лікувалася мазями і протиалергічними препаратами. Але ефекту не було. В лютому місяці я пішла до лікаря він назначив щоб я здала аналізи на гепатит, аналізи були хороші. А свербіж неприпинявся, не можу спати. В березні 2012 я пішла на УЗД там мені сказали що збільшена головка підшлункової залози, і розширена жовчна протока, і в звязку з цим свербіж. Направили мене на стац. лікув. в хірургію. Спочатку піля капельниць свербіж пропав, а потім знову появився і до сьогоднішнього дня. Білірубін на той час був 28-33, тепер 19. Відправили мене в обласну лікарню з підозрою на камінь в жовчній протоці. Каменя нема. Аналізи нормальні а свербіж чим далі тим гірше. Я не знаю що робити куди іти з чим то звязано, може ви чимось допоможете, чи то нерви, чи що ще може бути і як вийти з цього?

medisvit\_doctor

Додано: 16.10.2012 08:20

Добрий день. В мене свербіж усього тіла а ніхто не може сказати причину чому. Розкажу з чого все розпочалося. В 2010 році мені видалили жовчний міхур(ЖКХ), операція була дуже довга і важка, тому що починали оперувати лапароскопом, але не змогли тому що жовч був дуже великих розмірів, а закінчили зичайним способом (розрізали і видалили так)....

Я не знаю що робити куди іти з чим то зв'язано, може ви чимось допоможете, чи то нерви, чи що ще може бути і як вийти з цього?

Доброго дня! Виходячи з вашого опису захворювання я роблю такі висновки - що дійсно має місце збільшення головки підшлункової залози, тому є затримка жовчі в протоках, що може викликати свербіж. Отже я рекомендую дообстеження та лікування у хірургічній гастроентерології.

З повагою, [Лікар-хірург, онколог, мамолог Медведєв О.Л.](#)

vika2010mc

Додано: 16.10.2012 12:26

Що саме? Мій лікар каже що білірубін 19 та то не його патологія. Я була на компютерну томографію з контрастом мені виставили діагноз: Непрямі КТ ознаки дифузного пат. ураження підшлункової залози. КТ-ознаки холестазу. Підкажіть що може зробити ще якісь аналізи чи не може це викликати глисти, чи щитовидна залоза? Я здала вже аналіз і на сечову кислоту, що може з цим зв'язано. А може нерви?

medisvit\_doctor

Додано: 17.10.2012 16:22

Що саме? Мій лікар каже що білірубін 19 та то не його патологія. Я була на компютерну томографію з контрастом мені виставили діагноз: Непрямі КТ ознаки дифузного пат. ураження підшлункової залози. КТ-ознаки холестазу. Підкажіть що може зробити ще якісь аналізи чи не може це викликати глисти, чи щитовидна залоза? Я здала вже аналіз і на сечову кислоту, що може з цим зв'язано. А може нерви?

Добрий день. Минулого разу я казав про збільшену голівку підшлункової залози. Зараз білірубін 19, тому що ви лікувалися крапельницями, але його показники повернуться на попередні цифри згодом, як явище холестазу. Тому я наполягаю на вирішенні проблем лікування збільшеної голівки підшлункової залози у відділенні хірургічної гастроентерології з додатковим дообстеженням.

З повагою, [Лікар-хірург, онколог, мамолог Медведєв О.Л.](#)

VIETTER

Лікування ран

Додано: 21.09.2012 23:27

Скажіть будь ласка, а лікуванням трофічних виразок і діабетичної стопи у вас хтось займається ?

Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 26.09.2012 10:54

Скажіть будь ласка, а лікуванням трофічних виразок і діабетичної стопи у вас хтось займається ?

Дякую.

Доброго дня, шановний автор запитання. Данна патологія лікується у відділенні гнійної хірургії у лікарнях за місцем проживання. У медичному центрі "Медісвіт", нажаль, можливості вилікувати немає.

З повагою, [Лікар-хірург, онколог, мамолог Медведєв О.Л.](#)

marianna1989

Подразнення перетворилось на "гульку"

Додано: 09.09.2012 11:33

Добрий день.В мене виникла проблема після бриття з"явилося подразнення,а потім утворилась "гулька",здебільшого під шкірою.При натиску з"являється біль.Це небезпечно?Порадьте що робити?

medisvit\_doctor

Додано: 10.09.2012 12:52

Добрий день.В мене виникла проблема після бриття з"явилося подразнення,а потім утворилась "гулька",здебільшого під шкірою.При натиску з"являється біль.Це небезпечно?Порадьте що робити?

І Вам добрий день. Судячі з опису, має місце стафілококкове ураження шкіри. Будь-яке вогнище інфекції на тілі людини є небезпечним у сенсі розвитку ускладнень/зараження крові (сепсис). Тому раджу, якомога раніше звернутися до лікаря- хірурга. Вдалого вам дня.

З повагою, [лікар-хірург, Сидоренко О.В.](#)

rebutik

проктологія

Додано: 15.03.2011 15:17

Доброго дня, в мене по всіх признаках геморой, спеціаліста в районі немає,підскажіть як лікувати , мені назначив хірург реліф та детралекс.Підскажіть як лікувати , чи правильно підібрані ліки і тд.

medisvit\_doctor

Додано: 22.03.2011 11:19

Доброго дня, в мене по всіх признаках геморой, спеціаліста в районі немає, підкажіть як лікувати, мені назначив хірург реліф та детралекс. Підкажіть як лікувати, чи правильно підібрані ліки і тд.

Доброго дня, шанований автор питання! Для ефективного лікування раджу Вам все-таки звернутися на консультацію до проктолога. У вашому випадку я не можу рекомендувати Вам щось конкретне, бо я не маю повної картини захворювання. Ви можете записатися на прийом в наші мед.центри за телефоном 393-0000. Бажаємо удачі!

З повагою, [доктор-хірург, Сидоренко О.В.](#)

marry23

проктологія

Додано: 30.09.2012 19:56

Добрий вечір! Мене звуть Марія. Мені 23 роки, одружена, маю дочку 4 роки. У мене така проблема: коли ходжу в туалет по "большом" в мене тече кров. Порадьте будь ласка що робити.

medisvit\_doctor

Додано: 01.10.2012 08:34

Добрий вечір! Мене звуть Марія. Мені 23 роки, одружена, маю дочку 4 роки. У мене така проблема: коли ходжу в туалет по "большом" в мене тече кров. Порадьте будь ласка що робити.

Доброго дня, шановний автор запитання. Кровотеча з прямої кишки вимагає очної консультації лікаря-проктолога.

З повагою, [лікар-онколог, мамолог, хірург, Медведєв О.Л.](#)

ELENKA

Фіброаденома молочної залози

Додано: 22.10.2010 00:26

Підкажіть будь ласка, які шви накладають при даному хірургічному втручанні? А також які косметичні наслідки має дана операція.

Заздалегідь вдячна.



medisvit\_doctor

Додано: 26.10.2010 09:48

Підкажіть будь ласка, які шви накладають при даному хірургічному втручанні? А також які косметичні наслідки має дана операція.

Заздалегідь вдячна.

liliya777

**Фібroadенома молочної залози**

Додано: 24.03.2011 22:46

Доброго дня! Порадьте будь ласка що робити, мені 20 років, у правій молочній залозі виявили фібroadеному 14x7 мм. Чи обов'язково видаляти чи можливі інші шляхи лікування???

Чи правда, що після операції виникають нові фібroadеноми???

medisvit\_doctor

Додано: 25.03.2011 15:51

Доброго дня! Порадьте будь ласка що робити, мені 20 років, у правій молочній залозі виявили фібroadеному 14x7 мм. Чи обов'язково видаляти чи можливі інші шляхи лікування???

Чи правда, що після операції виникають нові фібroadеноми???

Доброго дня, шановний автор питання!

Нажаль, іншого дієвого методу лікування пухлин молочної залози, окрім хірургічного видалення, не існує. Інакше кажучи, якщо фібroadенома вже утворилася, то вона без операції вже нікуди не дінеться. Звичайно, нагальної потреби оперуватися прямо зараз немає, і найближчі місяці нічого не зміниться. Але ви повинні розуміти, що пухлини молочної залози гормоночутливі, так само, як і нормальна залозиста тканина, і, наприклад, під час вагітності, Ваша фібroadенома може раптово почати рости з ризиком перетворення у злоякісну пухлину. Тому бажано її все-таки видалити.

Після такої операції дійсно можуть виникати нові фібroadеноми, але «після» не означає «внаслідок». Ризик виникнення нової фібroadеноми після операції, такий самий, як і ризик виникнення фібroadеноми у здоровій (не оперованій) молочній залозі.

Бажаю здоров'я!

З повагою, [лікар-онколог, Філоненко А.Г.](#)

NKoretska21

Додано: 14.04.2011 22:04

у мене 6 числа зробили операцію, видалили фібroadеному, скажіть через скільки часу можна знімати шви? Мені сказали що через 2 тижні, не запізно буде?

medisvit\_doctor

Додано: 15.04.2011 11:24

у мене 6 числа зробили операцію, видалили фібroadеному, скажіть через скільки часу можна знімати шви? Мені сказали що через 2 тижні, не запізно буде?

Добрий день, шановний автор питання.

Строки зняття швів при подібних операціях не визначені якимись нормами, і залежать від характеру самого втручання (від того який об'єм тканин видалено, який сформувався натяг шкіри, та ін.), стану післяопераційної рани (наприклад наявність запалення), індивідуальних особливостей пацієнта. Строки визначає тільки лікуючий лікар. Повірте, що утримувати шви на рані зайвий час жоден хірург не схоче, але передчасне зняття швів також небажане, бо може призвести до розкриття рани. Тому раджу Вам регулярно приходити на перев'язки та контрольні огляди. Як тільки буде можливо, лікар сам запропонує зняти шви.

З повагою, [лікар-онколог, Філоненко А.Г.](#)

sveta\_dz0

Додано: 31.05.2011 14:02

Добрий день! Мені 24р. У мене виявили 4 фіброаденоми (різних розмірів).Скажіть будь-ласка, якщо їх видалити, яка ймовірність появи нових і в яких кількостях? І як в даній ситуації планувати вагітність?

medisvit\_doctor

Додано: 31.05.2011 17:03

Добрий день! Мені 24р. У мене виявили 4 фіброаденоми (різних розмірів).Скажіть будь-ласка, якщо їх видалити, яка ймовірність появи нових і в яких кількостях? І як в даній ситуації планувати вагітність?

Добрий день, дякую за питання.

За умови відсутності розладів гормонального фону (насамперед рівень пролактину), ймовірність виникнення у молочних залозах нових фіброаденом після видалення, така сама як і у всіх інших жінок. Тобто сам факт видалення утворення на цю ймовірність не впливає.

Щодо вагітності: оскільки вагітність може сприяти росту утворень у молочних залозах, а також може підвищувати ризик їх перетворювання, то бажано спочатку видалити всі утворення що більші за 1 см, і лише потім вагітніти.

З повагою, [лікар-онколог, Філоненко А.Г.](#)

posmishka

Додано: 28.10.2011 16:29

Доброго часу доби!Три тижні тому мені видалили фіброаденому 2,5см х 3,5см.Вчора нащупала на тому ж місці гулю.Скажіть будь ласка,чи це може бути нова фіброаденома чи може після операції так повинно бути?

medisvit\_doctor

Додано: 31.10.2011 14:25

Доброго часу доби! Три тижні тому мені видалили фіброаденому 2,5см х 3,5см. Вчора нащупала на тому ж місці гулю. Скажіть будь ласка, чи це може бути нова фіброаденома чи може після операції так повинно бути?

Доброго дня. Післяопераційне затвердіння - це явище звичне. Зазвичай воно розсмоктується через 1-3 місяці після операції. Але іноді може бути накопичення лімфи у місці операції, тому, у разі сумнівів у Вашому випадку краще звернутися до лікаря, що Вас оперував.

З повагою, [Лікар-хірург, онколог, мамолог Медведєв О.Л.](#)

sweety1989

Додано: 02.11.2011 08:25

Доброго дня! в мене фіброаденома 17\*15\*10...

звернулась до лікаря, сказав, що можна з тим жити, оперувати поки вона не збільшиться не потрібно! Сказали, що треба завагітніти, щоб вона розсмокталась.. зараз я вагітна на 10 тижні, звернулась до лікаря-онколога сказав оперувати на 15-18 тижнях вагітності під місцевим наркозом...

Підскажіть як бути? Місцевий наркоз це больно?

medisvit\_doctor

Додано: 02.11.2011 10:05

Доброго дня! в мене фіброаденома 17\*15\*10...

звернулась до лікаря, сказав, що можна з тим жити, оперувати поки вона не збільшиться не потрібно! Сказали, що треба завагітніти, щоб вона розсмокталась.. зараз я вагітна на 10 тижні, звернулась до лікаря-онколога сказав оперувати на 15-18 тижнях вагітності під місцевим наркозом...

Підскажіть як бути? Місцевий наркоз це больно?

Доброго дня. Я вважаю, що ви пропустили зручний час для операції поки не були вагітні. Справа в тому, що "розсмоктатись" при вагітності здатні лише деякі різновиди патології. І фіброаденома до них не відноситься. Навпаки, теоретично можливий її ріст, оскільки клітини фіброаденоми чутливі до гормону, що стимулює виділення молока. Але це не означає, що до початку лактації її обов'язково треба видаляти, тим більше під місцевим наркозом. Можливо при ретельному спостереженні вдасться "дотягнути" до закінчення лактації і оперуватись нормально. З приводу болю не слід хвилюватись. Наркоз є наркоз, хоч загальний хоч місцевий. Але утворення у грудних залозах краще видаляти все таки під загальним наркозом.

З повагою, [лікар-онколог, Філоненко А.Г.](#)

irynka

фіброаденома

Додано: 16.10.2012 12:25

Доброго дня. Мені 31 серпня цього року видалили фіброаденому з ЛГЗ. Фіброаденома змішана так показала цитологія. Хочу ВАС запитати коли мені можна вагітніти. Бо хотілося б щоб усе загоїлось добре до вагітності.

medisvit\_doctor

Додано: 16.10.2012 13:56

Доброго дня. Мені 31 серпня цього року видалили фіброаденому з ЛГЗ. Фіброаденома змішана так показала цитологія. Хочу ВАС запитати коли мені можна вагітніти. Бо хотілося б щоб усе загоїлось добре до вагітності.

Доброго дня.

Змішана фіброаденома - це один з типових різновидів таких утворень. З 31 серпня пройшло півтора місяця. Цього часу цілком достатньо, щоби все повністю загоїлось. Я вважаю що ви можете вагітніти вже зараз.

З повагою, [лікар-онколог, мамолог Філоненко А.Г.](#)

kja

пухлина

Додано: 27.11.2009 09:53

Доброго дня ! Підкажіть будь-ласка, я чоловік, у мене після того як випадково на груди упав камінь, з'явилась гулька на грудях спочатку ніби з запеченою кров'ю, а коли синюшність зійшла, гулька так і залишилась діаметром близько 0,6 см. Підкажіть що це може бути і що робити?

Ksenia28

гигрома

Додано: 23.12.2010 22:52

Доброго дня. Порадьте, що робити. У мене під колінною чашечкою хірург виявив гігрому і запропонував терміново видалити. Гарантій, що вона не з'явиться знову нема ніяких. Чи варто видаляти чи можливі інші способи лікування? Щиро вдячна.

troltaras123

Додано: 05.12.2011 20:02

Добрый день я хотів запитати в мене в грудині зробилась якась гулька всередині що це може бути і що робити?

medisvit\_doctor

Додано: 08.12.2011 16:39

Добрый день я хотів запитати в мене в грудині зробилась якась гулька всередині що це може бути і що робити?

Доброго дня, шановний автор запитання! На вашій грудині можуть бути як запальні, так і не запальні утворення. Тому дуже складно відповісти вам не побачивши це утворення. Вам необхідно звернутися до хірурга-онколога.

З повагою, [Лікар-хірург, онколог, мамолог Медведєв О.Л.](#)

VasRoman

**Біль в серці (після забою, удару)**

Додано: 20.09.2012 14:15

Доброго дня! Дуже потрібна ваша порада.

Сильно вдарився в область серця, синяка небуло, спочатку навіть здавалося, що болить не всередині. Вже на 2-3 день величина місця, на якій відчувався біль, зменшилась до розміру натиску 3 пальців. Після незначних фізичних навантажень(працював вдома) біль посилювався. Зараз біль відчувається: в момент, коли піднімаюся з ліжка(рух як коли качаєш прес), коли спускаюся сходами вниз. Ще біль відчувається, якщо, наприклад, підстрибнути намісці, підняти обидві руки догори, коли набираєш повітря наповну і в момент коли видихаєш. В перші дні біль помітно зменшилась, тому вирішив не звертатися до лікарні. Запитання до Вас, чи можна "перечекати" поки пройде біль чи все ж треба йти в лікарню.

medisvit\_doctor

Додано: 24.09.2012 11:04

Доброго дня! Дуже потрібна ваша порада.

Сильно вдарився в область серця, синяка небуло, спочатку навіть здавалося, що болить не всередині. Вже на 2-3 день величина місця, на якій відчувався біль, зменшилась до розміру натиску 3 пальців. Після незначних фізичних навантажень(працював вдома) біль посилювався. Зараз біль відчувається: в момент, коли піднімаюся з ліжка(рух як коли качаєш прес), коли спускаюся сходами вниз. Ще біль відчувається, якщо, наприклад, підстрибнути намісці, підняти обидві руки догори, коли набираєш повітря наповну і в момент коли видихаєш. В перші дні біль помітно зменшилась, тому вирішив не звертатися до лікарні. Запитання до Вас, чи можна "перечекати" поки пройде біль чи все ж треба йти в лікарню.

Доброго дня! Механічна травма невмозі зашкодити вашому серцю. Принаймні поки ребра залишаються цілими. Описані Вами симптоми характерні для простого забою грудної клітки. Зважаючи на значне зменшення болевого синдрому та позитивну динаміку протягом перших днів, спробуйте скористатись протизапальними місцевими препаратами (наприклад, гель диклофенаку). При відсутності позитивної динаміки чи посиленні болевого синдрому обов'язково зверніться на очний прийом до лікаря, бо запорукою встановлення правильного діагнозу є лише особистий огляд пацієнта.

З повагою, [лікар-кардіолог, терапевт Четверикова О.М.](#)

andriypadun

**Пальці рук і нігті синіють**

Додано: 08.04.2012 15:16

Добрий день, хочу запитати. Якось одного разу йшов по вулиці, витягнувши руки з кишень побачив, що пальці рук сині, нігті теж. Ще було, що після того як витиснув прищ на носі, ніс через 2 хв посинів. Час від час в мене пальці на руках трясуться особливо після навантаження. Що то може бути?

Natala555

**Артеріальний тиск**

Додано: 18.11.2011 09:58

Доброго дня..Я хочу проконсультуватися з лікарем - кардіологом, щодо такого питання..В мого брата, йому 47 років,практично кожної ночі, піднімається тиск крові.Вдень все добре, нічого не турбує,може бути дискомфорт, та здуття живота,після їди,а потім вночі, як не 200/100,то 160/90 тиску.І то тільки вночі піднімається тиск, починаються судороги..Після тиску болять в області жовчного..Версії лікарів різні.Одні кажуть що це від хребта, інші що він шлунка,ще інші -серце, і ще інші -нервова система..Ніхто не знає що лікувати,тому що аналізи ідеальні,узд теж..Жодних відхилень в здоров'ї не виявлено..Останніми днями, масажист визначив, що в нього защемлений серцевий нерв, чи це може бути причина, і що робити надалі? Щиро дякую за відповідь!!!

nadi

**Сумісність препаратів**

Додано: 24.11.2011 20:53

Доброго дня! Моїй мамі призначили препарат Клімадинон, але їй постійно потрібно приймати припарати від тиску, а саме Енап-Н та амлодіпін. Підкажіть будь ласка чи сумісні ці препарати?

medisvit\_doctor

Додано: 30.11.2011 16:04

Доброго дня! Моїй мамі призначили препарат Клімадинон, але їй постійно потрібно приймати припарати від тиску, а саме Енап-Н та амлодіпін. Підкажіть будь ласка чи сумісні ці препарати?

Доброго дня, шановний автор запитання. Названі Вами препарати сумісні, їх можна приймати разом.

З повагою, [лікар-кардіолог, Чепелевська Л.І.](#)

medisvit\_doctor

Додано: 30.11.2011 16:05

Доброго дня..Я хочу проконсультуватися з лікарем - кардіологом, щодо такого питання..В мого брата, йому 47 років,практично кожної ночі, піднімається тиск крові.Вдень все добре, нічого не турбує,може бути дискомфорт, та здуття живота,після їди,а потім вночі, як не 200/100,то 160/90 тиску.І то тільки вночі піднімається тиск, починаються судороги..Після тиску болить в області жовчного..Версії лікарів різні.Одні кажуть що це від хребта, інші що він шлунка,ще інші -серце, і ще інші -нервова система..Ніхто не знає що лікувати,тому що аналізи ідеальні,узд теж..Жодних відхилень в здоров'ї не виявлено..Останніми днями, масажист визначив, що в нього защемлений серцевий нерв, чи це може бути причина, і що робити надалі?  
Щиро дякую за відповідь!!!

Доброго дня, шановний автор запитання. Зазначені Вами симптоми і скарги, незвичайні і дуже цікаві. На жаль, без огляду нічого певного сказати неможливо. Рекомендую привести вашого брата на консультацію до лікаря.

З повагою, [лікар-кардіолог, Чепелевська Л.І.](#)

tanichka

папазол

Додано: 28.12.2011 19:01

Доброго дня! Останім часом маю підвищений тиск(140-100). Приймала папазол 1-2 таблетки, але помітила що стало важко дихати носом(після прийому таблетки) і у носі відчувається запах газу. Чи може це бути побічною дією папазолу?

medisvit\_doctor

Додано: 03.01.2012 09:53

Доброго дня! Останім часом маю підвищений тиск(140-100). Приймала папазол 1-2 таблетки, але помітила що стало важко дихати носом(після прийому таблетки) і у носі відчувається запах газу. Чи може це бути побічною дією папазолу?

Доброго дня, шановний автор запитання. Серед побічних дій папазолу не зустрічаються описані Вами симптоми. І все ж наполегливо радимо звернутися до лікаря з метою визначення можливої причини підвищення тиску і призначення адекватного лікування, так як папазол не входить до препаратів першої лінії при лікуванні артеріальної гіпертензії.

З повагою, [лікар-кардіолог, терапевт Четверикова О.М.](#)

Miki

AT

Додано: 13.08.2012 11:55

Добрий день!

хотів поцікавитись чи прийшов я всі аналізи щоб поставити крапку над "і", маю підвищений артеріальний тиск, кардіолог виписав інгібітор АПФ, але мені здається я пройшов не всі аналізи (УЗД: серця, нирок, наднирників, щитовидки; аналіз крові і сечі: Холестерин, Аналіз мочи на

глюкозу, Анализ крови развернутый, Анализ мочи общий, Печеночные пробы, Почечные пробы, Коагулограмма (ПВ, АЧТВ, Фибриноген, ТВ, МНО), Инсулин, Кортизол, Тестостерон свободный, Альдостерон, Дигидротестостерон, Пролактин, Лютеонизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон общий, Секс-связывающий глобулин человеческий, \*Процентное отношение свободного тестостерона, FTI%, (Тиреоидный) (ТТГ, АТПО, Т3 своб., Т4 своб.))

все в межах допустимого крім альдостерона 408,73 пг/мл (В состоянии стоя: 40.0 - 310.0 В состоянии сидя: 10.0 - 160.0), не зрозумів цей показник

питання в тому чи потрібно ще якісь аналізи пройти, чи можу вважати себе "гіпертоніком"? мій тиск 160-140/105-75 вік 30 років

medisvit\_doctor

Додано: 14.08.2012 13:34

Добрий день!

хотів поцікавитись чи прийшов я всі аналізи щоб поставити крапку над "і", маю підвищений артеріальний тиск, кардіолог виписав інгібітор АПФ, але мені здається я пройшов не всі аналізи (УЗД: серця, нирок, наднирників, щитовидки; аналіз крові і сечі: Холестерин, Анализ мочи на глюкозу, Анализ крови развернутый, Анализ мочи общий, Печеночные пробы, Почечные пробы, Коагулограмма (ПВ, АЧТВ, Фибриноген, ТВ, МНО), Инсулин, Кортизол, Тестостерон свободный, Альдостерон, Дигидротестостерон, Пролактин, Лютеонизирующий гормон (ЛГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Прогестерон, Эстрадиол, Тестостерон общий, Секс-связывающий глобулин человеческий, \*Процентное отношение свободного тестостерона, FTI%, (Тиреоидный) (ТТГ, АТПО, Т3 своб., Т4 своб.))

все в межах допустимого крім альдостерона 408,73 пг/мл (В состоянии стоя: 40.0 - 310.0 В состоянии сидя: 10.0 - 160.0), не зрозумів цей показник

питання в тому чи потрібно ще якісь аналізи пройти, чи можу вважати себе "гіпертоніком"? мій тиск 160-140/105-75 вік 30 років

Доброго дня, шановний автор запитання!

Зважаючи на цифри тиску, діагноз артеріальна гіпертензія є правомірним, тому Ви дійсно є "гіпертоніком".

Що стосується дообстежень, то сам по собі підвищений рівень альдостерону не є основою для постановки діагнозу, але потребує дообстежень у ендокринолога для виключення альдостеронізму (синдрому Кона).

З повагою, [лікар-кардіолог, терапевт Четверикова О.М.](#)



Miki

Додано: 14.08.2012 20:25

Доброго дня, шановний автор запитання!

Зважаючи на цифри тиску, діагноз артеріальна гіпертензія є правомірним, тому Ви дійсно є "гіпертоніком".

Що стосується дообстежень, то сам по собі підвищений рівень альдостерону не є основою для постановки діагнозу, але потребує дообстежень у ендокринолога для виключення альдостеронізму (синдрому Кона).

З повагою, лікар-терапевт, кардіолог Четверикова О.М.

меня ще порадили (не лікарі) здати АКТГ і суточну мочу на метанефрини, а також МРТ головного мозку, варто проходити ці додаткові аналізи? (діло не в грошах, а чи є сенс)

medisvit\_doctor

Додано: 15.08.2012 16:47

Доброго дня, шановний автор запитання!

Зважаючи на цифри тиску, діагноз артеріальна гіпертензія є правомірним, тому Ви дійсно є "гіпертоніком".

Що стосується дообстежень, то сам по собі підвищений рівень альдостерону не є основою для постановки діагнозу, але потребує дообстежень у ендокринолога для виключення альдостеронізму (синдрому Кона).

З повагою, лікар-терапевт, кардіолог Четверикова О.М.

меня ще порадили (не лікарі) здати АКТГ і суточну мочу на метанефрини, а також МРТ головного мозку, варто проходити ці додаткові аналізи? (діло не в грошах, а чи є сенс)

Доброго дня!

Дійсно, названі Вами обстеження бувають необхідні для пошуку причини гіпертензії. Але їх призначають не всім, а в залежності від клінічної картини. Ці аналізи при необхідності призначає ендокринолог, крім того, скоріше за все, Вам знадобляться іще деякі обстеження, зважаючи на підвищення альдостерону. Наполегливо раджу консультацію ендокринолога, який і визначить весь спектр дообстежень.

З повагою, [лікар-кардіолог, терапевт Четверикова О.М.](#)

snizuno4ka

**ДОПОМОЖІТЬ**

Додано: 25.11.2010 15:59

не знаю в якого лікаря попитати поради.... я постійно потію, в чому може бути проблема, ніякі дезодоранти не допомагають... постійно на одязі видно плями... мені 23 роки...

toxa

Додано: 21.09.2010 20:36

в мене таке питання. в мене обличчя стало чомусь червоного відтінку особливо щоки, і я не знаю що робити, прийняти щоб воно стало нормального кольору. я це став помічати раніше десь 2 роки тому, але воно червоніло не так часто, а зараз майже кожен день. підкажіть будь-ласка що мені приймати.

marafon

**Вплив кави на серцево-судинну систему**

Додано: 05.11.2010 12:59

Добрий день!

Мене турбують болі в серці. Вжив міцну каву. Зараз п"ю каву значно рідше.

Підкажіть, будь-ласка, якими препаратами можна підкріпити серцево-судинну систему від впливу кави. Також мається негативний вплив і на печінку, нирки.

Дякую.

Anatoliy

**артеріальна гіпертензія**

Додано: 25.03.2010 21:10

Як правильно перейти на прийом препаратів: Арифон Ретард та Екватор після прийому Еналопріла та Локрену

andrii\_m

Додано: 14.03.2010 12:14

Доброго дня. Мені 24 роки. Починаючи з 10 років інколи боліло серце. нещодавно поставили діагноз ПМК. пролапс 7 мм. регургітація умеренная. приймаю валерянку і триметазидин. болить серце майже постійно. Чи можу я служити в армії з таким діагнозом?

leon

**Дискенезія жовчних шляхів**

Додано: 10.01.2013 18:21

Доброго дня! Мені 31 р. Мене турбує загальний стан. Відчував постійний біль в низу справа. Були коліки невиносимі. зробив УЗД внутрішніх органів жовчний міхур значно збільшений і помітні згустки. Лікувався в санаторії Моршин з комплексом процедур відкачували жовч. Через три місяці знову відчуваю біль і поколювання. Постійно виснажений, порушений режим сну за ніч разів з 5 просинаюсь, з"явилась сухість шкіри. Інколи 2-3 дні підряд просто неможливо заснути. Вирішив здати аналіз крові. Прописали на разі місячний курс Нормовен і Гепабене. Чи можливо цього позбутись методом лікування чи все ж таки він буде постійно турбувати через

таку схильність і чи краще його видалити? Результат:

leon

Додано: 10.01.2013 18:22

Доброго дня! Мені 31 р. Мене турбує загальний стан. Відчував постійний біль в низу справа. Були коліки невиносимі. зробив УЗД внутрішніх органів жовчний міхур значно збільшений і помітні згустки. Лікувався в санаторії Моршин з комплексом процедур відкачували жовч. Через три місяці знову відчуваю біль і поколювання. Постійно виснажений, порушений режим сну за ніч разів з 5 просинаюся, з'явилась сухість шкіри. Інколи 2-3 дні підряд просто неможливо заснути. Вирішив здати аналіз крові. Прописали на разі місячний курс Нормовен і Гепабене. Чи можливо цього позбутись методом лікування чи все ж таки він буде постійно турбувати через

таку схильність і чи краще його видалити? Результат:

<http://fotki.yandex.ru/users/leonartis555/view/625790/?page=0&ncrnd=7903>

medisvit\_doctor

Додано: 11.01.2013 11:36

Доброго дня! Мені 31 р. Мене турбує загальний стан. Відчував постійний біль в низу справа. Були коліки невиносимі. зробив УЗД внутрішніх органів жовчний міхур значно збільшений і помітні згустки. Лікувався в санаторії Моршин з комплексом процедур відкачували жовч. Через три місяці знову відчуваю біль і поколювання. Постійно виснажений, порушений режим сну за ніч разів з 5 просинаюся, з'явилась сухість шкіри. Інколи 2-3 дні підряд просто неможливо заснути. Вирішив здати аналіз крові. Прописали на разі місячний курс Нормовен і Гепабене. Чи можливо цього позбутись методом лікування чи все ж таки він буде постійно турбувати через

таку схильність і чи краще його видалити? Результат:

Доброго дня, шановний автор запитання! Судячи з результату УЗД, має місце гіпомоторна дискінезія жовчного міхура і про оперативне втручання мова не йде. Щодо болів внизу справа, - обов'язково потрібен огляд спеціаліста-гастроентеролога, він назначить, якщо потрібно дообстеження, та призначить відповідне лікування. Це саме стосується і проблеми зі сном, потрібно в'яснити у спеціаліста на прийомі що є першопричиною.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

Roma

Синдром Жільбера

Додано: 04.01.2013 10:10

Добрий день! Мені 24 роки. Років 5 тому...мені поставили діагноз синдром Жільбера (врожений загин жовчних шляхів). Зараз болів в печінці немає, майже нічого не відчуваю. Інколи, дуже рідко не тривало відчувається важкість з правого боку. Залежно від їжі, в основному від нервових стресів на лиці з обох боків носа сухість шкіри, почервоніння, лущення. Білірубін у мене після аналізів дуже високий спільний приблизно 60, прямий 10. Знайомі кажуть що це дуже небезпечно і такі показники при гепатиті. Це мене насторожує і я хочу поради як що мені робити? які комплекси проходити і т.п. Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 04.01.2013 15:47

Добрий день! Мені 24 роки. Років 5 тому...мені поставили діагноз синдром Жільбера (вроджений загиб жовчних шляхів). Зараз болів в печінці немає, майже нічого не відчуваю. Інколи, дуже рідко не тривало відчувається важкість з правого боку. Залежно від їжі, в основному від нервових стресів на лиці з обох боків носа сухість шкіри, почервоніння, лущення. Білірубін у мене після аналізів дуже високий спільний приблизно 60, прямий 10. Знайомі кажуть що це дуже небезпечно і такі показники при гепатиті. Це мене насторожує і я хочу поради як що мені робити? які комплекси проходити і т.п. Дякую.

Шановний автор запитання! Синдром Жильбера або доброякісна гіпербілірубінемія, це брак ферменту печінки, який перетворює некон'югований білірубін в кон'югований (а не загин жовчного міхура). Небезпеки для здоров'я він не представляє. Вам я би порекомендувала здати аналіз крові на печінкові проби, зробити УЗД органів черевної порожнини та звернутись до спеціаліста, так як періодичні болі в правому підребер'ї та лущення шкіри на обличчі можуть бути проявом інших захворювань шлунково-кишкового тракту.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

55555

Додано: 01.10.2012 19:38

добрий вечір!

порадьте мені щось,будь ласка,мене тушнить,бурчить в животі і пече.  
що це може бути і що потрібно зробити,що усунути дизкомфорт?

medisvit\_doctor

Додано: 02.10.2012 14:22

добрий вечір!

порадьте мені щось,будь ласка,мене тушнить,бурчить в животі і пече.  
що це може бути і що потрібно зробити,що усунути дизкомфорт?

Шановний автор запитання! Печія, урчання в животі та нудота є проявами шлункової диспепсії, яка може супроводжувати ряд захворювань шлунково-кишкового тракту. Вам слід звернутися до спеціаліста, який встановить діагноз та призначить курс лікування. Заочно по інтернету зробити це неможливо.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

boss

**Кіста печінки**

Додано: 30.08.2012 16:45

Чи страшна річ як кіста печінки, зробив УЗД, ось що написали..

Печінка: Розміри печінки: права доля - 114,0 мм, ліва доля - 52,0 мм, хвостова доля - 37,0 мм. Контури рівні та чіткі. Капсула не ущільнена, з чіткими, та рівними контурами. Паренхіма звичайної ехогенності, однорідна, зернистість збережена. В правій долі підкапсульно анехогенний утвір - 5,2 мм з однорідним вмістом. Портальна вена - 10,0 мм. Внутрішньопечінкові судини без ознак дилатації, їх стінки не змінені.

Закоючення: ехо-ознаки: - кісти правої долі печінки  
- спленомегалії І ст.

medisvit\_doctor

Додано: 12.09.2012 11:36

Чи страшна річ як кіста печінки, зробив УЗД, ось що написали..

Печінка: Розміри печінки: права доля - 114,0 мм, ліва доля - 52,0 мм, хвостова доля - 37,0 мм. Контури рівні та чіткі. Капсула не ущільнена, з чіткими, та рівними контурами. Паренхіма звичайної ехогенності, однорідна, зернистість збережена. В правій долі підкапсульно анехогенний утвір - 5,2 мм з однорідним вмістом. Портальна вена - 10,0 мм. Внутрішньопечінкові судини без ознак дилатації, їх стінки не змінені.

Закоючення: ехо-ознаки: - кісти правої долі печінки  
- спленомегалії І ст.

Доброго дня, шановний автор запитання! Вірогідно, в результатах виявлено одиночну кісту печінки невеликого розміру. Для уточнення діагнозу, особливо при супутньому збільшенні селезінки, необхідно провести наступні дослідження: аналіз крові клінічний, аналіз крові на печінкові проби, аналіз крові на рівень антитіл класу Ig G до ехінококу, рівень альфа-фетопротейну в крові. Результати обстеження бажано обговорити на очній консультації.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Путренко Л.В.](#)

pencill

Додано: 24.04.2012 21:39

Доброго дня! Я хочу отримати консультацію. В мене на протязі трьох тижнів пече весь стравохід. Я пила льон і но ніч оmez. Трішки стало краще, але зараз знову повернулися ці відчуття.Що це може бути?

medisvit\_doctor

Додано: 26.04.2012 09:20

Доброго дня! Я хочу отримати консультацію. В мене на протязі трьох тижнів пече весь стравохід. Я пила льон і но ніч оmez. Трішки стало краще, але зараз знову повернулися ці відчуття.Що це може бути?

Шановна автор запитання! Судячи з вашого опису відчуттів, у вас закид вмісту шлунка в стравохід, який в свою чергу запалився. Щоб зрозуміти як лікуватися, обов'язково необхідно звернутись до фахівця та пройти фіброгастроуденоскопію (ФГДС).

З повагою,[лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

Galunadyra

Додано: 21.02.2012 18:00

Добрий день!! Скажіть будь ласка у мене вже декілька днів кал темно зеленого кольору таке вже бувало пару місяців назад але зараз весь час відчуваю важкість у животі! Що це може бути?

medisvit\_doctor

Додано: 22.02.2012 12:40

Добрий день!! Скажіть будь ласка у мене вже декілька днів кал темно зеленого кольору таке вже бувало пару місяців назад але зараз весь час відчуваю важкість у животі! Що це може бути?

Доброго дня, шановний автор запитання! Зміна забарвлення калу характерна при багатьох захворюваннях, зокрема дизбактеріозу, панкреатиту та ін. А тому вам необхідно звернутись до гастроентеролога для детального обстеження і визначення захворювання.

З повагою,[лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

Dimon

Підшлункова залоза.

Додано: 18.02.2012 23:57

Доброго дня! У мене на верхній губі з'явилися білі маленькі цятки, вони у мене приблизно 1 рік. Лікар дерматовенеролог сказав, що це відкладання холестерину, внаслідок порушень роботи підшлункової залози і воно ніяк не лікується. Також, інколи мене турбує незначний біль в області лівого підребер'я, який особливо з'являється після вживання жареного. Скажіть, будь ласка, який імовірний діагноз і яка тактика лікування?

medisvit\_doctor

Додано: 20.02.2012 12:58

Доброго дня! У мене на верхній губі з'явилися білі маленькі цятки, вони у мене приблизно 1 рік. Лікар дерматовенеролог сказав, що це відкладання холестерину, внаслідок порушень роботи підшлункової залози і воно ніяк не лікується. Також, інколи мене турбує незначний біль в області лівого підребер'я, який особливо з'являється після вживання жареного. Скажіть, будь ласка, який імовірний діагноз і яка тактика лікування?

Шановна, автор запитання! Відкладання холестерину - це порушення жирового та вуглеводного обміну, зкорегувати які можна, лише після детального обстеження, зокрема - підшлункової залози та печінки. А тому вам необхідно звернутись до відповідного фахівця та вирішити питання про об'єм обстежень та визначення курсу лікування.

З повагою,[лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

arichkasmiluk

**Шкідливість яєць!**

Додано: 10.02.2012 11:23

Доброго дня! Мій чоловік (21 рік) займається в тренажерному залі(з дитинства спортсмен), а зараз йде на змагання з фітнесу. І, він в цілях отримання білків, вживає штучний протеїн, а також приблизно 5-10 яєць в день. Скажіть будь ласка чи не шкідливо це для здоров'я і до яких наслідків це може призвести?

medisvit\_doctor

Додано: 10.02.2012 18:30

Доброго дня! Мій чоловік (21 рік) займається в тренажерному залі(з дитинства спортсмен), а зараз йде на змагання з фітнесу. І, він в цілях отримання білків, вживає штучний протеїн, а також приблизно 5-10 яєць в день. Скажіть будь ласка чи не шкідливо це для здоров'я і до яких наслідків це може призвести?

Шановна автор запитання, в БАДах, які містять штучні протеїни, як правило, знаходяться солі важких металів. А тому постійне їх вживання може призвести до непередбачуваних наслідків для здоров'я. Спортсменам, в т.ч. професійним, рекомендовано вживати тваринні білки, а саме найякісніший білок міститься в м'ясі індика та телятині. Щодо яєць, то їх рекомендовано, але не в такій кількості.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

alan

**Географічний язык**

Додано: 26.01.2012 20:57

Доброго дня. Мене звати Олег, мені буде 25, уже 3 роки я живу з географічним язиком, у 20 років мав язву, після цього, часто лікувався пійлобактом, та всякими іншими таблетками, після цього в мене постійно появляються і зникають білі полоси на язiku. Лежав на обстеженні в Івано-Франківській обласній лікарні, здавав повністю всі аналізи. Виявили тільки повний дизбактеріоз, інфекцію у жовчі, та легкий запальний процес у шлунку. Все пролікував, капався глутаргіном-аналіз жовчу в нормі, дизбактеріоз покращився, за рік набрав 13кг, чую себе добре, апетит добрий, але язык такий і залишився-білі полоси по ньому, з'являються і зходять. Був у професора Кириленка І.І., він сказав що язык мій такий і буде на ціле життя! Якщо на форумі є хороші спеціалісти що ви можете сказати по цьому поводу????

medisvit\_doctor

Додано: 27.01.2012 14:51

Доброго дня. Мене звати Олег, мені буде 25, уже 3 роки я живу з географічним язиком, у 20 років мав язву, після цього, часто лікувався пійлобактом, та всякими іншими таблетками, після цього в мене постійно появляються і зникають білі полоси на язiku. Лежав на обстеженні в Івано-Франківській обласній лікарні, здавав повністю всі аналізи. Виявили тільки повний дизбактеріоз, інфекцію у жовчі, та легкий запальний процес у шлунку. Все пролікував, капався глутаргіном-аналіз жовчу в нормі, дизбактеріоз покращився, за рік набрав 13кг, чую себе добре, апетит добрий, але язык такий і залишився-білі полоси по ньому, з'являються і зходять. Був

у професора Кириленка І.І., він сказав що язик мій такий і буде на ціле життя! Якщо на форумі є хороші спеціалісти що ви можете сказати по цьому поводу????

Шановний, автор запитання! Язик є дзеркалом шлунково-кишкового тракту. А значить і порушень, які в ньому відбуваються. Стосовно білих смуг, які ви на ньому спостерігаєте, вони можуть свідчити про дизбіоз в ротовій порожнині та кишківнику, а отже необхідно здати посів калу на дизбактеріоз та проконсультуватись з лікарем-гастроентерологом на очному прийомі.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

alan

Додано: 23.02.2012 20:30

У вас можна точно віддіагностувати цю причину..???

medisvit\_doctor

Додано: 24.02.2012 15:37

У вас можна точно віддіагностувати цю причину..???

Доброго дня, шановний автор запитання. Так, в нас роблять різноманітні обстеження, в тому числі посів калу на дизбактеріоз та фіброгастродуоденоскопія. Але, ці обстеження Вам назначить лікар-гастроентеролог на консультації. Для запису телефонуйте 393-00-00.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)


Sedmaya

Дисбактеріоз?

Додано: 12.01.2012 11:12


Доброго дня! Гінеколог направив на здачу аналізу калу на дисбактеріоз, оскільки в бак.посіві флори вагіни було виявлено *Klebsiella pneumoniae* 10\*8. Допоможіть, будь ласка, розшифрувати результат ан.калу. Також, підкажіть, будь ласка, чи може такий стан флори кишечнику бути причиною того, що я, при збереженому апетиті, не можу збільшити свою вагу? І чи потребує такий стан лікування (чи можна обійтись без антибіотиків)? Заздалегідь вдячна.

Патоген.мікроорганізми родини кишкових - не виявлено;

Біфідубактеріум - <10\*8 КУО/г (норма - від 10\*

Лактобациллус - <10\*6 КУО/г (норма - від 10\*6);

Ентерококкус фекаліс - 4x10\*6 КУО/г (норма - до 10\*6);

Ешеріхія колі заг. к-сть - 3x10\*7 КУО/г (норма - до 10\*

Ешеріхія колі слабоферментуюча - не виявлено (норма - до 10%);

Ешеріхія колі лактозонегативна - не виявлено (норма - до 5%);

Ешеріхія колі гемолітична - не виявлено (норма - 0 КУО/г );

Стафілококкус ауреус - не виявлено (норма - до 10\*3);

Умовно-патогенні ентеробактерії - не виявлено (норма - 0 КУО/г );

Дріжджеподібні гриби роду Кандіда - не виявлено (норма - до 10\*3).



medisvit\_doctor

Додано: 13.01.2012 09:43

Доброго дня! Гінеколог направив на здачу аналізу калу на дисбактеріоз, оскільки в бак. посіві флори вагіни було виявлено *Klebsiella pneumoniae*  $10^8$ . Допоможіть, будь ласка, розшифрувати результат ан.калу. Також, підкажіть, будь ласка, чи може такий стан флори кишечника бути причиною того, що я, при збереженому апетиті, не можу збільшити свою вагу? І чи потребує такий стан лікування (чи можна обійтись без антибіотиків)? Заздалегідь вдячна.

Патоген. мікроорганізми родини кишкових - не виявлено;

Біфідобактеріум -  $<10^8$  КУО/г (норма - від  $10^8$  😊);

Лактобациллус -  $<10^6$  КУО/г (норма - від  $10^6$ );

Ентерококкус фекаліс -  $4 \times 10^6$  КУО/г (норма - до  $10^6$ );

Ешеріхія колі заг. к-сть -  $3 \times 10^7$  КУО/г (норма - до  $10^8$  😊);

Ешеріхія колі слабоферментуюча - не виявлено (норма - до 10%);

Ешеріхія колі лактозонегативна - не виявлено (норма - до 5%);

Ешеріхія колі гемолітична - не виявлено (норма - 0 КУО/г);

Стафілококкус ауреус - не виявлено (норма - до  $10^3$ );

Умовно-патогенні ентеробактерії - не виявлено (норма - 0 КУО/г);

Дріжджеподібні гриби роду Кандіда - не виявлено (норма - до  $10^3$ ).

Шановна автор запитання! Для того, щоб відповісти на ваше запитання, необхідно мені знати чи є у вас скарги зі сторони ШКТ, розлади роботи кишківника, об'єктивно вас обстежити. Тому я рекомендую вам консультацію відповідного фахівця-гастроентеролога. Для запису на прийом телефонуйте 393 00 00.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

Sedmaya

Додано: 13.01.2012 09:50

Шановна автор запитання! Для того, щоб відповісти на ваше запитання, необхідно мені знати чи є у вас скарги зі сторони ШКТ, розлади роботи кишківника, об'єктивно вас обстежити. Тому я рекомендую вам консультацію відповідного фахівця-гастроентеролога. Для запису на прийом телефонуйте 393 00 00.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

Справа в тому, що з боку ШКТ я обстежуюсь регулярно - у мене хронічний гастрит та ГЕРХ (в основному турбує печія і іноді розпирання в шлунку після прийому їжі). Туалет нормальний, щоденний. Харчування, в основному, дієтичне - каші, молочні продукти, варені овочі, варена/запечена телятина/крольчатина/індичатина. Пр даному результату аналізу є відхилення, що потребують лікування?

medisvit\_doctor

Додано: 13.01.2012 18:02

Справа в тому, що з боку ШКТ я обстежуюсь регулярно - у мене хронічний гастрит та ГЕРХ (в основному турбує печія і іноді розпирання в шлунку після прийому їжі). Туалет нормальний, щоденний. Харчування, в основному, дієтичне - каші, молочні продукти, варені овочі,

варена/запечена телятина/крольчатина/індичатина. Пр даному результату аналізу є відхилення, що потребують лікування?

Шановна автор запитання, в аналізі калу на дизбактеріоз у вас є деякі відхилення, а саме знижена кількість біфідобактерій, лактобактерій та збільшена кількість кишкової палички. Це може бути одною із причин того, що ви не поправляєтесь. Цей стан потребує лікування, та не обов'язково антибіотиками.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

das89ha

Допоможіть будь ласка

Додано: 26.01.2012 21:16

Доброго вечора. Прошу у Вас допомоги, бо не можу вилікуватись уже другий рік. Два роки назад у мене виявили дискенезію жовчого міхура. Був перший і єдиний приступ. Після цього почалися проблеми. Я пролікувалася різними препаратами. Зараз жовчний хвилює рідко. Пройшла обстеження у санаторії. Мені поставили діагноз гострий гастродуоденіт. Також зробили зондування, бо жовчний був переповнений. Зараз, як і раніше мене дуже хвилює кишечник. Постійні болі внизу живота і здуття. По гінекології все нормально. Аналіз на дисбактеріоз не зробила, не встигла. Антибіотики не приймала давно. Зараз регулярно приймаю бактерії, пробувала вже всі, що наявні в аптеках. Та результат настає лише на декілька днів. Далі все починається знову. Допоможіть мені будь ласка. Чи можна мені якось вилікуватись без аналізів на дисбактеріоз. На вас єдина надія. Дякую.

medisvit\_doctor

Додано: 27.01.2012 14:56

Доброго вечора. Прошу у Вас допомоги, бо не можу вилікуватись уже другий рік. Два роки назад у мене виявили дискенезію жовчого міхура. Був перший і єдиний приступ. Після цього почалися проблеми. Я пролікувалася різними препаратами. Зараз жовчний хвилює рідко. Пройшла обстеження у санаторії. Мені поставили діагноз гострий гастродуоденіт. Також зробили зондування, бо жовчний був переповнений. Зараз, як і раніше мене дуже хвилює кишечник. Постійні болі внизу живота і здуття. По гінекології все нормально. Аналіз на дисбактеріоз не зробила, не встигла. Антибіотики не приймала давно. Зараз регулярно приймаю бактерії, пробувала вже всі, що наявні в аптеках. Та результат настає лише на декілька днів. Далі все починається знову. Допоможіть мені будь ласка. Чи можна мені якось вилікуватись без аналізів на дисбактеріоз. На вас єдина надія. Дякую.

Шановна автор запитання! Прочитавши ваше запитання я зрозуміла, що ви не повністю обстежені. Не зробивши відповідних обстежень, зокрема посіву калу, УЗД, об'єктивного огляду спеціаліста поставити діагноз, а тим більше назначити лікування, неможливо. Болі внизу живота, які вас турбують, характерні для декількох захворювань, а не тільки зокрема для хворіб кишківника. Раджу Вам не зволікати, та прийти на прийом до лікаря.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

das89ha

Відповідь лікарю

Додано: 27.01.2012 17:10

"Шановна автор запитання! Прочитавши ваше запитання я зрозуміла, що ви не повністю обстежені. Не зробивши відповідних обстежень, зокрема посіву калу, УЗД, об'єктивного огляду спеціаліста поставити діагноз, а тим більше назначити лікування, неможливо. Болі внизу живота, які вас турбують, характерні для декількох захворювань, а не тільки зокрема для хворіб кишківника. Раджу Вам не зволікати, та прийти на прийом до лікаря".

УЗД робила: результат гострий гастродуоденіт. Результат ендоскопії: гастрит з пониженою кислотністю. Аналіз калу, тільки не на дисбактеріоз. Результат: найпростіших і гельмінтів не виявлено. Чи постібно пройти аналіз на дисбактеріоз?

medisvit\_doctor

Додано: 27.01.2012 17:45

"Шановна автор запитання! Прочитавши ваше запитання я зрозуміла, що ви не повністю обстежені. Не зробивши відповідних обстежень, зокрема посіву калу, УЗД, об'єктивного огляду спеціаліста поставити діагноз, а тим більше назначити лікування, неможливо. Болі внизу живота, які вас турбують, характерні для декількох захворювань, а не тільки зокрема для хворіб кишківника. Раджу Вам не зволікати, та прийти на прийом до лікаря".

УЗД робила: результат гострий гастродуоденіт. Результат ендоскопії: гастрит з пониженою кислотністю. Аналіз калу, тільки не на дисбактеріоз. Результат: найпростіших і гельмінтів не виявлено. Чи постібно пройти аналіз на дисбактеріоз?

Так, потрібно. По результатам УЗД, діагноз гострого гастродуоденіту неправильний.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

andrew1477

Здуття живота

Додано: 11.12.2011 23:37

Турбує часто, супроводжується неприємними звуками з живота, дискомфортом. Що порадите, окрім правильного харчування? Які препарати можна приймати самому до відвідування лікаря? Які дані необхідні лікарю для призначення лікування (аналізи і т.д.)? Дякую

medisvit\_doctor

Додано: 16.12.2011 17:55

Турбує часто, супроводжується неприємними звуками з живота, дискомфортом. Що порадите, окрім правильного харчування? Які препарати можна приймати самому до відвідування лікаря? Які дані необхідні лікарю для призначення лікування (аналізи і т.д.)? Дякую

Шановний автор запитання, до відвідин лікаря, ви можете приймати еспумізан, також здати аналіз на амілазу крові та здати кал на дизбактеріоз. Але найдоцільніше відвідати гастроентеролога до здачі аналізів.

С уважением,[доктор-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

Vasylyna

Додано: 10.12.2011 17:02

Доброго дня. Мені 17 років. Майже пів року тому після алкогольного отруєння з моїм кишечником відбуваються дивні речі. Спочатку це було рідко але тепер відбувається частіше. Нааприкінці дня відчуваю дискомфорт в животі, здуття і булькає так якби там була відкрита пляшка газованої води при цьому я відчуваю як тріскає майже кожна булька. Ці бульки проходять по кишечнику і виводяться на зовні газами. Стілець 2 -4 рази на добу, а раніше до цього був 1 раз деколи бувало 2 і при цьому я відчувала себе нормально. Тепер після випорожнення кишечника десь за 5 хвилин після того приходить таке відчуття ніби хочеться його випорожнити знову. що це може бути? дякую

medisvit\_doctor

Додано: 19.12.2011 09:45

Доброго дня. Мені 17 років. Майже пів року тому після алкогольного отруєння з моїм кишечником відбуваються дивні речі. Спочатку це було рідко але тепер відбувається частіше. Нааприкінці дня відчуваю дискомфорт в животі, здуття і булькає так якби там була відкрита пляшка газованої води при цьому я відчуваю як тріскає майже кожна булька. Ці бульки проходять по кишечнику і виводяться на зовні газами. Стілець 2 -4 рази на добу, а раніше до цього був 1 раз деколи бувало 2 і при цьому я відчувала себе нормально. Тепер після випорожнення кишечника десь за 5 хвилин після того приходить таке відчуття ніби хочеться його випорожнити знову. що це може бути? дякую

Доброго дня, шановна автор запитання. Симптоми, які ви перелічили, характерні для багатьох гастроентерологічних захворювань. І тому вас повинен оглянути на очному прийомі лікар-гастроентеролог та назначити відповідне лікування та обстеження. Раджу Вам не зволікати, і прийти на прийом.

З повагою,[лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

matteanka

**Кабінет інфекційних захворювань**

Додано: 04.09.2011 00:33

Дуже довгий час маю проблеми з травленням та відчуття зуду в задньому проході. Аналізи калу здвала, нічого не виявили. Де можна здати більш детальний аналіз на виявлення шельмінтів? КАЗали, що потрібен кабінет інфекційних захворювань. Куди краще звертатися?

medisvit\_doctor

Додано: 07.09.2011 09:52

Дуже довгий час маю проблеми з травленням та відчуття зуду в задньому проході. Аналізи калу здвала, нічого не виявили. Де можна здати більш детальний аналіз на виявлення шельмінтів? КАЗали, що потрібен кабінет інфекційних захворювань. Куди краще звертатися?

Доброго дня, шанований автор питання! Для більшої достовірності аналіз калу на яйця глистів треба здавати триразово з інтервалом 1-2 дні. Це можна зробити нашій клініці. Дізнатись подробиці процедури можна за телефоном 393 00 00.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Кубічка О.А.](#)

pascal

**Дуже важливо!**

Додано: 28.08.2011 11:15

Добрий день. Мене звати Марта і у мене виникла проблема зі видаленням калу. Почалося все з того, що я деякий час сиділа на дієті. Дієта була не найкраще підібрана і після неї я помітила, що не можу сходити в туалет по декілька днів, а то й по тижню. Випробувала проносне, на початку помагало, але потім труднощі з\*являлися знову. Коли приїхала додому, пішла до лікаря гастроентеролога, яка виписала мені декілька лікарств на пом\*якшення калу (так як кал був дуже твердий і я не могла його видалити). Ніби знову стало все нормально, та закінчивши приймати курс лікарств, проблеми почалися знову. А декілька днів тому відчувся дискомфорт в шлунку, відчуття ніби в шлунок запхали повітряну кульку і надули її, при чому шлунок теж ніби надувся. Порадьте, що робити? Можливо варто зробити гастроскопію? Чи вистачить зробити УЗІ шлунка і кишечника, щоби виявити причину проблеми?

medisvit\_doctor

Додано: 31.08.2011 11:30

Добрий день. Мене звати Марта і у мене виникла проблема зі видаленням калу. Почалося все з того, що я деякий час сиділа на дієті. Дієта була не найкраще підібрана і після неї я помітила, що не можу сходити в туалет по декілька днів, а то й по тижню. Випробувала проносне, на початку помагало, але потім труднощі з\*являлися знову. Коли приїхала додому, пішла до лікаря гастроентеролога, яка виписала мені декілька лікарств на пом\*якшення калу (так як кал був дуже твердий і я не могла його видалити). Ніби знову стало все нормально, та закінчивши приймати курс лікарств, проблеми почалися знову. А декілька днів тому відчувся дискомфорт в шлунку, відчуття ніби в шлунок запхали повітряну кульку і надули її, при чому шлунок теж ніби надувся. Порадьте, що робити? Можливо варто зробити гастроскопію? Чи вистачить зробити УЗІ шлунка і кишечника, щоби виявити причину проблеми?

Доброго дня, Марта. Причин виникнення закрепу дуже багато, у тому числі і незбалансоване харчування (у Вашому випадку), яке може спричинити порушення моторики шлунково-кишкового тракту, а так само загострення хронічних захворювань. Лікування призначається комплексно, з урахуванням стану усіх органів травлення. У Вашому випадку рекомендується провести такі дослідження: фіброгастродуоденоскопію з визначенням хеликобактер пилори, ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, копрограмму, аналіз калу на дисбактеріоз. Всі перелічені процедури Ви можете зробити в наших медичних центрах, записатися можна за телефоном 393 00 00. Про спеціальну підготовку до процедур Вам розкажуть лікарі-координатори контакт-центру.

З повагою, лікар-гастроентеролог Кубічка О.А.

Bella23

як набрати кілограми

Додано: 24.08.2011 12:10

Доброго дня! Мене звуть Таня, я сестра цієї дівчини, про яку далі буду розповідати. Підкажіть як поправитися і до якого лікаря потрібно звернутися, щоб вилікувати основну хворобу. Їй 25 років, у 5-річному віці їй була зроблена операція по діагнозу гіпоплазія легень і була відрізана нижня доля лівої легені. Потім вона періодично лежала в лікарні, їй робили бронхоскопії. Після закінчення школи вона до лікарні не зверталася, в принципі їй потреби не було, відчувала вона себе добре, можна сказати на рівні з усіма іншими дітьми, так би мовити, і пригала, і бігала, хоча функція дихання була знижена (65%). У 2009 році відбулося досить різке погіршення стану, що привело до сьогоднішнього досить критичного. Розпочалося все із невеликої задишки, яка через два місяці переросла в таку, що вона була не в змозі піднятися на третій поверх, та зниження ваги із 42 кг до 38 кг (при рості 150 см). Вона лягла до лікарні, явного полегшення не відбулося, основна підозра лікарів туберкульоз легень, після 3 місяців проведених аналізів діагноз не підтвердився, але на нас чекав новий сюрприз, у неї лопає була з лівої сторони (бульозна емфізема). Після дренування і прийому преднізолону (20 мг) їй стало легше, але функція дихання складала 32 %, вона повернулася на роботу. Через кілька місяців вона поступово кидає преднізолон (серпень 2009р.) і відбувається знову погіршення стану, розпочинаємо прийом таблеток знову (10 мг), але це мало допомагає. Під час епідемії грипу вона підхоплює свинячий грип і потрапляє до реанімації (січень 2010р), плюс повторюється сценарій 2009 року, підозра на туберкульоз, лопає була з правої сторони і зниження вага до 28 кг. Після лікування стає краще, але організм наскільки був ослаблений що ходити вона не могла самостійно протягом місяця, а після цього передвигалася сама лише від ліжка до ліжка. Лікарі виписують з купою діагнозів (грип А (H1N1) важкий перебіг ускладнений негоспітальною двобічною полісегментарною пневмонією 4 гр, правобічний спонтанний пневмоторакс (стан після дренування легені), залишкова порожнина зліва, кістозна гіпоплазія легень, бульозна емфізема легень, пневмофіброз, ЛН III ст., хронічне легеневе серце, кахексія, правобічний осумкований плеврит) і словами що справи наші, м'яко кажучи, «Не хороші». Батьки забирають її з Києва до села, де намагаються підняти на ноги, за цей період до серпня 2011р. були різні стани, і досить критичні, коли від кашлю вона задихалася і періоди коли вона могла пройти повільною ходою 1 км, звичайно до стану в період до 2009 року ще дуже далеко. Зараз вона важить 30 кг (інколи доходимо до 32 кг), як поправитися не знаємо, хоча апетит у неї хороший. Приймає преднізолон (30 мг), коли збавляємо стан погіршується. Якщо описати її стан кількома реченнями, то можна сказати, що він більш менш стабільний, але вона постійно ослаблена, постійно знаходиться або в лежачому, або в сидячому положенні. Пульс в спокійному стані 90- 100 ударів і це при тому, що вона приймає бісопролол (2,5 мг в день), а кількість вдохів-видихів зранку дорівнює 24, вдень – 30, а після ходьби в 100 м може сягати 60. Скажіть, будь-ласка, чи є надія на повне чи часткове поліпшення чи це не лікується і чекати найгіршого найближчим часом. Будь-ласка, дайте обґрунтовану відповідь, для мене це дуже важливо, бо я просто мушу їй допомогти. Дякую. Таня

medisvit\_doctor

Додано: 07.09.2011 16:47

Доброго дня! Мене звуть Таня, я сестра цієї дівчини, про яку далі буду розповідати. Підкажіть як поправитися і до якого лікаря потрібно звернутися, щоб вилікувати основну хворобу. Їй 25 років, у 5-річному віці їй була зроблена операція по діагнозу гіпоплазія легень і була відрізана нижня доля лівої легені. Потім вона періодично лежала в лікарні, їй робили бронхоскопії. Після закінчення школи вона до лікарні не зверталася, в принципі їй потреби не було, відчувала вона себе добре, можна сказати на рівні з усіма іншими дітьми, так би мовити, і пригала, і бігала, хоча функція дихання була знижена (65%). У 2009 році відбулося досить різке погіршення стану, що привело до сьогоднішнього досить критичного. Розпочалося все із невеликої задишки, яка через два місяці переросла в таку, що вона була не в змозі піднятися на третій поверх, та зниження ваги із 42 кг до 38 кг (при рості 150 см). Вона лягла до лікарні, явного полегшення не відбулося, основна підозра лікарів туберкульоз легень, після 3 місяців проведених аналізів діагноз не підтвердився, але на нас чекав новий сюрприз, у неї лопає була з лівої сторони (бульозна емфізема). Після дренування і прийому преднізолону (20 мг) їй стало легше, але функція дихання складала 32 %, вона повернулася на роботу. Через кілька місяців вона поступово кидає преднізолон (серпень 2009р.) і відбувається знову погіршення стану, розпочинаємо прийом таблеток знову (10 мг), але це мало допомагає. Під час епідемії грипу вона підхоплює свинячий грип і потрапляє до реанімації (січень 2010р), плюс повторюється сценарій 2009 року, підозра на туберкульоз, лопає була з правої сторони і зниження вага до 28 кг. Після лікування стає краще, але організм наскільки був ослаблений що ходити вона не могла самотійно протягом місяця, а після цього передвигалася сама лише від ліжка до ліжка. Лікарі виписують з купою діагнозів (грип А (H1N1) важкий перебіг ускладнений негоспітальною двобічною полісегментарною пневмонією 4 гр, правобічний спонтанний пневмоторакс (стан після дренування легені), залишкова порожнина зліва, кістозна гіпоплазія легень, бульозна емфізема легень, пневмофіброз, ЛН III ст., хронічне легеневе серце, кахексія, правобічний осумкований плеврит) і словами що справи наші, м'яко кажучи, «Не хороші». Батьки забирають її з Києва до села, де намагаються підняти на ноги, за цей період до серпня 2011р. були різні стани, і досить критичні, коли від кашлю вона задихалася і періоди коли вона могла пройти повільною ходою 1 км, звичайно до стану в період до 2009 року ще дуже далеко. Зараз вона важить 30 кг (інколи доходимо до 32 кг), як поправитися не знаємо, хоча апетит у неї хороший. Приймає преднізолон (30 мг), коли збавляємо стан погіршується. Якщо описати її стан кількома реченнями, то можна сказати, що він більш менш стабільний, але вона постійно ослаблена, постійно знаходиться або в лежачому, або в сидячому положенні. Пульс в спокійному стані 90- 100 ударів і це при тому, що вона приймає бісопролол (2,5 мг в день), а кількість вдохів-видихів зранку дорівнює 24, вдень – 30, а після ходьби в 100 м може сягати 60. Скажіть, будь-ласка, чи є надія на повне чи часткове поліпшення чи це не лікується і чекати найгіршого найближчим часом. Будь-ласка, дайте обґрунтовану відповідь, для мене це дуже важливо, бо я просто мушу їй допомогти. Дякую. Таня

Добрий день, Таня! Уважно прочитала Ваше звернення. Одразу напишу, що в умовах спілкування в Інтернеті дуже важко надати вичерпну відповідь. Для цього треба спілкуватися очно. Безумовно, стан Вашої сестри важкий. Хвороба (Діагноз Ви прописали у зверненні) привела практично до стану інвалідності, - виражена дихально-серцева недостатність внаслідок бульозної хвороби легень, перенесених не один раз пневмотораксів, що ускладнювались вірусно-бактеріальними інфекціями, що, у свою чергу, посилювало дихальну недостатність. Дефіцит ваги - це наслідок хронічної гіпоксії (недостатнього поступлення кисню до органів та м'язів). Ваша сестра знаходиться у батьків в селі. Але я би порекомендувала періодично показувати її лікуючим лікарям (НДІ пульмонології, або Міський пульмоцентр) для того, щоб корегувати дозу преднізолону, призначати симптоматичне лікування. Такі пацієнти мають бути



під наглядом лікарів - це забезпечує для них більш нормальний стан та тривалість життя.

З повагою, [лікар-алерголог-пульмонолог Голубовська-Компанченко Т.А.](#)

blago

Додано: 13.07.2011 11:26

Сім місяців назад операція - поліп-уретри. Нещодавно виявили поліп у шлунку. Чи можна без операції видалити його? Чи можна зв'язатися з медичними центрами, лабораторіями по вірусології, виявити причину виникнення поліпів? Куди можна звернутися?

medisvit\_doctor

Додано: 13.07.2011 18:27

Сім місяців назад операція - поліп-уретри. Нещодавно виявили поліп у шлунку. Чи можна без операції видалити його? Чи можна зв'язатися з медичними центрами, лабораторіями по вірусології, виявити причину виникнення поліпів? Куди можна звернутися?

Доброго дня, шановний автор запитання!

Нині немає загальноновизнаної теорії походження поліпів шлунку. Не доведена, наприклад, роль вірусів. Найбільш поширеною є теорія, згідно якої поліпи з'являються через порушення відновних процесів слизової оболонки шлунку, порушення координації між ростом та розвитком клітин слизової оболонки. Відомо також що поліпи шлунку, на відміну від поліпів уретри, здатні перероджуватись у рак.

З моєї особистої лікарської практики, поліпи шлунку розвиваються насамперед через різні запальні зміни слизової оболонки шлунку.

В усякому разі поєднання поліпів в уретрі та в шлунку не є наслідком дії однієї причини. Це зовсім різні стани, що ніяк не пов'язані між собою.

Лікування поліпів шлунку – виключно хірургічне, але це не обов'язково велика операція.

Видалення поліпа, наприклад, можливе під час проведення гастроскопії – так звана ендоскопічна поліпектомія. Оскільки поліпи шлунку є передраковим станом, обов'язковим є гістологічне дослідження видаленого поліпа.

Щодо вибору лікувального закладу, з наведеної вище причини раджу Вам звертатися в центри, що практикують велику шлункову хірургію та здатні правильно провести лікування при будь-якому результаті гістологічного дослідження.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Гордієнко Н.М.](#)



ira125

геморой

Додано: 06.07.2011 00:03

Доброго дня! Є деякі питання стосовно геморою... не впевнена що по адресу, але проктолога не знайшла тут. сидяча робота і не правильне харчування вдаються в знаки(( судячи з результату то це 1 або швидше початкова стадія. дискомфорту ніякого, за 3-4 місяці коли помітила таке може 2 рази були незначні сліди крові після випорожнення. з анусу виліз на пів нігтя мізинця маленький "відросток" чи як це назвати... не хотілось б запускати і також хірургічне втручання не радує, може якісь припарати порадите... чи краще не експериментувати і одразу до лікаря ?!.... Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 07.07.2011 09:29

Доброго дня! Є деякі питання стосовно геморою... не впевнена що по адресу, але проктолога не знайшла тут. сидяча робота і не правильне харчування вдаються в знаки(( судячи з результату то це 1 або швидше початкова стадія. дискомфорту ніякого, за 3-4 місяці коли помітила таке може 2 рази були незначні сліди крові після випорожнення. з анусу виліз на пів нігтя мізинця маленький "відросток" чи як це назвати... не хотілось б запускати і також хірургічне втручання не радує, може якісь припарати порадите... чи краще не експериментувати і одразу до лікаря ?!.... Дякую!

Доброго дня, шановний автор запитання! Дякую за питання. Враховуючи скудні виділення крові під час випоржнення та наявність "невеликого" вузлика біля видхідника, насамперед треба мати на увазі хронічну тріщину чи поліп. Ці захворювання, при тривалому перебігу, можуть становити загрозу на рак. Тому раджу одразу звернутися до лікаря.

Для геморрою на початкових стадіях притаманні значні та безболісні виділення яскраво червоної крові під час випорожнення. Випадіння вузлів у вигляді м'яких утворень з'являється на пізніх стадіях. Раджу не зволікати, та звернутися до лікаря. Бажаю Вам удачі!

З повагою, [лікар хірург-проктолог, Сидоренко О.В.](#)

guerrilla\_warrior

Додано: 05.11.2011 22:45

доброго дня. Я відчуваю невелику біль в анусі, весною хворів на геморой, було випадання геморойного вузля, але без кровотечі. Проїшов лікування: приймав проктоглівенол, флебодіа,німесил,аскорутин. зараз видимих признаков повернення геморою нема, але турбує біль. що мені робити? дякую

medisvit\_doctor

Додано: 07.11.2011 12:34

доброго дня. Я відчуваю невелику біль в анусі, весною хворів на геморой, було випадання геморойного вузля, але без кровотечі. Проїшов лікування: приймав проктоглівенол, флебодіа,німесил,аскорутин. зараз видимих признаков повернення геморою нема, але турбує біль. що мені робити? дякую

Доброго дня, шановний автор запитання! Незначний біль в анусі може свідчити про наявність запального процесу прямої кишки і хронічної анальної тріщини. Навіть якщо зараз немає видимих ознак геморою, це не виключає існування гемороїдальної хвороби, яка при тривалому перебігу викликає запальні зміни в стінці прямої кишки. Слід також знати, біль в анусі іноді може супроводжувати рак цієї ділянки кишки. Наполегливо пропоную звернутися на огляд до проктолога, аби виключити всі ризики для здоров'я.

З повагою, [лікар хірург-проктолог, Сидоренко О.В.](#)

Pugach\_Bohdan

коліт

Додано: 20.02.2011 23:53

Добрий день! 3 червня місяця 2010 року після отруєння йогуртом турбує біль в животі (в області пупка), при натискуванні в центрі живота чутно переливання рідини, вздуття, відчуття тяжкості після їжі, живіт ніби роздувається. В одній лікарні поставили діагноз хронічний коліт, лікування специфічного не було, тільки мікроклізми з ромашкою, магнітотерапія підшлункової залози, мінеральні води, пробіотики. Здавалося б все йшло на полегшення, як тільки припинив лікування, всі симптоми поступово вернулись. В наступній лікарні поставили діагноз дизбактеріоз і дизкінезія жовчних, пройшов курс лікування, відчув незначне полегшення. Потім зайнявся самолікуванням: пропив піобактеріофаг, потім ністатін, пімафуцин (натаміцин). Симптом роздування живота дещо вдалося усунути, але тяжкість, переливання рідини залишились, здавалося, що їжа просто не травиться. Попробував приймати ферментни (мезим, фестал), полегшення не відчув. Звернувся до інфекціоніста, той призначив здати аналіз на дизбактеріоз та копрограму з виділенням я'єць гельмінтів. Результат: дизбактеріозу немає, копрограма теж в нормі, єдине тільки РН калу 6.0 і наявні дріжджеві гриби. Інфекціоніст направив до гастроентеролога, той вислухав, глянув на язик і сказав що в мене знижена кислотність шлунку, призначив дієту при диспепсії з шлунковою гіпосекрецією, колікід, біогаія, мезим. Змін на краще не сталося. Хочу зауважити, що до отруєння ще приймав якусь індійську траву на протязі 3 тижнів, яка б мала очистити кишечник, в мене вона викликала збільшення частоти стільця до 5-8 разів на день. Потім відчув дискомфорт в задньому проході, крові не було, дискомфорт до цих пір, здається що просвіт кишки звузився і погано відходять гази. Дайте, будь ласка, пораду, що робити? Що це може бути? Буду дуже вдячний

medisvit\_doctor

Додано: 23.02.2011 09:43

Добрий день! 3 червня місяця 2010 року після отруєння йогуртом турбує біль в животі (в області пупка), при натискуванні в центрі живота чутно переливання рідини, вздуття, відчуття тяжкості після їжі, живіт ніби роздувається. В одній лікарні поставили діагноз хронічний коліт, лікування специфічного не було, тільки мікроклізми з ромашкою, магнітотерапія підшлункової залози, мінеральні води, пробіотики. Здавалося б все йшло на полегшення, як тільки припинив лікування, всі симптоми поступово вернулись. В наступній лікарні поставили діагноз дизбактеріоз і дизкінезія жовчних, пройшов курс лікування, відчув незначне полегшення. Потім зайнявся самолікуванням: пропив піобактеріофаг, потім ністатін, пімафуцин (натаміцин). Симптом роздування живота дещо вдалося усунути, але тяжкість, переливання рідини залишились, здавалося, що їжа просто не травиться. Попробував приймати ферментни (мезим, фестал), полегшення не відчув. Звернувся до інфекціоніста, той призначив здати аналіз на дизбактеріоз та копрограму з виділенням яєць гельмінтів. Результат: дизбактеріозу немає, копрограма теж в нормі, єдине тільки РН калу 6.0 і наявні дріжджеві гриби. Інфекціоніст направив до гастроентеролога, той вислухав, глянув на язик і сказав що в мене знижена кислотність шлунку, призначив дієту при диспепсії з шлунковою гіпосекрецією, колікід, біогаія, мезим. Змін на краще не сталося. Хочу зауважити, що до отруєння ще приймав якусь індійську траву на протязі 3 тижнів, яка б мала очистити кишечник, в мене вона викликала збільшення частоти стільця до 5-8 разів на день. Потім відчув дискомфорт в задньому проході, крові не було, дискомфорт до цих пір, здається що просвіт кишки звужився і погано відходять гази. Дайте, будь ласка, пораду, що робити? Що це може бути? Буду дуже вдячний

Доброго дня, шановний автор питання!

З огляду на Ваші скарги, можна припустити розвиток хронічного запального процесу в кишечнику. Для того, щоб вирішити Вашу проблему, необхідна очна консультація лікаря гастроентеролога з метою встановлення точного діагнозу та призначення адекватної терапії. Звертайтеся, будемо раді допомогти. Телефон контакт-центру - 393-00-00.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Кубічка О.А.](#)

biluk

Додано: 20.03.2011 11:05

Добрий день. Хочу запитати у вас поради. Моїй донечці 2рочки і 6місяців. Ми постійно хворіємо. В тернополі нам поставили діагноз - Б.Астма, гастроентеральна ферментопатія, дистонія жовчних шляхів, алергічний бронхіт, алергічний риніт атопічної форми. В 11 міс. ми вперше попали в лікарню і вже тоді через УЗД сказали, що в нас трохи збільшена печінка (і так до сьогодні). За останній рік в нас постійно розлади калу, - неперетравлені частинки особливо вареної їжі, рідкий стілець, забарвлення - світлокоричневого, коричневого кольору, консистенція нагадує дитяче рідке пюре, деколи було жирне, деколи (частіше) зі слизю, прожилків крові ніколи не замічала. За грудень січень цього місяця 5 раз був темнокоричневий кал зі слизом, при цьому у дитини дуже болів животик і могла бути рвота або зригування. Глисти, цисти і лямблії у нас ніколи не виявлялись. Гастроентеролог після останньої консультації (10 березня) нам назначив галстену (раніше ми його не приймали) і солянку з пепцином, біфі-форм, жовчогінний чай (приймали неодноразово). Лікування алергічних запалень проводиться гормонально (антибіотики насприймаються і на частину антибіотиків алергія). Після прийому галстени кал у нас раптово став густим (як горошки), запорів немає. (Результати аналізів - трипсин 1:60; ЗА Крові - гемоглобін 128, ер - 4,25; кольор, показник - 0,9; лейкоц. - 4,0; еозинофіли - 3; палички 4; сегмент - 34; лімфоц. - 56; моноцити - 3; РОЕ - 3. ЗА сечі --- колір св. - жовтий;

лейкоцити - 1-2. Біохімія - сечовина - 3,0; креатинін - 0,053; холестерин - 5,8; В-ліпопротеїни - 47; білірубін заг. - 13,83; Лорлужна фосфатаза - 204,2; АлАТ - 20,4; АсАТ - 18,3. ) Животик м'який. Алергії на їжу майже не має ( яйце, лимон, гранат). в тернополі за це лікарі навіть не хотіли братися, - сказали щоб ми їхали в ОХМАДИТ. Будь -ласка підкажіть що б це могло бути.

medisvit\_doctor

Додано: 21.03.2011 17:53

Добрий день. Хочу запитати у вас поради. Моїй донечці 2рочки і 6місяців. Ми постійно хворіємо. В тернополі нам поставили діагноз - Б.Астма, гастроентеральна ферментопатія, дистонія жовчних шляхів, алергічний бронхіт, алергічний риніт атопічної форми. В 11 міс. ми вперше попали в лікарню і вже тоді через УЗД сказали , що в нас трохи збільшена печінка (і так до сьогодні). За останній рік в нас постійно розлади калу,- неперетравлені частинки особливо вареної їжі, рідкий стілець, забарвлення - світлокоричневого, коричневого кольору, консистенція нагадує дитяче рідке пюре, деколи було жирне, деколи ( частіше) зі слизю, прожилків крові ніколи не замічала. За грудень січень цього місяця 5 раз був темнокоричневий кал зі слизом, при цьому у дитини дуже болів животик і могла бути рвота або зригування. Глисти, цисти і лямблїї у нас ніколи не виявлялись.Гастроентеролог після останньої консультації (10 березня) нам назначив галстену (раніше ми його не приймали) і солянку з пепцином, біфі-форм, жовчогінний чай (приймали неодноразово). Лікування алергічних запалень проводиться гормонально ( антибіотики на сприймаються і на частину антибіотиків алергія).Після прийому галстени кал у нас раптово став густим ( як горошки), запорів немає. (Результати аналізів - трипсин 1:60; ЗА Крові - гемоглобін 128, ер - 4,25; кольор, показник - 0,9; лейкоц. - 4,0; еозинофіли - 3; палички 4; сегмент - 34; лімфоц. - 56; моноцити - 3; РОЕ - 3. ЗА сечі --- колір св. - жовтий; лейкоцити - 1-2. Біохімія - сечовина - 3,0; креатинін - 0,053; холестерин - 5,8; В-ліпопротеїни - 47; білірубін заг. - 13,83; Лорлужна фосфатаза - 204,2; АлАТ - 20,4; АсАТ - 18,3. ) Животик м'який. Алергії на їжу майже не має ( яйце, лимон, гранат). в тернополі за це лікарі навіть не хотіли братися, - сказали щоб ми їхали в ОХМАДИТ. Будь -ласка підкажіть що б це могло бути.

Доброго дня, Шановна мама! Ви надали дуже багато важливої інформації, яка викликає ще більше питань. За що саме не брались лікувати лікарі? На підставі чого був виставлений діагноз? Відносно збільшений розмір печінки у дитини 2 років - це норма. Чи встановлений діагноз бронхіальна астма? Як дитина до сьогодні росте та розвивається? Чи проводилась оцінка, чи були відхилення? Да стілець має зміни, але чи проводився його лабораторний аналіз? Як сформульований діагноз в направленні в ОХМАТДИТ? Де Ви в Києві чи в Тернополі? Дайте більш детальної інформації із самого народження, щоб ми мали можливість Вам допомогти.

З повагою, [лікар-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.І.](#)

biluk

Додано: 22.03.2011 18:36

Добрий день! Пишу вам детальну інформацію про донечку.

Вагітність протікала з ускладненнями. 3 тижні перша загроза, в 14 – 18 друга, в 22 тижні мені поставили діагноз пієлонефрит вагітних внаслідок чого мені назначили антибіотики, в 34 тиж.

Нова загроза передчасних родів які зупинили, в 39 тиж. ,я народила здорову дівчику вагою 3,300, ріст 52, роди пройшли нормально. На виписку (3 день) втратила вона 200 грам. .

0 – 6 міс: до місяця була жовтушка (в нас обох 1 гр різні резуси, в неї +, в мене -), пупчик заростав до 3 тижня; в 2 міс ввели яблучний сік – реакція нормальна, за 2 тиж., ввели яблучне пюре – стілець мав темне забарвлення і запах яблука. В 5,5 міс в нас вилізли зубки. До 6 міс дефекація була 4 рази в день. Щеплення БЦЖ і гепатиту Б в роддомі перенесла нормально. В 1 і 2 місяці гепатит Б – теж нормально, а 3 місяці АКДС закінчилося за 12 годин рвотою. В 4 міс., був нежить. 3 народження кожен день чхала і кашляла.

0-12: В 8 зробили другу АКДС. В 9 міс. Місцеві лікарі поставили коклюш (клінічно не підтверджений), лікувались в дома. Після чого почалося в 11 міс щось страшне:

Виписка №1: 11 місяців:

Повний діагноз – Двобічна позалікарняня бронхопневмонія ускладнена обструктивним синдромом ДН I ст., риніт, дефіцитна анемія I, прізування зубів. Аналізи: цукор – 3,0; ЗАК – гемогл. – 105; ер – 3,48, коль. показник – 0,9; лейкоц. – 9,4; п. – 6, сегм – 64, лімф – 26; м – 3.

Лікування: Ампісульбін 500 мл, лазолван – сироп, біфіформ, еуфілін.

Виписка №2: 11 міс і 1 тиж. Діагноз – Вторинна гастроентеральна ферментопатія. Аналізи ЗАК – ер. – 3,81, гемогл. – 116, КП – 0,9, лейкоц. – 6,8, еозин. – 1, п – 3, сегм. – 59, лімф. – 31, м. – 6, глюкозо 4,17. ЗА сечі: - білок (-). епітел. – 1-2, лейкоц. – 2-3. ентеробіоз – нормальний. Лікування : - ніфуроксазит сироп, біфіформ, гастроліт, система.

Виписка № 3: 11 міс і 2 тиж. Гостра позалікарняня бронхопневмонія ускладнена обструктивним синдромом ДН I ст. ЗАК – гемогл., - 122, ер – 4,18, КП -0,9, лейкоц., -6,2, п. – 4, еозин., - 2, лімф – 39, м. – 3. Лікування: цефатоксин 100мл, інстаріл, лазолван, капання одне – преднізолон, еуфілін, ношпа, фізроцин.

Виписка № 4: 1 рік рівно. Обструктивний бронхіт. Аналізи: ЗАК. Ер – 3,61, гемогл. – 110, КП – 0,9, лейкоц. – 9,7п – 3, сигм – 57, лімф. – 30, КП – 0,9п – 3, сегм – 57, лімф – 30, глюкоза 4,9. Лікування цефтріаксон 500мл. Лазолван.

Виписка № 5 :1 рік і 5 міс. ГРВІ, Гострий трахеобронхіт, гострий риніт, прорізування зубів, дефіцитна анемія середньої важкості. Аналізи: Ер – 3,39, гемогл. – 82, КП – 0,9, лейкоц. – 8,4п – 8, сигм – 49, лімф. – 37, цукор 3,7 Лікування амікацин 90мл, мультитабс,

Виписка із охмадиту: Діагноз – Бронхіальна астма, атопічна, після приступний період.

Супутній: алергічний риніт, гіпоімунний стан, дискінезія жовчних шляхів, медикаментозна алергія. Аналізи: Гемогл. – 102, лейкоц – 5,2, шое 3, еоз – 10, палички 0, сегм – 36, лімф. 42, мон 12. кал на ферменти трипсин 1:60. біохімія – Іонограма – Na- 138,3 K4,2 Ca105,2; Печінкові проби холест. – 3,9, білі руб – 11,6, АСТ – 24,4, АЛТ – 10,7, цукор 5,1. проба на муковісцидоз негативна. Ig E – 203. Лікування зодак, беклазон, артіхол, рибомуніл, vormіл. Зараз трипсин рівний нулю. У нас то запори, то проноси але один два рази в день, живіт м'який, кал неперетравлений. Підкажіть, що робити і що думати.

medisvit\_doctor

Додано: 24.03.2011 09:29

Добрий день! Пишу вам детальну інформацію про донечку.

Вагітність протікала з ускладненнями. 3 тижні перша загроза, в 14 – 18 друга, в 22 тижні мені поставили діагноз пієлонефрит вагітних внаслідок чого мені назначили антибіотики, в 34 тиж.

Нова загроза передчасних родів які зупинили, в 39 тиж. ,я народила здорову дівчику вагою

3,300, ріст 52, роди пройшли нормально. На виписку (3 день) втратила вона 200 грам. .  
 0 – 6 міс: до місяця була жовтушка (в нас обох 1 гр різні резуси, в неї +, в мене -), пупчик заростав до 3 тижня; в 2 міс ввели яблучний сік – реакція нормальна, за 2 тиж., ввели яблучне пюре – стілець мав темне забарвлення і запах яблука. В 5,5 міс в нас вилізли зубки. До 6 міс дефекація була 4 рази в день. Щеплення БЦЖ і гепатиту Б в роддомі перенесла нормально. В 1 і 2 місяці гепатит Б – теж нормально, а 3 місяці АКДС закінчилося за 12 годин рвотою. В 4 міс., був нежить. З народження кожен день чхала і кашляла.

0-12: В 8 зробили другу АКДС. В 9 міс. Місцеві лікарі поставили коклюш (клінічно не підтверджений), лікувались в дома. Після чого почалося в 11 міс щось страшне:

Виписка №1: 11 місяців:

Повний діагноз – Двобічна позаликарняня бронхопневмонія ускладнена обструктивним синдромом ДН І ст., риніт, дефіцитна анемія І, прізування зубів. Аналізи: цукор – 3,0; ЗАК – гемогл. – 105; ер – 3,48, коль. показник – 0,9; лейкоц. – 9,4; п. – 6, сегм – 64, лімф – 26; м – 3.

Лікування: Ампісульбін 500 мл, лазолван – сироп, біфіформ, еуфілін.

Виписка №2: 11 міс і 1 тиж. Діагноз – Вторинна гастроентеральна ферментопатія. Аналізи ЗАК – ер. – 3,81, гемогл. – 116, КП – 0,9, лейкоц. – 6,8, еозин. – 1, п – 3, сегм. – 59, лімф. – 31, м. – 6, глюкоза 4,17. ЗА сечі: - білок (-). епітел. – 1-2, лейкоц. – 2-3. ентеробіоз – нормальний. Лікування : - ніфуроксазит сироп, біфіформ, гастроліт, система.

Виписка № 3: 11 міс і 2 тиж. Гостра позаликарняня бронхопневмонія ускладнена обструктивним синдромом ДН І ст. ЗАК – гемогл., - 122, ер – 4,18, КП -0,9, лейкоц., -6,2, п. – 4, еозин., - 2, лімф – 39, м. – 3. Лікування: цефатоксин 100мл, інстаріл, лазолван, капання одне – преднізолон, еуфілін, ношпа, фізроцин.

Виписка № 4: 1 рік рівно. Обструктивний бронхіт. Аналізи: ЗАК. Ер – 3,61, гемогл. – 110, КП – 0,9, лейкоц. – 9,7п – 3, сигм – 57, лімф. – 30, КП – 0,9п – 3, сегм – 57, лімф – 30, глюкоза 4,9. Лікування цефтріаксон 500мл. Лазолван.

Виписка № 5 : 1 рік і 5 міс. ГРВІ, Гострий трахеобронхіт, гострий риніт, прорізування зубів, дефіцитна анемія середньої важкості. Аналізи: Ер – 3,39, гемогл. – 82, КП – 0,9, лейкоц. – 8,4п – 8, сигм – 49, лімф. – 37, цукор 3,7. Лікування амікацин 90мл, мультитабс,

Виписка із охмادиту: Діагноз – Бронхіальна астма, атопічна, після приступний період.

Супутній: алергічний риніт, гіпоімунний стан, дискінезія жовчних шляхів, медикаментозна алергія. Аналізи: Гемогл. – 102, лейкоц – 5,2, шое 3, еоз – 10, палички 0, сегм – 36, лімф. 42, мон 12. кал на ферменти трипсин 1:60. біохімія – Іонограма – Na- 138,3 K4,2 Ca105,2; Печінкові проби холест. – 3,9, білі руб – 11,6, АСТ – 24,4, АЛТ – 10,7, цукор 5,1. проба на муковісцидоз негативна. Ig E – 203. Лікування зодак, беклазон, артіхол, рибомуніл, ворміл. Зараз трипсин рівний нулю. У нас то запори, то проноси але один два рази в день, живіт м'якенький, кал неперетравлений. Підкажіть, що робити і що думати.

Доброго дня, шановна мама! На сьогодні першочергово треба розібратись із кишечником згідно результатів аналізів. Вам треба здати аналіз калу на дисбактеріоз, аналіз калу на копрограму.

З повагою, [лікар-педіатр, неонатолог, гастроентеролог, Нехаєнко М.І.](#)



olesiakotuk

підкажіть будь-ласка.

Додано: 11.01.2012 22:26

Доброго вечора. Мені 19 років. В мене в дитинстві був гастрит. я його підліковувала, але мені сказали що він хронічний. От десь з 12 до 18 років майже нічого не турбувало. Недавно 2 рази дуже сильно отруїлась, і мені сказали що міг загостритись гастрит. Сходила на УЗ і зонт. В кінці висновку Уз написали УЗ ознаки дискінедії жовчевивідних шляхів. З всіх висновків що мені пояснив гастроентеролог, я зрозуміла що в 12-палій кишці запалена цибулина і в мене є закид жовчі. Лікар виписав мені перед їдою пити мотиліум, після їди фосфалюгель. А також 2 рази на тиждень уколи мукози+ траумель. і так 4 тижні. Порадьте мені будь-ласка чи це подіє..бо наразі жодних відчуттів покращення стану в мене нема.

Живіт мене не дуже і болить, але є важкість після їди, постійне відчуття голоду, а також неприємний запах з рота, чи може це бути повязание з гастритом, тому що зуби я всі підлікувала і постійно слідкую за ними? А також я завжди хочу поправитись, бо виглядаю дуже худенькою, і їм я багато, але в мене нічого не виходить. можливо є якась спеціальна дієта, при якій можна поправитись при гастриті.??

medisvit\_doctor

Додано: 13.01.2012 09:35

Доброго вечора. Мені 19 років. В мене в дитинстві був гастрит. я його підліковувала, але мені сказали що він хронічний. От десь з 12 до 18 років майже нічого не турбувало. Недавно 2 рази дуже сильно отруїлась, і мені сказали що міг загостритись гастрит. Сходила на УЗ і зонт. В кінці висновку Уз написали УЗ ознаки дискінедії жовчевивідних шляхів. З всіх висновків що мені пояснив гастроентеролог, я зрозуміла що в 12-палій кишці запалена цибулина і в мене є закид жовчі. Лікар виписав мені перед їдою пити мотиліум, після їди фосфалюгель. А також 2 рази на тиждень уколи мукози+ траумель. і так 4 тижні. Порадьте мені будь-ласка чи це подіє..бо наразі жодних відчуттів покращення стану в мене нема.

Живіт мене не дуже і болить, але є важкість після їди, постійне відчуття голоду, а також неприємний запах з рота, чи може це бути повязание з гастритом, тому що зуби я всі підлікувала і постійно слідкую за ними? А також я завжди хочу поправитись, бо виглядаю дуже худенькою, і їм я багато, але в мене нічого не виходить. можливо є якась спеціальна дієта, при якій можна поправитись при гастриті.??

Доброго дня, шановна автор запитання. Так, відчуття важкості в животі, голоду, неприємний запах із ротової порожнини є частими симптомами хронічних захворювань шлунку та 12-палої кишки. Окрім фіброгастроскопії, яку ви зробили, я би рекомендувала зробити аналіз на Хелікобактер Пілорі, яка часто є першопрчиною вищезгаданих проблем, а також при необхідності, відповідно пролікуватись.

З повагою, [лікар-гастроентеролог Ямроз Л.В.](#)

my\_afrodita

Додано: 15.02.2011 19:31

Добрий вечір! 2 роки назад моїй мамі за рентгенологічним обслідуванням ставили діагноз - дивертикул стравоходу, проте ендоскопічні дослідження його не виявляли і досі не виявляють, уже 7 разів перевіряли. На сьогодні мамі з кожним днем усе гіршає: якщо раніше під час прийому їжі вона не могла ковтати (не проходила їжа), то зараз навпаки, але стає гірше після прийому (десь через 15-20 хв.), постійна біль за грудиною, з віддаванням у спину; відчуття, наче

горло перерізане, важкість у грудях, що призводить млявість (аж до відчуття втрати свідомості), булькотіння в горлі, неприємний запах з рота, інколи сухий кашель (прослуховується, ніби якась пустота присутня у горлі), коли нагинається сильна давка на горло, яке ж одразу починає із зовнішньої сторони червоніти, проте в області щитовидної залози на фоні почервоніння виникає білий трикутник. Допоможіть, будь ласка! Я розумію, що не бачачи пацієнта, лише читати різноманітні симптоми, важко робити якісь висновки і прогнози, проте сподіваюся на Вашу відповідь! Хоча б проаналізуйте симптоми, чи можуть вони все ж таки бути пов'язані з дивертикулом, бо лікар (торакальний хірург) відмовляється від цього діагнозу, а свій не встановлює... Спостерігаємо, що з'являються інші теж симптоми пов'язані уже зі шлунком, лікування гастриту з пониженою кислотністю (яке вже згодом встановили ендоскопісти) ніяких результатів не дає! Ми, хвилюємося за неї, оскільки, час іде, а змін на краще не має! Сподіваюся на ваше розуміння!

medisvit\_doctor

Додано: 17.02.2011 11:33

Добрий вечір! 2 роки назад моїй мамі за рентгенологічним обслідуванням ставили діагноз - дивертикул стравоходу, проте ендоскопічні дослідження його не виявляли і досі не виявляють, уже 7 разів перевіряли. На сьогодні мамі з кожним днем усе гіршає: якщо раніше під час прийому їжі вона не могла ковтати (не проходила їжа), то зараз навпаки, але стає гірше після прийому (десь через 15-20 хв.), постійна біль за грудиною, з віддаванням у спину; відчуття, наче горло перерізане, важкість у грудях, що призводить млявість (аж до відчуття втрати свідомості), булькотіння в горлі, неприємний запах з рота, інколи сухий кашель (прослуховується, ніби якась пустота присутня у горлі), коли нагинається сильна давка на горло, яке ж одразу починає із зовнішньої сторони червоніти, проте в області щитовидної залози на фоні почервоніння виникає білий трикутник. Допоможіть, будь ласка! Я розумію, що не бачачи пацієнта, лише читати різноманітні симптоми, важко робити якісь висновки і прогнози, проте сподіваюся на Вашу відповідь! Хоча б проаналізуйте симптоми, чи можуть вони все ж таки бути пов'язані з дивертикулом, бо лікар (торакальний хірург) відмовляється від цього діагнозу, а свій не встановлює... Спостерігаємо, що з'являються інші теж симптоми пов'язані уже зі шлунком, лікування гастриту з пониженою кислотністю (яке вже згодом встановили ендоскопісти) ніяких результатів не дає! Ми, хвилюємося за неї, оскільки, час іде, а змін на краще не має! Сподіваюся на ваше розуміння!

Доброго дня, шановний автор запитання!

Ваше питання вже раніше обговорювалось в цій темі:

Наразі на Ваше питання відповідь надає лікар Лялюхіна Ю.Є.: <http://www.medisvit.com/ua/forum?t=801url>

Добрый день!

Описанные Вами симптомы действительно могут быть связаны с дивертикулом пищевода. При данной патологии именно рентген-исследование имеет большую диагностическую ценность по сравнению с фиброгастроуденоскопией. В любом случае последнее слово в интерпретации диагноза остается за врачом, который смотрит больного и анализирует данные дополнительных исследований.

С уважением, [доктор-терапевт Лялюхина Ю.Е.](#)



nuuki

Післяопераційна проблема з туалетом

Додано: 12.01.2011 22:25

Доброго дня! Маю наступну проблему. У вересні моїй бабусі зробили операцію-видалили кусочок кишки (була пухлина). Після операції бабуся має постійну проблему з туалетом. Спочатку починає боліти з правого боку і ніякі знеболюючі не допомагають. Перестає боліти лиш тоді коли сходить в туалет. Але і тут проблема. Кал ніби застрягає в кишці. А коли нарешті, після довгих мук виходить, то зазвичай дуже твердий. Спочатку я думала що це запор. Бабуся п'є траву сену але і це не допомагає. Я незнаю як з цим справитися. Бабуся по ночах не спить так її болить а я незнаю що робити. Порадьте як бути. Дякую

medisvit\_doctor

Додано: 19.01.2011 11:02

Доброго дня! Маю наступну проблему. У вересні моїй бабусі зробили операцію-видалили кусочок кишки (була пухлина). Після операції бабуся має постійну проблему з туалетом. Спочатку починає боліти з правого боку і ніякі знеболюючі не допомагають. Перестає боліти лиш тоді коли сходить в туалет. Але і тут проблема. Кал ніби застрягає в кишці. А коли нарешті, після довгих мук виходить, то зазвичай дуже твердий. Спочатку я думала що це запор. Бабуся п'є траву сену але і це не допомагає. Я незнаю як з цим справитися. Бабуся по ночах не спить так її болить а я незнаю що робити. Порадьте як бути. Дякую

Доброго дня, шановний автор питання! Болі в кишечнику в післяопераційний період можуть бути викликані різними причинами - порушення перистальтики кишечника через вік, запорами, а також (нажаль) прогресуванням пухлинного процесу. Треба намагатися налагодити щоденний та регулярний стул (з використанням проносного в краплях в поєднанні з клізмами). Будь-ласка, почніть з огляду у дільничного лікаря. Огляд животу руками (пальпація) надає багато інформації про наявність проблем. Лікар допоможе Вам підібрати оптимальний знеболюючий препарат.

Нажаль, дати вірну відповідь заочно дуже важко.

З повагою, лікар-гастроентеролог Гордієнко Н.Н.

nlkj

Дисбактеріоз

Додано: 07.12.2010 14:56

Доброго дня! Чи не могли б Ви прокоментувати аналізи (трихолог рекомендував здати для виявлення причини випадіння волосся)?

Бакпосів калу на дисбактеріоз

Результат 1 'Патогенні мікроорганізми родини кишкових не виявлено

Норма: 0 КУО/г

Результат 2 Bifidumbacterium <10\*8 КУО/г

Норма: 10\*8-10\*10 КУО/г

Результат 3 Lactobacillus <10\*6 КУО/г

Норма: 10\*6-10\*9 КУО/г

Результат 4 'Enterococcus faecalis 5x10\*7 КУО/г

Норма: 10\*3-10\*6 КУО/г

Результат 5 Escherichia coli загальна кількість 10\*8 КУО/г

Норма: 10\*6-10\*8 КУО/г

Результат 6 'Escherichia coli лактозонегативна не виявлено

Норма: до 5%

Результат 7 'Escherichia coli слабоферментуюча не виявлено

Норма: до 10%

Результат 8 'Escherichia coli гемолітична не виявлено

Норма: 0 КУО/г

Результат 9 'Staphylococcus aureus не виявлено

Норма: 0-10\*3 КУО/г

Результат 10 Умовно-патогенні ентеробактерії не виявлено

Норма: 0 КУО/г

Результат 11 'Дріжджеподібні гриби роду Candida 10\*4 КУО/г

Норма: 0-10\*3 КУО/г

S=Чутливий I=Помірно стійкий R=Стійкий

Resultat 11

Воріконазол S

Флуконазол S

Ністатин S

Амфотерицин S

Клотримазол S

Кетоконазол S

Чутливість до антимікробних препаратів

1226 6490 17

paz

Додано: 21.05.2010 01:14

Допоможіть встановити діагноз!! вже досить довго почуваю себе погано. минулого літа хворів пневмонією. лікування антибіотиками загострило гастрит і ще добавило хворіб шлунково-кишкового тракту. ерозивний езофагіт, холецистохолангіт, дискинезія жовчних шляхів. Почав втрачати вагу!! в грудні 2009 року в мене виявили паразита, карликового ціп"яка. я провів належний курс лікування і після повторної перевірки його не було виявлено.

два місяці тому я лежав на стаціонарі, лікувався від вищесказаних хворіб(гастрит). Після того почав дотримуватися строгої дієти і до сьогодні. До того ж зберігав нормальний емоційний стан.

До чого я веду, а зараз мене ще більше почав боліти живіт, дискінезія, болить печінка інколи.

Ще характерними симптомами є: по всій області ніг і рук періодично поболюють м"язи, тремтять руки і ноги, особливо зранку коли просинаюся. і болить м"яз тазу. два дні болить потім перестає.перерва. жар в тілі, але без температури. про що можуть свідчити такі симптоми???

Тому є підстави припускати, що всетаки першопричиною болів в животі не є мої шлункові хвороби, а щось інше. Особисто я вважаю, що це можуть бути паразити.

Порадьте куди звернутися на діагностику і будь ласка порекомендуйте що робити в такій ситуації. мені вже діагноз 6 місяців не можуть встановити. Буду вдячний за відповідь.

gordvit

болі у животі

Додано: 13.05.2010 08:58

Доброго дня. підкажіть будь-ласка. у кінці 2009 року перехворів пневмонією, вживав багато антибіотиків. на початку 2010 року поставили діагноз - ерозія шлунка. вживав знову антибіотики. біль у животі не припинялась. здав аналізи - виявили лямблїї. пролікувався. болі залишилися. лікар сказав - дисбактеріоз - призначив колоти ехінацею, мукозу. проколов. болі залишилися, тушнота, змінений стул. підкажіть що робити?

ziba1777

Додано: 10.12.2009 16:12

Доброго дня! Скажіть будь-ласка, чи може викликати вживання препаратів орністат та ДЕ-Нол утворення чорного кольору калу? Дякую!

medisvit\_doctor

Додано: 11.12.2009 15:07

Доброго дня! Скажіть будь-ласка, чи може викликати вживання препаратів орністат та ДЕ-Нол утворення чорного кольору калу? Дякую!

Добрий день, шановний автор!

При прийомі препарату Де-нол дійсно кал може набувати чорного кольору. З повагою, лікар-гастроентеролог Ю.М. Заріцька.

andriy

Додано: 01.11.2009 10:37

В мене проблема. 3 дні тому почалися болі в області шлунка та нирок з невисокою температурою. На другий температури вже не маю, сильні спазми шлунка. Третій день - це вчора, почався сильний понос на вечір полегшало але вночі знову почався ще сильніший після того як випив горілку з перцем (порадили) і ніщо не помагає. Що робити? Порадьте будь ласка. Тиждень тому було подібне в сина, який ходить в дитсадок, Але він це легше переніс.

boss

Ліва нирка

Додано: 30.08.2012 16:39

мені 17 років, 28.08.2012р зробив УЗД сечовивідної системи. Ліва нирка насторожила, хочу готуватись до виступу силового характеру, навантаження під час підготовки паде саме на нирки, ось що написали щодо нирки....

Ліва нирка: Звичайної форми, розмірів - 105/59/56 мм. Фізіологічна рухливість збережена в повному об'ємі. Контури рівні, чіткі. Фрагменти капсули без особливостей. Співвідношення паренхіми і кортикального шару не порушене. Кортикальний шар - 20,0 мм ЧМС нирки не розширене, ущільнене, гіперехогенна. Візуалізуються одиничні деформовані порожнинки до 12,0 мм з потовщеним гіперехогеним контуром. В порожнині нирки гіперехогенні включення і конкременти не виявлені. Сечоводи без ознак дилатації. Кровоплини не порушені.

Заключення: ехо-ознаки - помірно виражених дифузних змін лівої нирки.

Прошу лікарів дати мені розуміти що це, і чи це страшне щось, і якщо можливо як воро вилікується!

medisvit\_doctor

Додано: 10.09.2012 09:32

мені 17 років, 28,08,2012р зробив УЗД сечовивідної системи. Ліва нирка насторожила, хочу готуватись до виступу силового характеру, навантаження під час підготовки паде саме на нирки, ось що написали щодо нирки....

Ліва ринка: Звичайної форми, розмірів - 105/59/56 мм. Фізіологічна рухливість збережена в повному об'ємі. Контури рівні, чіткі. Фрагменти капсули без особливостей. Співвідношення паренхіми і кортикального шару не порушене. Кортикальний шар - 20,0мм ЧМС нирки не розширене, ущільнене, гіперехогенна. Візуалізуються одиничні деформовані порожнинки до 12,0 мм з потовщеним гіперехогеним контуром. Впорожнині нирки гіперехогенні включення і конкременти не виявлені. Сечоводи без ознак дилатації. Кровоплини не порушені.

Заклучення: ехо-ознаки - помірно виражених дифузних змін лівої нирки.

Прошу лікарів дати мені розуміти що це, і чи це страшне щось, і якщо можливо як воро вилікується!

Доброго дня, шановний автор запитання!

Для того, щоб відповісти на питання, про функціональний стан Ваших нирок, треба здати загальний аналіз сечі, аналіз крові з вени на показники: сечовина, креатинін і загальний аналіз крові розгорнутий. Вимірювати артеріальний тиск 2 рази на день, записуючи результати на аркуш впродовж тижня. Якщо є попередні результати УЗД нирок - знайти їх. З усіма цими результатами з'явитися на прийом до лікаря уролога або нефролога.

З повагою, [лікар-терапевт Носко Н.О.](#)

a-romanuk

**біль в низу живота**

Додано: 26.04.2012 16:04

Доброго дня ! В мене така проблема вже протягом тижня відчуваю постійний біль в низу живота (так ніби постійно хочеться в туалет), але болю під час мочевипускання немає (як при циститі) . Підкажіть будь-ласка, що це може бути, і до якого лікаря звернутися, чи це справа тільки в урології

medisvit\_doctor

Додано: 03.05.2012 16:48

Доброго дня ! В мене така проблема вже протягом тижня відчуваю постійний біль в низу живота (так ніби постійно хочеться в туалет), але болю під час мочевипускання немає (як при циститі) . Підкажіть будь-ласка, що це може бути, і до якого лікаря звернутися, чи це справа тільки в урології

Добрий день, проблема яку Ви описали залежить від статі. У жінок такі симптоми окрім циститу зі сорони урології, можуть викликати "пісок", дрібні кристалики які є в сечі травмують слизову і викликають її подразнення, що супроводжується відчуттям ніби постійно хочеться в туалет. Окрім урології таке можливе і при проблемах із жіночими статевими органами. Якщо говорити про чоловіків, то ці симптоми можливі тільки при урологічній патології, а саме це може давати "пісок" або простатит. Раджу звернутися до лікаря за назначенням ефективного лікування.

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.Є.](#)

Dimon

**Кіста**

Додано: 02.04.2012 22:54

Доброго дня! Мені 19 років. В мене виявили кісту надяєчка, які наслідки це може мати для здоров'я? Як це лікується?

medisvit\_doctor

Додано: 04.04.2012 11:52

Доброго дня! Мені 19 років. В мене виявили кісту надяєчка, які наслідки це може мати для здоров'я? Як це лікується?

Добрий день, в більшості випадків кіста має доброякісний перебіг і потребує лише нагляду, Лікується тільки оперативним шляхом. Показами для операції є нагноєння кісти, запалення, великий розмір 2, і більше, сантиметрів.

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.Є.](#)

gysia9

**білкові фракції**

Додано: 27.02.2012 15:08

Доброго дня.Підскажіть,будь-ласка,про що свідчить підвищення фракції альфа-1 глобулінів до 8.3 при нормі 3.8-6.5.???дуже дякую.

Saniokfbi

**Результати обстеження**

Додано: 24.08.2011 13:57

Доброго дня! В результаті обстеження в приватні лікарні в мене було виявлено: "кокова мізерна флора" і "дріжджоподібні поодинокі грибки"... Що мені робити? Чим лікуватися? Як я міг цим заразитися, якщо статевого контакту в мене не було?

seko

гострі болі

Додано: 23.07.2011 04:24

доброго дня

в мене дивні болі при сечовипусканні печіння чи це просто такий гострий біль важко зрозуміти з супроводження виділення білої речовини на протязі цілого дня (так вже десь день 6)

розрадьте ато вже незнаю де себе діти

буду дуже вдячний за допомогу

medisvit\_doctor

Додано: 26.07.2011 18:41

доброго дня

в мене дивні болі при сечовипусканні печіння чи це просто такий гострий біль важко зрозуміти з супроводження виділення білої речовини на протязі цілого дня (так вже десь день 6)

розрадьте ато вже незнаю де себе діти

буду дуже вдячний за допомогу

Доброго дня.

Описані Вами прояви притаманні уретриту (запалення сечовивідного каналу). Бажано звернутись на очну консультацію до уролога і, можливо, дослідити виділення на наявність мікробів, бо від цього залежатиме лікування (для різних мікробів-різні препарати).

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.С.](#)

seko

Додано: 04.08.2011 16:58

пішов до лікара сказали що є підозра на гонорею і треба повдорно здати аналіз

от мучить питання чи не запізно звернувся чи не переросте вона в хронічну і чи хронічна гонорея лікується?

medisvit\_doctor

Додано: 05.08.2011 09:32

пішов до лікара сказали що є підозра на гонорею і треба повдорно здати аналіз

от мучить питання чи не запізно звернувся чи не переросте вона в хронічну і чи хронічна гонорея лікується?

Доброго дня, шановний автор запитання! На сьогоднішній день лікується і хронічна форма гонореї, але не зволікайте в лікуванні.

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.С.](#)

larjta-57

Додано: 14.07.2011 23:08

Доброго вечора! Моїй дочці 17 років, ще дівчина. Проблема в тому, що вона вживає 3-4 літра води в день, а в туалет по-маленькому ходить один раз в день тільки зранку. В неї нічого не болить, не отікає. З нирками ніколи проблем не було. Єдина проблема це сколіоз грудно-поперековий 3 ступеню. Має зайву вагу приблизно 20 кг. Зріст 172, вага 85. Скажіть, будь ласка, що це може бути і до якого лікаря звернутись? Дуже буду вдячна за відповідь!

medisvit\_doctor

Додано: 15.07.2011 15:18

Доброго вечора! Моїй дочці 17 років, ще дівчина. Проблема в тому, що вона вживає 3-4 літра води в день, а в туалет по-маленькому ходить один раз в день тільки зранку. В неї нічого не болить, не отікає. З нирками ніколи проблем не було. Єдина проблема це сколіоз грудно-поперековий 3 ступеню. Має зайву вагу приблизно 20 кг. Зріст 172, вага 85. Скажіть, будь ласка, що це може бути і до якого лікаря звернутись? Дуже буду вдячна за відповідь!

Доброго дня, шановний автор запитання! Щоб відповісти на питання необхідно уточнити, Ваша донька завжди так ходить мало в туалет, чи це стало останнім часом із настанням літа?

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.С.](#)

larjta-57

Додано: 18.07.2011 16:46

Вона взагалі мало ходить в туалет (1-2 рази в день), а рідини вживає велику кількість. А на даний час вона знаходиться в Одесі, їсти не їсть зовсім, води випиває 3-4 літри негазованої мінеральної, а в туалет їй хочеться тільки один раз зранку. І так вже 4 дні. Скажіть що робити, і до якого лікаря звернутися?

medisvit\_doctor

Додано: 20.07.2011 09:39

Вона взагалі мало ходить в туалет (1-2 рази в день), а рідини вживає велику кількість. А на даний час вона знаходиться в Одесі, їсти не їсть зовсім, води випиває 3-4 літри негазованої мінеральної, а в туалет їй хочеться тільки один раз зранку. І так вже 4 дні. Скажіть що робити, і до якого лікаря звернутися?

Доброго дня, шановний автор запитання! Зменшення кількості сечовипускань пов'язано із тим, що вода виділяється із потом. Але 2 сечовипускання за добу це замало, все таки Вам потрібно після приїзду звернутись до спеціаліста по нирках - нефролога. Для запису можете зателефонувати в наш контакт-центр за номером (044) 393-0000.

З повагою, [лікар-уролог Ковальчук В.С.](#)

PROKOP

Запитання до нефролога!

Додано: 23.10.2011 14:12

Доброго вечора! Я вже 18 років живу з однією ниркою, в зв'язку з тим, що другу видалили з приводу вродженого гідронефрозу. З них 11 років, після гострого пієлонефриту залишилися розширені лоханки до 19 мм, а на даний час звужилися лоханки до 15 мм. З такою ниркою я виносила і народила сама здорову дитину без всяких проблем. Зараз хочу ще одну дитину, але лікарі всі говорять, щоб не ризикувала. В мене питання наскільки цей ризик високий і чи можна цього запобігти, які обстеження пройти до вагітності і якщо нирка не буде справлятися з вагітністю, то чи можна на той час допомогти, щоб зберегти мене і мою дитину.

medisvit\_doctor

Додано: 24.10.2011 11:51

Доброго вечора! Я вже 18 років живу з однією ниркою, в зв'язку з тим, що другу видалили з приводу вродженого гідронефрозу. З них 11 років, після гострого пієлонефриту залишилися розширені лоханки до 19 мм, а на даний час звужилися лоханки до 15 мм. З такою ниркою я виносила і народила сама здорову дитину без всяких проблем. Зараз хочу ще одну дитину, але лікарі всі говорять, щоб не ризикувала. В мене питання наскільки цей ризик високий і чи можна цього запобігти, які обстеження пройти до вагітності і якщо нирка не буде справлятися з вагітністю, то чи можна на той час допомогти, щоб зберегти мене і мою дитину.

Доброго дня, шановний автор запитання! Для того, щоб відповісти на Ваше запитання з приводу ризиків, необхідно мати чітке уявлення про функції Вашої єдиної нирки, для цього необхідно здати ряд аналізів (загальний аналіз сечі, бакпосів сечі, бажано триразово, розгорнутий аналіз крові, креатинін і сечовину крові) і обстежень (УЗД нирки і сечовивідних шляхів, можливо екскреторну урографію або динамічну реносцинтиграфію), а далі, залежно від отриманих результатів, вже говорити про ризики. На жаль, при наростанні ниркової недостатності при вагітності, найчастіше доводиться переривати вагітність. Тому і рекомендується вирішити всі питання до настання вагітності.

З повагою, [лікар-нефролог, Лялюхіна Ю.Є.](#)

**Маріанна (Гість) · Субота, квітня 13 2013, 07:59**

Скажіть будь-ласка ,що мені

Робити! Вже 4 День температура 38,6 ,буває і більше,ми її збиваєм ,але вона

Знов росте.Горло дуже дуре,кашляю мокрим кашлем що вже захрипла!Що мені робити?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Понеділок, квітня 15 2013, 02:06 · [Приховати](#) · #1

Доброго дня! Подібні симптоми можуть бути проявом грипу або парагрипу. В таких випадках потрібно викликати Вашого сімейного лікаря (дільничного терапевта). Бажаємо Вам якнайшвидшого одуження. З повагою МЦ АНІКО.



Оксана (Гість) · Субота, жовтня 27 2012, 04:41

**Сину 6 років, у дитини постійна температура тіла 34,5 - 35,5. при цьому він відчуває слабкість, постійно блідий, іноді скаржиться на головний біль, стає холодним. з ким проконсультуватися, можливо потрібні якісь аналізи проконсультуйте будь ласка. дякую. чекатиму відповіді**

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, жовтня 31 2012, 07:22

В першу чергу потрібно звернутись до дитячого ендокринолога в ендокринологічний диспансер. Найвірогідніше, що це є порушення обміну речовин, обмінних процесів. Обов'язково потрібно перевірити щитовидну залозу.

Вікторія (Гість) · Середа, жовтня 31 2012, 08:25

## КОНСУЛЬТАЦІЯ

Доброго дня! До кого можна звернутись з варикозним розширенням вен? Чула, що у вас будуть проводитись консультації по четвергам. Хотілося б дізнатись детальніше.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Субота, листопада 17 2012, 10:55

Записуємо на консультацію до судинних хірургів на 27 грудня по тел.(0362) 43-98-93 68-49-49 067-364-31-08 Дзвоніть , будемо раді Вам допомогти!

марія (Гість) · Середа, жовтня 31 2012, 09:38

**коротка вуздечка верхньої губи.**

Дитині 2 роки маємо коротку вуздечку верхньої губи та неправильний привкус (передні зуби дуже наперед). Підкажіть до якого спеціаліста ми можемо звернутися у вашому центрі?дякую

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Понеділок, листопада 19 2012, 04:12

Ви можете перезвонити нам по тел.(0362) 43-98-93 68-49-49 067-364-31-08 і записатися на консультацію до дитячого хірурга.

Наталія (Гість) · Вівторок, листопада 13 2012, 12:39

## Стул у дитини

Доброго дня! Донечці 5 місяців, стул раз на 2 дні, частіше слизистий, дитина на грудному вигодовуванні.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, листопада 22 2012, 04:10 · [Приховати](#) · [#1](#)

Можете дати дитині "Бібінорм", цей препарат містить біфідобактерії і покращує моторику кишечника. Для точнішої діагностики треба зробити копрограму та бактеріальний посів калу.Будьте здорові !

[МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, листопада 16 2012, 08:47

## Моїй дитині 3 місяці, чи нормальні показники? (запитання від Христини)

Паличкоядерні % 1  
Сегментоядерні % 22  
Еозинофіли % 8  
Лімфоцити % 57  
Моноцити % 12

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, листопада 22 2012, 04:16 · [Приховати](#) · #1

Потрібна консультація педіатра, з обов'язковим оглядом дитини, так як чотири показники лейкоцитарної формули змінені. Дзвоніть, будемо раді Вам допомогти.

Світлана (Гість) · Четвер, листопада 29 2012, 01:50

## Щеплення

Доброго дня! моїй дитині не зробили щеплення БЦЖ (не було вакцини у пологовому). Тепер синові 1 рік 10 міс. Медсестра запрошує на прививку КПК або на БЦЖ (оскільки їм дали кілька флаконів вакцини БЦЖ і потім її знову не буде). Дитина є алергіком, перед попередніми щепленнями давала Зодак по 5 кр,день. На сьогодні є кілька висипань на ніжках. Питання: яке з щеплень нам зараз робити, чи краще почекати? Дякую!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, грудня 07 2012, 09:47 · [Приховати](#) · #1

Перед прививкою на БЦЖ обов'язковим є проведення реакції Манту та здача загального аналізу крові. Все це проводиться на фоні приймання протиалергічного препарату. При негативній реакції Манту можна розпочинати щеплення з БЦЖ. Оскільки дитина є алергіком, то проведення даних обстежень та прививок рекомендовано проводити під суворим наглядом педіатра.

[МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, грудня 21 2012, 07:26

## Підкажіть будь-ласка по рез.аналізу що з донечкою і як лікувати? (запитання від Тані)

Добрий день. Моїй донечці 4 міс., в 3 міс. її обсипало на тілі плямками (похожими на лишай), щоки теж обсипало, але дрібними червоними прищиками, лікар скизав - кропивниця. Лікували, не допомогло, потім сказали що може алергія на лактозу в суміші "Нестожен" (приймаєм її з народження) - ми перейшли на безлактозну суміш "Нан", нічого не допомогло, лише кал став зелений. Потім почати пити каплі Феністил і маститись "псилобальзамом" - курс лікування 1 тиждень, на тілі все майже пройшло, а на щічках лишилися в малих кількостях висушені від бальзаму прищики ?

?ким лишилось відпасти. Але тут знов - вся спина обсипана і сильний свербіж. Здали аналіз на бакпосиви та копрограму калу. Підкажіть будь-ласка по рез.аналізу що з донечкою і як лікувати. бо не знаю коли до нашого лікаря попадемо. Дякую.

Бакпосів калу: Escherichia coli 106 /г, Staphylococcus aureus 103 /г, Дріжджеподібні гриби роду Candida 104 /г.

Копрограма калу:

колір калу - зелено-жовтий

консистенція - ?????????

форма калу - неоформлений

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, грудня 28 2012, 09:51 · [Приховати](#) · #1

У Вашої донечки вірогідніше атопічний дерматит на фоні дизбактеріозу кишківника. Потрібно детальніше обстежитись, зробити аналіз на чутливість до антибіотиків виділеної мікрофлори. Обов'язково візуальний огляд дитини у педіатра. Будемо раді Вам допомогти !

**Оксана (Гість) · Вівторок, лютого 19 2013, 05:34**

## Чи можна в АНІКО обстежити дитину на всі види глистів + лямблій, якщо так, куди звернутися і яка ціна?

Чи можна в АНІКО обстежити дитину на всі види глистів + лямблій, якщо так, куди звернутися і яка ціна?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, лютого 21 2013, 08:37 · [Приховати](#) · #1

Аналіз на гельмінти (аскариди, токсокари, лямблій) можна здати по крові (кров береться з вени) натщесерце. з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 10.30. Аналіз коштує 250 грн.

**Лена (Гість) · Понеділок, лютого 25 2013, 03:55**

## В дитини збільшені лімфовузли, яке потрібно обстеження та яка ціна?

обстеження, аналізи

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, лютого 27 2013, 08:52 · [Приховати](#) · #1

Вам потрібно здати загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою. Потрібен огляд педіатра та лор-лікаря. При потребі, мазок із зіву на мікрофлору. Вартість консультації - 80грн. З повагою, педіатр МЦ "Аніко".

**Надя (Гість) · Неділя, березня 03 2013, 08:17**

## Чи можна інтроферобіон в уколах замінити якимось іншим препаратом???

Доброго дня!!! Мені 26 років. В мене виявили вірус папілома 16 типу, і ще слабка дисплазія. Лікар приписав інтроферобіон в уколах. Скажіть будь ласка, чи можна його замінити якимось іншим препаратом???

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, березня 05 2013, 09:11 · [Приховати](#) · [#1](#)

Можна замінити вагінальними свічками " Генферон" 1млн. інтравагінально по 1 суп. 1 раз в день. З повагою, лікар гінеколог МЦ АНІКО

**Ірина (Гість) · Четвер, березня 07 2013, 09:59**

### простудні захворювання

У доньки 9 місяців 5 днів була температура, уже третій день не має, кашель спершу був сухий, тепер вологий, нежить, приймали афлубін, ереспал, ефізол, називін. Дитина почувається краще, але сімейний лікар наполягає на госпіталізації і антибіотиках і ношпі. Що робити?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, березня 13 2013, 07:55 · [Приховати](#) · [#1](#)

Потрібний візуальний огляд дитини, оскільки заочна консультація у такому випадку не можлива. Будемо раді допомогти! Лікар педіатр МЦ АНІКО

**Лєна (Гість) · Субота, березня 16 2013, 07:29**

### Спируліна

Дитині після УЗД внутрішніх органів призначили спірулуну, як вітамін, в інтернеті пишуть для похудіння, чи можна це дитині яка і так худа? Чи не нашкодить?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, березня 20 2013, 08:45 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Спируліна - це ретельно збалансований Природою набір близько 2000 вітамінів (майже всі види, крім Д), 18 амінокислот, у т. ч 8 незамінних, ненасичених жирних кислот, безліч мікро - макроелементів, ферментів, рослинних пігментів, нуклеїнових кислот (ДДНК, РНК) та ін. біологічно активних речовин. Однозначно це Вашій дитині не зашкодить.

Бажаємо Вам здоров'я!

Педіатр медичного центру Аніко

Олена (Гість) · Понеділок, березня 25 2013, 06:36

## Чи потрібно лікувати гіпертонус, чому трясеться підборіддя та синія над губкою.

Добрий вечір. Мій синочок народився 10.01.2013 з вагою 2.900 втратив 0.250, обхват грудей 29, голови 29. З народження дитина неспокійна бо маємо проблеми із животиком, практично не спали. Перший місяць на ГВ думала що ненаїдається почала годувати кашею і груддю підкормлювати, але стан майже не змінився після каші так само е спить постійно на руках, в день може наспати до 3х годин максимум. Засинаємо 1а година ночі і спимо до 10 - 12 год. в ночі годую тільки груддю. У місяць консультація невропатолога: підвищений тонус верхніх кінцівок, порушення сну, здригання, посіпування плечами та головою в бік, призначення "Неврохель" 1/4 таблетки 2 рази в день, купання в заспокійливих травах, масаж.

Зараз дитині 2,5 вага 6 кг, об гр - 41, голови - 39.

Після лікування практично стан не змінився, почало тряситися підборіддя в стані спокою (тряслось лише під час плачу), посиніння над верхньою губою під час сильного плачу, руки важко розгинаються важко робити зарядку, посіпування плечами та головою в бік при годуванні чи засипанні, але загальний стан нормальний бавиться ручками, ніжками, голівку утримує добре на животику (тримає з 1 місяця), посміхається коли до нього говориш з 1 місяця. Сьогодні були у невропатолога діагноз синдром підвищеної нервово- рефлексорної збудливості, далі приймати неврохель, купання та назначила "цераксон" на 45 днів.

Чи потрібно пити ці всі ліки, а особливо "цераксон" чи не засильний він. Чи потрібно лікувати гіпертонус, чому трясеться підборіддя та синія над губкою.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, квітня 04 2013, 03:17 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Тремор підборіддя і цинов носогубного трикутника це - прояви перенатальної енцефалопатії, підвищеної нервово-рефлексорної збудливості. Цераксон - приймати обов'язково. З повагою лікар- педіатор МЦ АНІКО.

Крістіна (Гість) · Понеділок, квітня 08 2013, 04:47

## Біль в лівій частині живота

Дитина 2 років скаржиться на біль в животі. Біль нетривалий, проте періодичний. Прицьому в калі видно неперетравлені часточки їжі. Також з 6 місяців при штучному годуванні на лиці з'явилась висипка, яка не реагує на антигістаміни та інші ліки. До якого спеціаліста звернутись, які аналізи здати? Це проблеми в роботі підшлункової?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, квітня 11 2013, 01:08 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Вам потрібно звернутися на консультацію до педіатра та гастроентеролога. Зробити аналіз на копрограму та дисбактеріоз, а також аналіз сечі на діастазу. Обстеження УЗД органів черевної порожнини. З повагою МЦ АНІКО.

Дмитро (Гість) · Вівторок, квітня 09 2013, 11:07

## Рвотний рефлекс! мені 22 роки

Рвотний рефлекс від нічого! мені 22 роки .... часто це буває під час того коли я курю ! допоможіть будь-ласка

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, квітня 09 2013, 03:40 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Зазвичай блювотний рефлекс може бути психосоматичною реакцією організму на стрес, самостійно з яким він впоратися не може. В будь-якому випадку, якщо Ви вважаєте, що блювотний рефлекс виникає від паління, то найлегший і найдієвіший спосіб уникнення - це перестати палити, а також варто було б звернутися до гастроентеролога, щоб виключити органічну причину. З повагою МЦ АНІКО.

Денис (Гість) · Вівторок, березня 26 2013, 09:18

## Травма на лиці

Доброго дня.

Три місяці на зад отримав травму на правій щоці(був сильний набряк), використовував багато засобів але рубець і набряк ще трішки залишився. Що порадете у такому випадку

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, квітня 04 2013, 02:55 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Вам потрібно звернутися до травматолога. можливо необхідно зробити рентгенографію та інші обстеження. Нажаль на даний момент травматолога у нас немає. З повагою МЦ АНІКО.

Надія (Гість) · Четвер, лютого 14 2013, 08:48

## Скажіть будь ласка скільки треба бути в гіпсі і який час реабілітації?

Доброго дня! хотіла б запитати: в мене рентгенологічно діагностували краєвий перелом головки таранної кістки наклали гіпсову лангету і сказали так іходити 3 тиж, прочитавши про цей перелом....ю всюде пише носити гіпс 5-6 тиж, Скажіть будь ласка скільки треба бути в гіпсі і який час реабілітації! Зарання дякую!!!!!!!!!!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, лютого 15 2013, 04:13 · [Приховати](#) · [#1](#)

Шановна пані Надія, термін фіксації кисті в лонгеті визначений Вашим лікарем і обумовлений рентгенологічною картиною та характером травми. При проведенні контрольного обстеження, можливо будуть внесені корективи. Бажаємо швидкого одужання.

Катерина (Гість) · Середа, березня 20 2013, 04:19

## Можливо мені пора звернутись до психотерапевта ?

Доброго вечора. Не впевнена чи мені точно потрібно звертатись до психолога, але більше не знаю куди йти за порадою. Мені 29 років, я заміжня, можна сказати, що успішна. Але якось все не так... Останнім часом у мене все болить. Вірніше кожного разу болить щось інше. Дуже турбує шлунок (жахлива печія) та болі в серці - особливо ввечері. Зверталась до гастроентеролога та кардіолога, пройшла всі дослідження, ніякої патології не знайшли. А мені все гірше і гірше, вже стала погано спати і зриватись на чоловіка. Прочитала у Вас на сайті статтю про депресію, та й думаю чи немає її часом у мене. Сподіваюсь, що Ви допоможете мені розібратись. Дуже чекаю на відповідь. Дякую.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, березня 26 2013, 07:26 · [Приховати](#) · [#1](#)

Основним критерієм, що визначає необхідність звернення до психолога чи психотерапевта, є наявність якоїсь проблеми (внутрішньої чи зовнішньої), існування якої приносить людині неспокій і яку він не може вирішити самостійно. Тобто, він уже робив спроби, але вони не принесли бажаного результату. Найчастіше, це відбувається тому, що людина не знає, за що хапатися. Це можна сформулювати як: «Все погано, ВСЕ!» Людині важко зрозуміти: у чому саме в нього складності. Для цього необхідний професійний погляд з боку. Справа в тому, що існують захисні механізми психіки, які оберігають нас від неблагополучної інформації. Тому досить часто люди просто не бачать або не хочуть побачити, в чому полягають їхні проблеми і життєві складності.

Наступним етапом, що перешкоджає самостійно вирішити проблему, є нестача елементарних психотерапевтичних знань. У такому випадку візит до психотерапевта допомагає отримати ці відсутні знання, усвідомити допущені помилки і скоригувати свою поведінку.

Відповідаючи на ваше запитання, можу сказати наступне: Все, що ви описуєте в розповіді про себе, дійсно нагадує симптоми депресії. Проте, для того щоб точно визначити, що з Вами необхідно більше інформації. А ідеально було б Вам записатись на прийом. Тому, що для більш точної оцінки вашого стану необхідно провести оцінку психологічного стану (за допомогою тестових методик та бесіди). І вже на основі результату первинної консультації можна буде стверджувати, що з Вами та розробити план вашого лікування та психотерапевтичної допомоги.

Антон (Гість) · Неділя, березня 03 2013, 08:10

## Скажіть, якщо це справді так, то як з цією «проблемою» боротись?

Доброго дня. Моя дружина 15 днів назад народила сина. Пологи пройшли без ускладнень. Виписали нас додому, але з нею щось не те: агресивна, тривожна, майже не приділяє уваги дитині, буз будь якого приводу плаче, відмовляється їсти та вставати з ліжка, погано спить. Наш педіатр каже, що це – післяпологова депресія. Скажіть, якщо це справді так, то як з цією «проблемою» боротись?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Понеділок, березня 04 2013, 09:25 · [Приховати](#) · [#1](#)

Післяпологова депресія в легкій формі є досить поширеним явищем, яке проходить безслідно. Дещо важчі випадки вимагають консультування у спеціаліста. Самостійно з важкими випадками післяпологової депресії впоратись не вийде, адже депресивний стан жінки є небезпечним як для неї самої, так і для дитини, і має тенденцію до хроніфікації.

Потрібно звернутися до лікаря, коли після пологів у жінки з'явилися:  
 стійке відчуття смутку, занепокоєння, "марності" існування;  
 постійно присутні в настрої безнадія, песимізм; труднощі у концентрації уваги, запам'ятовуванні, мисленні, прийнятті рішень;  
 втрата інтересу до дитини, чоловіка, оточення;  
 розлади сну (безсоння, раннє пробудження);  
 незникаюче відчуття втоми, виснаженості, навіть деяка загальмованість в думках і рухах, зменшилась енергійність; неспокійність поведінки, дратівливість, конфліктність;  
 думки про смерть чи самогубство;

Відповідаючи на ваше питання: «як з цією «проблемою» боротись?» рекомендую Вам показати свою дружину спеціалісту який точно зможе визначити ступінь важкості захворювання та призначити відповідне лікування та психотерапію.

Детальніше у цьому матеріалі <http://aniko-mc.com/aktualno-pro-zdorovja/139-aktualno/1408-pisljapologova-depresija.html>

Лікар психолог-психотерапевт, Тетяна Бондарчук

**sashok (Гість) · Середа, квітня 03 2013, 06:38**

## **проблеми з зором**

Трохи став недобачати. Які мені вживати вітаміни.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, квітня 04 2013, 03:31 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Для поліпшення зору слід звернути увагу на лікувальні препарати, що містять вітамін А або бета -кератин. Завдяки взаємодії вітаміну А з ферментами і гормонами сітківки ока, формуються зорові пігменти, які необхідні для сутінкового бачення Пантотенова кислота або вітамін В5 бере участь амінокислотном і білковому обміні речовин, а також у роботі нейромедіаторів - речовин, які необхідні для функціонування центральної нервової системи. Нейромедіатори забезпечують центральну нервову систему глюкозою, і володіють заспокійливим антистресову дію. Поліпшенню зору сприяють біодобавки, що містять антоціанозидів, які сприяють відновленню зорового пігменту родопсин, що відповідає за гостроту зору і володіє яскраво вираженим антиоксидантну дію. Антоціанозидів запобігають тромбоутворення і запалення, зміцнюють стінки кровоносних судин і сприяють активації ферментів сітківки ока. З повагою МЦ АНІКО.



**Світлана (Гість) · Вівторок, листопада 20 2012, 09:50**

### **Закипають очки в малюка.**

Доброго дня. Моєму синові 7 місяців. У нас з народження закипає очко. наш місцевий окуліст сказала, що закупорений каналчик і що після півроку повинно пройти. Ми капали Флоксалом, Тобрексом, постійно промиваємо, а воно не проходить і все. Що робити? Невже треба зондування каналчика. Дуже страшно йому маленькому лісти в очко. Порадьте як бути? Наперед дякую за відповідь.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, листопада 23 2012, 09:40 · [Приховати](#) · [#1](#)

Якщо краплі не допомагають , то треба зондувати каналчик , іншого лікування немає. Процедури не треба боятися , вона є стандартною, але робиться в умовах стаціонару.

**Катерина (Гість) · Субота, грудня 01 2012, 05:39**

### **Втрата рівноваги**

Доброго дня! Мені 26 років, декілька днів підряд відчуваю головокружіння іноді втрату рівноваги і при цьому трішки нудить. Скажіть будь-ласка що це, чи потрібно здати якісь аналізи?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, грудня 04 2012, 09:07 · [Приховати](#) · [#1](#)

Такі симптоми проявляються при судинній патології , вегето-судинній дисфункції. Для уточнення діагнозу необхідно провести лабораторні обстеження та УЗД судин, рентенографію шийного відділу хребта. Раді будемо Вам допомогти!

**Лариса Петрівна (Гість) · П'ятниця, березня 29 2013, 02:53**

### **Чи потрібно при гіпертонії постійно приймати таблетки?**

Мені виставили діагноз гіпертонічна хвороба і сказали, що потрібно постійно приймати таблетки від тиску. Що ви з цього приводу скажете?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Субота, березня 30 2013, 12:07 · [Приховати](#) · [#1](#)

Коментар - Л. Ільницька, доцент кафедри медичної діагностики та терапії, лікар кардіолог Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Тактика лікування залежить від наявності чи відсутності у Вас ураження серця, судин очного дна, нирок та супутніх захворювань, зокрема цукрового діабету. Якщо у Вас присутні вище названі зміни, то постійний прийом гіпотензивних препаратів є обов'язковим.

Світлана (Гість) · П'ятниця, лютого 22 2013, 09:50

## Що таке порушення фази реполяризації міокарда ?

Що таке порушення фази реполяризації міокарда ?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, лютого 26 2013, 08:36 · [Приховати](#) · [#1](#)

Фаза деполяризації і реполяризації - це фази діяльності кардіоміоцита (серцевої клітини), тобто скорочення та розслаблення серцевої клітини. Порушення фази реполяризації не є діагнозом і супроводжує велику кількість нозологій: неврози, анемії, ожиріння, порушення обміну при цукровому діабеті, гіпотиреозі, тиреотоксикозі, а також при суто кардіальній патології: ІМ, кардіоміопатіях, порушеннях серцевого ритму та ін. Тому найкраще проконсультуватись у кардіолога, маючи при собі попередні ЕКГ, Ехо КС, дані загального та біохімічного аналізів крові.

Ксенія (Гість) · П'ятниця, березня 15 2013, 10:50

## Профілактика захворювання щитовидної залози та зменшення надлишкової ваги

Добрий день. У мене захворювання щитовидної залози і не хватає йоду в організмі. Які можна приймати ліки для збільшення йоду в організмі та відповідно зниження ваги тіла?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, березня 22 2013, 08:24 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Для призначення лікування Вам необхідно зробити дообстеження: УЗД щитовидної залози, аналіз крові на ТТГ, вільний Т4, АТПО. З повагою, ендокринолог МЦ АНІКО

Наталія (Гість) · Вівторок, листопада 13 2012, 12:45

## Висип на спинці

Доброго дня, нам 5 місяців. З'явилася висипка на спинці, педіатр порадив протирати настоянкою календули, годую груддю, дитину ніколи не висипало, хоча їм майже все. Чи може це бути алергічна реакція на вагінальні таблетки, які мені приписав гінеколог?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, листопада 20 2012, 04:06

Заочна діагностика проблем шкіри не коректна. Можливий перипоріт через перегрів дитини. Можливий токсико-алергічний дерматит. Необхідна очна консультація дерматолога для встановлення діагнозу.

Тетяна (Гість) · П'ятниця, січня 11 2013, 10:32

## Алергія у 6 міс.

Доброго дня!

У нашого сина (6місяців, вага - 10,6 кг) у 3,5-4 місяці почалися висипання у вигляді червоних сухих плям, особливо на руках, ногах, щоках. Знайома педіатр нам ставила перекорм, і ми місяць робили клізми (і собі, і сину) + пропили місяць біфідумбактерин. Вона радила нам швидше вводити прикорм, щоб син поменше вживав мого молока, через яке і йде така реакція (у мене атопічний дерматит).

Місцевий педіатр з огляду на стан сина відмінила чергову прививку і призначила лоратадин(або кларитин)+ентеросгель, які ми приймали 10 днів, безрезультатно. Вже місяць я дотримуюся дієти, прикорм сина почала з білих овочів - кабачок, цвітна капуста, картопля.

Ще нам радять зробити алергопроби на моє молоко і продукти прикорму, але ж висипка була і до прикорму, а якщо виявиться алергічна реакція на моє молоко, то доведеться відлучати від грудей і давати суміші.

Як нам діяти? Чекаємо Вашої допомоги!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, січня 15 2013, 09:28 · [Приховати](#) · [#1](#)

Дитині треба здати загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, кал на копрограму та записатись на консультацію до дерматолога. При підтвердженні діагнозу "Атопічний дерматит", потрібна консультація алерголога для визначення об'єму обстежень і тактики лікування.

Наташа (Гість) · Субота, січня 19 2013, 07:21

## Скажіть будь-ласка чи можна дитині варити молочні каші з такими аналізами на алергени?

Доброго дня! Дитині 9 міс. Алергія розпочалася в 7міс. Лікарі сказали що на коров'яче молоко. Відмінивши молочні каші і почавши давати гіпоалергену суміш алергія не проходила!!! У дитини спочатку червоніли щоки, а потім висипало все лице прищами. Були такі періоди що майже не було а потім знову появляється, при цьому нічого нового в раціон не вводили!!! Вирішили здати аналіз на алерген і ось результати:

На молоко коров'яче не має, а на казеїн майже не має (козеїн-0,17 IU/ ml.) це відноситься до «0 клас не має, чи майже не має - (0,00-0,34 IU/ ml ).

Скажіть будь-ласка чи можна дитині варити молочні каші? Наперед дякую!!!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, січня 22 2013, 07:35 · [Приховати](#) · [#1](#)

Якщо в дитини хвилеподібний перебіг дерматиту, вірогідна причина - проблеми з кишківником - дисбіоз, ферментопатія і т.п. В такому випадку лактоза (молочний цукор) може сприяти посиленню дисбіозу, хоча це не алергія. Необхідне уважне спостереження і дообстеження. З повагою лікар-алерголог МЦ АНІКО.

**Дарія (Гість) · Неділя, лютого 10 2013, 08:25**

## 3й тиждень болить зліва під лопаткою, що робити?

Добрий вечір!

3й тиждень болить зліва під лопаткою, робила УЗД серця-здорова, рентген легенів-також здорова, в мене хронічний гастродуоденит, та затруднення в диханні 3й тиждень-через нервову систему. Відвідую масаж, завтра буде 7й сеанс... масаж не допомагає. Біль в спині починається коли даю фізичну навантаження- різні вправи, прибирання і т.д.  
дякую!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, лютого 13 2013, 09:38 · [Приховати](#) · [#1](#)

Враховуючи Ваші скарги, а також механізм виникнення болю, можна думати що Ваша проблема пов'язана з патологією хребта. Консультація лікаря невролога, вертебролога допоможе уточнити діагноз. Бажаємо Вам здоров'я.

[МЦ АНІКО](#) · Понеділок, листопада 12 2012, 06:30

## Яка може бути причина росту РОЕ? (запитання від Людмили)

доброго дня! У моєї мами плеврит туберкульозної етіології, була незначна кількість рідини, зараз лишилися спайки (спостерігається в тубдиспансері). При початку захворювання температура тіла підвищувалася кілька разів на день до 38,5. зараз підвищується до 37,3 в другій половині дня, ближче до вечора, на ранок нормалізується. Поганий апетит, схудла, відсутня сила, важкість в ногах (ватні ноги). Результати аналізів крові в нормі крім ШОЄ - є тенденція до росту. В попередньому гемоглобін 100, роє 60, зараз гемоглобін 111, роє 68. І це все на фоні лікування протитуберкульозними препаратами. Туберкульозу немає. Органи черевної порожнини і малого тазу перевіряли в Експерт (обл.лік) - все в нормі крім рідини в плеврі (зараз немає). лікуючий лікар порадив приймати прописані ліки і контролювати ріст роє. Хотілося б отримати консультацію гематолога щодо росту роє, яка може бути причина. Дякую.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Понеділок, листопада 19 2012, 08:25

Прискорення ШОЄ може бути наслідком запального процесу, інтоксикації, аутоімунного захворювання, злоякісних пухлин, захворювань нирок, інфаркта міокарда та прийому деяких медичних препаратів. Бажаємо Вам здоров'я.

**Наталія (Гість) · Середа, лютого 13 2013, 04:42**

## Підозра на цукровий діабет

Доброго дня.

Мене звати Наталія. мені 24 роки. в мене 31 тиждень вагітності (вагітність друга, перша протікала без ускладнень, дитині 2 роки 4 міс. народилася в строк з вагою 3кг 300 грм.) сьогодні мені брали кров з пальця на цукор. робили 3 рази кожну годину: 1-й на голодний шлунок, 2-й - 30-40 хв. після їжі (їлі бутерброд з маслом та ковбасою) і 3-й раз без їжі. вийшли такі показники 10:00 - цукор 4,0  
11:00 - 7.4  
12:00 - 4,0  
скажіть, будь-ласка, що такі показники можуть означати? і як мені діяти?  
якщо треба робити якісь обстеження, яка буде їх вартість у вашому центрі?

Заздалегідь дякую

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, лютого 21 2013, 07:33 · [Приховати](#) · #1

При наявності чинників гестаційного діабету, вагітній необхідно провести одногодинний або 3х-годинний тест толерантності до вуглеводів. Визначення глюкози проводиться тільки з венозної крові. Представлені

Вами результати не є інформативними для діагностики гестаційного діабету. Вам необхідно проконсультуватися з акушером-гінекологом про необхідність дообстеження. Вартість визначення глюкози крові 20 грн. З повагою лікар ендокринолог МЦ АНІКО

**Володимир (Гість) · Четвер, січня 31 2013, 07:07**

### **Чи може бути це вроджене, чи сильно це небезпечно, і чи можна оперувати руку?**

Добрий Вечір! В мене батько (1951 р.н.) готувався до операції на руці, і лікар сказав зробити кардіограму. Кардіолог сказав що в батька погана кардіограма (повна блокада лівої ніжки гіса) і він не радить робити операцію. Батько останній раз робив кардіограму коли йшов ще в армію, і йому тоді казали що з серцем щось не те, але в армію відправили. Його ніколи серце не торбувало, і зараз не болить, в нього нема задишки як у сердечників. В мене питання чи може бути це вроджене, чи сильно це небезпечно, і чи можна оперувати руку. Дякую

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, лютого 06 2013, 07:19 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Повна блокада БЛНПГ може зустрічатись на фоні як збільшених порожнин серця, так і незбільшених. Але така ЕКГ-ознака завжди насторожує лікаря. Тому потрібні дообстеження: Ехо КС, холтер МТ. Після таких дообстежень можна дати чітку відповідь.

**Галина (Гість) · П'ятниця, грудня 07 2012, 10:11**

### **проблеми з ковтанням**

добрий день  
у мене часто бувають проблеми з ковтанням слюни чи їжі  
просто ніби клинить і не можу зробити ковток  
це дуже нервує і заважає нормально жити  
буду дуже вдячна якщо підкажете що це і що робити  
дякую

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Понеділок, грудня 10 2012, 07:43 · [Приховати](#) · [#1](#)

Порушення ковтання може бути симптомом дегенеративного захворювання з ураженням нервово-м'язевої системи. З метою уточнення діагнозу Вас повинен оглянути лікар невропатолог з першочерговими методами дослідження. При таких симптомах показано обстеження електроміографія, МРТ - графія, деякі лабораторні дослідження. Будемо раді Вам допомогти.

Арт (Гість) · Неділя, лютого 24 2013, 06:39

## БІЛЬ В ГОЛОВІ

Мені 24, майже постійна втома сонливись,важкість і незначний біль в голові.Що робити?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, лютого 28 2013, 07:24 · [Приховати](#) · #1

Наприкінці зими організм відчуває виснаження, досить часто це проявляється загостренням хронічних захворювань, атонічними стресами. Наукове обґрунтування цих процесів Ви знайдете в науково-популярній літературі. З метою об'єктивізації скарг та визначення стану метаболізму Вашого організму ми рекомендуємо звернутись до лікаря невролога. З повагою, лікар-консультант МЦ АНІКО

Ксенія (Гість) · П'ятниця, березня 15 2013, 10:54

## Міжхребетна грижа

Скажіть чи можна займатися йогою, якщо є міжхребетна грижа середньою тяжкості?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, березня 19 2013, 09:31 · [Приховати](#) · #1

При наявності такої патології хребта показані ряд реабілітаційних заходів. Окрім медикаментозної терапії, показана лікувальна терапія (ЛФК), фізіотерапія, в програму яких можуть бути включені і вправи з йоги. Мета - укріплення м'язового корсету, покращення трофіки ураженого сегмента, зменшення тонічного компонента. При цьому потрібно врахувати дані клінічних та параклінічних методів обстеження пацієнта.

Тетяна (Гість) · П'ятниця, березня 22 2013, 04:02

## Мені 24 роки, порадьте щось?

Доброго дня! Мені 24 р. У мене на животі та біля шиї появляється висипка у вигляді рожевих плям, не чешеться та сходить до 5хв. Спочатку висипало коли я нервувалась чи хвилювалась, але тепер почало висипати навіть при хороших емоціях (коли я сильно сміюсь і т.д), тобто при збудженому стані. Порадьте щось! Буду дуже вдячна!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, березня 27 2013, 04:06 · [Приховати](#) · #1

Подібні прояви можуть бути причиною порушення регуляції судинного тонуусу при вегетативній дисфункції. При цьому необхідно виключити наявність алергічного компонента, обстежити функцію щитоподібної залози. Будемо раді надати Вам кваліфіковану допомогу. МЦ АНІКО.

софія (Гість) · Вівторок, квітня 16 2013, 05:29

## Як позбутися діареї?

Три тижні назад приймала антибіотики від венеричних хвороб і майже відразу почалася діарея кожного ранку і до обіду і так 2 тижні. Наче нічим не отравилась бо вживала домашню свіжу їжу. Пила 3 дня ригідрон, смекту, дифлюзол і лінекс і все пройшло, але почалися запори. Ці ліки виписав терапевт, але я йому не сказала про антибіотики. Через декілька днів знову почалася діарея. Скажіть, чи може бути таке, що я антибіотиками порушила мікрофлору і що для цього треба вживати.

Ліза (Гість) · Вівторок, квітня 09 2013, 09:04

## Порадьте як набрати вагу

Доброго дня!мены 25 років !пройшла гастроскопію і узд,сказали що багато жовчі в шлунку і дванадцятипалій кишці!!дотримувалась дієти,трішки допомгло!зараз харчуюсь нормально,але не можу набрати ваги!є дискомфорт в шлунку,бурчіння ікота після прийому їжі! бліда шкіра! низький гемоглобін!інші аналізи в нормі!дякую!!

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, квітня 11 2013, 06:59 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Дефіцит ваги може бути пов'язаний не тільки із станом шлунково-кишкового тракту. Необхідно з'ясувати чи немає патології ендокринної та нервової системи, психічного стану, гельмінтозу, непереносимості харчових продуктів. Необхідно знати чи немає у Вас дисбактеріозу кишківника, кили діафрагми, можливо це є функціональні розлади. Отже, Вам потрібно звернутися на прийом до дільничного терапевта. Фахівці МЦ АНІКО будуть завжди раді Вам допомогти.

Катя (Гість) · Субота, березня 30 2013, 03:34

## Порекомендуйте, чим можна полікувати шлунок, щоб зникла алергія?

При винекнені болі в шлунку, проявляється алергія(кропивниця), порекомендуйте, чим можна полікувати шлунок, щоб зникла алергія? Дякую

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Понеділок, квітня 01 2013, 03:00 · [Приховати](#) · [#1](#)

Можливо, у Вас хронічний панкреатит, гельмінтоз, або якась харчова непереносимість, які проявляються алергією та болями в животі. Отже, щоб Вам щось порекомендувати, необхідно знати що саме є у Вас. Побудьте на дієті з виключенням гострої, жирної, жареної та консервованої їжі. Попийте відвар ромашки, льону, поприймайте сорбенти та обстежтесь.



Уляна (Гість) · Субота, березня 02 2013, 10:55

## Щоб Ви порадили

Доброго дня) Дитині 2,2р до кого краще звернутись у такому питанні : Дитина при дефракції тупає ночками і бігає по хаті, тобто вона не може нормально сходити на горщик так щоб сісти і все зробити. Робили узі у нас загиб жовчного, каллограма нормальна і аналіз сечі теж. Можливо тріщинка в проході . Приймали Креон і Нормазе. До кого мені краще звернутись у цьому питанні до Вас чи до хірурга-проктолога. Дякую за відповідь

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · П'ятниця, березня 22 2013, 09:25 · [Приховати](#) · #1

Доброго дня! Перш за все потрібно виключити тріщину анусу ( консультація проктолога ). При загибі жовчного найкраще допоможуть жовчогінні чаї та холосас. Також необхідно дообстежитись , щоб виключити спастичний коліт. З повагою, педіатр МЦ АНІКО

Тетяна (Гість) · Неділя, березня 03 2013, 08:19

## Що це може бути? і що мені робити?

Добрий день.

Пише Вам Тетяна з Київщини. Мені 34 роки. Десять днів тому стала відчувати дискомфорт в області горла, а саме - ніби комок в горлі і важко зробити відрижку, яка аж проситься, щоб її зробили. Коли відрижка все ж таки відбувається, то вона якась неповноцінна виходить, млява. Такого раніше у мене ніколи не було. Я у січні стаціонарно лікувалась у відділенні неврології, під час лікування лікар призначив УЗД органів черевної порожнини. Діагноз - холецистопанкреатит. За останній місяць ніяких аналізів не здавала. Буває що ковтаю слину аби проглотити той комок, або навпаки відплювувати слину, та це не допомагає. При цьому ніяких болювих відчуттів немає. Із ліків на даний час я приймаю ортофен і лімфоміазот, у мене ревматоїдний поліартрит. Що це може бути? і що мені робити? Дякую

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, березня 06 2013, 04:07 · [Приховати](#) · #1

Для виключення патології стравоходу, необхідно зробити фіброгастродуоденоскопію, а також рентгеноскопію стравоходу та шлунку. З повагою лікар гастроентеролог МЦ АНІКО

Марія (Гість) · Середа, лютого 20 2013, 06:13

## Щоб ви порадили?

Доброго дня. Жінка 33 роки. Жовчевий міхур видовженої форми 94:28мм, стінка ущільнена, не потовщена (2мм), пристінково є гіперохненні нашарування до 3 мм, є перегин в тілі, є застій жовчі у вигляді пластівців, без конкрементів. На даний момент приймаю уролесан і фурагін, так як є запалення мочевого. Аналізи крові норма. Щоб ви порадили. Наперед вдячна.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, лютого 26 2013, 08:55 · [Приховати](#) · [#1](#)

УЗ обстеження жовчевого міхура в динаміці. Прийом урсодезоксихолевої кислоти, або фітопрепаратів для очищення жовчевого міхура та жовчевивідних шляхів. Для більш конкретної поради необхідно бачити хворого та результати всіх його обстежень. З повагою лікар-гастроентеролог Наталія Шумлянська.

**Petro (Гість) · Понеділок, лютого 18 2013, 08:11**

### вага

відчуваю час від часу важкість у шлунку, здуття, неприємні відчуття в шлунку чи кишечнику. не так давно виявили хелікобактер пілорі, пройшов курс лікування, на даний момент симптоми маю ті ж самі але все ж таки це все терпимо. Проблема ще й в іншому. При рості 190 см важу приблизно 68 кг. Як можна набрати 10-20 кг, адже при простих заняттях спортом (тренажерний зал) більше 1-2 кг не зміг набрати?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, лютого 19 2013, 04:15 · [Приховати](#) · [#1](#)

Щоб знати як допомогти Вашій проблемі, необхідно визначити причину недостатності ваги. Адже недостатня вага може бути як при різних захворюваннях ШКТ (виразкова хвороба, хронічний панкреатит, ентерит та ін.), так і при інших соматичних та психічних захворюваннях. Отже, Вам необхідно пройти всебічне обстеження. Будемо раді Вам допомогти!

Аня (Гість) · Понеділок, січня 14 2013, 12:27

## Не покоїть мій стан здоров'я. Дайте хоча б свою думку згідно цього

Добрий день! Не знаю чи з цим питанням до вас,але якщо зможете,дайте пораду,будь ласка. Справа в тім,що мене турбує мій кишечник: вздуття живота після кожного прийому їжі,часта відрижка,відходження газів,інколи не частий біль з лівого боку та по всьому животі. Кожного ранку,мене болять крижі. Також,помічала слиз ще давніше до цього всього,його не багато,але він є. Відчуття голоду нема,тому що все прикриває відчуттям переповнюваності.Також буває бурчання в животі і часті закрепи. Це триває вже як два,а то і більше тижнів. Перед Новим Роком,попала в лікарню з підозрою на апендицит,хоча торбував той самий лівий бік. Пролежала три дня і виписали,порекомендувавши просвітити кишечник та дотримуватися дієти. Сходивши до ще двох лікарів-гастроентерологів,я почула,що скоріше всього це коліт.Один лікар запевнив мене в цьому і виписав препарати Lascium і Пангрол 20000,інший сказав здати кал. Кал ще не здала. Два лікаря відмовляють мене просвічувати кишечник,бо не бачуть явних сильних симптомів і покладаються ще навік,бо мені тільки 15 років. Та мене всерівно не покоїть мій стан здоров'я. Вже стільки всього прочитала... Дайте хоча б свою думку згідно цього

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, січня 15 2013, 04:32 · [Приховати](#) · [#1](#)

У Вашому випадку необхідно думати про захворювання кішківника, про глистну інвазію, про харчову непереносимість та інше. Але відповідь можна отримати тільки після обстеження шлунково-кішечного тракту ( ФГДС, кольпоскопія, УЗД ОЧП, лабораторні обстеження ). Нажаль і в 15 років бувають серйозні захворювання.

[МЦ АНІКО](#) · Субота, січня 05 2013, 10:44

## Скажіть чи шкідливі пропіл і метилпарабени? (запитання від Валентини)

У мене діагноз хронічний некаменевий холецистит і анальна тріщина, сфінктерит. Мені прописали дієту на 15 днів, і після цього приймати фестал, щоб не було закрепів.У складі препарату є заборонені пропіл і метилпарабени. Скажіть чи шкідливі вони? І ще я хотіла запитати, чи можна пити льон при холециститі? Завчасно вдячна вам за відповідь.

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Вівторок, січня 08 2013, 12:06 · [Приховати](#) · [#1](#)

До складу медичних препаратів можуть входити речовини які мають відносно негативний вплив на органи , але користь від лікувального ефекту більша. При правильному застосуванні Ви уникнете ( шкідливого впливу) побічної дії.

[МЦ АНІКО](#) · Понеділок, листопада 26 2012, 10:11

## Біль "колюча" в області 3-4 ребра. Як діяти і що це може бути? (питання від Ксенії)

Добрий день. Прокинулася серед ночі від жакливого болю з лівого боку під ребрами. Якщо знизу рахувати, то це в районі 3-4 ребра. саме по собі не болить. але повернутися на бік, кашляти, глибше дихати - боляче. біль "колюча". як діяти і що це може бути?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Середа, листопада 28 2012, 03:00 · [Приховати](#) · [#1](#)

Біль в даній зоні може бути причиною пов'язаною з захворюванням хребта, поразенням нервового ганглію. Конкретні рекомендації можна отримати після попереднього огляду лікаря невролога, травматолога.

Лариса (Гість) · Субота, березня 30 2013, 01:29

## лікування під час годування груддю

чи є у вас консультація по варикозному розширенню вен? які методи лікування? Чи можна лікувати під час годування груддю?

Відповідь від [МЦ АНІКО](#) · Четвер, квітня 04 2013, 11:13 · [Приховати](#) · [#1](#)

Доброго дня! Так, у нас проводиться консультація лікарем-флебологом, щочетверга. Методи лікування є різні. Все залежить від того на якій стадії варикозна хвороба. Вам потрібно записатись на консультацію до лікаря-флеболога за тел.(067)364-31-08, (0362) 43-98-93, 68-49-49 (консультація безкоштовна). На консультації нададуть детальну інформацію щодо Вашої проблеми. Під час годування грудьми лікування протипоказане. Лише еластична компресія панчохою. З повагою МЦ АНІКО.

marjynka

**Перевірка щитовидної залози.**

Додано: 28.02.2011 10:04

Чи можна якимось чином перевірити стан своєї щитовидної залози? Чи можливе лікування на дому?

medisvit\_doctor

Додано: 01.03.2011 17:04

Чи можна якимось чином перевірити стан своєї щитовидної залози? Чи можливе лікування на дому?

Доброго дня, шановний автор запитання! Для визначення стану щитоподібної залози необхідно провести УЗД, що дозволить оцінити структуру щитоподібної залози, і визначити вміст у крові основних гормонів, що характеризують її функцію: вільного тироксину та тиреотропного гормону. Лікування захворювань щитоподібної залози "на дому" можливо, бо зазвичай воно тривале (місяці і навіть роки) і рідко вимагає стаціонарного режиму. Виключеннями є випадки, коли необхідне хірургічне втручання.

З повагою, [лікар-ендокринолог Ляпкало Л.М.](#)

kate\_sobbo

**дитина постійно висовує язичок**

Додано: 06.01.2011 13:43

моя 2 місячна дитина постійно висовує язичок, і навіть часто спить з висунутим язиком. на це звернула увагу невролог і відправила нас до ендокринолога, а ендокринолог говорить що це неврологія....кому вірити і до кого звертатись?

kate\_sobbo

Додано: 06.01.2011 14:06

хотіла ще додати що дитина народилась недоношеною на 34 тижні вагітності, скринінг на ттг в нормі.(0,6) і язичок в неї в період гри постійно в русі, тобто вона його то висовує, то засовує....але все таки наш невролог говорить що він її не подобається, і що нам необхідна консультація ендокринолога! тобто вона хоче щоб виключили гіпотеріоз, незважаючи на результати аналізів! скажіть будь-ласка, які ще повинні бути симптоми у 2 місячної дитини крім висунутого язика, і чи можна стверджувати про наявність хвороби лише за висунутим у дитини язичком?

medisvit\_doctor

Додано: 18.01.2011 16:52

хотіла ще додати що дитина народилась недоношеною на 34 тижні вагітності, скринінг на ттг в нормі.(0,6) і язичок в неї в період гри постійно в русі, тобто вона його то висовує, то засовує....але все таки наш невролог говорить що він її не подобається, і що нам необхідна консультація ендокринолога! тобто вона хоче щоб виключили гіпотеріоз, незважаючи на результати аналізів! скажіть будь-ласка, які ще повинні бути симптоми у 2 місячної дитини крім висунутого язика, і чи можна стверджувати про наявність хвороби лише за висунутим у дитини язичком?

Добрий день, шановний автор питання! Для гіпотиреоза в цьому віці характерно: зміна голосу (стає грубим), дитина погано набирає вагу, є зміни м'язового тону, погіршується стан шкіри. Проте, перебіг захворювання і симптоми індивідуальні, тому виключити або підтвердити наявність захворювання має ендокринолог. Нажаль, Ви не вказуєте які симптоми, крім язика, непокоять невролога. Тобто, з боку нервової системи лікар знаходить патологічні зміни чи ні? При таких скаргах бажано проконсультувати дитину у дитячого хірурга з приводу вуздечки язика, та отоларинголога, для перевірки функціонування носоротоглотки.

З повагою, лікар-терапевт Гнилокурченко А.В.

katy

**харчова алергія**

Додано: 22.08.2011 23:40

В моєї дочки харчова алергія приблизно почалась рік назад(почалось з апльсин висипало все тіло червоними п'ятнами) і з того часу ми дуже часто сидимо на гіперактивній дієті, так як з'їсть чогось з харчовими добавками зразу висипка по цілому тілу. Правда літом алергії не було ні на суниці ні на інші фрукти і овочі(апельсини ми не вживаємо). Алергія виникає після харчових добавок у продуктах наприклад у печеннях різного виду. Підкажіть невже вона не буде їсти нічого з магазинних продуктів. Дочці 5 років

medisvit\_doctor

Додано: 29.08.2011 14:56

В моєї дочки харчова алергія приблизно почалась рік назад(почалось з апльсин висипало все тіло червоними п'ятнами) і з того часу ми дуже часто сидимо на гіперактивні дієті, так як з'їсть чогось з харчовими добавками зразу висипка по цілому тілу. Правда літом алергії не було ні на суниці ні на інші фрукти і овочі(апельсини ми не вживаємо). Алергія виникає після харчових добавок у продуктах наприклад у печеннях різного виду. Підкажіть невже вона не буде їсти нічого з магазинних продуктів. Дочці 5 років

Доброго дня, шановний авто запитання! Алергія на харчові добавки (барвники, стабілізатори, консерванти та ін.) зустрічається дуже часто, і може бути як істинною, так і неправдивою. У будь-якому випадку продуктів з харчовими добавками необхідно уникати. Подібна ситуація дуже часто виникає при порушеннях роботи травної системи. Тому раджу проконсультуватися з лікарем. Доброго Вам здоров'я!

З повагою, [лікар-педіатр-алерголог Шуміліна-Абрамовська Н.В.](#)

lilya777

**Фіброаденома молочної залози**

Додано: 24.03.2011 22:46

Доброго дня! Порадьте будь ласка що робити, мені 20 років, у правій молочної залозі виявили фіброаденому 14х7 мм. Чи обов'язково видаляти чи можливі інші шляхи лікування??? Чи правда, що після операції виникають нові фіброаденоми???

medisvit\_doctor

Додано: 25.03.2011 15:51

Доброго дня! Порадьте будь ласка що робити, мені 20 років, у правій молочної залозі виявили фіброаденому 14х7 мм. Чи обов'язково видаляти чи можливі інші шляхи лікування??? Чи правда, що після операції виникають нові фіброаденоми???

Доброго дня, шановний автор питання!

Нажаль, іншого дієвого методу лікування пухлин молочної залози, окрім хірургічного видалення, не існує. Інакше кажучи, якщо фіброаденома вже утворилася, то вона без операції вже нікуди не дінеться. Звичайно, нагальної потреби оперуватися прямо зараз немає, і найближчі місяці нічого не зміниться. Але ви повинні розуміти, що пухлини молочної залози гормоночутливі, так само, як і нормальна залозиста тканина, і, наприклад, під час вагітності, Ваша фіброаденома може раптово почати рости з ризиком перетворення у злоякісну пухлину. Тому бажано її все-таки видалити.

Після такої операції дійсно можуть виникати нові фіброаденоми, але «після» не означає «внаслідок». Ризик виникнення нової фіброаденоми після операції, такий самий, як і ризик виникнення фіброаденоми у здоровій (не оперованій) молочної залозі.

Бажаю здоров'я!

З повагою, [лікар-онколог, Філоненко А.Г.](#)

