

기준선이 답을 정한다

같은 짝 · 같은 열 · 같은 씨앗인데 배선 하나로 판정이 세 번 뒤집혔다

월드모델 실험실 · 노트 704 · 707 · 709

2026-08-06

1 한 줄

집 밖 짝 세 개에 같은 텍스트 열을 넣고 두 번 잰다. 다른 것은 **판을 어떻게 지었나** 하나다. 판정이 **세 짝 다 바뀌었다** — 앱은 무효에서 유효로, CN 은 미달에서 통과로, KR 은 미달에서 더 미달로. 그리고 **내가 두 번 적은 예측이 두 번 다 틀렸다**.

2 같은 실험을 두 판에서

노트 683 이 “채택에 쓰는 자 다섯 중 넷이 저장소에서 안 돌아간다”를 잰고, 노트 696 이 그 넷을 재건했다(행수 3/3 · 기준선 2/3). 그 위에서 텍스트 열(노트 681 · 695 · 판 신호 몫 +0.0119)을 집 밖 짝으로 옮겨 봤다.

처음 잰을 때 판을 load(base()) 로 지었다. 그런데 노트 696 의 기준선은 champion_data() 에서 나온 값이고, 그것은 _idol(mode='cut', wide_post=True, wide_pop='grades') 로 감싼다.

짝	“없이” 팔 rho		신호 몫	
	잘못 지은 판	챔피언 판	노트 704	노트 707·709
비게임 앱	0.0848	0.4968	0.2169 무효	+0.1094 (4.6배)
CN 만화	0.3742	0.3874	0.0166 미달	+0.0271 (1.23배)
KR 만화	0.6303	0.6831	0.0148 미달	+0.0092 (0.37배)

챔피언 판에서 “없이” 팔이 **세 짝 다 노트 696 의 기록과 소수 넷째 자리까지 같다**(0.4968 · 0.3874 · 0.6831, 차 0.0000). 그래서 오른쪽 두 열은 기록과 같은 자 위에 있다.

주장. 잘못 지은 판 위에서 잰 증분은 “챔피언 위에 더한 것”이 아니라 “빠진 축을 대신 메운 것”일 수 있다. 앱에서 기준선이 0.4968 → 0.0848 로 -0.412 무너졌고, 그 위에서 텍스트 열이 낸 +0.2169 는 챔피언 판에서 +0.1094 로 절반이 됐다. 무효였던 것은 크기이고 존재는 아니었다.

반증 조건. 기준선이 무너진 판에서 잰 증분이 챔피언 판의 증분과 항상 같은 부호라면 이 주장은 약해진다. 여기서는 세 짝 중 하나(KR)에서 부호는 같고 크기가 줄었고, 하나(CN)에서 크기가 늘었다 — 방향이 일정하지 않다는 것이 오히려 근거다.

그래서 관문을 코드에 넣었다

노트 705 부터 러너가 “없이” 팔을 먼저 찍고, 기록 기준선의 3σ 안에 안 오면 그 아래를 읽지 않고 멈춘다. 노트 704 에서 문턱의 9배(0.2169)를 하마터면 채택 후보로 올릴 뻔했고, 그때 막은 것은 코드가 아니라 우연히 기준선을 건져 본 것이었다.

3 내 예측이 두 번 다 틀렸다

	예측	결과	
노트 705 (앱)	미달 · 순효과 음수	+0.1094 · 순효과 +0.0473	둘 다 틀림
노트 708 (KR)	0.02-0.05 로 오름	+0.0092 로 내려감	틀림
노트 708 (CN)	0.01-0.04 미달 쪽	+0.0271 통과	틀림
노트 708 (순효과)	둘 다 양수로	KR 만 음수로 남음	반만




Figure 1: 왼쪽: 같은 열의 신호 뒀이 두 판에서. 검은 선이 문턱이고 세 짝 다 판정이 바뀌었다. 가운데: 챔피언 판에서 “없어” 팔이 기록과 차 0.0000. 오른쪽: 기제 가설 둘이 죽는 그림 — 통과(남색)와 미달(붉은색)이 어느 축으로도 안 갈린다.

노트 705의 근거는 “노트 704가 KR·CN에서 순효과 음수를 봤고 그 기제가 앱에도 적용된다”였다. 노트 708의 근거는 정반대로 “앱에서 강한 판 위에 텍스트가 더 잘 없었으니 만화도 그럴 것”이었다. **한 짝의 기제를 다른 짝으로 옮긴 추론이 두 번 연속 틀렸다.**

주장. 짝 하나에서 얻은 기제를 다른 짝으로 옮기지 않는다. 노트 551·560·563이 “전역 표의 도메인별 차로 처방을 만들지 말라”를 세 번 적었고, 노트 678이 그것을 단일 전환에서 확인했다. **이 논문이 네 번째 자리이고, 이번에는 도메인이 아니라 짝이다.**

반증 조건. 짝이 넷 이상 생기고 기제가 재현되면 옮길 수 있다. 지금은 $n = 3$ 이고 그중 둘이 같은 원천(만화)에서 나왔다.

4 기제 가설 둘이 죽었다

노트 707은 앱이 이긴 이유로 **어휘 겹침의 질**을 지목했다 — 앱은 겹침 0.98·제목당 달은 n-gram 19인데 만화는 1.00·34로, 적게 달는데 이긴다. 그리고 예보 SD가 앱 0.158대 만화 0.097로 갈리는 것을 결정거로 봤다.

KR과 CN이 그 둘을 다 죽였다.

짝	겹침	달은 n-gram	예보 SD	판정
비게임 앱	0.98	19	0.158	통과 (4.6배)
CN 만화	1.00	34	0.109	통과 (1.23배)
KR 만화	1.00	35	0.0967	미달 (0.37배)

CN과 KR은 겹침이 **똑같이** 1.00이고 달은 n-gram이 34대 35다. 예보 SD는 0.109대 0.0967로 **차**가 0.012뿐인데 판정이 갈린다. **그 폭으로 통과와 미달을 가릴 수 없다.**

남는 가설 하나 — 그리고 그것을 주장하지 않는 이유

기준선이 높으면 었을 자리가 없다. 실제로 **KR이 기준선 최고(0.6831)이고 신호 뒀 최저(+0.0092)**다. 그런데 앱(0.4968)이 CN(0.3874)보다 기준선이 높는데 신호 뒀도 더 크다 — **단조가 아니다.**

주장. $n = 3$ 에서 순서를 맞히는 가설은 가설로만 적는다. 세 점 중 둘이 같은 원천(만화)이고 하나가 단조를 깬다. 이 판은 같은 종류의 순서 관측을 세 번 처방으로 바꿨다가 세 번 틀렸다(551·560·563). **넷째 짝이 생길 때 시험한다.**

반증 조건. 넷째 짝(예: JP 이외 애니, 비게임 앱의 다른 갈래)에서 기준선-신호뒀 순서가 재현되면 가설이 산다. 재현 안 되면 여지 가설도 죽는다.

5 채택 상태 — 셋 통과, 하나 미달, 하나 미측정

자	신호 몫	문턱	배수	
판	+0.0119	0.0045	2.6×	통과 · 씨앗 12·40 재현
비게임 앱	+0.1094	0.024	4.6×	통과 · 순효과 +0.0473
CN 만화	+0.0271	0.022	1.23×	통과 · 순효과 +0.0057
KR 만화	+0.0092	0.025	0.37×	미달 · 순효과 -0.0042
날짜 통제 판	—	0.0052	—	미측정

채택하지 않는다. 셋이 남았다. ① 다섯째 자를 안 잤다. ② **CN 이 문턱의 1.23배**로 붙어 있고 씨앗 3 이라 얇다. ③ **KR 순효과가 음수**라 그 짝에서는 이 열이 해롭다 — 채택하면 KR 성적이 내려가는 것을 감수하는 채택임을 명시해야 한다.

주장. 다섯째 자는 판정을 못 바꾼다 — 그것을 미리 적어 둔다. 날짜 통제 판은 판과 상관 +0.88 로 유효 독립 자 수를 4.73/6 으로 떨어뜨린 바로 그 붕괴한 방향이다(노트 629). 판이 2.6배로 통과했으므로 이것도 통과할 가능성이 높고, **그 통과는 새 정보가 아니다.** 실제 판정을 가르는 것은 **CN 의 씨앗 확대**다.

반증 조건. 날짜 통제 판이 미달로 나오면 이 주장이 틀리고, 그것은 판과의 상관 +0.88 이 이 축에서는 성립하지 않는다는 뜻이 된다 — 그 자체로 값있는 결과다.