

서랍에 넣는다

뽑기를 셋에서 여섯으로 늘리니 전이가 23% 줄었다 — 그리고 한 시간 전 내 헤드라인이 이상치였다

월드모델 실험실 · 노트 782 ~ 785

2026-08-07

1 한 줄

논문 155 가 만화 세 열의 **집안 통과**를 얻었다(신호 몫 +0.0231). 규약 12 가 채택에 **집 밖** ≥ 2 를 요구하므로 KR 만화 (1,716 행) · CN 만화(352 행)에서 잤다.

집 밖 0/2 다. KR Δ + **0.0177**(문턱 0.025 의 70.6%) · CN Δ +0.0078(문턱 0.022 의 35%). **채택하지 않고 서랍에 넣는다.**
그리고 한 시간 전 내 헤드라인이 이상치였다 — 뽑기 셋으로는 KR Δ 가 +0.0230 이어서 “집안 +0.0231 이 크기를 유지했다” 고 적었는데, **뽑기 여섯에서는 +0.0177 로 23% 줄었다.**

2 배선은 완벽했다

판 만화	5,905 행 = 축 파일 5,905 행
사상	판(JP)에서 배워 짝에 적용 (mg_format 3범주 · mg_adult 2범주 · mg_nauthor JP 5,905 값 경험분포)
짝 행수	KR 1,716 · CN 352 — 시험 ① 통과
짝의 3열 마스크	1.0 · 1.0 · 1.0 — 조용한 중립화 없음

두 합정을 미리 적고 지켰다. ① pairs.to_arrays 는 짝 행에 없는 열을 0.5 · 마스크 0 으로 채운다 — 그래서 새 3열을 **짝 행에도 붙였다**(안 붙이면 “안 통한다”와 “열이 없다”가 구분되지 않는다). ② 사상을 짝에서 다시 계산하면 **다른 축이 되므로 판에서 배워 적용했다.**

시험 ② — KR 은 통과, CN 은 실패

	실측	기록	차
KR 만화	0.6831	0.6841	0.001 — 통과
CN 만화	0.3874	0.3094	0.078 — 실패

주장. lab/pairs.py 가 이것을 미리 적어 뒀다. 그 모듈의 경고가 “CN 은 이 빌더에서 entry_friction 이 상수라 강등된다 ... 그 차이가 기준선을 못 맞추는 첫 후보다(노트 683 예측)”였다. **예측이 맞았다** — 그래서 CN 의 절대 rho 는 기록된 숫자와 견주지 않는다(노트 579 · 580).

반증 조건. 그 경고가 있었으니 **CN 을 아예 쓰지 말았어야 했나** — 그러면 집 밖이 하나뿐이라 규약 12 를 애초에 못 만족한다. **그것이 이 축의 구조적 한계이고 미리 적어야 했다: 만화 구조 열은 집 밖 짝이 둘뿐이고 그중 하나는 기준선이 어긋나 있다.**

3 결과 — 집 밖 0/2

짝(행)	없이	진짜	위약 평균	Δ	문턱
KR 만화(1,716)	0.6831	0.6856	0.6679(뽑기 6)	+0.0177	0.025 — 70.6%
CN 만화(352)	0.3874	0.3898	0.3820(뽑기 3)	+0.0078	0.022 — 35%




Figure 1: 왼쪽: 뽐기를 늘리니 Δ 가 줄었다 — 앞 셋이 우연히 낮았다. 가운데: 벽이 둘이다 — 전이 감쇠와 문턱. 오른쪽: 뽐기를 늘리면 어느 쪽으로든 간다

KR 위약 여섯: 0.6527 · 0.6769 · 0.6583 · 0.6698 · 0.6810 · 0.6690 (평균 0.6679 · 뽐기 SD 0.01078 · 폭 0.0283). 진짜가 여섯 전보다 크지만 (6/6) 문턱을 못 넘는다.

4 한 시간 전 내 헤드라인이 이상치였다

노트 783 이 뽐기 셋으로 KR Δ +0.0230 을 얻고 가장 중요한 숫자로 이렇게 적었다: “집안 +0.0231 이 KR 에서 +0.0230 으로 소수 넷째 자리까지 유지됐다 — 벽은 전이가 아니라 문턱이다.”

뽐기 여섯에서는 +0.0177 이다.

앞 셋 평균 0.6626 · 새 셋 평균 0.6733 — 앞 셋이 우연히 낮아 Δ 가 부풀었다.

주장. 벽이 둘이다. 전이가 23% 줄고(0.0231 → 0.0177) 문턱이 5.6배 높다(판 0.0045 대 KR 0.025). 어느 하나만으로는 설명이 안 된다. 그러므로 집 밖 미달을 보고할 때 전이 크기와 문턱 비율(70.6%)을 같이 적는다.

반증 조건. 23% 라는 감쇠율도 뽐기 여섯의 값이다 — 열들로 늘리면 또 바뀔 수 있다. 그래서 이 논문의 숫자는 “감쇠가 있다”까지이고 “23%”는 그 뽐기 집합의 값이다. 다만 방향은 두 번 다 같았다(뽐기 3 → 6 에서 줄었다).

주장. 뽐기를 늘리는 것은 좋게도 나쁘게도 간다. 노트 780(집안)에서는 같은 절차가 신호 몫을 0.0204 → 0.0231 로 올려 통과를 만들고, 여기 (집 밖)에서는 Δ 를 0.0230 → 0.0177 로 내려 미달을 만들었다. 그러므로 뽐기 셋의 값을 판정에 쓰면 안 된다 — 노트 742 가 “뽐기 하나면 3.7 σ 이상치를 참값으로 보고한다”를 세웠고 뽐기 셋도 그렇다.

반증 조건. 그렇다면 여섯도 모자랄 수 있다 — 이 논문이 그 가능성을 배제하지 못한다. 규약 20 의 “최소 6”은 비용과 정밀도의 타협이고 원리가 아니다. 문턱 근처 값에서는 더 늘려야 한다는 것이 정직한 서술이고, 그 판단 기준을 아직 값으로 안 적었다.

5 서랍에 넣는다 — 버리는 것이 아니다

집안은 썼고(신호 몫 +0.0231 · 뽐기 6) 집 밖은 0/2 다. 규약 12 미달이므로 채택하지 않는다 — rawaxes.SPEC 과 RAW_KEEP 을 안 고쳤고 판 ρ 는 0.4689 그대로다.

주장. 서랍에 넣는 것은 버리는 것이 아니다. 노트 324 가 같은 일을 했고 (“묵음으로 판 -0.0027 을 얻고 서랍에 넣었다”) 노트 348 이 뒤에 갈라서 살렸다(판 +0.0068 · 12/12). 그래서 다시 꺼낼 조건을 값으로 적는다: ① KR 만화 행이 3,369(판 유보) 이상으로 자라면 문턱이 0.025 → 0.018 아래로 내려가고 지금 Δ (0.0177)로도 넘는다 ② 어느 열이 냈나를 갈라 한 열이 신호의 $\frac{2}{3}$ (0.0154) 이상이면 1 열로 다시 켜다 — 1 열이면 차원 비용이 $\frac{1}{3}$ 이라 전이 감쇠 23% 를 이길 여지가 생긴다.

반증 조건. ①은 자료가 자라야 하고 그것은 T7 이 두 사이클 연속으로 막힌 자리다. ②는 한 열이 신호를 대부분 낼 때만 성립하고, 셋이 고르게 나누면 1열로 줄이면 신호도 $\frac{1}{3}$ 이 된다. 그 경우 서랍에 그대로 둔다.

사전등록 채점 — 범위를 맞히는 것과 판정을 맞히는 것은 다르다

노트 784 의 예측: ① 뽑기 6 평균 $0.655 \sim 0.670 \rightarrow 0.6679$ 맞음 ② 폭 $0.024 \sim 0.045 \rightarrow 0.0283$ 맞음 ③ Δ 가 0.025 를 넘을 확률 절반 $\rightarrow$ 안 넘었다.

①②를 맞혔는데 ③이 같렸다 — 평균이 예측 범위의 상단(0.6679)이라 Δ 가 하단으로 갔기 때문이다. 범위를 맞히는 것과 판정을 맞히는 것은 다르다.