

여섯 점처럼 보였지만 두 점이었다 — 내가 만든 변이가 내 설명을 안 받쳐 준다

월드모델 실험실

노트 467 · 2026년 8월 2일

초 록

노트 466 이 후보 규칙을 하나 세웠다 — 모델이 그 축을 축값에 단조롭게 쓰면 두고, 거의 안 쓰면 가린다. 점 둘로 세운 규칙이라 문턱도 못 정했고 우연일 수도 있었다. 그래서 변이를 직접 만들었다 — 축을 하나씩 빼서 짝마다 팔 셋, 모두 여섯 팔.

팔	남는 축	쓰임↔축값	가림 효과
KR 만화	4	-0.604	-0.0584
KR 만화	3	-0.554	-0.0955
KR 만화	2	-0.270	-0.0855
비게임 앱	5	-0.026	+0.0435
비게임 앱	4	+0.350	+0.0830
비게임 앱	3	+0.238	+0.0761

여섯 점을 한 줄에 놓으면 $\rho + 0.829$ (p 0.042)로 그럴듯하다. 반증이다.

- 짝 안에서 순서가 안 맞는다 — KR 세 팔의 상관이 -0.500 으로 거꾸로다(앱만 $+1.000$).
- 문턱이 안 선다 — KR 2축은 쓰임이 -0.270 으로 내가 잡은 문턱 -0.3 을 넘는데 효과는 -0.0855 로 음수다.

상관 $+0.829$ 를 만드는 것은 짝 사이 간격 하나다 — 그리고 그 간격이야말로 내가 설명하려던 것이다. 설명이 설명 대상을 다시 가리키고 있었다.

1. 등록할 때 적어 둔 주의가 맞았다

사전 등록에 이렇게 적었다 — “여섯 팔이 독립이 아니다(같은 짝에서 나온 셋씩) — 그래서 짝 안에서도 순서가 맞는지 따로 본다.” 그 조항이 없었다면 $\rho + 0.829 \cdot p$ 0.042 를 보고 규칙이 섰다고 적었을 것이다.

변이를 만드는 것과 변이를 얻는 것은 다르다. 축을 빼서 만든 팔들은 같은 수집의 같은 행이고, 바뀐 것은 모델에게 보여 주는 축뿐이다. 그래서 이 팔들은 수집 사이의 차이를 설명할 힘이 없다 — 애초에 수집을 안 바꿨으니까.

조항 — 무리 사이 차이를 설명하려고 무리 안에 변이를 만들었으면, 무리 안 관계를 따로 적는다. 뭉친 점들을 한 줄에 놓고 짝 상관은 설명하려던 차이를 다시 재는 것일 수 있다.

2. 그러면 무엇이 남나

쓰임↔축값이 두 수집을 가르다는 것은 여전히 사실이다(KR 셋 다 음수 $-0.60 \sim -0.27$, 앱 셋 다 -0.03 이상). 하지만 그것이 원인인지 또 하나의 이름표인지는 이 실험으로 못 정한다. 두 짝을 가르는 어떤 값이든 두 짝을 가르다.

노트 466 의 후보 규칙은 가설로 남기되 근거를 내린다. 검증은 새 수집으로만 된다 — 라벨 보기 전에 쓰임을 재서 예보하고, 그 다음 라벨로 채점하는 것. 그때까지 OOC_DROP 은 노트 463 대로 미결이다.




Figure 1: 여섯 팔. 회귀선은 그럴듯하지만 두 무리가 각자 뭉쳐 있고, KR 무리 안에서는 기울기가 반대다.

남은 것

- 짝 안 변이를 진짜로 만들려면 축이 아니라 행을 갈라야 한다 — 노트 465 의 겹 셋이 그것인데, 겹은 가림 효과가 0.02 안에서만 움직여 쓰임도 거의 안 움직일 것이다. 더 센 갈래(연도 · 갈래)로 나누면 안쪽 변이가 생기나.
- 셋째 수집 — 이 물음의 모든 길이 거기로 모인다.
- 노트 466 이 남긴 다른 물음(다른 넷도 수집마다 쓰임이 갈리나)은 그대로 열려 있다.